IO. CHRIST. POLYC. ERXLEBEN

PHIL. D. ATQVE PROF. P. O. IN ACADEMIA GEORGIA AVGVSTA, REG. SOCIET. SCIENT. GOETTING. INSTIT. REG. HISTOR. GOETTING. SOCIET. BATAV. PHILOSOPH. EXPERIMENT. ROTERODAMI DICATAE, SOCIET. REG. OECON. CELLENSIS SODALIS; SOCIET. BEROLIN. NATVR. CVRIOS. MEMBR. HONORAR.

SYSTEMA REGNI ANIMALIS

PER

CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES, VARIETATES

CVM

SYNONYMIA ET HISTORIA ANIMALIVM.

CLASSIS I

MAMMALIA.

Moder, Gottingae, 1777.



Donum Cel. Auctoris.

LIPSIAE

IMPENSIS WEYGANDIANIS

MDCCLXXVII.

SERENISSIMO

ATQVE

POTENTISSIMO PRINCIPI

AC DOMINO

GEORGIO III

MAGNAE BRITANNIAE, FRANCIAE,

HIBERNIAE

REGI

DEFENSORI FIDEI

DVCI BRVNSVICENSIVM ET LVNEBVRGENSIVM

S. R. I. ARCHITHESAVRARIO ET

PRINCIPI ELECTORI

DOMINO SVO CLEMENTISSIMO.

In Academia TVA Goettingensi, REX CLEMENTISSIME eruditus, inque eadem postea constitutus publicus professor, TVISque stipendiis, vt aliis sermonibus et scriptionibus prosim, nutritus, AVGVSTISSIMO TVO NOMINI istum praecipue librum inscribendum iudicaui, quem vix conscripsissem, nisi bibliotheca Georgiae TVAE Augustae maxime adiutus. Ea

 autem

autem potiſſimum cura ſubit animum, vt quae TIBI, REGVM OPTIME, dicantur, TE digna ſint. Heic tamen non habeo, quae excuſationi mihi eſſe poſſint praeter ea, quae olim apud Veſpaſianum ſuum Plinius: et Diis ruſticos multasque gentes ſupplicare, et mola tantum ſalſa litare, qui non habent thura.

MAIESTATI TVAE

deuotiſſimus

Io. Chriſt. Polyc. Erxleben.

PRAEFATIO.

Animus fuit in conſcribendo libro, cuius priorem edo particulam, primo catalogum animalium locupletiorem exhibendi iſtis, qui in ſyſtemate naturae perilluſtris LINNEI, aliisque libris offenduntur, dein ſynonyma plura ex auctoribus collecta tradendi ſuisque quaelibet ſpeciebus tribuendi, quam quae LINNEVS habet, iique qui huius viri immortalis veſtigia preſſere.

Diſpoſui itaque, quae mihi innotuerunt ex Mammalium claſſe animalia, hanc enim ſolam hodie abſolutam edo, tam propriis obſeruationibus, quam auctorum lectione. Genera ſtabiliui, quae mihi maxime naturalia viſa, nullius iurans in verba magiſtri; ſpecierum characteres erui, varietates praecipuas notaui, in has minus tamen curioſus quam in ipſas ſpecies.

Synonyma, cum vix ac ne vix quidem vmquam omnia ex auctoribus colligere me poſſe mox intelligerem, maiorem tamen eorumdem copiam attuli quam quae apud vllum alium occurrit auctorem, cum octo circiter millia ex quadringentis fere voluminibus hauſta ſynonyma ad Mammalia animalia ſpectantia collegerim, inque hoc libro iam ſiſtam. Inter haec autem

ne vnicum quidem esse, quod non ipse euolverim atque ex auctore suo descripserim, fidem dare possum, paucissimis iis exceptis, quae signo peculiari (†) notaui, ex auctoribus desumtis, quos mihi ipsi videre nondum licuit. Varietatum synonyma minus curaui.

Neque autem mutaui synonyma auctorum, ne verbo quidem; quod ab aliis haud bene factum credo; neque latino sermone descripsi, quae alia lingua imposita sunt nomina animalibus ab ipsis auctoribus. Omnia chronologico ordine disposui, vt eo melius ex ipsa synonymia patescat artis progressus, quamuis id incommodi habeat is ordo, vt saepius repetenda essent varia nomina, quae alias magis contrahi potuissent.

In figuris animalium citandis semper fere distinxi bonas a mediocribus, vtrasque a malis et pessimis, nec non quae ex viuo, vt dicunt, paratae sunt, a descriptis. Cum vero nonnullorum auctorum, EDWARDSII, BVFFONII, aliorumque figurae tantum non omnes bonae, imo optimae, sunt, de his raro aliquid monui, nisi vbi notandus erat aliquis defectus.

Nomina animalium, quibus appellantur hodie apud varias orbis gentes, sedulo conquisiui. Maximi heic mihi adiumenti fuit, quod gratissima profecto mente publice testandum est, singularis

gularis beneuolentia, qua collega aestumatissimus, IO. ANDR. DIEZE vir doctiss. nomina animalium hispanica, lusitanica, italica, anglica, saepe etiam gallica, quae compilaueram, accuratius examinare, corrigere vehementerque augere aliis mihi plane ignotis voluit. Hoc scilicet studio pro ea, qua pollet vir doctissimus erga omnes litterarum cultores humanitate, eaque qua me suscepit amicitia, eo magis gratum vtileque lectoribus opus profecto effecit; me vero sibi obstrictissimum reddidit, qui praeter ea cum reliquis, qui bibliothecae academicae Georgiae Augustae praesunt viris doctissimis, libris mihi nondum notis ad scopum meum facientibus indigitandis afferendisque maxime proficuum operi, quod hic sisto, se praebuit.

Libros porro aliquot in bibliotheca academica nondum exstantes rarioresque, pro suo in me fauore lubentissime, quod gratissima recolo mente, communicauit CHRIST. GVIL. BÜTTNER vir doctiss.

Iniustum autem foret, si intactum illaudatumque hic dimitterem IVST. CHRIST. LODER virum clariss. historiae naturalis atque medicae artis cultorem apud nos felicissimum, quem praecipue adiutorem, cumque indefessum maxime atque sedulum, habui in colligendis atque ordi-

nandis nominibus ex Russorum, Tungusorum, Buraetorum etc. linguis desumtis. Nil vere sine isto in his praestitissem, cum ne legere quidem, quae Russorum characteribus scripta sunt, ante sciuerim, quam amicitia viri clarissimi frui licuerit.

Absoluto denique opere, typisque fere exscripto, hungarica animalium mammalium nomina beneuole communicauit Generosissimus IOSEPHVS DE PODMANICZKY, Nobilis Hungarus, notato simul adiectis in parenthesi litteris sono, quo pronuntianda sunt. Haec eo gratiora fore lectoribus iudicaui, quo rarius apud alios occurrunt auctores, addidique sub fine voluminis.

Atque haec fere sunt, quae monenda heic habui. Simili studio et reliquas regni animalis classes complecti animus est, multaque eo facientia iam collegi; quando vero alteram, Auium, classem absoluere liceat, multis aliis negotiis obrutus hactenus nescio. Goettingae, mense Nouembri, CIↃIↃCCLXXVI.

CATA-

CATALOGVS

Voluminum eorumque editionum quibus vſus ſum.

Act. holmienſ. Der königl. ſchwed. Academie der Wiſſenſchaften Abhandlungen, aus dem Schwed. überſ. durch Abr. Gotth. Käſtner, Hamb. et Lipſ. 1749 ſeqq. 8 mai.

Act. nidroſ. Der Drontheimiſchen Geſellſchaft Schriften, aus dem Däniſchen überſ. Hafn. 1765 ſeqq. 8.

Act. vpſal. Acta ſocietatis regiae ſcientiarum vpſalienſis, Holm. 1744 ſeqq. 4.

Adanſ. Seneg. Hiſtoire naturelle du Senegal, par M. Adanſon, à Paris 1757, 4 mai.

Aelian. anim. Aeliani de natura animalium Libri XVII cum animaduerſionibus Conr. Geſneri et Dan. Wilh. Trilleri, curante Abr. Gronouio, Lond. 1744, 4 mai.

Agric. an. ſubt. Georgii Agricolae de animantibus ſubterraneis liber, Witteb. 1614, 8.

Agric. monogr. Ioh. Georg. Agricola von des Hirſchens Natur und Eigenſchaft, Amberg. 1603, 4. †

Albin birds A natural hiſtory of birds illuſtrated with a hundred and four Copper-plates, by Eleaz. Albin, Lond. 1731-1738, 4; Vol. I-III.

Aldrov. biſulc. Vlyſſ. Aldrouandi quadrupedum omnium biſulcorum hiſtoria, Bonon. 1642, fol.

Aldrov. digit. Vlyſſ. Aldrouandi de quadrupedibus digitatis viuiparis L. III et de quadrupedibus digitatis ouiparis L. II Bonon. 1645, fol.

Aldrov. ornith. Vlyff. Aldrouandi ornithologia, Bonon. 1646, fol. Tom. I-III.

Aldrov. pifc. Vlyff. Aldrouandi de pifcibus L. V et de Cetis Lib. vnus, Bonon. 1638, fol.

Aldrov. folid. Vlyff. Aldrouandi de Quadrupedibus folidipedibus L. Bonon. 1647, fol.

Aleff. quadrup. Animali quadrupedi tolti dal naturale diffegnati, incifi e miniati co i lor veri colori da Innoc. Aleffandri e Pietr. Scataglia, in Venez. 1771 - 1775, fol. mai. Tom. I-IV.

Allam. Buff. hift. nat. Editio batava operis Buffcniani, quam curavit doctiff. Allamand. †

Alpin. Aeg. Profp. Alpini hiftoria Aegypti naturalis, Lugd. bat. 1735, 4.

Anderf. Isl. Herrn Ioh. Anderfon Nachrichten von Island, Grönland und der Straffe Davis, Frankf. und Leipz. 1747, 8.

Anfon voy. A voyage round the world in the years 1740, 1, 2, 3, 4 by George Anfon Efq. compiled — by Rich. Walter Lond. 1748, 4 mai.

Argenf. Molucc. The difcovery and conqueft of the Molucco and Philippine Islands, written in Spanifh by Bartholomew Leonardo de Argenfola, Lond. 1708, 4.

Arift. hift. anim. Ariftotelis hiftoria de animalibus, Iul. Caef. Scaligero interprete, cum eiusdem commentariis, Tolof. 1619, fol.

Art. defcript. Petr. Artedi Defcriptiones fpecierum pifcium, Lugd. bat. 1738, 8.

Art. gen. Petr. Artedi genera pifcium, Lugd. bat. 1738, 8.

Art. fynon. Petr. Artedi fynonymia nominum pifcium, Lugd. bat. 1738, 8.

Bancr. Guian. An effay on the natural hiftory of Guiana in South America, in feveral letters from a Gent-

a Gentleman of the medical faculty (Edw. Bancroft) Lond. 1769, 8 mai.

Barbot Guin. A deſcription of the Coaſts of North and South-Guinea and of Ethiopia inferior, vulgarly Angola, by Iohn Barbot; *in Churchill's collect. II p.* 1.

Barr. Fr. équ. Eſſai ſur l' hiſtoire naturelle de la France équinoxiale, par Pierre Barrere, à Paris 1749, 12.

Barthol. act. hafn. Thom. Bartholini Acta medica et philoſophica hafnienſia ann. 1671 et 1672 Hafn. 1673 ſeqq. 4.

Baub. monogr. Caſp. Bauhini de lapidis Bezaar ortu, natura, differentiis veroque vſu Liber, Baſil. 1613, 8.

Bell trav. Travels from St. Petersburg in Ruſſia to diverſe parts of Aſia by Iohn Bell, Glasgow 1763, 4; Tom. I et II.

Bellon. aquat. Petr. Bellonii de aquatilibus Libri II, Pariſ. 1553, 8 long.

Bellon. obſ. Petri Bellonii obſeruationes tribus libris expreſſae, Antwerp. 1605, fol.

Bellon. oiſ. L'hiſtoire de la nature des oyſeaux avec leurs deſcriptions et naïfs portraicts retirez du naturel par Pierre Belon du Mans, à Paris 1555, fol.

Bellon. poiſſ. L' hiſtoire naturelle des eſtranges poiſſons marins, par Pierre Belon du Mans, à Paris 1551, 4.

Bergen orat. Car. Aug. a Bergen oratio de Rhinocerote, Francof. ad V. 1746, 4. †

Berl. Samml. Berliniſche Sammlungen zur Beförderung der Arzneywiſſenſchaft, der Naturgeſchichte etc. Berolin. 1768 ſeqq. 8.

Bernier voy. Voyages de François Bernier, contenant la deſcription des etats du Grand Mogol etc. à Amſterd. 1699, 12; Tom. I, II.

Blumenb.

Blumenb. gen. hum. var. Io. Frid. Blumenbach diſputatio de generis humani varietate natiua, Goett. 1775, 8.

Bom. dictionn. Dictionnaire raiſonné univerſel d'hiſtoire naturelle par M. Valmont de Bomare, à Paris 1768, 4 mai. Tom. I-IV.

Bont. Ind. or. Iacobi Bontii hiſtoriae naturalis et medicae Indiae orientalis L. VI cum Guil. Piſonis de Indiae vtriusque re naturali et medica L. XIV Amſtel. 1658, fol.

Borr. Cochinch. An Account of Cochinchina by Chriſtopher Borri; *in Churchill's collection II p.* 787.

Boſſm. Guin. Reiſe nach Guinea durch Wilh. Boſſmann, Hamb. 1708, 8.

Boullaye voy. Les voyages et obſervations du Sieur de la Boullaye-le-Gouz, à Paris, 1657, 4.

Bradl. nat. A philoſophical account of the works of nature, by Rich. Bradley, Lond. 1721, 4 max.

Bresl. Samml. Sammlung von Natur- und Medicin-wie auch hierzu gehörigen Literaturgeſchichten, Leipz. 1717-1730, 4.

Brick. North-Carol. The natural hiſtory of North-Carolina, by Iohn Brickell, Dublin, 1737, 8.

Briſſ. regn. an. Regnum animale in claſſes IX diſtributum: Le regne animal diviſé en IX claſſes, par M. Briſſon, à Paris 1756, 4 mai.

Brown. Iam. The civil and natural hiſtory of Iamaica, by Patrick Browne, Lond. 1756 fol.

Bruin Reiz. Cornelis de Bruins Reizen over Moskovie, door Perſie en Indie, Amſterd. 1711 fol.

Buff. hiſt. nat. Hiſtoire naturelle générale et particuliére, avec la deſcription du cabinet du Roi, par MM. de Buffon et D'aubenton, à Paris 1749-1767, 4 mai. Tom. I-XV.

Caeſ. Gall. C. Iul. Caeſaris de bello gallico Libri VIII.

Caſtelli monogr. De hyaena odorifera ἐξετάσις Petri Caſtelli, Francof. 1641, 12.

Catesb.

Catesb. Carol. The natural hiſtory of Carolina, Florida and the Bahama Islands by Mark Catesby, Lond. 1731, fol. mai. Tom. I, II.

Cauche Madag. Relations veritables et curieuſes de l'isle de Madagaſcar et du Breſil, à Paris, 1651, 4.

Chardin voy. Voyages du Chevalier Chardin en Perſe et autres lieux de l'Orient, à Amſt. 1735, 4; Tom. I-IV.

Charlet. exerc. Gualt. Charletoni exercitationes de differentiis et nominibus animalium, Oxon. 1677, fol.

Charlev. nouv. Fr. Hiſtoire et deſcription generale de la nouvelle France, par le P. de Charlevoix, à Paris 1744, 4; Tom. I-III.

Churcb. collect. A collection of voyages and travels, Lond. 1704, fol.

Cieza Peru The ſeventeen years travels of Peter de Cieza through the mighty Kingdom of Peru, Lond. 1709, 4.

Cluſ. exot. Car. Cluſii exoticorum L. X Antwerp. 1605, fol.

Columm. aquat. Aquatilium et terreſtrium aliquot animalium aliarumque naturalium rerum obſeruationes Fabio Columna auctore; *in* Eiusdem minus cognitarum rariorumque ſtirpium Ecphraſi, Rom. 1616, 4.

Comm. petrop. Commentarii academiae ſcientiarum imperialis petropolitanae, Petrop. 1726 - 1752, 4 mai. Tom. I- XIV.

Condam. voy. Relation abregée d'un voyage fait dans l'interieur de l'Amerique méridionale par M. de la Condamine, à Paris, 1745, 8.

Cranz. Groenl. Dav. Cranz Hiſtorie von Grönland, Barby, 1765, 8.

Dampier voy. Nouveau voyage autour du monde par Guill. Dampier, à Rouen 1723, 8; Tom. I-V.

Dapp. Afr.	Umständliche und eigentliche Beschreibung von Africa, durch O. Dapper, Amsterd. 1670, fol.
De la Caille voy.	Iournal historique du voyage fait au Cap de bonne esperance, par M. de la Caille, à Paris 1763, 12.
Della Valle voy.	Les fameux voyages de Pietro della Valle à Paris 1662, 4; Tom. I-IV.
Des March. voy.	Voyage du Chevalier Des Marchais en Guinée, à Amsterd. 1731, 8, Tom. I-IV.
Dictionn. anim.	Dictionnaire raisonné et universel des animaux par M. D. L. C. D. B. à Paris 1759, 4 mai. Tom. I-IV.
Dierev Acad.	Relation du voyage du Port Royal de l' Acadie ou de la nouvelle France, par M. Diere'ville, à Amsterd. 1710, 8.
Dobbs Hudf.	An account of the countries adjoining to Hudson's bay by Arthur Dobbs Esq. Lond. 1744, 4.
Du Halde Chin.	Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, par le P. I. B. du Halde, à la Haye 1736, 4; Tom. I-IV.
Du Pratz Louis.	Histoire de la Louisiane, par M. Le Page du Pratz, à Paris 1758, 8; Tom. I-III.
Du Tertre Antill.	Histoire generale des Antilles par le R. P. Du Tertre, à Paris 1667, 4; Tom. I-III.
Edw. birds	A natural history of Birds, by George Edwards, Lond. 1743-1751, 4; Tom. I-IV.
Edw. glean.	Gleanings of natural history, by George Edwards Lond. 1758-1764, 4; Tom. I-III.
Edw. monogr.	Edwards Beschreibung des Sanglins oder kleinern Cagui, Hamb. 1773, 4.
Egede Groenl.	Description et histoire naturelle du Groenland par M. Egede, à Copenh. 1763, 8.

Ellis

Ellis Hudſ. Heinr. Ellis Reiſe nach Hudſons Meerbuſen, Goett. 1750, 8.

Fermin Surin. Phil. Fermins hiſtoriſch phyſikaliſche Beſchreibung der Kolonie Surinam, aus dem Franz. überſ. Berlin 1775, 8; Tom. I, II.

Fernand. anim. Hiſtoriae animalium et mineralium nouae Hiſpaniae lib. I Franc. Fernandez authore; *in Hernandezii (eiusdem auctoris) rer. medic. theſauro.*

Feuill. Iourn. Iournal des obſervations, phyſiques, mathematiques et botaniques, faites par l'ordre du Roi ſur les côtes orientales de l'Amerique meridionale etc. par le R. P. Louis Feuillée, à Paris 1714, 4; Tom. I-III.

Flacourt Madag. Hiſtoire de la grande isle Madagaſcar, compoſée par le Sieur de Flacourt, à Paris 1658, 4.

Forsk. fn. orient. Petr. Forskål faunae orientalis conſpectus; in eiusd. deſcriptionibus animalium quas in itinere orientali obſeruauit, Haun. 1775, 4.

Frezier voy. Relation du voyage de la mer de Sud aux côtes du Chili, du Perou et du Breſil, par M. Frezier, à Amſt. 1717, 8; Tom. I, II.

Friſch Vögel Ioh. Leonh. Friſch Vorſtellung der Vögel in Teutſchland, Berlin, fol.

Froger voy. Relation d'un voyage fait en 1695, 1696 et 1697 aux côtes d'Afrique, Detroit de Magellan, etc. par le Sieur Froger, à Paris 1699, 8.

Garc. arom. Aromatum et ſimplicium aliquot medicamentorum apud Indos naſcentium hiſtoria conſcripta a D. Garçia ab Horto; *in Cluſii exot.*

Geſn. aquat. Conr. Geſneri hiſtoriae animalium Lib. IIII qui eſt de piſcium et aquatilium animantium natura, Tiguri 1558, fol.

Gesn. av. Conr. Gesneri historiae animalium Lib. III qui est de auium natura, Tiguri 1555 fol.

Gesn. Fischb. Conr. Gesneri vollkommenes Fischbuch, Frankf. 1670, fol.

Gesn. quadrup. Conr. Gesneri historiae animalium Lib. I de Quadrupedibus viuiparis, Tiguri 1551 fol.

Gesn. Thierb. Allgemeines Thierbuch, durch Conr. Gesnerum in lateinischer Sprache beschrieben, durch Conr. Forerum ins Teutsche übers. Frankf. 1669, fol.

I. G. Gmel. Sibir. Ioh. Georg Gmelins Reise durch Sibirien, Goett. 1751, 8; Tom. I-IV.

S.G.Gmelin Reis. Sam. Georg. (*erronee pro Gottlieb*) Gmelins Reise durch Rufsland zur Untersuchung der drey Naturreiche, Petersb. 1770 sqq. 4 mai. Tom. I-III.

Grab. monogr. Io. Andr. Grabae elaphographia s. descriptio Cerui, Ien. 1667, 8. †

Grew mus. reg. soc. Musaeum regalis societatis, or a Catalogue and description of the rarities belonging to the Royal Society, by Nehem. Grew, Lond. 1686, fol.

Gronov. zooph. I. Laur. Theod. Gronouii Zoophylacii Gronouiani fasciculus primus, Lugd. bat. 1763, fol.

Gum. Orin. El Orinoco illustrado y defendido, por el Padre Ioseph Gumilla, en Madrid 1745, 4; Tom. I, II.

Hallen vierf. Die Naturgeschichte der Thiere in sistematischer Ordnung. Die vierfüssigen Thiere, von Ioh. Sam. Haller (falso pro Hallen) Berl. 1757, 8.

Hartenfels monogr. Elephantographia curiosa, seu Elephanti descriptio, authore D. Geo. Chph. Petri ab Hartenfels, Erford. 1715, 4.

Hasselqu. Palaest. Frid. Hasselquists Reise nach Palaestina, aus dem Schwed. übers. Rostock 1762, 8 mai.

Hawkesw.

Hawkesw. Seereis. Geschichte der Seereisen und Entdeckungen im Südmeer von Ioh. Hawkesworth, aus dem Engl. übers. von Ioh. Frid. Schiller, Berlin 1774, 4 mai. Tom. I-III.

Heins. monogr. Vdalr. Heinsii dissertatio de Alce, Ien. 1697, 4.

Hernand. Mex. Rerum medicarum nouae Hispaniae thesaurus, seu plantarum, animalium, mineralium mexicanorum historia, ex Franc. Hernandez relationibus a Nardo Ant. Reccho collecta, Rom. 1651, fol.

Hill anim. An history of animals, by Iohn Hill, Lond. 1752, fol.

Hist. de l'acad. Histoire de l'academie royale des sciences, avec les mémoires, à Paris 1699 seqq. 4.

Höchstr. Lapp. Petr. Höchströms Beschreibung von dem unter Schwedischer Crone gehörigen Lappland, aus dem Schwed. übers. von Templin, 1748, 8.

Houtt. nat. hist. Natuurlyke historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineralien, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus, Amsterd. 1761 seqq. 8 mai.

Hugh. Barbad. The natural hystory of Barbados by the reverend Mr. Griffith Hughes Lond. 1750 fol.

Hulden monogr. Phil. Lib. ab Hulden multifariae vtilitatis Rangifer, Ien. 1696, 4.

Iacob. mus. reg. Museum regium seu catalogus rerum tam naturalium quam artificialium quae in Basilica bibliothec. augustiss. Daniae Monarchae asseruantur descriptus ab Olig. Iacobaeo, Hafn. 1696, fol.

Ionst. av. Io. Ionstoni theatrum vniuersale de auibus Heilbr. 1756, fol.

Ionst. quadrup. Io. Ionstoni theatrum vniuersale omnium animalium quadrupedum, Heilbr. 1755, fol.

Ionſt. piſc.	Io. Ionſtoni hiſtoriae naturalis de piſcibus et cetis Libri V, Heilbr. 1767, fol.
Kaempf. amoen. exot.	Engelb. Kaempferi amoenitatum exoticarum politico-phyſico-medicarum faſciculi V, Lemgou. 1712, 4.
Kaempf. Iapon.	The hiſtory of Iapan, by Engelb. Kaempfer, Lond. 1727, fol.
Kalm Amer.	Pet. Kalms Beſchreibung der Reiſe nach dem nördlichen America, Goett. 1759, 8; Tom. I-III.
Klein. miſſ. piſc.	Iac. Theod. Klein hiſtoriae piſcium naturalis promouendae miſſus I-V, Ged. 1040-1749, 4 mai.
Klein. prodr. av.	Iac. Theod. Klein hiſtoriae auium prodromus, Lubec. 1750, 4.
Klein. quadrup.	Iac. Theod. Klein Quadrupedum diſpoſitio breuisque hiſtoria naturalis, Lipſ. 1751, 4.
Knorr delic.	Deliciae naturae ſelectae, oder auserleſenes Naturaliencabinet ehemals herausgegeben von Georg. Wolfg. Knorr, beſchrieben von Phil. Lud. Stat. Müller Nürnb. 1766 fol. mai. Tom. I, II.
Knox Ceylon.	An hiſtorical relation of the Island Ceylon, by Rob. Knox, Lond. 1681, fol.
Kolbe Vorgeb.	Vollſtändige Beſchreibung des africaniſchen Vorgebirges der guten Hoffnung von M. Pet. Kolben, Nürnb. 1709, fol.
Kram. Auſtr.	Guil. Henr. Kramer elenchus vegetabilium et animalium per Auſtriam inferiorem obſervatorum, Vienn. 1756, 8.
Laet Amer.	Nouus orbis ſeu deſcriptionis Indiae occidentalis L. XVIII auth. Io. de Laet, Lugd. bat. 1633, fol.
Laur. muſ. reg.	Muſeum regium ſeu catalogus rerum tam naturalium quam artificialium etc. ab Olig. Iacobaeo quondam deſcriptus, nunc vero illuſtratus accurante Ioh. Lauerentzen Hafn. fol.

Lawſon

Lawſon Carol. A new voyage to Carolina, by Iohn Lawſon' Lond. 1709, 4. *Conuenit cum editione hac etiam pagina altera ſub titulo:* the Hiſtory of Carolina by Iohn Lawſon, Lond. 1718, 4; *cui icones additae ſunt, quas non reperio in priore.*

Laxm. Sibir. br. M. Erich Laxmann's Sibiriſche Briefe herausgegeben von Aug. Ludw. Schlözer, Goett. 1769, 8.

Ligon Barbad. A true and exact hiſtory of the Island of Barbados, by Rich. Ligon, Lond. 1657 fol.

Linn. amoen. acad. Car. Linnaei amoenitates academicae, Holm. 1749-1769, 8 mai. Tom. I-VII. *Tomi prioris editione lugdunenſ.* 1749 *vſus ſum.*

Linn. fn. ſuec. 1. Car. Linnaei Fauna ſuecica, Lugd. bat. 1746, 8.

Linn. fn. ſuec. 2. Car. Linnaei Fauna ſuecica, ed. altera auctior, Stockh. 1761, 8.

Linn. Gothland. } *Linn. Oeland.* } Carls von Linné Reiſen durch Oeland und Gothland, aus dem Schwed. überſ. Halle 1764, 8.

Linn. mant. II. Car. a Linné mantiſſa plantarum altera, Holm. 1771, 8. mai.

Linn. muſ. Ad. Frid. I. Car. Linnaei Muſeum Adolphi Friderici Regis, Stockh. 1754, fol. mai.

Linn. muſ. Ad. Frid. II. Car. a Linné Muſeum Adolphi Friderici Regis, Tomi II prodromus, Holm. 1764, 8. mai. cum muſeo Lud. Vlr. reginae.

Linn. Schon. Carl Linnaei Verſuche einer Natur-Kunſt- und Oeconomie hiſtorie von einigen ſchwediſchen Provinzen, Leipz. 1756, 8.

Linn. ſyſt. nat. 2. Car. Linnaei ſyſtema naturae, Holm. 1740, 8. *Vſus ſum quinta editione, Hall.* 1747 *quae conuenit cum ſecunda.*

Linn. ſyſt. nat. 6. Car. Linnaei ſyſtema naturae, Holm. 1748, 8. *Vſus ſum editione ſeptima, Lipſ.* 1748, *quae conuenit cum ſexta.*

Linn. ſyſt. nat. 10. Car. Linnaei ſyſtema naturae, ed. 10 reformata, Holm. 1758, 8 mai.

Linn. syst. nat. 12. Caroli a Linné Systema naturae, ed. 12 reformata, Holm. 1766, 8. mai.

Linn. Westgoth. Carls von Linné Reisen durch Westgothland, aus dem Schwed. übers. Halle 1765, 8.

Lobo Abiss. Voyage historique d'Abissinie du R. P. Ierome Lobo, de la comp. de I. trad. du Portugais par M. le Grand, Amsterd. 1728, 8; Tom. I, II.

Ludolf. Aeth. Iobi Ludolfi historia aethiopica, Francof. 1681, fol.

Ludolf. comment. Iobi Ludolfi ad suam historiam aethiopicam commentarius, Francof. 1691, fol.

Maillet Aeg. Description de l'Egypte composée sur les mémoires de M. de Maillet par M. l'abbé le Mascrier, à Paris 1735, 4.

Mandelsl. Reis. Ioh. Albr. von Mandelslo morgenländische Reisebeschreibung, Schlesw. 1658, fol.

Marcgr. Brasil. Georg. Marcgrauii de Liebstad historiae rerum naturalium Brasiliae Libri VIII, cum Gail. Pisonis de medicina brasiliensi L. IV Lugd. bat. 1648, fol.

Marii monogr. Io. Marii Castorologia explicans Castoris animalis naturam et vsum, Aug. Vind. 1685, 8.

Marmol Afr. L'Afrique de Marmol, à Paris 1667, 4 Tom. I, II.

Mart. Buff. vierf. Herrn von Buffons Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere, mit Vermehrungen aus dem Franz. übers. Berl. 1772 seqq. 8.

Mart. Naturlex. Friedr. Heinr. Wilh. Martini allgemeine Geschichte der Natur in alphabetischer Ordnung, Berl. 1774 seqq. 8 mai.

Mart. Spitzb. Frid. Martens Spitzbergische oder Grönländische Reisebeschreibung, Hamb. 1675, 4.

Maupert. oeuvr. Oeuvres de Maupertuis, Lyon, 1768, 8; Tom. I - IV.

Mem. de l'acad. vid. *Hist. de l'acad.*

Merian. Surin. Mar. Syb. Meriaen over de Voortteeling en wonderbaerlyke Veranderingen der Surinamsche Insecten, t'Amsterd. 1719, fol.

Meroll.

Meroll. Cong. A voyage to Congo and feveral other Countries in the fouthern Africk by Ierom Merolla da forrento; *in Church. collect. I p.651.*

Meyer Thiere Ioh. Dan. Meyers Vorftellung allerhand Thiere und ihrer Scelete, Nürnb. 1748 feqq. fol. Tom. I-III.

Moncon. voy. Iournal des voyages de Monfieur de Monconys, à Lyon, 1665, 4; Tom. I, II.

Moor. trav. Travels into the inland part of Africa by Francis Moore, Lond. absque anno, 8.

Mort. Northampt. The natural hiftory of Northampton-fhire, by Iohn Morton, 1712, fol.

Müll. Dan. prodr. Zoologiae danicae prodromus, auct. Oth. Frid. Müller, Haun. 1776, 8.

Müll. Naturf. Des Ritters Carl von Linné vollftändiges Naturfyftem, ausgefertiget von Phil. Ludw. Stat. Müller, Nürnb. 1773-1776, 8; Tom. I-VI et Suppl.

Müll. Samml. Sammlung ruffifcher Gefchichte, Petrop. 1732 feqq. 8.

Muf. Befler. Rariora Mufei Besleriani, quae olim Bafil. et Mich. Rup. Besleri collegerunt, commentariolo illuftrata a Io. Henr. Lochnero, 1716, fol.

Muf. Worm. Mufeum Wormianum, feu hiftoria rerum rariorum etc. Lugd. bat. 1655, fol.

Naturf. Der Naturforfcher, Halle 1774 feqq. 8 mai.

Neuh. Gefandfch. Die Gefandfchaft der Oftindifchen Gefelfchaft an den Tartarifchen Cham durch Ioh. Neuhof, Amfterd. 1666, 4 mai.

Nieremb. hift. nat. Io. Eufeb. Nierembergii hiftoria naturae maxime peregrinae, Antwerp. 1635, fol.

Nieub. Brafil.
Nieub. Eaft. Ind. } Voyages and Travels into Brafil and the Eaft-Indies, by Mr. Iohn Nieuhoff; *in Church. Collect. II p. 1.*

Nov. comment. petr. Noui commentarii academiae fcientiarum imperialis petropolitanae, Petrop. 1750 feqq. 4.

Ol. Magn. ſept. Hiſtoria de gentibus ſeptentrionalibus, autore Olao Magno, Rom. 1555, fol. min.

Olear. Gott. Kunſtk. Gottoifiſche Kunſtkammer, durch Adamum Olearium, Schlesw. 1674, 4.

Olear. Reiſ. Vermehrte newe Beſchreibung der Muſcowitiſchen und Perſiſchen Reyſe durch Adam Olearius Aſcanius, Schlesw. 1656, fol.

Oppian. cyneg. Oppiani de venatione Lib. IV de piſcatu LV ſtudio et opera Conr. Rittershuſii, Lugd. bat. 1597, 8.

Osb. Oſtind. Pet. Osbeck Reiſe nach Oſtindien und China, aus dem Schwed. überſ. Roſtock 1765, 8.

Ovalle Chile Alonſo de Ovalle hiſtorical relation of the Kingdom of Chile; *in Church. collect. III p.* 1.

Pallas miſcell. P. S. Pallas miſcellanea zoologica, quibus nouae imprimis atque obſcurae animalium ſpecies deſcribuntur, Hag. Com. 1766, 4.

Pallas Reiſ. P. S. Pallas Reiſe durch verſchiedene Provinzen des Ruſſiſchen Reichs, St. Petersb. 1771 ſeqq. 4 mai.

Pallas ſpicil. Petri S. Pallas ſpicilegia zoologica, Berol. 1767 ſeqq. 4 mai.

Parſons monogr. Die natürliche Hiſtorie des Nashorns von D. Parſons aus dem Engl. von Georg Leonh. Huth, Nürnb. 1747, 4.

Paullini monogr. { Chriſt. Franc. Paullini Talpa, Francof. 1689, 8. Chriſt. Franc. Paullini Lagographia curioſa ſ. leporis deſcriptio, Aug. vind. 1691, 8. † }

Penn. brit. zool. Britiſh Zoology, Lond. 1763 ſeqq. fol. mai.

Penn. ind. zool. Indian Zoology, by Thom. Pennant, Lond. 1769, fol.

Penn. ſyn. quadr. Synopſis of Quadrupeds, Cheſter, 1771. 8.

Pernetty voy. Hiſtoire d'un voyage aux isles Malouines fait en 1763 et 1764 par Dom Pernetty, à Paris 1770, 8; Tom. I, II.

Perr. anim. Memoires pour ſervir à l'hiſtoire naturelle des animaux, par M. Perrault; *in Memoires de*

de l' acad. roy. des sciences depuis 1666 *jusqu'* à 1699 *Tom. III Part. I - III*, 4.

Petiv. gazoph. Iac. Petiveri Gazophylacium naturae et artis, Lond. 1702 seqq. fol.

Philos. transact. Philosophical Transactions; notissimum opus prodiens ab anno inde 1665, Lond. 4.

Pis. Ind. Guil. Pisonis de Indiae vtriusque re naturali et medica L. XIV, Amstel. 1658, fol.

Plin. hist. nat. C. Plinii Secundi naturalis historiae Libri XXXVII. Citaui capita editionum vulgarium, et Harduini.

Pocock. orient. A description of the East and some other Countries by Rich. Pococke, Lond. 1743, fol. Tom. I, II.

Pontopp. Dan. Den Danske Atlas, eller Konge-Riget Dannemark med dets naturlige Egenskaber, etc. forestillet — ved Erich Pontoppidan, Kiobenh. 1763-1769, 4; Tom. I - V.

Purch. Pilgr. Purchas his Pilgrimes, Lond. 1625 fol. Tom. I-V.

Rai. syn. pisc. Io. Raii synopsis methodica piscium, Lond. 1713, 8.

Rai. syn. quadr. Synopsis methodica animalium quadrupedum et serpentini generis, auct. Io. Raio, Lond. 1693, 8.

Rauwolf. Reis. Beschreibung der Reyss Leonhardi Rauwolfen, so er vor dieser Zeit gegen Aufgang in die Morgenländer selbst vollbracht, Frankf. 1582, 4; Tom. I-III.

Red. opusc. Franc. Redi Opuscula varia physiologica, Lugd. bat. 1729, 2; Tom. I-III.

Riding. jagdb. Th. Abbildung der jagdbaren Thiere mit derselben angefügten Fährten und Spuhren von Ioh. El. Ridinger, Augsb. 1740, fol. mai.

Rochef. Antill. Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l'Amerique (par Rochefort) à Rotterd. 1665, 4.

Rondel. aquat. Guil. Rondeletii vniuerſae aquatilium hiſtoriae pars altera, Lugd. 1555, fol.

Rondel. piſc. Guil. Rondeletii libri de piſcibus marinis, Lugd. 1554, fol.

Rumph. herb. amb. auct. Geo. Everh. Rumphii herbarii amboinenſis auctuarium, cura et ſtudio Ioh. Burmanni, Amſt. 1755, fol.

Ruſſ. Alepp. The natural hiſtory of Aleppo and parts adjacent, by Alex. Ruſſel M. D. Lond. 1756, 4 mai.

Rytſchk. Orenb. Orenburgiſche Topographie verfaſſet von Peter Rytſchkov, Riga 1772, 8; Tom. I, II.

Rzacz. Polon. Hiſtoria naturalis curioſa regni Poloniae, magni ducatus Lituaniae annexarumque prouinciarum, opera P. Gabriel. Rzaczynski S. I. Sandomir. 1721, 4.

Rzacz. Polon. auct. Auctarium hiſtoriae naturalis - curioſae regni Poloniae etc. ſtudio P. Gabr. Rzaczynski S. I. Ged. 1736, 4.

Scheff. Lappon. Io. Schefferi Lapponia, Francof. 1673, 4.

Scheuchz. it. alp. Itinera per Heluetiae alpinas regiones facta a Io. Iac. Scheuchzero, Lugd. bat. 1723, 4; Tom. I - IV.

Schonev. ichth. Ichthyologia et nomenclaturae animalium marinorum, fluuiatilium, lacuſtrium, quae in ducatibus Sleſuici et Holſatiae et emporio Hamburgo occurrunt triuiales, auctore Steph. a Schonevelde, Hamb. 1624, 4.

Schreb. Säugth. Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur, mit Beſchreibungen, Erlang, 1775 ſeqq. 4 mai.

Schroeck. monogr. Luc. Schroeckii exercitatio academica de moſcho, Ien. 1667, 4.

Schultz. bil. De bile medicina diſſ. Io. Domin. Schultze, Goett. 1775, 4.

Schwenckf. theriotr. Caſp. Schwenckfeld theriotrophium Sileſiae, Lignic. 1603, 4.

Seb.

Seb. thes. Alb. Sebae locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, Amstel. 1734 — 1765, fol. max. Tom. I-IV.

Shaw trav. Travels, or observations relating to several Parts of Barbary and the Levant, by Thom. Shaw, Oxford 1738, fol. mai.

Sibb. Scot. an. Scotia illustrata, siue prodromus historiae naturalis etc. auctore Rob. Sibbaldo, Ediub. 1684, fol. Pars secunda specialis: tomus II de animalibus Scotiae.

Sloane Iam. A voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Iamaica, by Hans Sloane, Lond. 1702 - 1725 fol. Tom. I, II.

Stell. Kamtsch. Georg Wilh. Stellers Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, Frankf. und Leipz. 1774, 8 mai.

Strahlenb. As. Das nord- und ostliche Theil von Europa und Asia, ausgefertigt von Phil. Ioh. von Strahlenberg, 1730, 4.

Sulz. monogr. Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters, von F. G. Sulzer, Goett. 1774, 8.

Tavernier voy. Les six voyages de Iean - Bapt. Tavernier, à Paris 1682, 4; Tom. I-III.

Thevenot voy. Relation d'un voyage fait au Levant par M. de Thevenot, à Paris 1665, 4; Tom. I, II.

Thevet cosmogr. La Cosmographie universelle d'André Thevet, à Paris 1575 fol. Tom. I, II.

Toreen Surat. Eine ostindische Reise nach Suratte, China, etc. verrichtet von Olof Toreen; *cum Osbeckii supra citato itinere.*

Tournef. voy. Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roi par M. Pitton de Tournefort, à Amsterd. 1718, 4; Tom. I. II.

Tulp. obs. Nic. Tulpii obseruationes medicae, Amstel. 1672, 8.

Tyson monogr. Orang Outang siue homo siluestris: or the anatomy of a pygmie, by Edw. Tyson, Lond. 1699, 4 mai.

Valent.

Valent. Amboin. Omſtandig Verhaal van de Geſchiedeniſſen en Zaaken — in Amboina, door François Valentyn, Dordr. 1726, fol. Operis V voluminum pars III.

Ulloa voy. Voyage hiſtorique de l'Amerique meridionale fait par ordre du Roi d' Eſpagne par Don George Iuan et par Don Antoine de Ulloa, à Amſt. 1752, 4; Tom. I, II.

Wafer voy. Voyage de Mr. Wafer; *in tomo IV itin. Dampierii.*

Wagn. Heluet. Hiſtoria naturalis Heluetiae curioſa auct. Io. Iac. Wagnero, Tiguri 1680, 12.

Wagn. muſ. baruth. P. C. Wagners Beſchreibung des Bareuther Naturaliencabinets. *Inceptum opus, non abſolutum, absque titulo, editum ab anno inde 1763 fol. mai. Vidi tab.* 1 *ad* 16 *et commentarium a pag.* 1 *ad pag.* 28.

Waldung. monogr. Wolffg. Waldungi Lagographia ſ. liber de natura et vtilitate leporum, Amberg. 1619, 4. †

Willughb. piſc. Franc. Willughbeii de hiſtoria piſcium libri IV. Totum opus recognouit, coaptauit, ſuppleuit Ioh. Raius, Oxon. 1686, fol.

Worm. monogr. Ol. Wormii hiſtoria animalis quod in Norwegia quandoque e nubibus decidit, Hafn. 1653, 4. †

Ysbr. Reiſ. Drie-jarige Reize naar China door E. Ysbrants Ides, Amſterd. 1704, 4.

Zerenghi monogr. La vera deſcrittione dell' Hippopotamo, autore Federico Zerenghi da Narni, Napoli, 1603, 4. †

REGNI

REGNI ANIMALIS
CLASSIS I.
M A M M A L I A.

MAXILLAE *incumbentes*, *tectae*: DENTIBVS *intrusis plerisque*.
MAMMAE *lactiferae*.

* * *

Ordines Classis primariae difficulter determinandi, si vere naturales quaeris; neque pedibus, neque dentibus distinguendi.

Synoptica methodo disposuerunt praecipue e pedum structura Quadrupeda Raius et huic multo inferior Kleinius, postea prudentior Pennantus.

Systematica methodo e solis dentibus desumta vsus est in decima Systematis Naturae editione immortalis Linneus; adhibitis simul pedibus in duodecima: Brissonius autem nimis inhaerens minutiis solos dentes adhibuit ad distinguendos ordines.

Mihi haec generum series arridet, missis omnibus in ordines diuisionibus.

1. HOMO.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarii conici, longitudine aequales, approximati.

Manus

Manus in palmis, non in plantis.
Mammae pectorales II.
Cauda nulla.

2. SIMIA.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarii solitarii, reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.
Molares obtusi V - VI vtrinque.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda nulla.

3. PAPIO.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarii reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda abbreuiata.
Sacci in buccis pro macerando cibo.

4. CERCOPITHECVS.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarii reliquis longiores, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda elongata, non prehensilis.
Nates callosae.
Sacci in buccis pro macerando cibo.

5. CEBVS.

5. CEBVS.

Dentes Primores incifores, fupra et infra IV.
Laniarius vtrinque I.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda prehenfilis.
Nates pilofae.

6. CALLITHRIX.

Dentes Primores incifores fupra et infra IV.
Laniarii folitarii.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda elongata non prehenfilis.
Nates tectae.
Sacci in buccis nulli.

7. LEMVR.

Dentes Primores fuperiores IV: intermediis remotis.
inferiores VI longiores, porrecti, compreffi, paralleli, approximati.
Laniarii folitarii, approximati.
Molares plures, fublobati: antici longiores acutiores.
Manus in palmis plantisque (plerisque).

8. DIDELPHIS.

Dentes Primores fuperiores X.
inferiores VIII: intermediis duobus breuiffimis.
Laniarii longi, plures.

Mola-

Molares denticulati.
Lingua ſubciliata.
Plantae manus, pollice mutico.
Cauda longa, gracilis, ſubnuda.

9. BRADYPVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.
Laniarii? obtuſi, ſolitarii, molaribus longiores occurſantes.
Molares vtrinque V cylindrici, obtuſi.
Corpus pilis tectum.
Crura antica multo longiora poſticis.
Vngues longiſſimi.

10. MYRMECOPHAGA.

Dentes nulli.
Lingua teres, extenſilis.
Os anguſtatum in roſtrum.
Corpus pilis tectum.
Vngues longi arcuati.

11. MANIS.

Dentes nulli.
Lingua teres, extenſilis.
Os anguſtatum in roſtrum.
Corpus ſquamis tectum.
Mammae pectorales II.

12. DASYPVS.

Dentes molares plures, VII - VIII vtrinque, absque primoribus, absque laniariis.
Corpus cataphractum teſta oſſea, zonis interſecta.
Vngues acuti.

13. TAL-

13. TALPA.

Dentes Primores ſuperiores VI.
inferiores VIII.
Laniarii maior I; inferiores IV.
Naſus elongatus.
Palmae foſſoriae.

14. SOREX.

Dentes Primores ſuperiores II bifidi.
inferiores IV: intermediis breuioribus (interdum II).
Laniarii vtrinque plures.
Naſus elongatus gracilis.
Pedes digitati.

15. PTEROPVS.

Dentes Primores IV vtrinque.
Palmae corpore longiores, pollicibus breuiſſimis, membrana inter digitos expanſa et ad crura poſtica extenſa, pro volatu.
Mammae duae pectorales.

16. VESPERTILIO.

Dentes Primores ſupra et infra numero inaequales, variantes.
Palmae corpore longiores, pollicibus breuiſſimis, membrana inter digitos expanſa et ad crura poſtica extenſa, pro volatu.
Mammae duae pectorales.

17. VRSVS.

Dentes Primores superiores VI, intus excauati, alterni.
inferiores VI: laterales II longiores lobati; secundarii basi interiores.
Laniarii solitarii, conici.
Molares V s. VI: primo laniariis approximato.
Lingua laeuis.
Membrana nictitans.
Nasus prominens.
Penis scatens osse incuruo.

18. ERINACEVS.

Dentes Primores superiores II distantes.
inferiores II minus distantes.
Laniarii vtrinque II recumbentes.
Corpus spinis tectum.

19. SVS.

Dentes Primores superiores IV conuergentes.
inferiores VI prominentes (*variante paullulum numero in variis*),
Laniarii superiores II breuiores.
inferiores II exserti.
Rostrum truncatum, prominens, mobile.
Pedes bisulci.

20. HYDROCHAERVS.

Dentes Primores II - X.
Laniarii nulli.

Palmae

Palmae vngulis quatuor.
Plantae vngulis tribus.

21. HIPPOPOTAMVS.

Dentes Primores Superiores IV per paria remoti.
Inferiores IV prominentes: intermediis longioribus.
Laniarii ſolitarii, inferiores maiores, recurvati, oblique truncati.
Pedes margine vnguiculati.

22. RHINOCEROS.

Dentes Primores vtrinque II, remotiſſimi, obtuſi; *niſi forte laniarii ſint abſque primoribus.*
Cornu ſolidum, conicum, naſo inſidens.
Pedes vngulati.

23. ELEPHAS.

Dentes Primores nulli vtrinque.
Laniarii ſuperiores elongati.
Proboſcis longiſſima, prehenſilis.
Corpus nudiuſculum.

24. EQVVS.

Dentes Primores Superiores VI, obtuſe truncati.
Inferiores VI, prominentiores.
Laniarii ſolitarii, vtrinque remoti.
Pedes vngula indiuiſa.
Mammae II inguinales.

25. CAMELVS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VI ſpathiformes.

Laniarii diſtantes: ſuperiores III; inferiores II.

Cornua nulla.

Labium ſuperius fiſſum.

Pedes ſubdidactyli.

26. BOS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.
Laniarii nulli.

Cornua concaua, antrorſum verſa, lunata, laeuia.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

27. OVIS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.
Laniarii nulli.

Cornua concaua, retrorſum verſa, intorta, rugoſa.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

28. CAPRA.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.
Laniarii nulli.

Cornua concaua, ſurſum verſa, erecta, compreſſa, ſcabra.

Mentum barbatum.

Pedes vngulati.

Mammae inguinales.

29. AN-

29. ANTILOPE.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.
Laniarii nulli.
Cornua concaua, ſurſum verſa, teretia, annulata vel ſpiralia.
Mentum imberbe.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

30. CERVVS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.
Laniarii nulli (interdum ſolitarii ſuperius).
Cornua ſolida, annua, tenera corio hirto tecta apiceque creſcentia, denudata.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

31. MOSCHVS.

Dentes Primores Superiores nulli.
Inferiores VIII.
Laniarii ſuperiores ſolitarii exſerti.
Cornua nulla.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

32. LEPVS.

Dentes Primores vtrinque II: *ſuperiores* duplicati: interioribus ſ. palatinis minoribus.
Laniarii nulli.
Pedes digitati: digitis 5-4.

33. HYSTRIX.

Dentes Primores vtrinque II oblique ſciſſi.
Laniarii nulli.
Molares IV vtrinque ſupra et infra.
Corpus ſpinis tectum.

34. CAVIA.

Dentes Primores ſupra et infra II.
Laniarii nulli.
Pedes digitati: digitis 4 - 3. (At Pacae 5 - 5.)
Cauda nulla, aut breuis.

35. GLIS.

Dentes Primores vtrinque II.
Laniarii nulli.
Auriculae abbreuiatae.
Pedes digitati: digitis 4 - 5.
Cauda breuis vel mediocris, piloſa.

36. SPALAX.

Dentes Primores vtrinque II, cuneiformes, plani.
Laniarii nulli.
Oculi minuti.
Auriculae nullae.
Pedes pentadactyli.
Cauda nulla ſ. breuiſſima.

37. MVS.

Dentes Primores vtrinque II; *inferiores* ſubulati.
Laniarii nulli.
Pedes digitati: digitis 4 - 5.
Cauda gracilis, ſubnuda.

38. IACV-

38. IACVLVS.

Dentes Primores vtrinque II.

Laniarii nulli.

Pedes antici breuiſſimi; poſtici elongati.

Cauda elongata, apice floccoſa.

39. SCIVRVS.

Dentes Primores vtrinque II: *ſuperiores* cuneati; *inferiores* compreſſi.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 4-5: palmis ſaepe vnguiculus pollicaris.

Cauda longa, pilis longioribus.

40. CASTOR.

Dentes Primores vtrinque II: *Superiores* truncati, angulo transuerſo excauati; *inferiores* apice transuerſi.

Laniarii nulli.

Pedes digitati: digitis 5-5.

Cauda plana, nec teres, ſquamoſa.

41. LVTRA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, diſtincti.

Inferiores VI, obtuſiores, conferti: duo interiores.

Pedes pentadactyli palmati.

42. MVSTELA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, diſtincti.

Inferiores VI, obtusiores, conferti: duo interiores.

Lingua laeuis.

Pedes fissi, pentadactyli.

43. VIVERRA.

Dentes Primores vtrinque VI: intermediis breuioribus.

Molares plures quam tres.

Lingua retrorsum saepe aculeata.

Vngues exserti.

44. FELIS.

Dentes Primores VI acutiusculi: exterioribus maioribus.

Laniarii solitarii, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Molares terni.

Lingua retrorsum aculeata.

Pedes digitati: digitis 5-4: vnguibus retractilibus.

45. CANIS.

Dentes Primores Superiores VI: laterales longiores distantes: intermedii lobati.

Inferiores VI: laterales lobati.

Laniarii solitarii, incuruati.

Molares VI s. VII (pluresue quam in reliquis).

46. PHOCA.

Dentes Primores Superiores VI paralleli: exteriores maiores.

Inferio-

Inferiores IV paralleli, diſtincti, aequales, obtuſiuſculi.

Laniarii ſolitarii: ſuperiores a primoribus, inferiores a molaribus remoti, primoribus longiores.

Molares V ſ. VI, tricuſpidati.

Auriculae nullae (plurimis).

Corpus poſtice gracileſcens.

Pedes pentadactyli: poſtici coaliti.

47. TRICHECHVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii ſuperiores ſolitarii.

Molares ex oſſe rugoſo vtrinque; inferius duo. (vtrinque quatuor ſecundum Pennantum).

Labia geminata, fiſſa.

Auriculae nullae.

Pedes digitati pentadactyli palmati: poſteriores compedes coadunati in pinnam.

48. BALAENA.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales; poſticorum loco *pinna caudalis* horizontalis absque vnguibus.

Dentium loco in maxilla ſuperiore *laminae* corneae.

Fiſtula reſpiratoria duplex ſupra caput.

49. PHYSETER.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales; poſticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque vnguibus.

Dentes in maxilla inferiore; non in ſuperiore.
Fiſtula reſpiratoria in capite ſ. fronte.

50. DELPHINVS.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae* pectorales; poſticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque vnguibus.
Dentes in maxilla vtraque.
Fiſtula reſpiratoria in capite.

51. MONODON.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae pectorales*; poſticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque vnguibus.
Dentes duo in maxilla ſuperiore exſerti, praelongi, recti, ſpirales.
Fiſtula reſpiratoria in vertice.

Naturales hic ſubeſſe *ordines* generum 1-7; 9-11; 12-20; 21-24; 25-31; 32-40; 41-46; 47-51; apparet; neque male coniungi crediderim 7 et 8; 11 et 12; 20 et 21; 24 et 25; 31 et 32; 40 et 41; 46 et 47.

Linnaeanam methodum qui praefert, ita diſponat genera ante dicta:

Secun-

Secundum editionem X Syſtematis naturae:

I. PRIMATES.

Dentes Primores ſuperiores IV, paralleli.
Mammae pectorales II.

1. HOMO.	1. HOMO.
2. SIMIA.	2. SIMIA.
	3. PAPIO.
	4. CERCOPITHECVS.
	5. CEBVS.
	6. CALLITHRIX.
3. LEMVR.	7. LEMVR.
4. VESPERTILIO.	15. PTEROPVS.
	16. VESPERTILIO.

II. BRVTA.

Dentes Primores nulli vtrinque.

5. ELEPHAS.	23. ELEPHAS.
6. TRICHECVS.	47. TRICHECHVS.
7. BRADYPVS.	9. BRADYPVS.
8. MYRMECOPHAGA.	10. MYRMECOPHAGA.
9. MANIS.	11. MANIS.

III. FERAE.

Dentes Primores ſuperiores VI, acutiuſculi.
Laniarii ſolitarii.

10. PHOCA.	46. PHOCA.
11. CANIS.	45. CANIS.
12. FELIS.	44. FELIS.

13. VI-

13. VIVERRA.	43. VIVERRA.
14. MVSTELA.	41. LVTRA.
	42. MVSTELA.
15. VRSVS.	17. VRSVS.

IV. BESTIAE.

Dentes Primores vtrinque: intermediis diſtantibus.

Laniarii ſemper vno plures vtrinque.

Naſus vltra os prominens.

16. SVS.	19. SVS.
17. DASYPVS.	12. DASYPVS.
18. ERINACEVS.	18. ERINACEVS.
19. TALPA.	13. TALPA.
20. SOREX.	14. SOREX.
21. DIDELPHIS.	8. DIDELPHIS.

V. GLIRES.

Dentes Primores bini ſupra et infra, a molaribus remoti.

Laniarii nulli.

22. RHINOCEROS.	22. RHINOCEROS.
23. HYSTRIX.	33. HYSTRIX.
24. LEPVS.	32. LEPVS.
25. CASTOR.	40. CASTOR.
26. MVS.	34. CAVIA.
	35. GLIS.
	36. SPALAX.
	37. MVS.
	38. IACVLVS.
27. SCIVRVS.	39. SCIVRVS.

VI. PE-

VI. PECORA.

Dentes Primores ſuperiores nulli.
inferiores VI aut VIII a molaribus remotiſſimi.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

28. CAMELVS.	25. CAMELVS.
29. MOSCHVS.	31. MOSCHVS.
30. CERVVS.	30. CERVVS.
31. CAPRA.	28. CAPRA.
	29. ANTILOPE.
32. OVIS.	27. OVIS.
33. BOS.	26. BOS.

VII. BELLVAE.

Dentes Primores obtuſe truncati.
Mammae duae inguinales.

34. EQVVS.	24. EQVVS.
35. HIPPOPOTAMVS.	21. HIPPOPOTAMVS.
	20. HYDROCHAERVS.

VIII. CETE.

Spiracula ſupra Caput.
Pinnae pectorales caudaliſque horizontalis, absque vnguibus.

36. MONODON.	51. MONODON.
37. BALAENA.	48. BALAENA.
38. PHYSETER.	49. PHYSETER.
39. DELPHINVS.	50. DELPHINVS.

Secun-

Secundum editionem XII Syſtematis naturae.

I. PRIMATES.

Dentes Primores inciſores: ſuperiores IV paralleli.
Mammae pectorales II.

1. HOMO.	1. HOMO.
2. SIMIA.	2. SIMIA.
	3. PAPIO.
	4. CERCOPITHECVS.
	4. CEBVS.
	6. CALLITHRIX.
3. LEMVR.	7. LEMVR.
4. VESPERTILIO.	15. PTEROPVS.
	16. VESPERTILIO.

II. BRVTA.

Dentes Primores nulli vtrinque.

5. ELEPHAS.	23. ELEPHAS.
6. TRICHECHVS.	47. TRICHECHVS.
7. BRADYPVS.	9. BRADYPVS.
8. MYRMECOPHAGA.	10. MYRMECOPHAGA.
9. MANIS.	11. MANIS.
10. DASYPVS.	12. DASYPVS.

III. FERAE.

Dentes Primores ſuperiores ſex, acutiuſculi.
Canini ſolitarii.

11. PHOCA.	46. PHOCA.
12. CANIS.	45. CANIS.
13. FELIS.	44. FELIS.
14. VIVERRA.	43. VIVERRA.

15. MV-

15. MVSTELA.	41. LVTRA.
	42. MVSTELA.
16. VRSVS.	17. VRSVS.
17. DIDELPHIS.	8. DIDELPHIS.
18. TALPA.	13. TALPA.
19. SOREX.	14. SOREX.
20. ERINACEVS.	18. ERINACEVS.

IV. GLIRES.

Dentes Primores bini supra et infra approximati, a molaribus remoti.
Laniarii nulli.

21. HYSTRIX.	33. HYSTRIX.
22. LEPVS.	32. LEPVS.
23. CASTOR.	40. CASTOR.
* CAVIA.	34. CAVIA.
34. MVS.	35. GLIS.
	36. SPALAX.
	37. MVS.
	38. IACVLVS.
25. SCIVRVS.	39. SCIVRVS.
26. NOCTILIO.	16. VESPERTILIO.

V. PECORA.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VI aut VIII a molaribus remotissimi.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

27. CAMELVS.	25. CAMELVS.
28. MOSCHVS.	31. MOSCHVS.
29. CERVVS.	30. CERVVS.
30. CAPRA.	28. CAPRA.
	29. ANTILOPE.
31. OVIS.	27. OVIS.
32. BOS.	26. BOS.

VI. BEL-

VI. BELLVAE.

Dentes Primores obtuſe truncati.
Pedes vngulati.

33. EQVVS.	24. EQVVS.
34. HIPPOPOTAMVS.	21. HIPPOPOTAMVS.
	20. HYDROCHAERVS.
35. SVS.	19. SVS.
36. RHINOCEROS.	22. RHINOCEROS.

VII. CETE.

Spiracula ſupra Caput.
Pinnae Pectorales caudalisque horizontalis absque vnguibus.

37. MONODON.	51. MONODON.
38. BALAENA.	48. BALAENA.
39. PHYSETER.	49. PHYSETER.
40. DELPHINVS.	50. DELPHINVS.

REGNI

REGNI ANIMALIS

CLASSIS I

M A M M A L I A.

---

1. HOMO.

Dentes Primores incisores, supra et infra IV.
Laniarii conici, longitudine aequales, approximati.

Manus in palmis, non in plantis.

Mammae pectorales II.

Cauda nulla.

Sapiens. 1. HOMO.
Nosce te ipsum.
Variat cultura, loco, non specie.

Lappo. α. Paruus torosus albus macrocephalus, facie plana lata, maxilla inferiore prominula acuminata vix barbata, oculis paruis profundis nigrofuscis, naso paruo obtuso, buccis inflatis, ore magno, labiis crassis, auriculis magnis, pilis rectis nigris crassis, brachiis longioribus, manibus plantisque minoribus.
In borealibus Europae, Asiae, Americae.

Tatarus. β. Mediocris oliuaceus, facie plana lataque, fronte rugosa, oculis paruis profundis nigris, superciliis largis, naso breui crasso, buccis tumidis, mento prominente acuminato, barba rariore, dentibus longio-

longioribus interſtitiis maioribus, pilis nigris craſſioribus, femoribus craſſis, cruribus breuioribus.

Ab Imao verſus circulum arcticum in Aſia.

Aſiaticus. γ. Mediocris luridus rigidus, pilis nigricantibus, oculis paruis nigris, naſo depreſſo, labiis craſſis, dentibus antrorſum verſis.

Trans Gangem.

Europaeus. δ. Mediocris albus toroſus, pilis flaueſcentibus prolixis, oculis caeruleis vel fuſcis, labiis tenuioribus.

Afer. ε. Magnus niger, cute holoſericea ex reticulo mucoſo Malpighiano craſſiore nigroque, pilis atris contortuplicatis, oculis nigris viridibusue, naſo ſimo, labiis tumidis, ventre inflato, mammis lactantibus prolixis.

Praecipue in Africa occidentali.

Americanus. ς. Mediocris rufus, pilis nigris rectis craſſis, facie ephelitica, fronte parua, oculis nigris, naſo aquilino, naribus patulis, mento ſubimberbi (niſi forte ſoli arti hoc tribuendum).

Cauſſa varietatum frigoris calorisque gradus varii, vitae ratio, ritus moresque, ignota alia.

Varietates artificioſae monſtroſaeque: *Europaei* auriculis immobilibus, iunceaeque puellae abdomine attenuato corpore veſpiformi. *Sinenſes* oculis paruis remotis, capite conico, naſo plano depreſſo, vnguibus manuum longiſſimis, abdomine tumido, dentibus nigris, feminaeque pedibus minimis. *Hottentotti* monorchides.

Homo ferus LINN. non eſt varietas.

Patagonici gigantes fabuloſi cum veterum *pygmaeis* (niſi forte Simiae), *hermaphroditisque* Floridae.

DE-

DESCRIPTIO: CORPVS ipſa ſua conformatione erectum, nudum, Pilis raris remotiſſimis adſperſum, ſubſexpedale.

CAPVT obouatum: *Pileus* longius piloſus: *Syncipite* obtuſo, *Vertice* obtuſiſſimo, *Occipite* gibboſo.

Facies nuda: *Frons* planiuſcula, quadrata, *Temporibus* compreſſa, angulis ſinu intra Pileum adſcendens. *Supercilia* prominula pilis extrorſum in ſuturam imbricatis, interſtincta *Glabella* planiuſcula. *Palpebra ſuperior* mobilis, *inferior* quieta; vtraque *Ciliis* exſtantibus ſubrecuruatis pectinata. *Oculi* rotundi: *Pupilla* orbiculata absque membrana nictitante. *Genae* gibbae, molliuſculae, coloratae. *Malae* compreſſiuſculae. *Buccae* laxiores. *Naſus* prominens, labio breuior, compreſſus, apice altior gibboſiorque: *Naribus* ouatis, intus hirtis, margine craſſiuſculo. *Labium ſuperius* ſubperpendiculare, *Lacuna* exaratum; *Labium inferius* erectiuſculum, magis gibbum. *Mentum* prominens, obtuſum, gibboſum. *Os* maribus ſetis barbatum, imprimis mentum ſetis faſciculatum. *Dentes* vtrinque *Primores* inciſores, erecti, paralleli, approximati. *Laniarii* ſolitarii, vix longiores, vtrinque reliquis approximati; *Molares* quini, obtuſiuſculi. *Aures* laterales: *Auriculae* rotundato-lunatae, appreſſiuſculae, nudae, ſupra margine fornicatae; infra gibboſae, molles.

TRVNCVS conſtans Collo, Thorace, Dorſo, Abdomine:

Collum teretiuſculum, capite breuius; *Ceruicis Nucha* concaua; *Gula* ſupra concaua, medio ſubtus gibba.

Thorax antice poſticeque depreſſiuſculus; *Pectus* planiuſculum, *Iugulo* excauato, *Axillis* concauis barbatis, *Scrobiculo* planiore. *Mammae* duae, pectorales, diſtantes, gibbae, rotundatae: *Papilla* cylindrica, obtuſa, rugoſa, areola cincta.

Dorsum Tergo planiusculo, *Humeris* exstantibus, *Interscapulio* depresso.

Abdomen gibbum, laxum: *Vmbilico* excauato, *Epigastrio* planiore, *Hypogastrio* gibbosiore, *Hypochondriis* rotundatis, *Inguinibus* planiusculo-concauis. *Pubis* regio barbata. *Genitalia* exserta: *Pene* cylindrico, *Scroto* subrotundo, rugoso cute laxa, *sutura* longitudinali per *Perinaeum* excurrente; f. *Vulua* gibba, compressiuscula, *clitoride*, *nymphis hymeneque* instructa. *Cauda* exserta nulla.

ARTVS ex *Manibus* loco pedum anteriorum et *Pedibus* posterioribus:

Manuum *Armi* diuaricati, crassiusculi, teretes, longitudine pedum. *Cubitus* obtuso-prominulus. *Vlna* crassitie armorum, teres, introrsum planior. *Palmae* rotundatae, dilatatae, planae, extus conuexae, *Vola* concaua; *Digiti* V: *Pollex* remotus, breuior, crassior. Digiti 2, 3, 4, 5, approximati, horum 5 minor reliquis, dein 4, 2 sed 3 paullo longior, medium femoris attingens. *Vngues* omnibus rotundati, obouati, plano-conuexi, *lunula* pallida.

Pedum *Femora* approximata, *Lumbis* musculosis, *Natibus* gibbis, carnosis, *Genubus* antrorsum versis, obtusissimis, poplitibus subtus concauis. *Crura* longitudine femorum, postice musculoso-ventricosa, inferne angustiora, antice macra. *Calcanei Talis* insistentes, prominuli, gibbi: *Malleolis* lateralibus, oppositis, hemisphaericis, duriusculis. *Plantae* oblongae, supra conuexiusculae, subtus planae, transuerse concauae. *Digiti* V: omnes incurui, subtus gibbi, approximati. *Pollex* crassior, breuior; 2, 3 subaequales, 4, 5 decrescentes; vltimo minimo. *Vngues* vt in Manibus omnes.

Differt itaque a reliquis Corpore erecto nudo, at piloso Capite, Superciliis Ciliisque, maturis Pube, Axillis. Caput Cerebro omnium maximo; Vuula;

Facies

Facies abdomini parallela, nuda: Naſo prominente, compreſſo, breuiore; Mento prominente. Cauda nulla. Pedes Talis inſiſtentes. Mares mento barbato; Feminae imberbi.

NASCITUR ceteris Animalibus imperaturus fragillimus, nudus, ſuapte natura inermis, ad vagitus ſtatim et ploratum, ad omnem fortunae contumeliam proiectus, tardae ſapientiae alienae opis indigens, poſt dies grauiditatis 274, longitudine 15-20 pollicum, ponderis 6-7 librarum, capite ingenti. Sed miſeret atque etiam pudet aeſtimantem, quam ſit friuola animalium ſuperbiſſimi origo.

Infans laborat poſt partum ictero neophytorum triduo; dormit multum, non diu. Ridet animal riſibile et lacrymat poſt dies 40. Dentes excreſcunt primores inferiores, tumque ſuperiores, menſe 6-12, anno 6-12 aliis permutandi; laniarii menſe nono decimoque, molares anteriores anno ſecundo.

Puber vario tempore, pro climate, ſexu, victu, anno 12-16. Maſculis teſtes ſcrotum intrant verſus pubertatem. Menſtruo laborat matura viro.

Adoleſcit anno 20-22. Monogamia naturali viuit, luxurie defluens polygamus paſſim. Parit 1-2, rarius 3-4. Praeter mulierem pauca animalia coitum nouere grauida.

Seneſcit temporibus capillisque canis, corpore areſcente curuato. Aetas 70-80 annorum. Viuimus vt immortales, et morimur vt mortales.

Habitat intra tropicos *Palmis lotophagus.*

Hoſpitatur extra tropicos *ſub nouercante Cerere carniuorus. Raro miſerrimus abiectiſſimusque ſaeuit in propriam ſpeciem anthropophagus.*

HOMO TROGLODYTES *nocturnus*, non confundendus cum Simia Satyro, morbidus reperitur paſſim in

Zona torrida, rariusque extra eam, *Africanis* Dondos, *Lusitanis* Albinos, *Indis* Kackerlack, Kalkalak, Kalkalatt, *vulgo* Leucaethiops: minor conterraneis, colore albiſſimo, cute holoſericea vel ſquamoſa, pilis albis interdumque flauis, impubis ſaepe imberbisque, iride aurea, rarius pallide caerulea, noctu videt luſcitioſus (vix membrana nictitante.) Corpus debile. Mors praematura. Ad hunc accedit *Aethiops maculatus* itidem morbidus.

* * *

HOMO LVCIFER orbis antarctici caudatus fabuloſus.

2. SIMIA.

Dentes Primores inciſores, ſupra et infra IV.
Laniarii ſolitarii, reliquis longiores, ſupra a primoribus, infra a molaribus remoti.
Molares obtuſi V-VI vtrinque.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda nulla.

Satyrus. 1. S. ferruginea, lacertorum pilis reuerſis, natibus tectis.

Satyrus *Plin. hiſt. nat. V c.* 1 *(Hard. c.* 1*) c.* 8 *(Hard. c.* 8*)?*

Σατυροι *Aelian. anim. XVI c.* 15*?*

Satyrus *Geſn. quadr. p.* 974.

The Pongo (and the Engeco) *Purch. Pilgr. II p.* 982.

Baris *Nieremb. hiſt. nat. p.* 179.

Orang Outang Indorum *Ionſt. quadr. p.* 139.

Tre-

Tretrétretré, Tratratratra *Flacourt Madag. p.* 154? (breuicaudatum dicit.)

Ourang-Outang *Bont. Ind. or. p.* 84 *fig.* pessima, mulieris potius, non Simiae.

Satyrus indicus, homo syluestris: Orang-outang *Tulp. obs. p.* 270 *tab.* 14.

Fese *Neuh. Gesandsch. p.* 373. *fig.* fere Tulpii.

Quojas Morrou *Dapp. Afr. p.* 393, 582, *fig. p.* 583 Tulpii.

Satyrus indicus; Orang Outang Indis, the Drill *Charlet exerc. p.* 16.

Orang Outang siue homo syluestris *Tyson monogr. figg.* bonae.

Barris *Barbot Guin. p.* 101.

The Quojas-Morrou or Worrou *Barbot Guin. p.* 115.

L'animal appellé Sinsin *du Halde Chin. I. p.* 33.

Chimpanzee *Scotin tabula peculiari Lond.* 1738. †

Simia ecaudata subtus glabra *Linn. syst. nat. 6 p.* 3 *n.* 1.

Simia Orang Outang *Klein. quadr. p.* 86.

Simia acauda subtus glabra. The Simia without a tail, with a smooth belly. The Satyr *Hill. anim. p.* 535.

L'homme des bois: Simia (Homo silueſtris) vnguibus omnibus planis et rotundatis, caesarie faciem cingente *Briss. regn. an. p.* 189 *n.* 2.

Der Waldmensch *Hall. vierf. p.* 549.

Simia (Satyrus) ecaudata subtus nuda *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 25 *n.* 1.

The Man of the wood *Edw. Glean. I tab.* 213.

Baris ou homme des bois *Dictionn. anim. I p.* 250.

Homme sauvage *Dictionn. anim. II p.* 487.

Orang-outang *Dictionn. anim. III p.* 279.

Pongos *Dictionn. anim. III p.* 531.

Satyre *Dictionn. anim. III p.* 43.

De Sater of Boschmensch *Houtt. nat. hist. I p.* 330 *tab.* 5 *fig.* 2 Edw.

Aap zonder Staart, van onderen kaal *Houtt. nat. hist. I p.* 354 *tab.* 6 *fig.* 1 Tulpii.

Simia (Pygmaeus) ecaudata ferruginea capite lacertisque pilis reuerfis *Linn. amoen. ac. VI p.* 68 *fig.* 4 *fub nomine: Pygmaeus Edwardi* fig. Edw.
Simia (Satyrus) ecaudata fubtus nuda abdomine gibbofo *Linn. amoen. ac. VI p.* 69 *fig.* 3 Scotini.
Homme fauvage *Bom. dictionn. II p.* 534.
Pongos *Bom. dictionn. III p.* 626.
Quojavaurau *Bom. dictionn. III p.* 697.
Simia (Satyrus) ecaudata ferruginea, lacertorum pilis reuerfis, natibus tectis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 34 *n.* 1.
Les Orang-Outangs ou le Pongo et le Iocko *Buff. hift. nat. XIV p.* 43.
Le Iocko *Buff. hift. nat. XIV tab.* 1 fig. bon.
Great Ape *Penn. fyn. quadr. p.* 96 *n.* 64.
Iocko *Aleff. quadrup. IV tab.* 173 fig. Buff.
Der Satyr *Müll. Naturf. I p.* 119 *tab.* 5 *fig.* 1, 2. Edw. *tab.* 6 *fig.* 1 Tulp.
Der Bufchmenfch, Erdmenfch *Mart. Naturlex. I p.* 551 *fig.* Buffon.
Der Orang outang: Simia Satyrus *Schreb. Säugth. I p.* 54 *n.* 1 *tab.* 2 fig. Buff. *tab.* 2, B fig. Allam. in edit. bat. Buffon.
Orang outang *in India orientali.*
Sinfin *Sinenfibus.*
Pongo, Iocko *Congenfibus.*

Varietas duplex: maior (le Pongo *Buff.*) et minor (le Iocko *Buff.*)
Corpus erecti ad pedes 5-6 altum, vndique veftitum, brunneum: pilis antice rarioribus rufo-fufcis, longitudine vix digiti transuerfi, poftice denfioribus. Caput rotundum. Facies plana, humanae fimilis, nigricans. Frons nuda, breuior quam homini. Cilia nigra: fuperiora longiora denfiora. Superciliorum loco feries transuerfa pilorum. Nafus depreffus vix prominens. Os a nafo remotius quam

quam in homine, margine hirto. Saccus in buccis nullus, qui in reliquis Simiis omnibus. Mentum barbatum. Auriculae humanis ſimiles maiores. Capilli reliquis pilis longiores. Brachia longiora, vt genua tangant in erecto animali, pollicibus breuioribus. Manus intus glabrae nigricantes. Vngues rotundati. Plantae forma pedum, pollice breuiſſimo; reliquis digitis longioribus. Pili in lacertis reuerſi verſus cubitum. Nates tectae. Mari frenulum praeputii nullum. Genitalia feminina humanis ſimilia. Coſtae vtrinque 13. Fortiſſimum muſculoſumque animal.

Deeſſe vngues in palmarum pollicibus ex cel. Camperi obſeruatione habet cl. *Blumenbach de gen. hum. var. p.* 38.

Habitat ſolitaria in deſertiſſimis regionibus interioris Africae, Sumatrae, Borneo, Iauae, Sinae. Dormit in arboribus. Grauis, melancholica, nec malitioſa petulansque, inſtar reliquarum Simiarum. Iunior manſueſcit docillima. Edit fructus et nuces. Celeris agilisque defendit ſe lapidibus baculoue. Marem aiunt appetere mulieres, feminam parere vnum ad duo. Fabula autem eſt, naſci e coitu mulierum indarum cum ſimiis. Veterum Satyrus videtur.

Tulpiana figura et deſcriptio, quod mihi quidem videtur, ſpeciem haud diuerſam ſpectat (aliter ſentiente cl. *Blumenb. de gen. hum. var. p.* 37 qui propriam ſpeciem putat). Femina fuit, quam deſcripſit Tulpius: antice tota glabra facie, fronte, auriculis, pectore, abdomine, brachiis, cruribus; abdomine gibboſo ſ. tumido. Munda fuit, erecta incedens, docilis et ſapiens, long. ~~5 ped.~~ ad summum 3 pedum; erat enim „longitudine pueri trimi."

longimana. 2. S. brachiis longitudine corporis.
Le Grand Gibbon *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 92 *tab.* 2.

Le petit Gibbon *Buff. hist. nat. XIV tab.* 3.

A ſingular ſpecies of Monkeys without tails: Golocks Bengalenſibus *De Viſme Philoſ. Trans. LIX p.* 71 *tab.* 3 figg. veroſimiliter malae.

The longarmed Ape *Penn. ſyn. quadr. p.* 99 *n.* 66.

Homo (Lar) brachiis longitudine corporis *Linn. mant. II p.* 521.

Gibbon grande *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 174 *fig.* 1 Buff.

Gibbon picciolo *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 174 *fig.* 2 Buff.

Der indianiſche langärmige Affe, der Schleuderaffe *Mart. Naturlex. I p.* 565 figg. Buff.

Der langarmige Affe: Simia longimana *Schreb. Säugth. I p.* 66 *n.* 2 *tab.* 3 figg. Buff.

Der Langarm *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 4 *t.* 1 *fig.* 1 Buff.

Corpus erectum, humanae altitudinis, pilis nigris durioribus. Caput rotundum. Facies plana, nigreſcens, humanae ſimillima. Oculi profundi, magni. Regio oculorum, naſi, oris, nuda. Circumferentia faciei ſubpiloſa cinerea. Auriculae nudae, nigrae, rotundatae. Nates calloſitate parua. Brachia longiſſima ad plantas vsque extenſa, vt erecta incedat tetrapus. Vngues plani in palmis, ſubacuti in plantis.

Varietas maior et minor, quarum haec coloribus pallidioribus.

Habitat

SIMIAE cum affinibus curioſae, attentae, ſuſpectae, memores, furaces, petulantes, imitatrices, geſticulatrices, laſciuae, indociles, minantur; hoſtes adeunt motis dentibus labiisque, rident, cibos bucca macerant, pediculos venantur, tactu excellunt. Monogamae natos vlnis gerunt, menſtruant, terrefactae cacant immundae, vrinae meatu ſaepe diſtincto a vulua; vtero etiam gerentes libidinoſae. Phytiphagae edunt fructus, ſemina, olera, radices, oua auium, ranas, inſecta, vermes. Prolem mire amant. Defendunt ſe lapidibus, excrementis, arborum ramis in hoſtes proiectis.

Habitat in Coromandel, Bengalaeque ſiluis, in Malacca Moluccisque, Sinae finitimis. Mitis, ſegnis, frigoris pluuiaeque impatiens. Menſtruat.

Varietatem aliam β habet *Penn. ſyn. quadr. p.* 100, quae fuit apud Lord Clive, in omnibus perquam ſimilem minori, at forma elegantiore pedibusque anticis breuioribus. Facies, auriculae, pileus capitis, palmae et plantae nigra, reliquum corpus et brachia pilis argenteis. Alitudo biennis circiter ped. 3. Mitis erat atque laeta.

Siluanus. 3. S. brachiis corpore breuioribus, natibus caluis, capite ſubrotundo.

πιθηκος *Ariſt. hiſt. anim. II c.* 13 *n.* 83, 84.
Simia *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 54 (*c.* 80 *Hard.*) *XI c.* 37 (*c.* 62 *Hard.*) *c.* 44 (*c.* 100, 101. *Hard.*)
πιθηκος *Aelian. anim. V c.* 26.
Simia *Gesn. quadrup. p.* 957 fig. mediocr.
Simia *Alpin. Aeg. I p.* 242 *tab.* 20 *fig.* 1 mala.
Simia *Aldrov. digit. p.* 199.
Simia *Ionſt. quadrup. p.* 96, 137.
Simia 1 et 2 *Ionſt. quadrup. tab.* 59 figg. mediocr.
Cercopithecus *Ionſt. quadrup. tab.* 59 *fig. inferior ad ſiniſtram* mediocr.
Simia, ein Aff *Gesn. Thierb. p.* 1 fig. mala, melior *p.* 2.
Simia *Ludolf. Aeth. I c.* 10 *n.* 52.
Simia ſimpliciter dicta cauda carens *Rai. ſyn. quadr. p.* 149.
Simia ſimpliciter dicta cauda carens *Sloan. Iam. II p.* 328.
Ein Aff *Meyer Thiere I tab.* 13 fig. mediocr.

Simia

Tecto comis arborum intertexto altiſſimisque columnis innixo obumbrantur terrae aeſtuantes inter tropicos Indiae, ne adurantur; hoc tectum inhabitant gentes Simiarum cum affinibus, nec non Pſittacis volucribusque aliis.

Simia ecaudata, rufo nigricans *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 4.

Simia acauda capite maiore. The great-headed Simia, with no tail *Hill anim. p.* 536.

Simia (vulgaris) ecaudata, clunibus tuberosis *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 1.

Le Singe: Simia (.....) vnguibus omnibus planis et rotundatis *Briss. regn. an. p.* 188 *n.* 1.

Simia (Syluanus) ecaudata, clunibus tuberoso-callosis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 25 *n.* 2.

Singes *Dictionn. anim. IV p.* 194 cum congener.

Aap zonder Staart, het Gat Eeltagtig uitpuilende *Houtt. nat. hist. I p.* 356.

Singe *Bom. dictionn. IV p.* 226 cum congener.

Simia (Syluanus) ecaudata, natibus caluis, capite subrotundo *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 34 *n.* 2.

Le Pitheque *Buff. hist. nat. XIV p.* 84.

The Pigmy ape *Penn. syn. quadr. p.* 98 *n.* 65 *tab.* 12 *fig.* 1 bon.

Piteco *Aless. quadrup. IV tab.* 198 fig. mediocr.

Der Waldteufel *Müll. Naturs. I p.* 120.

Der gemeine Affe: Simia Siluanus *Schreb. Säugth. I p.* 68 *n.* 3 *tab.* 4 fig. propria bona.

Affe der Alten *Mart. Naturlex. I p.* 546 fig. Schreb.

Simia, Mona, *Italis.*

Singe; Guenon (femina) *Gallis.*

Simio, Ximio, Mono (mas); Simia, Ximia, Mona (femina) *Hispanis.*

Bogío, Bugío (mas); Bogía, Bugía (femina) *Lusitanis.*

Affe; Aeffinn (femina) *Germanis.*

Ape

Accedunt ad Hominem forma, incessu saepe erecto, clauiculis, vnguibus, facie nudiuscula, auriculis, ciliis, vuula, musculis loquelae inseruientibus non loquentes, vtero. Deesse in Simiis ossicula auditus cl. *Martini Naturlex. I p.* 525.

Ape *Anglis.*
Aap *Belgis.*
Обезьяна (Obes'jana) *Ruſſis.*
Magnitudo Felis maioris. Frons ad ſuperciliorum regionem transuerſe gibba. Facies in medio nuda rugoſa. Auriculae humanae. Vngues plani. Nates caluae. Color oliuaceus, ſubtus flaueſcens. Scrotum tamquam intra vuluam reconditum; vel penis intra ſcroti foramen; autumno teſticuli intumeſcunt. Sedes feminae rapi inſtar extuberans. Lacertorum pili ſubtus reuerſi, vti et verticis.
Habitat in Africa Indiaque, gregaria. In Iamaica inſula dicitur eſſe ex nauibus naufragium paſſis ſuperſtes.
Animal ridendum riſibili, agile, imitans, erectum ſedet, minatur minis, cachinno blanditur, Caffrorum more ſalutat. Sorbilia manu haurit. Edit poma, nuces, ſimiliaque, atque inſecta, praecipue formicas. Prolem mire amat. Menſtruat. Libidinoſum animal. Parit prae reliquis in Europa, grauida in menſem decimum. Hoſtes pellit arenis oculis eorum iniectis. Docilis mitisque.

Inuus. 4. S. capite oblongo, natibus caluis.
Simius Cynocephalus *Alpin. Aeg. I p.* 241 *tab.* 15 *fig.* 1 mala.
Simius Cynocephalus alter *Alpin. Aeg. I p.* 241 *tab.* 16 fig. mediocr.
Cynocephalus *Ionſt. quadrup. p.* 144.
Cynocephalus. Hundsköpff. Mommenet 1 *Ionſt. quadrup. tab.* 59 fig. mediocr.
Simia ecaudata, clunibus tuberoſis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 3.
Simia acauda, clunibus tuberoſis. The tail-leſs Simia, with large buttocks *Hill. anim. p.* 536.
Le Singe cynocephale: Simia cynocephala (. . . . .) vnguibus omnibus planis et rotundatis *Briſſ. regn. an. p.* 191 *n.* 1.

Simia

Simia (Inuus) ecaudata, natibus caluis, capite oblongo *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 34 *n.* 3.
Le Magot *Buff. hist. nat. XIV p.* 109 *tab.* 7, 8 figg. malae, Siluani potius adulti.
The Barbary ape *Penn. syn. quadr. p.* 100 *n.* 67.
Tartarino *Aless. quadrup. IV tab.* 175 figg. Buff.
Der Buschgott, Pan *Müll. Natursf. I p.* 121.
Der Buschgott *Mart. Naturlex. I p.* 549 fig. Buff.
Der Hundskopf: Simia Inuus *Schreb. Säugth. I p.* 71 *n.* 4 *tab.* 5 fig. propria bona (reiicienda Buffoniana).

Simillima S. Siluano, sed rostro productiore, colore pallidiore. supra sordide virescente, subtus obscure flauescente, cute caeruleo-grisea. Ad 4 pedes altus. Oculi parui. Nasus depressius. Auriculae humanis similes. Facies lanuginosa, albicans: pili frontis nigri, in collo rufescentes. Crura extus rufa. Manus nudae nigrae. Vngues rotundati. Nates caluae.

Habitat in India Africaque gregaria, raro ad Gibraltar, forsan casu. Malitiosa, ferox, stupida. Tetrapus vtplurimum incedit. Bene fert nostrum clima. Menstruat.

Vix videtur Cynocephalus veterum, ad proximum, vel ad Cercopitheci genus potius referendus.

3. PAPIO.

3. PAPIO.

Dentes Primores inciſores, ſupra et infra IV.
Laniarii reliquis longiores, ſupra a primoribus, infra a molaribus remoti.

Manus in plamis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda abbreuiata.

Sacci in buccis pro macerando cibo.

Sphinx. 1. P. facie nigra, vnguibus acuminatis, natibus caluis purpureis.

Sphinx *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 21 (*c.* 30 *Hard.*)?

Sphingion *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 29 (*c.* 34, 35 *Hard.*) *X c.* 72 (*c.* 93 *Hard.*)?

Sphinx *Geſn. quadrup. p.* 979?

Papio *Aldrov. dig. p.* 259 *fig. p.* 260 peſſima.

Papio primus *Ionſt. quadrup. p.* 144 *tab.* 61 fig. Aldrov.

Eine Art des Vielfraſses, Babuin *Geſn. Thierb. p.* 357 *fig. p.* 358 Aldrov.

Babio: the Baboon *Charlet. exerc. p.* 16.

Papio *Rai. ſyn. quadr. p.* 158.

Bavian *Kolbe Vorgeb. p.* 138 *tab.* 5 *fig.* 1 mala.

Simia ſemicaudata, ore vibriſſato, vnguibus acutis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 5.

Cebus, Papio; Baboon, Hyaena Gesneri *Klein quadr. p.* 89.

Simia cauda breui, ore vibriſſato The whiſkered Simia, with a very ſhort tail: the Baboon *Hill. anim. p.* 537.

Le

PAPIONES facie longiore, roſtro latiore, dentibus fortioribus, recedunt a Simiis, libidinoſiſſimi, moribus magis efferati. Hi cum Simiis et Cercopithecis omnibus Americae plane exules. Male nouo orbi varias ſpecies tribuit Fermin.

Le Babouin: Papio *Briss. regn. an. p.* 192 *n.* 1.
Der Mamonet *Hall. vierf. p.* 553.
Der Pavian *Hall. vierf. p.* 559.
Simia (Sphinx) ſemicaudata, ore vibriſſato, vnguibus acuminatis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 25 *n.* 3.
Babouin ou Babon *Dictionn. anim. I p.* 198.
Papio *Dictionn. anim. III p.* 354.
Kortſtaartige Aap, met Hairen aan den Bek en ſpitſe Nagelen *Houtt. nat. hiſt. I p.* 257.
Simia (Sphinx) ſemicaudata, ore vibriſſato, vnguibus acuminatis, natibus caluis *Linn. ſyſt. nat.* 12 *I p.* 35 *n.* 6.
Le Papion ou Babouin proprement dit *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 133.
Grand Papion *Buff. hiſt. nat. XIV tab.* 13 fig. bon.
Petit Papion *Buff. hiſt. nat. XIV tab.* 14 *fig. bon.*
Babbuino grande *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 176 *fig.* 1 Buff.
Babbuino picciolo *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 176 *fig.* 2 Buff.
Der Bavian *Müll. Naturſ. I p.* 122.
Der braune Pavian: Simia Sphinx *Schreb. Säugth. I p.* 80 *n.* 8 *tab.* 6 fig. Buff.
Babuino *Italis.*
Babouin *Gallis.*
Monazo (mas); Monaza (femina) *Hiſpanis.*
Bugío rabudo *Luſitanis.*
Pavian *Germanis.*
Baviaan *Belgis.*
Baboon *Anglis.*
Babian *Suecis.*
Choakauma *Hottentottis.*

Longi-

In genera quinque diuidendae SIMIAE LINNAEI aliorumque auctorum mihi videntur e placitis Buffonii, cum vere inter ſe differant ſpecies numeroſiſſimae.

Longitudo corporis 3 - 4 pedum, caudae pollicum 7 - 8 et forsan maior. Caput oblongum Canis, sed obtusius, crassiusque rostrum. Oculi parui approximati. Nasus caninus. Facies nigra nuda. Palpebrae albae. Auriculae rotundatae nudae. Collum crassum breue. Corpus quadratum, torosum, robustum. Pili rufo fusci; ventre et cruribus intus subdenudatis, cute alba. Crura breuia. Manus glabrae, nigrae. Vngues in pollicibus plani ac rotundati, in reliquis digitis acuminati. Cauda recuruata. Nates sanguinolentae.

Habitat in calidissimis Africae Indiaque. Aspectu malignus et ferox. Animal libidinosum mulieribus facile vim inferens, neque domandum. Tetrapus incedit. Edit fructus arborum aliaque vegetabilia. Menstruat. Parit 1 - 2, sterilis in nostris terris.

Os non vibrissatum secundum Buffonium, vti Linneo.

Maimon. 2. P. facie violacea, vnguibus acuminatis, natibus caluis purpureis.

Le Magot ou Tartarin: Cercopithecus cynocephalus parte corporis anteriore longis pilis obsita, naso violaceo nudo *Briss. reg. an. p.* 214 *n.* 3.

Magot ou Tartarin. *Dictionn. anim. III p.* 6.

Simia (Maimon) caudata subbarbata, genis caeruleis striatis, natibus caluis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 35 *n.* 7. (Descriptio autem ad sequentem pertinet.)

Le Mandrill *Buff. hist. nat. XIV p.* 154 *tab.* 16 mas; *tab.* 17 femina.

The ribbed-nose Baboon *Penn. syn. quadr. p.* 103 *n.* 69.

Mandril maschio *Aless. quadrup. IV. tab.* 177 *fig.* 1 Mandril femmina *fig.* 2. figg. Buff.

Der Teufel *Müll. Naturs. I p.* 123.

Der Maimon: Simia Maimon *Schreb. Säugth. I p.* 74 *n.* 5 *tab.* 7 fig. Buff.

Magnitudo praecedentis facileque maior fortiorque, at mitior eſt. Caput oblongum, caninum. Naſus longus, depreſſus, nudus, violaceus. Facies violacea, ſtriis longitudinalibus profundis. Os parvum, labiis tenuioribus. Auriculae ſubacuminatae, nudae. Pili corporis ruſo fuſci, in pectore et ventre griſei. Nates nudae, ſanguineae. Cauda poll. 2-3 longa, valde piloſa, erecta. Manus nudae. Penis quaſi circumciſus. Vulua prominens. Menſtruat.

Habitat in Africa, ſorteque in Aſia. Edit fructus, piſces, carnes. Sedet erectus, tetrapus incedit, interdumque erectus. Vox infantis. Dentibus ſtridet. Mucum e naribus perpetuo defluentem lingua lambit. Dicitur mulieres per vim ſtuprare.

The Smitten *Barbot Guin. p.* 212 *Boſſm. Guin. p.* 301 aut idem animal eſt, aut affine: certe non Simia Satyrus, vti Buffonio videtur.

Mormon. 3. P. facie cyanea, pilis verticis faſtigiatis, natibus caluis purpureis.

Anatome Cercopitheci Mamonet dicti *Barthol. act. hafn. I p.* 67, 313 *fig.* mala; videtur tamen hic fuiſſe, quem ſecuit.

The Man-Tiger from Africa *Bradl. nat. p.* 117 *tab.* 15 *fig.* 1 mala.

Das ſogenannte wilde Thier Choras *Bresl. Samml. XV p.* 177 *fig.* mediocr.

Simia ſemicaudata, maxilla inferiore barbata, vertice ſetis erectis mitram referentibus obſito, vnguibus acutis, Auſtr. Choras *Kram. Auſtr. p.* 310.

Mamonet *Dictionn. anim. III p.* 14?

Simia (Mormon) ſemicaudata ſubbarbata nigro fuſca, malis tumidis nudis cyaneis oblique ſtriatis, naribus caluis ſanguineis *Allſtroemer: Act. holmienſ.* 1766 *p.* 144 *tab.* 3 fig. propria bona.

the Mantegar. Edw. Tyson, in philos. Transact vol. 24. 1704. p. 1571 fq.

Simia

Simia Mormon *Berlin. Samml. I p.* 387 *fig.* Alſtroem.

The tufted Ape *Penn. ſyn. quadr. p.* 102 *n.* 68 *tab.* 12 *fig.* 2 mala deformisque, cauda mutilata, vt Simia videatur.

Der Choras: Simia Mormon *Schreb. Säugth. I p.* 75 *n.* 6 *tab.* 8 fig. Alſtroem.

Der Choras *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 6 *t.* 1 *fig.* 2 Alſtroem.

Longitudo 2 pedum (forſan nondum adulti). Facies longiuſcula plana, fronte conuexa. Circumferentia faciei pilis lanuginoſis obſcure griſeis, in fronte erectis denſisque faſtigiatis. Oculi parvi, profundi, iride fuſca. Naſus ſanguineus. Buccae nudae, tumidae, caeruleae, ſulcis 4-5 obliquis. Os truncatum, marginatum, porcinum. Myſtaces plures, absque ordine, breues, molliores. Sacci buccarum ampliſſimi. Auriculae breues, acuminatae, rigidae. Ab auribus ad nucham ſtria ſubnuda, cute perfecte alba. Mentum barba alba, verſus gulam breuiore, ibidemque ſubflaueſcente. Collum breue et craſſum, ſupra obſcure canum, ſubtus flaueſcenti-album. Corpus poſtice graciletcens. Dorſum pilis denſis longisque, obſcure canis. Pectus flaueſcenti album. Venter albus. Lumbi pilis rarioribus, cute violacea transparente. Nates eleuatae cordiformes, nudae, ſanguineae. Sutura abdominis longitudinalis, nuda ſanguinea. Cauda violacea, 2 poll. longa, recuruata. Scrotum cum pene album vel violaceum. Crura antica et poſtica dorſo concoloria. Digiti nudi, nigricantes, cute molli. Vngues ſubacuti, pollicum rotundati.

Habitat in Zeylona, aliisque Indiae regionibus. Segnior reliquis affinibus, minus ludibundus, magisque mundus. Laſciuus valde, fortis, docilis, manſueſcit. Vox porci. Incedit tetrapus.

Nemestrina. 4. P. subbarbatus griseus, iridibus brunneis, natibus caluis, cauda nuda contortuplicata.

Monkeys of a docile kind *Kaempf. Iap. I p.* 126?

The pig-tailed Monkey *Edw. glean. I p* 8 *tab.* 214.

Simia (Nemestrina) semicaudata subbarbata grisea, iridibus brunneis, natibus caluis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 35 *n.* 4.

Le Maimon *Buff. hist. nat. XIV p.* 176 *tab.* 19.

The pig-tail Baboon *Penn. syn. quadr. p.* 105 *n.* 71.

Mammone *Aless. quadrup. IV tab.* 179 fig. Buff.

Der Waldgott *Müll. Naturs. I p.* 121.

Der Schweinschwanzaffe: Simia Nemestrina *Schreb. Säugth. I p.* 79 *n.* 7 *tab.* 9 fig. Edw.

Similis Cercopitheco Cynomolgo. Longitudo corporis ped. 2 - $2\frac{1}{2}$, caudae poll. 5 - 6. Facies nuda, e nigro rubra. Oculi castanei. Palpebrae nigrae. Nasus depressus. Supra et infra os pili rari nigri. Labia tenuia. Auriculae humanis similes, nudae, mediocres, subacuminatae. Pileus capitis coloris obscurioris. Corpus supra pilis nigro-olivaceis, subtus pallidioribus. Manus nudae, nigrae. Vngues longi, plani. Pollices plantarum longiores, membrana connexi cum indice. Cauda nudata, gracilis, torta vt in Porco. Genitalia masculina extus haud propendentia.

Habitat in Sumatra, Iaponia, mitis docilisque, minusque lasciuus. Frigoris impatiens. Dormit sedens, incedit bipes quadrupesque. Rarius visus in Europa.

Apedia. 5. P. palmarum pollice approximato, vnguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis.

Simia cauda abrupta, vnguibus compressis: pollice palmarum digitis adhaerente *Linn. amoen. acad. I p.* 558.

Simia

Simia (Apedia) ſemicaudata, palmarum pollice approximato, vnguibus oblongis: pollicum omnium rotundatis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 25 *n.* 4.

Kortſtaartige Aap, met de Duimen digt tegen de Vingers aangevoegd, de Nagelen langwerpig, die der Duimen altemaal gerond *Houtt. nat. hiſt. I p.* 358.

Simia (Apedia) ſemicaudata, palmarum pollice approximato, vnguibus oblongis: pollicum rotundatis; natibus tectis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 35 *n.* 5.

The little Baboon *Penn. ſyn. quadr. p.* 105 *n.* 70.

Der Kurzſchwanz *Müll. Naturſ. I p.* 122.

Magnitudo felis. Caput ſubrotundum. Os prominens, paruum, retuſum, fuſcum, pilis patulis. Facies fuſca, ſubnuda. Auriculae ſubrotundae, nudae. Corpus pilis ſubflaueſcentibus, apice nigricantibus. Nates tectae. Cauda vix duo digitos transverſos longa, obtuſa, piloſa. Palmarum digiti oblongi, pollice reliquis adhaerente, vt in plantis humanis. Plantarum digiti longiores, pollice magis remoto, vt in palmis humanis. Vngues longi, curui, conuexi, compreſſi, lineares, obtuſi, pollicum rotundati.

Cercopithecum ſciureum cauda mutilata putat doctiſſ. Schreberus: at noſtro auriculae magis nudae, ſingularisque palmarum ſtructura, vt differre potius credam.

Species obſcura.

* A new Baboon *Penn. ſyn. quadr. addit. tab.* 13 *fig.* 2.

Maior, informis, fuſco rufus, artubus longioribus, quadrupes, cauda porcina erecta. Patria ignota. Niſi forte ſit Papio Sphinx; ad quem refert doctiſſ. Schreberus.

4. CERCOPITHECVS.

Dentes Primores inciſores, ſupra et infra IV.
Laniarii reliquis longiores, ſupra a primoribus, infra a molaribus remoti.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda elongata, non prehenſilis.
Nates calloſae.
Sacci in buccis pro macerando cibo.

Hamadryas. 1. C. cinereus, auribus comoſis, vnguibus acutiuſculis, natibus caluis.

Κυνοκέφαλος *Ariſt. hiſt. anim. II c.* 13 *n.* 83.
Cynocephalus *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 54 (*c.* 80 *Hard.*)
Κυνοκέφαλος *Aelian. anim. II c.* 46. *IV c.* 46. *VI c.* 10 *VII c.* 19. *X c.* 30.
Cynocephalus *Gesn. quadrup. p.* 971.
Simia ſupra aures comata *Alpin. Aeg. I p.* 242 *tab.* 17 fig. mediocr.
Simia Cynocephalus ad vtramque aurem magna coma dependente *Alpin. Aeg. I p.* 242 *tab.* 18, 19 figg. mediocr.
An Κυνοκέφαλος? *Cluſ. exot. p.* 370 fig. peſſima.
Cynocephalus 2 Pertrand *Ionſt. quadrup. tab.* 59 fig. mala.
Der Hundskopf *Gesn. Thierb. p.* 13 fig. eadem.
Simia caudata imberbis, auribus comoſis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 7.
Le Tartarin. Geoffroy & Fr. Cuvier. 5me Livr.

Simia

Simiae maxime affinis:
Si mihi cauda foret, cercopithecus eram.
MARTIAL.

Simia caudata imberbis, auribus comofis. The tailed Simia with hairy ears *Hill. anim. p.* 537 *tab.* 26 fig. mediocr.

Simia (aegyptiaca) cauda elongata, clunibus tuberofis nudis *Haffelqu. Palaeft. p.* 269.

Simia (Hamadryas) caudata imberbis, auribus comofis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 27 *n.* 11.

Geftaarte Aap zonder Baard, de Ooren met dikke Hairdodden *Houtt. nat. hift. I p.* 363.

Simia (Hamadryas) caudata cinerea, auribus comofis, vnguibus acutiufculis, natibus caluis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 36 *n.* 8.

The dogfaced Monkey *Penn. fyn. quadr. p.* 107 *n.* 72 *tab.* 14 *fig.* 1 Edwardsii inedita.

Die Waldnymphe *Müll. Naturf. I p.* 124.

Der graue Pavian: Simia Hamadryas *Schreb. Säugth. I p.* 82 *n.* 9 *tab.* 10 fig. Edw.

Proxime accedit ad praecedens genus, vt Papionem diceres, nifi effet cauda fere longitudine corporis. Vltra 5 pedes altus. Caput fubrotundum pilofiffimum, imprimis pone auriculas. Roftrum teres, oblongum, bafi craffiufculum, apice magis attenuatum. Facies nuda, ex rubro nigrefcens. Oculi parui. Auriculae acutae, capillis occultatae. Corpus craffum, breue, parum verfus inguina contractum, pilofiffimum, imprimis antice; grifeo oliuaceum. Artus fortes et craffi, pilofiffimi. Digiti aequales, excepto pollice breviore. Vngues rotundati, in plantis acutiufculi. Nates denudatae, fanguineae. Cauda parum attenuata, pilofa, erecta.

CERCOPITHECI difficile genus, fpecierum numerofiffimarum, accuratius adhuc determinandarum.

Habitat gregarius in calidiſſimis Aſiae et Africae. Valde ferox, impudens atque laſciuus, difficulter domandus.

Hunc puto veterum Cynocephalum, cum doctiſſ. Pennanto, qui et huc refert *le Babouin Buff.* mihi potius ad Papionem Sphingem referendum.

Veter. 2. C. barbatus albus, barba nigra.

Simia alba ſeu incanis pilis, barba nigra promiſſa *Rai. ſyn. quadr. p.* 158.

Cebus Elaurandus Zeylanenſium *Klein. quadr. p.* 89.

Le Singe blanc à barbe noire: Cercopithecus barbatus albus, barba nigra *Briſſ. regn. an. p.* 207 *n.* 21.

Simia (Veter) caudata barbata alba, barba nigra *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 36 *n.* 9.

Le Lowando *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 169.

Der Altvater *Müll. Naturſ. I p.* 124.

Der weiſse Bartaffe; weiſs mit ſchwarzem Barte *Schreb. Säugth. I p.* 86 *n.* 10 *B)*

Elawandum *Zeylanenſibus.*

Habitat in Zeylona; Aſia.

Forſan vnicam modo ſpeciem efficit cum inſequentibus 3, 4, 5, ſic putantibus Pennanto, Schrebero, Buffonio. Forſan et C. Faunus coit cum his omnibus. Separatim proponam ſingulos, donec certiora eluceſcant.

Senex. 3. C. barbatus totus albus.

Simiae candentes toto corpore *Plin. hiſt. nat. VIII. c.* 21 *(c.* 31 *Hard.)?*

Πιθηκος εν Πρασιοις τοις ινδικοις *Aelian. anim. XVI c.* 10?

Another ſort of monkeys, Wanderows *Knox Ceylon. p.* 25.

The

The lion-tailed Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 109 *n.* 73 *γ)*
Der weiſse Bartaffe; ganz weiſs *Schreb. Säugth. I p.* 86 *n.* 10 *A)*

Habitat in Zeylona; Aſia.

Vetulus. 4. C. barbatus niger, barba alba.
Πιθηκος εν Ινδοις *Aelian. anim. XVII c.* 39?
Monkeys *Knox Ceylon. p.* 25 *fig.*
Cercopithecus niger barba incana promiſſa *Rai. ſyn. quadr. p.* 158.
The little bearded Man *Barbot Guin. p.* 212.
Bartmännerchen *Boſſm. Guin. p.* 302.
Cercopithecus niger, barba incana promiſſa *Klein. quadrup. p.* 89.
Le Singe noir à barba blanche: Cercopithecus barbatus niger, barba incana *Briſſ. regn. an. p.* 207 *n.* 22.
Simia (Silenus) caudata barbata nigra, barba niuea prolixa *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 26 *n.* 5.
Ouanderons *Dictionn. anim. III p.* 296.
Geſtaarte Aap met een Baard, zwart over 't Lyf, hebbende een grooten ſneeuwwitten Baard *Houtt. nat. hiſt. I p.* 358.
Ouanderons *Bom. dictionn. III. p.* 311.
L'Ouanderou *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 169 *tab.* 18 fig. male cauda truncata.
The lion-tailed Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 109 *n.* 73 *δ) tab.* 13 *A fig.* 1.
Simia di Ceylan *Aleſſ. quadr. IV tab.* 178 fig. Buff.
Der Weiſsbart *Müll. Naturſ. I.* 124.
Der ſchwarze Bartaffe; ſchwarz mit weiſsem Barte: Simia Silenus *Schreb. Säugth. I p.* 87 *n.* 11 *tab.* 11. fig. Buff.

...rn. de Breydenbach Reyss in das gelobte Land. 1486.

...enberg's Reisa. T. II. P. 2. pm 180 sq.

Wanduru *Zeylanensibus.*
Slinger-aap *Belgis.*

Habitat in Zeylona, Asia, Africa.

Silenus. 5. C. barbatus totus niger.
Simia callitriches leonino corpore *Alpin. Aeg. I p.* 243 *tab.* 20 *fig.* 2 mediocr.
Simia callitrix magnitudine Cynocephalorum *Alpin. Aeg. I p.* 244 *tab.* 21 fig. melior.
Simia caudata caesarie prolixa faciem cingente *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 13.
Simia capite comoso. The hairy-headed Simia *Hill. anim. p.* 539 *tab.* 26 fig. mediocr.
Le Singe noir d'Egypte: Cercopithecus barbatus niger, caesarie prolixa nigra faciem cingente *Briss. regn. an. p.* 209 *n.* 26.
Simia (Silenus) caudata barbata nigra, barba nigra prolixa *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 36 *n.* 10.
The lion-tailed Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 109 *n.* 73.

Habitat in India orientali Africaeque calidioribus.

Rostrum elongatum. Facies nuda. Corpus postice gracilescens. Nates callosae. Long. 3-3½ ped. Ferox. Tetrapus vtplurimum incedit.

Faunus, 6. C. barbatus, cauda apice floccosa.
Cercopithecus barbatus 1 *Clus. exot. p.* 371 *cum fig.*
Cercobithecus barbatus Clusii *Nieremb. hist. nat. p.* 177 *cum fig.* Clus.
Cercopithecus barbatus Clusii *Ionst. quadrup. tab.* 74 fig. Clus.
Cercopithecus barbatus 1 Clusii *Rai. syn. quadr. p.* 159.
Cebus barbatus primus Clusii *Klein. quadrup. p.* 89.

Simia

Simia caudata barbata, cauda floccofa *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 15.

Simia caudata barbata, cauda floccofa. The bearded Simia, with a woolly tail *Hill anim. p.* 540.

Le Singe barbu à queue de Lion: Cercopithecus barbatus, fupra ex nigro et fufco mixtus, infra albus, barba incana mucronata, cauda in floccum definente *Briff. regn. an p.* 209 *n.* 25.

Der groffe brandfarbige Affe aus Guinea *Hall. vierf. p.* 554.

Simia (Faunus) caudata barbata, cauda apice floccofa *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 26 *n.* 6.

Geftaarte Aap met een Baard, de Staart aan't end een kwaft hebbende *Houtt. nat. hift. I p.* 359.

Simia (Faunus) caudata barbata, cauda apice floccofa *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 36 *n.* 11.

Der Löwenfchwanz, Waldgeift *Müll. Naturf. I p.* 125.

Species obfcura, adeoque dubia. Corpus nigricans: pectus et anteriora abdominis alba. Auriculae mediocres. Nafus fimus. Barba incana mucronata. Vngues humani. Cauda longa, fat craffa, in floccum definens.

Habitat - - - - - - -

Pertinere huc quoque videtur:

Le Malbrouck *Buff. hift. nat. XIV p.* 224 *tab.* 29.

Simia di Bengala *Aleff. quadrup. IV tab.* 182 fig. Buff.

Der Malbruk: Simia Faunus *Schreb. Säugth. I p.* 90 *n.* 12 *tab.* 12 fig. Buff.

Longitudo corporis ped. $1\frac{1}{2}$, cauda fere longitudine corporis. Facies cinerea. Oculi magni. Palpebrae coloris carnei. Roftrum prominens. Nafus

fus depressus. Auriculae magnae, tenues, colore carneo. Supra flauofuscus, subtus flauogriseus. Fascia grisea ab oculis ad aures. Quadrupes.

Habitat in Bengala.

Varietatem C. Cynomolgi, posteaque Aygulae putat Pennant.

Affinis quoque, nisi propria species obscura:

Cercopithecus non barbatus I *Clus. exot. p.* 371.

Cercopithecus non barbatus I Clusii *Rai. syn. quadr. p.* 160.

Simia caudata imberbis fuscoflaua, pectore gulaque albis, cauda floccosa *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 9.

Cebus imberbis I Clusii *Klein. quadrup. p.* 89.

Simia subflauescens pectore albescente, cauda floccosa. The yellowish Simia, with a whitish breast, and a woolly tail *Hill anim. p.* 538.

Le Singe à queue de Lion: Cercopithecus ex flauo fuscus, cauda in floccum desinente *Briss. regn. an. p.* 203 *n.* 15.

Der Affe mit ausgerauftem büschligem Schwanze und gelber Kehle *Hall. viers. p.* 557.

Totus ex flauo fuscus, excepto pectore et gutture albicantibus. Cauda subnuda, apice floccosa.

Cynomolgus. 7. C. imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcuata, natibus caluis.

Cercopithecus *Gesn. quadrup. p.* 967 *cum fig.* mediocr.

Cercopithecus angolensis maior *Marcgr. Bras. p.* 227.

Macaquo Congensium *Ionst. quadrup. p.* 143.

Le premier de nos Singes *Perr. anim, II p.* 55 *tab.* 43 *fig. superior* mediocr.

Cercopithecus angolensis maior *Rai. quadrup. p.* 155.

Simia

Simia caudata imberbis, naribus elatis bifidis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 10.

Cercopithecus angolenſis maior *Barr. Fr. equ. p.* 149.

Cebus angolenſis maior Macaquo Marcgr. *Klein quadrup. p.* 89.

Simia caudata naribus bifidis. The long-tailed Simia with bifid noſtrils *Hill anim. p.* 538.

Le Makaque: Cercopithecus cynocephalus naribus bifidis, elatis, natibus caluis *Briſſ. reg. an. p.* 213 *n.* 2.

Der gröſſere angoliſche Affe *Hall. vierf. p.* 556.

Simia (Cynamolgos) caudata imberbis, naribus bifidis elatis, clunibus tuberoſis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 28 *n.* 16.

Macaque *Dictionn. an. III p.* 10.

Geſtaarte Aap zonder Baard, met een geſpleeten opgeWipte Neus, de billen bultig *Houtt. nat. hiſt. I p.* 367.

Simia (Cynomolgus) caudata imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcuata, natibus caluis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 38 *n.* 15.

Le Macaque *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 190 *tab.* 20.

The hare-lipped Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 111 *n.* 74.

Macacco *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 180 *fig.* 1. Buff.

Der Hundsbeiſſer, angoliſche Affe *Müll. Naturſ. I p.* 127.

Die Meerkatze: Simia Cynamolgos *Schreb. Säugth. I p.* 91 *n.* 13 *tab.* 13 fig. Buff.

Macaquo *Congenſibus.*

Longitudo corporis 2 ped. et vltra. Caput magnum. Roſtrum prominens. Facies nuda liuida rugoſa. Criſta piloſa parua in vertice. Oculi parui. Naſus craſſus depreſſus: nares bifidae elatae. Auriculae piloſae. Corpus craſſum, breue, ſubtus flaueſcenti-ſupra oliuaceo-griſeum. Nates callo-

ſae-

ſae. Cauda longitudine corporis vel paullo brevior, arcuata. Pedes breuiores. Vngues pollicum rotundati, reliquorum digitorum acuti, imprimis in plantis.

Habitat in Guinea, Congo, Angola, Africa auſtrali. Moſchum paullulum ſpirat, gregarius, mitis facileque manſueſcens. Clamat Hah Hah, mire geſticulatur. Quadrupes incedit, rariusque bipes. Menſtruat.

Cynocephalus. 8. C. imberbis flaueſcens, ore producto, cauda recta, natibus caluis.

Guineenſis alius *Marcgr. Braſ. p.* 228.

Cercopithecus *Ionſt. quadrup. tab.* 59 *fig. inferior ad dextram.*

Cercopithecus guineenſis tertius Marcgrauii *Rai. ſyn. quadr. p.* 157.

Cebus tertius guineenſis *Klein. quadrup. p.* 89.

Le Singe de Guinée: Cercopithecus pilis ex vmbra, griſeo, fuſco et flauo variegatis veſtitus *Briſſ. regn. an. p.* 196 *n.* 6.

Le Cercopithéque cynocéphale: Cercopithecus cynocephalus ex virideſcentibus et flauicantibus pilis variegatus *Briſſ. regn. an. p.* 213 *n.* 1.

Der Hundskopf *Müll. Naturſ. I p.* 128.

Simia (Cynocephalus) caudata imberbis flaueſcens, ore producto, cauda recta, natibus caluis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 38 *n.* 16.

Simiae Inuo ſimillimus, ſed caudatus; forſan non vere differt a Cynomolgo, ſic putante doctiſſ. Schrebero.

Habitat in Africa.

Diana. 9. C. barbatus, fronte barbaque faſtigiata.

Cercopithecus barbatus II *Cluſ. exot. p.* 371.

Beard-

Beard-men *Purch. Pilgr. II. p.* 955.

Cercopithecus barbatus Guineensis *Marcgr. Braf. p.* 227 *fig. p.* 228 mala.

Cercopithecus barbatus Guineensis *Ionft. quadrup. tab.* 60 fig. Marcgr.

Cercopithecus barbatus guineensis, Congensibus Exquima *Rai. fyn. quadr. p.* 156.

Cercopithecus barbatus 2 Clusii *Rai. fyn. quadr. p.* 159.

Simia caudata barbata: barba cana, cauda fimplici *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 16.

Cebus barbatus. Exquima Guineenfis *Klein. quadrup. p.* 89.

Cebus barbatus 2 Clusii *Klein. quadrup. p.* 89.

Simia barbata cana, cauda fimplici. The Simia with a hoary beard, and naked tail *Hill anim. p.* 540.

Die Meerkatze Diana *Linné: Act. holmienf.* 1754 *p.* 213 *tab.* 6. fig. propria.

Le Singe de Guinée à barbe blanche: Cercopithecus barbatus fuscus, punctis albis infperfus, barba alba *Briff. regn. an. p.* 207. *n.* 23.

Le Singe barbu: Cercopithecus barbatus, ex nigro et fusco mixtus, pectore et anteriore ventris parte albis, barba incana mucronata *Briff. regn. an. p.* 208 *n.* 24.

Der glatthärige Affe *Hall. vierf. p.* 555.

Bärtige Meerkatze. Diane *Hall. vierf. p.* 600.

Simia (Diana) caudata barbata, fronte barbaque faſtigiata *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 26 *n.* 8.

Geftaarte Baard-Aap, met een gekuifden Baard en een Toupet op 't Voorhoofd *Houtt. nat. hift.* 1 *p.* 360 *tab.* 6 *fig.* 2 Linn.

Simia (Diana) caudata barbata, fronte barbaque faſtigiata *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 38 *n.* 17.

L'Exquima *Buff. hift. nat. XV p.* 16.

The spotted Monkey *Penn. fyn. quadr. p.* 112 *n.* 75.

Diane *Müll. Naturf. I p.* 128 *tab.* 6 *fig.* 2 Linn.

Die

Die Diane: Simia Diana *Schreb. Säugth. I p.* 94 *n.* 14 *tab,* 14 fig. Linn.
Exquima *Congensibus.*

Magnitudo felis maioris. Facies nuda, nigra circa oculos et nasum. Nasus depressus. Oculi flauofusci. Auriculae paruae, rotundatae, nigrae, fere nudae. Frons pilis erectis, albis, fastigiatis, linea transuersa in formam lunae crescentis. Barba fastigiata nigra, subtus alba pilis longioribus, insidens tuberi adiposo. Caput corpusque nigrum, punctis albidis adspersum Gula, pectus et brachia intus alba. Dorsum postice et supra ferrugineum. Femora subtus heluola. Linea alba ab ano ad genua in exteriore latere femorum ducta. Abdomen pedesque nigri. Manus nigrae, subtus nudae. Vngues longiusculi. Cauda recta nigra, corpore longior, non prehensilis vti Marcgrauio et Buffonio.

Habitat in Guinea, Congo. Iunior ludibundus deiicit omnia, peregrinos nictitando salutat, iratus maxillas hiante ore exagitat. Adultior dentibus laniariis elongatis mordax et malignus euadit. Cubile purum seruat. Vocatus respondet Greck. Plus potat congeneribus. Amat calorem, at meridie vmbram quaerit. Noctibus frigidioribus clamat. Dormit per noctem et in tenebris, interdiu perpetuo in motu. Menstruat e caudae apice.

Mona. 10. C. barbatus supra rufofuscus, cauda grisea, natibus macula vtrinque alba, pedibus nigris.
Monichus *Alpin. Aeg. I p.* 242 *tab.* 20 *fig.* 3?
Le Singe varié: Cercopithecus pilis ex nigro et fusco variegatis vestitus, pedibus nigris, cauda cinerea *Briss. reg. an. p.* 198 *n.* 9.
La Mone *Buff. hist. nat. XIV p.* 258 *tab.* 36.
The varied Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 118 *n.* 84.

Monna

Monna *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 184 fig. Buff.

Die Mone: Simia Mona *Schreb. Säugth. I p.* 97 *n.* 15 *tab.* 15 fig. Buff.

DieMone *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 7 *tab.* 1 *fig.* 3. Buff.

Longitudo corporis 1½ ped. caudae 2 ped. Caput paruum, rotundatum. Roſtrum craſſum, breue. Facies plana, fuſca. Frons lunula griſea: faſcia nigra ab oculis ad aures, et inde ad humeros et brachia. Auriculae rotundatae. Barba e pilis albis, flauis nigrisque mixta. Corpus ſupra ruſo-fuſcum, venter et crura intus albicant. Crura extus et pedes nigra. Vngues ſubacuti, pollicum vero rotundati. Cauda obſcure griſea, ad eiusdem ortum vtrinque macula parua alba. Nates calloſae. Quadrupes incedit.

Habitat in Aſia, Africa, vulgaris. Mitis et docilis.

Sabaea. 11. C. imberbis flauicans, facie atra, cauda cinerea, natibus caluis.

Le Singe verd: Cercopithecus ex cinereo flaueſcens, genis longis pilis albis obſitis *Briſſ. regn. an. p.* 204 *n.* 17.

Singes verds *Adanſ. Seneg. p.* 76, 177.

The St. Iago Monkey *Edw. Glean. I p.* 10 *tab.* 215.

Simia (Sabaea) caudata imberbis flauicans, facie atra, cauda cinerea, natibus caluis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 38 *n.* 18.

Le Callitriche *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 272 *tab.* 37.

The green Monkey *Penn. ſyn. quadr p.* 113 *n.* 76.

Callitrice *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 185 *fig.* 1 fig. Buff.

Der Mohr *Müll. Naturſ. I p.* 129.

Der grüne Affe: Simia Sabaea *Schreb. Säugth. I p.* 100 *n.* 17 *tab.* 18 fig. Edw.

Magnitudo Cati. Corpus ſupra e cinereo viridique flaueſcens; ſubtus gula, pectore, abdomine, femoribus album. Caput paruum rotundatum. Roſtrum elongatum. Facies nuda atra. Auriculae paruae, rotundatae, nigrae. Tempora ex albido flaueſcentia, pilis longioribus reuerſis. Supercilia nigra ſetoſa. Cauda recta, gracilis, longitudine corporis, cana. Pedes cinerei. Vngues rotundati, ſed in anticis ouati. Nates calloſitate parua.

Habitat in Africa, gregarius; vulgaris in inſulis capitis viridis. Quadrupes. Mutus.

Patas. 12. C. barbatus ſupra ruber, ſubtus canus.

Κῆπος *Aelian. anim. XVII c.* 8.

Simius Callitrichus *Alpin. Aeg. I p.* 244 *tab.* 20 *fig.* 4. mala.

Peaſants *Barbot Guin. p.* 212 ?

Le Singe roux d'Egypte: Cercopithecus barbatus, rufus, facie nigra, caeſarie alba cincta *Briſſ. regn. an. p.* 210 *n.* 27.

Patas *Dictionn. anim. III p.* 359.

Patas *Bom. dictionn. III p.* 385.

Le Patas à bandeau noir *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 208 *tab.* 25.

Le Patas à bandeau blanc *Buff. hiſt. nat. XIV tab.* 26.

The red Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 116 *n.* 82.

Scimie roſſe del Senegal *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 181 fig. Buff.

Der rothe Affe: Simia Patas *Schreb. Säugth. I p.* 98 *n.* 16 *tab.* 16 fig. Buff.

Der rothe Affe *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 7 *tab.* 1 *fig.* 4 Buff.

Longitudo corporis ad 2 ped. forſan et maior. Corpus gracile, ſupra pulchre rubrum, ſplendens, ſubtus canum. Oculi profundi. Roſtrum longum.

Linea

Linea transuerſa nigra ſupra oculos inter aures. Auriculae tenues, pilis longioribus. Mentum barba flaua. Cauda corpore breuior. Nates calloſae.

Variat faſcia alba faciei; barba alba.

Habitat in Senegal. Quadrupes plerumque incedit. Minus agilis reliquis, curioſus valde. Defendit ſe lapidibus atque excrementis in hoſtes proiectis.

nictitans. 13. C. imberbis niger punctis pallidis adſperſus, naſo albo, pollice palmarum breuiſſimo, natibus tectis.

White noſes *Purch. Pilgr. II p.* 955.
Angolenſis alius *Marcgr. Braſ. p.* 227.
Simia (nictitans) caudata imberbis nigra punctis pallidis adſperſa, naſo albo, pollice palmarum breviſſimo, natibus tectis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 40 *n.* 23.
The winking Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 120 *n.* 87.
Der nickende Affe *Müll. Naturſ. I p.* 132.
Der weiſsmäulige Affe *Schreb. Säugth. I p.* 103 *n.* 20.

Magnitudo fere Simiae Siluani. Facies breuis piloſa. Orbitae nudae. Irides luteae. Naſus albus. Labia et mentum albida. Pili corporis nigri annulis aliquot pallidioribus. Nates tectae. Cauda recta, cylindrica, corpore longior. Pedes et cauda nigra. Pollex palmarum non longior primo articulo indicis.

Habitat in Guinea, ludibundus, capite continuo nictitans.

Petauriſta, 14. C. barbatus facie nigra, labiis macula triangulari alba, buccis auriculisque nudis.

 Blanc-

Blanc-nez *Allam. Buff. hist. nat. XIV p.* 141 *tab.* 39 *f*

Der weiſsnaſige Aſſe: Simia Petauriſta *Schreb. Säugth. I p.* 103 *n.* 21 *tab* 19 *B* fig. Allam.

Die Weiſsnaſe *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 8 *tab.* 2 *fig.* 1 Allam.

Longitudo corporis 13 pollicum, caudae 20 poll. Facies plana, nigra. Oculi magni, profundi. Frons flaua. Orbitae atque buccae nudae. Macula triangularis niuea ſub naribus, apice deorſum verſo. Mentum barba alba breui. Auriculae ouatae, nudae. Faſcia nigra trans caput ab aure ad aurem, pilis longioribus. Dorſum et cauda ſupra et pedes latere exteriore nigro-oliuacea. Manus nigrae. Pedes intus pallide griſei. Pectus et venter alba. Nates caluae. Vngues rotundati.

Habitat in Guinea. Tetrapus. Mitiſſimus, agilis. Ne barba madeſcat, dum potat, bene curat.

Talapoin. 15. C. buccis barbatis, pedibus nigris, cauda ſupra oliuacea, ſubtus cinerea.

Le Talapoin *Buff. hist. nat. XIV p.* 287 *tab.* 40.

The Talapoin Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 115 *n.* 79.

Talapoino *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 186 *fig.* 1 Buff.

Der ſchwarznaſige Affe: Simia Talapoin *Schreb. Säugth. I p.* 101 *n.* 18 *tab.* 17. fig. Buff.

Der ſchwarznaſige Affe *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 8 *tab.* 1 *fig.* 5 Buff.

Caput rotundum. Roſtrum ſubelongatum. Naſus acutus. Facies plana, coloris carnei. Auriculae magnae, rotundatae, nudae, nigrae. Pili in buccis longiſſimi verſus aures reflexi. Mentum barba parua. Corpus ſupra et artus latere exteriore obſcure flaueſcenti-virides, ſubtus flauo-albidi. Pedes nigri. Vngues digitorum acuminati, pollicum rotundati. Cauda longa, gracilis, ſupra obſcure oliuacea, ſubtus cinerea. Nates calloſae.

Lon-

Longitudo corporis pedis vnius, caudae 19 pollicum.

Habitat in India.

Num eadem cum ſequente?

Cephus. 16. C. buccis barbatis, vertice flaueſcente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea.

Alius Guineenſis *Marcgr. Braſ. p.* 228.

Alius Guineenſis *Rai. ſyn. quadr. p.* 156.

Simia caudata, genubus auribusque barbatis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 12.

Cebus barbatus alius Guineenſis *Klein quadrup. p.* 89.

Simia caudata, auribus genubusque barbatis. The tailed Simia, with tufts of hair at the ears and knees *Hill anim. p.* 539.

Le Singe de Guinée à barbe jauneâtre: Cercopithecus nigricans, genis et auriculis longis pilis ex albo flauicantibus obſitis, ore coeruleſcente *Briſſ. regn. an p.* 206 *n.* 19.

Simia (Cephus) caudata, buccis barbatis, vertice flaueſcente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 27 *n.* 9.

Geſtaarte Baard-Aap, met gebaarde Wangen, de top geelagtig, de Pooten zwart, de Staart aan 't end vaal *Houtt. nat. hiſt. I p.* 362.

Simia (Cephus) caudata, buccis barbatis, vertice flaueſcente, pedibus nigris, cauda apice ferruginea *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 39 *n.* 19.

Le Mouſtac *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 283 *tab.* 39.

The Mouſtache Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 114 *n.* 78.

Muſtacchio *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 185 *fig.* 2 Buff.

Das Blaumaul *Müll. Naturſ. I p.* 130.

Der blaumäulige Affe: Simia Cephus *Schreb. Säugth. I p.* 102 *n.* 19 *tab.* 19. fig. Buff.

Longitudo corporis ped. 1 caudae 18 poll. Facies nuda caerulescens. Vertex flauus pilis longis erectis. Nasus breuis. Lunula superciliorum transuersa alba. Circa os pili aliquot nigri. Labia infra nasum niuea. Ante auriculas fasciculi duo magni pilorum flauorum. Corpus supra e rubro vel virescente griseum, subtus pallidius. Cauda dorso concolor, excepto apice ferrugineo. Nates callosae. Pedes nigri. Vngues plani.

Habitat in Guinea. Tetrapus incedit. Ludit et clamat.

Aethiops. 17. C. imberbis vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis.

Simia Aethiops *Hasselqu. Palaest. p.* 270.

Simia (Aethiops) caudata imberbis, vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 28 *n.* 14.

Gestaarte Aap zonder Baard, met overendstaande witte Hairen op den Kop en een Wit Maantje aan 't Voorhoofd *Houtt. nat. hist. I p.* 366.

Simia (Aethiops) caudata imberbis, vertice pilis arrectis lunulaque frontis albis *Linn. mus. Ad. Fr. II pag.* 4.

Simia (Cephus) β *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 39.

Le Mangabey *Buff. hist. nat. XIV p.* 244 *tab.* 32.

Le Mangabey à collier blanc *Buff. hist. nat. XIV tab.* 33.

The white-eye-lid Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 144 *n.* 77.

Mangabey *Aless. quadr. IV tab.* 183 fig. Buff.

Der weissäugige Affe: Simia Aethiops *Schreb. Säugth. I p.* 105 *n.* 22 *tab.* 20, 21 figg. Buff.

Caput subrotundum. Rostrum obtusiusculum, breue. Facies nigra, lanuginosa. Mystaces breuiusculae, subri-

ſubrigidae, ſparſae ſine ordine. Naſus oblongus, aequalis, parum eleuatus. Nares oblongae, baſi remotiores. Supercilia piloſa: pilis longis molliuſculis. Palpebrae ſuperiores albiſſimae, ſine linea candida tenuis proxime ſuper ſupercilia transuerſaliter per frontem extenſa. Auriculae ſubrotundae, nigrae, margine inaequales. Coma ſubrigida, candida, erecta, copioſa, parum longa ad tempora infra auriculas (in Buffonii varietate). Corpus teres, aequale, verſus inguina parum anguſtatum. Cauda corpore paullo longior, teres, baſi craſſior, apice aequalis, ſubtus ad baſin valde piloſa. Lumbi latiores. Nates caluae. Crura anguſtiora. Manus nigrae. Digiti plantarum longiores. Vngues pollicum et palmarum plani, rotundati; plantarum ſubacuti. Color capitis, dorſi, laterum, caudae et crurum ſupra ex cano et viridescente mixtus, in aliis obſcurior. Abdomen, gula et crura ſubtus candida. Crura anterius cana. Cauda ſubtus ferruginea. Magnitudo felis domeſticae.

Hunc lubenter contraherem cum Cepho, praeeunte ſummo Linneo, niſi propriam ſpeciem dicerent Buffonius, Pennantus, Schreberus, olimque ipſe Linneus.

Habitat in Aethiopia, Madagaſcar. Mitis atque docilis. Quadrupes incedit. Menſtruat.

Aygula. 18. C. ſubimberbis griſeus, eminentia piloſa verticis reuerſa longitudinali.

Simia (Aygula) caudata ſubbarbata, eminentia piloſa verticis longitudinali *Osb. Oſtind. p.* 130.
Simia (Aygula) caudata ſubbarbata griſea, eminentia piloſa verticis longitudinali *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 27. *n.* 10.

Geſtaarte Baard-Aap, die grys is van Koleur, met een Kuif van Hair langs heen boven op den Kop *Houtt. nat. hiſt. I. p.* 363.

The middle ſized black Monkey *Edw. glean. III p.* 221 *tab.* 311.

Simia (Aygula) caudata ſubimberbis griſea, eminentia piloſa verticis reuerſa longitudinali *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 39 *n.* 21.

L'Aigrette *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 190 *tab.* 21.

The Egret Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 116 *n.* 81.

Aigrette *Alcſſ. quadrup. IV tab.* 180 *fig.* 2. Buff.

Der Eulaffe *Müll. Naturſ. I p.* 131.

Der Tjäkko: Simia Aygula *Schreb. Säugth. I p.* 106 *n.* 23 *tab.* 22 fig. Buff.

Magnitudo Felis minoris. Corpus griſeum, coloris Lupi, ſubtus gula, pectore abdomineque albicàns. Cauda corpore longior, cinerea, attenuata. Caput antice nigrum, eminentia piloſa verticis griſea. Facies planiuſcula, albida, nuda. Naſus depreſſus, breuiſſimus, ab ore remotus lacuna labii ſuperioris gemina. Bucca ſubbarbata, pilis ſurſum verſis. Supercilia frontis gibba, ſetòſa, prominentia. Auriculae acutiuſculae. Pedes nigri ſemipalmati: vnguibus pollicum rotundatis, reliquis oblongis. Sutura arcuata ab aure verſus oculos deorſum ad baſin maxillae inferioris. Sutura alia cubiti longitudinalis.

Habitat in India orientali. Ludibundus, alligatus ſaltat continuo. Blanditur homini aliisque Aygulis: aliis Simiis viſis geſticulatur. Ludit cum canibus. Dormiunt plures capitibus ſibi inuicem appoſitis. Noctu perpetuo clamat.

Buffonio videtur varietas Cynomolgi, quod quidem maxime miror.

Pen-

Pennanto le Malbrouck Buffonii, quem vide in C. Fauno, huc pertinere videtur: neque equidem hoc intelligo.

Maura. 19. C. totus niger.

Simiolus ceylonicus *Seb. thes. I p. 77 tab. 48 fig. 3?*
Cebus Simiolus ceylonicus *Klein. quadrup. p. 88?*
The Negro Monkey *Penn. syn. quadr. p. 115 n. 80.*
Der Mohraffe: Simia Maura *Schreb. Säugth. I p. 107 n. 24 tab. 22 B* fig. propria.
Der Mohraffe *Müll. Naturs. Suppl. p. 9 tab. 2 fig. 2* Schreb.

Caput rotundum. Nasus subacutus. Facies coloris fusco carnei, pilis paucis nigris. Irides rubro fuscae. Pili supra oculos longi cum supercilis connexi. Auriculae pilis temporum suboccultatae. Pili corporis, artuum et caudae nigri, sat longi, pectus et venter e nigro carnea subnuda. Manus cute nigra molli. Magnitudo felis maioris.

Habitat in Guinea, agilis mitisque.
Num varietas C. Aygulae?

sinicus. 20 C. imberbis, capillitio horizontali plano.

A Rillow *Knox Ceylon p. 26 cum fig.* mal.
Le bonnet-chinois *Buff. hist. nat. XIV p. 224 tab. 30*
The Chinese Monkey *Penn. syn. quadr. p. 117. n. 87.*
Simia (sinica) caudata imberbis, capillitio vndique horizontaliter caput obumbrante *Linn. mant. II p. 521.*
Simia di Bengala *Aless. quadrup. IV tab. 182* fig. Buff.
Der Hutaffe: Simia sinica *Schreb. Säugth. I p. 108 n. 25 tab. 23* fig. Buff.
Der Hutaffe *Müll. Naturs. Suppl. p. 9 tab. 2 fig. 3* Buff.

Pallide cinereo fuscus. Facies plana, rugosa, incarnata, lanugine alba. Nasus longus, laeuis, albicans. Capillitium horizontale orbiculi instar ca-

put obumbrat. Auriculae magnae, rotundatae. Labium ſuperius craſſum. Vertex et dorſum medio caſtanea, crura pallide fuſca, manus flaueſcentes. Corpus ſubtus pallide fuſcum. Cauda corpore longior, ſupra colore dorſi, ſubtus ventris.

Habitat in India orientali gregarius. Spoliat hortos et agros, vt vix retineatur.

Hunc Buffonius refert ad ſuum Malbrouck, quem vide in C. Fauno.

Roloway. 21. C. nigro fuſcus, barba alba bifida.

Palatine, ou Roloway *Allam. Buff. hiſt. nat. XV p.* 77 *tab.* 13 *f*

Der Palatinaffe: Simia Roloway *Schreb. Säugth.* I *p.* 109 *n.* 26 *tab.* 25 fig. Allam.

Der Palatinaffe *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 10 *tab.* 2 *fig.* 5 Allam.

Longitudo corporis 1½ ped. Cauda longitudine corporis. Facies triangularis, plana, nigra, circumferentia alba, ex qua oritur barba alba bifida in pectus propendens. Corpus ſupra nigro fuſcum, pilis in capite, lateribus cruribusque apice albis. Pectus, venter, circumferentia natium calloſarum, et crura latere interiore alba (in patria animalis dicuntur eſſe aurantii coloris).

Habitat in Guinea. Mitis, ludibundus.

Nemaeus. 22. C. mento buccisque barbatis, natibus piloſis, cauda alba.

Sifac *Flacourt Madag. p.* 153? (vix eſt.)

Le grand Singe de la Cochinchine: Cercopithecus cinereus, genis longis pilis ex albo flauicantibus obſitis, torque ex caſtaneo purpuraſcente *Briſſ. regn. an. p.* 205 *n.* 18.

Le Douc *Buff. hiſt. nat. XIV p.* 298 *tab.* 41.

The Cochinchina Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 119 *n.* 85.

Simia

Simia (Nemaeus) caudata imberbis, buccis barbatis, cauda alba *Linn. mant. II p.* 521.

Sifach *Aleff. quadrup. IV tab.* 186 *fig.* 2 Buff.

Der Duk: Simia Nemaeus *Schreb. Säugth. I p.* 110 *n.* 27 *tab.* 24 fig. Buff.

Der Duk *Müll. Naturf. Suppl. p.* 10 *tab.* 2 *fig.* 4 Buff.

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$-4 ped. Facies breuis, planiufcula, rubra. Labia et orbitae oculorum brunneae. Auriculae minutae, nudae, rubrae. Frons barbaque alba. Tempora pilis longioribus exalbido cinereis. Collare purpurafcens. Caput fupra et corpus grifeum, pectus et venter flaua. Pedes fupra nigri, infra albi. Pollex palmarum breuis. Vngues fubacuti, excepto pollice plantarum. Ad bafin caudae macula magna alba. Nates tectae pilofae, quod foli huic Cercopitheco proprium. Cauda alba, mediocris, vix longitudine corporis.

Habitat in Cochinchina. In Madagafcar? Erectus faepe incedit.

Species obfcurae.

* The tawny Monkey *Penn. fyn. quadr. p.* 120 *n.* 86 Magnitudo Cati. Roftrum paullulum productum, coloris carnei. Nafus planus. Aures coloris carnei. Supra pallide fufcus, pilorum bafibus cinereis. Dorfum poftice aurantium. Pedes cinerei. Venter albus. Cauda corpore breuior.

Habitat in India. Malignus.

Varietas facie nigra, buccis pilis longis albis, corpore pallide grifeo virefcens. Artus grifei. Cauda fufca. *Penn. fyn. quadr. addit. tab.* 13 *A fig.* 2.

** The Goat Monkey *Penn. fyn. quadr. p.* 120 *n.* 88. Facies nuda, caerulea, oblique ftriata. Barba longa caprina. Corpus et artus profunde fufca. Cauda longa. *Muf. brit.*

*** The

*** The annulated Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 121 *n.* 89.

Facies plana. Pili longiores in fronte et buccis. Corpus et artus ſupra fuſca, venter cinereus. Cauda corpore breuior, annulata colore profundius et pallidius fuſco. *Muſ. brit.*

5. CEBVS.

Dentes Primores inciſores, ſupra et infra IV. Laniarius vtrinque I.

Manus in palmis plantisque.

Mammae pectorales II.

Cauda prehenſilis.

Nates piloſae.

Belzebul. 1. C. barbatus niger, caudae extremo pedibusque brunneis.

Aquiqui *Laet Amer. p.* 553.

Guariba Braſilienſibus *Marcgr. Braſ. p.* 226 *fig.* bona.

Cercopithecus Guariba apud Braſilienſes dictus *Ionſt. quadrup. p.* 142.

Cercopithecus Meerkatz *Ionſt. quadrup. tab.* 61.

Guariba Braſilienſibus Marcgrauii *Rai. ſyn. quadrup. p.* 153.

Singes *Dampier voy. III p.* 302.

Simia caudata barbata, cauda prehenſili *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 14.

Cebus Guariba Marcgrauii *Klein. quadrup. p.* 88.

Simia caudata barbata, cauda ſeminuda. The bearded Simia, with the tail half naked *Hill. anim. p.* 539.

Le Sapajou noir: Cercopithecus niger, pedibus fuſcis *Briſſ. regn. an. p.* 194 *n.* 2.

Die ſchwarze glatte Meerkatze *Hall. vierf. p.* 555.

Aquiqui *Dictionn. anim. I p.* 148.

Aqui-

Aquiqui *Bom. dictionn. I p.* 136.

Simia (Belzebul) caudata barbata nigra, cauda prehensili extremo pedibusque brunneis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 37. *n.* 12.

L'Ouarine *Buff. hist. nat. XV p.* 5.

The howling Baboon *Bancr. Guian. p.* 133.

The Preacher Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 122 *n.* 91.

Der Fliegenfänger *Müll. Naturs. I p.* 125.

Der schwarze Brüllaffe: Simia Belzebul *Schreb. Säugth. I p.* 112 *n.* 28.

Guariba, Guereba *Brasiliensibus.*

E maximis huius generis, magnitudine vulpis. Niger, pilis longis laeuissimis nitidus. Barba rotunda, nigra. Facies elata. Oculi nigri, splendentes. Auriculae breues, subrotundae. Pedes et caudae extremum fusca; cauda apice nuda. Mas paullo maior femina. Tetrapus.

Habitat in Brasilia et propinquis terris gregarius.

Minor aliquis ante et post meridiem in medio et altiori loco residet, reliqui paullo inferius circumsident: ille praecinit alta voce et signo manu dato, reliqui omnes accinunt, donec superior iterum manu signum det; tunc omnes vno momento silent, et superior grandi voce cantionem finit; nisi forte hac in fabula elephantem ex musca fecerit Marcgrauius. Mordax animal, nec domandum. Catulos in dorso gerit.

Os singulare cauum et durum in gula, vnde vox fortis; quod vide apud *Grew mus. reg. soc. p.* 11 *tab.* 2 sub nomine: a throttle bone of a male Aquiqui.

Seni-

CEBI cum Callitrichibus soli nouo orbi proprii, nisi forte Iacchus in Aethiopia reperiatur.

CEBOS dico, non quod veterum Cebos putem animalia veteribus certe ignota, sed quod nomine generico indigeo.

Seniculus. 2. C. barbatus rufus.

Rex ſimiorum *Laet Amer. p.* 553.

Arabata *Gum. Orin. I p.* 295.

Cercopithecus barbatus maximus, ferrugineus, ſtertoroſus *Barr. Fr. équ. p.* 150.

Le Singe rouge de Cayenne: Cercopithecus barbatus ſaturate ſpadiceus *Briſſ. regn. an. p.* 206 *n.* 20

Simia (Seniculus) caudata barbata rufa, cauda prehenſili *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 37 *n.* 13.

L'Alouate *Buff. hiſt. nat. XV p.* 5.

Another Monkey *Bancr. Guian. p.* 135.

The royal Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 123 *n.* 91 *α)*

Der Greiſs *Müll. Naturſ. I p.* 126.

Der rothe Brüllaffe: Simia Seniculus *Schreb. Säugth. I p.* 113 *n.* 29.

Mono colorado *Carthagenienſibus.*

Alawata, Singe rouge *Guianenſibus.*

Magnitudo circiter praecedentis, vel paullo maior. Color totius ruber. Barba minor. Vngues acuti, pollicum plantarum rotundiore. Auriculae magnae.

Habitat in Guiania in ſiluis ad fluuium. Transeuntes ex arboribus voce ingrata, rauca admodum ſimul clamoſa eminusque audienda ſalutat; vix adſpici ſe ſinit, quin illico clamet. Nocturnus. Victitat Muſae fructibus. Caro editur ſapida. Vox ingratior adhuc quam praecedentis.

Varietatem C. Belzebul putant Buffonius atque Pennantus, quod vix credibile videtur.

Paniſcus. 3. C. imberbis ater, palmis tetradactylis.

Cercopithecus maior, niger, faciem humanam referens: Qouata *Barr. Fr. équ. p.* 150.

Le Belzébut: Cercopithecus in pedibus anterioribus pollice carens, cauda inferius verſus apicem pilis deſtituta *Briſſ. regn. an. p.* 211 *n.* 29.

The

The four-fingered Monkey: Simia fuſca maior, palmis tetradactylis, cauda prehenſili ad apicem ſubtus nuda *Brown. Iam. p.* 489.

Simia (Paniſcus) caudata barbata, cauda prehenſili, palmis ſubtetradactylis. *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 26 *n.* 7.

Belzebut *Dictionn. anim. I p.* 272.

Geſtaarte Baard-Aap, met een aanvattende Staart, de Voorpooten omtrent viervingerig *Houtt. hiſt. I p.* 359.

A Spider Monkey *Edw. Glean. III p.* 222 (absque figura).

Simia (Paniſcus) caudata imberbis atra, cauda prehenſili, palmis tetradactylis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 37 *n.* 14.

Le Coaita *Buff. hiſt. nat. XV p.* 16 *tab.* 1.

The ape here called a Quato *Bancr. Guian. p.* 131 (ecaudatam dicit).

Quata *Fermin Surin. II p.* 115.

The fourfingered Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 124 *n.* 92.

Coaita *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 187 fig. Buff.

Der kleine Pan oder Waldgott *Müll. Naturſ. I p.* 126

Der vierfingerige Affe: Simia Paniſcus *Schreb. Säugth. I p.* 115 *n.* 30. *tab.* 26 fig. Buff.

Magnitudo Moloſſi. Corpus gracile, atrum, pilis longis, rudibus, villoſum. Caput paruum, oblongum, roſtro craſſo. Oculi magni, profundi. Auriculae breues, humanae, nudae. Facies nuda, ex nigro rubra. Naſus depreſſus. Pedes longi, graciles, cum cauda extrema dimidia brunnea, ſubtus nuda. Ne quidem rudimentum pollicis in palmis. Vngues palmarum rotundati, plantarum oblongiuſculi. Cauda corpore longior.

Habitat

Habitat in Guiania, Brafilia, Peru. In magnis gregibus arbores inhabitat, raro in terra videtur. Salit ex arbore in arborem ex cauda dependens, etiam pluribus inter fe cauda concatenatis. Gefticulatur, ramos, vrinam, excrementa iniicit in peregrinantes. Agillimus, fat mitis ac docilis. Vix fert noftrum clima. Cauda omnia arripit, cibumque eadem ori admouet, diciturque cauda pifcari. Parit 1-2. Menftruat.

Capucinus 4. C. imberbis fufcus, cauda hirfuta, pileo artubusque nigris.

Cercopithecus brafilianus II. Cay *Cluf. exot. p.* 372

Cay *Laet Amer. p.* 553.

Caa apud Touvoupinamboutios *Ionft. quadrup. p.* 144.

Cay Brafilianis Tououpinamboutiis dictus *Rai. fyn. quadr. p.* 155.

Macaq *Froger voy. p.* 145.

Simia (Capucina) caudata imberbis, cauda longa hirfuta, facie flauefcente *Linn. muf. Ad. Frid.* I *p.* 2 *tab.* 2.

Le Sapajou brun: Cercopithecus fufcus, capitis vertice nigro *Briff. regn. an. p.* 193 *n.* 1.

Le petit Singe negre: Cercopithecus totus niger *Briff. regn. an. p.* 196 *n.* 5.

Der ledergelbe Mufkusaffe *Hall. vierf. p.* 557?

Simia (Capucina) caudata imberbis, cauda longa hirfuta, facie flauefcente *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 29 *n.* 19.

Geftaarte Aap zonder Baard, met een lange ruige Staart, het Aangezigt geelagtig *Houtt. nat. hift. I p.* 369.

Simia (Capucina) caudata imberbis fufca, cauda prehenfili hirfuta, pileo artubusque nigris, natibus tectis *Linn fyft. nat.* 12, *I p.* 42, *n.* 30.

Le Sajou *Buff. hift. nat. XV p.* 37. Le Sajou brun *tab.* 4. Le Sajou gris *tab.* 5. (Hoc quidem fynonymon

mon doctiss. Schreberus refert ad Apellam, Pennantus ad trepidum, mihi huc potius pertinere videtur.)

Le Saï *Buff. hist. nat. XV p.* 51 *tab.* 8.

Le Saï à gorge blanche *Buff. hist. nat. XV tab.* 9.

Der braune Sapajou *Fermin Surin II p.* 115.

The weeper Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 127 *n.* 94.

Saj *Alest. quadrup. IV tab.* 189 fig. Buff.

Saiu bruno *Alest. quadr. IV tab.* 188 *fig.* 1. Grigio *fig.* 2 figg. Buff.

Der Capuziner *Müll. Naturs. I. p.* 136.

Der Winselaffe: Simia Capucina *Schreb. Säugth. I p.* 120 *n.* 34 *tab.* 29 fig. Linn.

Longitudo corporis 12-14 pollicum. Variat colore fusco, nigro, griseo, in dorso saturatiore; at capitis vertex, pedes caudaque nigra. Pectus ferrugineum, interdum album. Caput rotundum. Rostrum breue et crassum. Facies incarnata, plerisque nigricans, fronte magis incarnata. Ruga varicosa nigra retractilis supra frontem ante pileum. Nasus crassus, versus oculos carinatus. Oculi castanei, approximati. Auriculae rotundatae, pilosae, incarnatae. Dentes laniarii non distantes a proximis. Cauda corpore paullo longior, semper curuata, circumque collum saepius coniecta, pilis longioribus villosa. Vngues digitorum acuti, pollicum plantarum rotundati. Pedes situ transuerso ponit, vt postici semper inter anticos collocentur.

Habitat in Brasilia et Surinamo, gregarius.

Tarsis incedit tetrapus, non salit. Tardus, nec facile scandit. Miser et eiulans semper, clamore horrendo hostes pellit; stridet saepius vti Cicada; iratus latrat more catuli. Agilis, ludibundus. Melius reliquis omnibus fert nostrum clima, vt adeo in Gallia pariat. Non menstruat. Parit 1-2. Moschum redolet. Mitis, docilis, timidus.

Apella. 5. C. imberbis, corpore fuſco, pedibus nigris.

Simia (Apella) imberbis, cauda prehenſili, pedibus nigris, corpore fuſco *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 1 *tab.* 1.

Simia (Apella) caudata imberbis, cauda ſubprehenſili, corpore fuſco, pedibus nigris *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 28 *n.* 17.

Geſtaarte Aap zonder Baard, met een Staart die byna kan grypen, een bruin Lighaam en zwarte Poten *Houtt. nat. hiſt. I p.* 367.

Simia (Apella) caudata imberbis, cauda ſubprehenſili, corpore fuſco, pedibus nigris, natibus tectis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 42 *n.* 29.

Der Kahlbart *Müll. Naturſ. I p.* 136.

Der Saju: Simia Apella *Schreb. Säugth. I p.* 119 *n* 33 *tab.* 28 fig. Linn.

Hic quibus differat a Capucino, non ſatis intelligo Coniungit vtrumque cum trepido doctiſſ. Pennantus.

Habitat in America auſtrali.

trepidus. 6. C. imberbis, capillitio arrecto, manibus pedibusque caeruleis, cauda villoſa.

The buſh-tailed Monkey *Edw. glean. III p.* 222 *tab.* 312.

Simia (trepida) caudata imberbis, capillitio arrecto manibus pedibusque caeruleis, cauda prehenſili villoſa *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 39 *n.* 20.

The Capucin Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 126. *n.* 93.

Der Zitteraffe *Müll. Naturſ. I p.* 130.

Der Buſchſchwanzaffe: Simia trepida *Schreb. Säugth. I p.* 118 *n.* 31 *tab.* 27 fig. Edw.

Differt a praecedentibus capillitio arrecto hemiſphaerico. Forte eadem ſpecies, vti videtur Pennanto.

Habitat in America auſtrali.

Fatuel-

Fatuellus. 7. C. imberbis, capitis fasciculis pilorum duobus erectis.

The Tittee: Simia minor subfusco-miscella, ventre albido, cauda ad apicem nuda *Brown. Iam. p.* 489?

Le Sapajou cornu: Cercopithecus ex nigro et fusco variegatus, fasciculis duobus pilorum capitis coniculorum aemulis *Briss regn. an. p.* 165 *n.* 3.

Simia (Fatuellus) caudata imberbis, cauda prehensili, capitis fasciculis pilorum duobus corniculorum aemulis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 42 *n.* 28.

The horned Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 129 *n.* 96.

Der Feldgott *Müll. Naturs. I p.* 135.

Der Hornaffe: Simia Fatuellus *Schreb. Säugth. I p.* 118 *n.* 32.

A Capucino differt fasciculis pilorum duobus in vertice corniculorum aemulis; forte varietas mera eiusdem, vti Buffonio videtur.

Habitat in America australi.

sciureus. 8. imberbis flauo fuscus, ore caerulescente, pedibus ferrugineis.

Sagouin *Froger. voy. p.* 144.

Cercopithecus minor luteus: Sapajou jaune *Barr. Fr. équ. p.* 151.

Simia (sciurina) imberbis, cauda longa, occipite gibbo, vnguibus plantarum quatuor oblongis *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 3.

Le Sapajou jaune: Cercopithecus pilis ex fusco, flavescente et candicante variegatis vestitus, pedibus ex flauo rufescentibus *Briss. regn. an. p.* 197 *n.* 8.

Simia (sciurea) caudata imberbis, occipite prominulo, vnguibus quatuor plantarum oblongis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 29 *n.* 20.

Geſtaarte Aap zonder Baard, het Agterhoofd uitſteekende, vier Nagelen der Agterpooten langwerpig *Houtt. nat. hiſt. I p.* 369.

Der ſehr kleine americaniſche Affe, mit kurzem Bart, langem Schwanz, ſchwarzblauem Mund und langen Nägeln; Todtenköpflein genannt *Muſ. baruth. p.* 1 *tab. I* fig. bona.

Simia (ſciurea) caudata imberbis; occipite prominulo, vnguibus quatuor plantarum ſubulatis, natibus tectis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 43 *n.* 31.

Le Saïmiri *Buff. hiſt. nat. XV p.* 67 *tab.* 10.

Der gelbe Sapajou *Fermin Surin. II p.* 116.

The orange Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 128 *n.* 95.

Sajmiri *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 190 fig. Buff.

Der Eichhornaffe *Müll. Naturſ. I p.* 136.

Das Todtenköpfchen: Simia ſciurea *Schreb. Säugth. I p.* 121 *n.* 35 *tab.* 30 fig. muſ. Baruth.

Singe de nuit *Cayennenſibus.*

Sapajou aurore, Sapajou orangé, Sapajou jaune *Gallis vulgo.*

Longitudo corporis 10-12 poll. Caput rotundum, occipite gibbo prominulo. Facies plana, nuda. Naſus depreſſus, parumper acutus, apice nigreſcens. Supercilia ſetacea. Oculi magni. Orbitae incarnatae. Os fuſco caeruleſcens, paruum. Auriculae rotundatae, pilis longioribus ſordide albis. Corpus pilis molliſſimis flauo fuſcis, ſubtus pallidum. Vlnae et tibiae ferrugineae ſiue aurantiae. Vngues palmarum rotundati, plantarum ſubulati, excepto pollicum. Cauda longitudine dupla corporis villoſa, apice nigra.

Habitat in Braſilia et Guiania.

Tenerum animal, vix ferens noſtrum clima. Prouocatum clamat miſere. Moſchum redolet.

Huius

Huius omnino foetus videtur:
Cercopithecus americanus minor, Monkje dicitur *Seb. thes. I p.* 52. *tab.* 33. *fig.* 1.
Cebus Caput mortuum vulgo *Klein. quadrup. p.* 88.
Le Singe à queue de rat: Cercopithecus in dorso spadiceus, in ventre glaber, cauda murina *Briss. regn. an. p.* 201 *n.* 13.
Der Todtenkopf *Hall. vierf. p.* 558.
Simia (Morta) caudata imberbis, ore fusco, corpore spadiceo, cauda nuda subsquamosa *Linn syst. nat.* 10, *I p.* 29 *n.* 18.
Tête de Mort *Dictionn. anim. IV p.* 324.
Gestaarte Aap zonder Baard, met een bruinen Bek, het Lyf scharlaken rood, de Staart kaal en eeniger maate geschubd *Houtt. nat. hist. I p.* 368. *tab.* 6 *fig.* 5.
Cercopithecus caudatus, imberbis, ore fusco: cauda nuda subsquamosa *Gronov. zooph. I p.* 5. *n.* 21.
Tête de Mort *Bom. dictionn. IV p.* 366.
Simia (Morta) caudata imberbis spadicea, ore fusco, cauda nuda squamosa *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 43 *n.* 32.
Die Meerkatze mit dem Todtenkopf *Fermin. Surin. II p.* 116.
Der Todtenkopf, Mönch, *Müll. Naturs. I p.* 137 *tab.* 6 *fig.* 5.

lugubris. 9. C. imberbis niger, facie ferruginea.

Magnitudo Capucini. Totus niger. Facies ferruginea, cum circumferentia vsque in pedes anticos. Est in viuario Sereniss. Principis Hassiae, Cassellis. Mitis. A nemine hactenus descriptus, quantum video.

Species obscurae.

* Cercopithecus Luzonis minimus D. Camel. Magu vel Boot Indorum *Petiv. gazoph. tab.* 13 *fig.* 11

Simia caudata, ore ciliisque vibrizatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 6.

Simia (Syrichta) caudata imberbis, ore ciliisque vibrissatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 29 *n.* 21.

Gestaarte Aap zonder Baard, de Bek en Oogleden met lange Hairen *Houtt. nat. hist. I p.* 369

Simia (Syrichta) caudata imberbis, ore ciliisque vibrissatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 44 *n.* 33.

The Philippine Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 121 *n.* 90.

Der Zwerg *Müll. Natursf. I p.* 137.

Der Magu: Simia Syrichta *Schreb. Säugth. I p.* 124 *n.* 36 *tab.* 31 fig. Petiv.

Habitat in Philippinis insulis.

Nocturnam dicit Petiuerius, qui solus eam habuit, arborisque ramo circumligare pullum ad suum corpus.

** The Antigua Monkey *Penn. syn. quadr. p.* 129 *n.* 97.

Longitudo corporis 18 pollicum, caudae 20 poll. Facies nigra. Nasus breuis. Tempora barbata. Dorsum et latera colore ex aurantio et nigro intime mixto. Venter albus. Crura extus nigra, intus cinerea. Cauda profundius cinerea. Rich. Morris Esq. habuit ex Antigua, loco tamen natali incerto. Mitis, agilis, ludibundus.

CAL-

6. CALLITHRIX.

Dentes Primores inciſores ſupra et infra IV.
Laniarii ſolitarii.
Manus in palmis plantisque.
Mammae pectorales II.
Cauda elongata non prehenſilis.
Nates tectae.
Sacci in buccis nulli.

Pithecia. 1. C. ſubimberbis, vellere nigro apice albo, cauda nigra villoſiſſima.

Cagui Braſilienſibus *Marcgr. Braſ. p.* 227 *fig.* mediocr.

Cagui Braſilienſibus *Ionſt. quadrup. p.* 143 *tab.* 60 fig. Marcgr.

Cagui maior Braſilienſibus *Rai. ſyn. quadr. p.* 154.

Le Sapajou à queue de renard: Cercopithecus pilis nigris, apice albido, veſtitus, cauda pilis longiſſimis nigris obſita. *Briſſ. regn. an. p.* 195 *n.* 4.

The Sakee-winkee: Simia minima, capite albido, dorſo fuſco pone ruſeſcenti, cauda crinita *Brown. Iam. p.* 489.

Simia (Pithecia) caudata ſubimberbis, vellere nigro apice albo, cauda nigra villoſiſſima *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 40 *n.* 22.

Le Saki *Buff. hiſt. nat. XV p.* 88 *tab.* 12.

The Saccawinkee *Bancr. Guian. p.* 135.

Der ſchwarze Saguin *Fermin Surin. II p.* 117?

The fox tailed Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 130 *n.* 98.

Simia coda di volpe *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 191 fig. Buff.

Der Affe mit dem Fuchsſchwanz, der Saki *Berl. Samml. IV p.* 72.

Der Poſſenreiſser *Müll. Naturſ. I p.* 132.

Der Saki: Simia Pithecia *Schreb. Säugth. I p.* 125 *n.* 37 *tab.* 32 fig. Buff.

Maxima huius generis, longitudine corporis 17 pollicum. Caput rotundatum, paruum, rostro breviore. Auriculae paruae, rotundatae. Facies nigricans, lanugine breui, alba. Frons et tempora tecta pilis longioribus albidis. Nasus crassus. Oculi magni, prominentes, nigri. Corpus nigrum, pilis omnibus apice albis. Gula et abdomen pilis sordide albicantibus. Cauda pilis longis nigris, interdum rufis, elongata. Manus nigrae. Vngues acuti, pollicum rotundati.

Habitat in Guiania. Facile mansuescit, ludibundus, semper tamen paullulum malitiosus.

Iacchus. 2. C. auribus villosis patulis, cauda hirsutissima cinerea nigro annulata.

Callithrix *Plin. hist. nat. VIII c.* 54 *(c.* 80 *Hard.)?*

Cercopithecus Brasilianus I *Clus. exot. p.* 371.

Cercopithecus Brasilianus III Sagouin *Clus. p.* 372 *cum fig.* mediocr.

Sagovin *Laet Amer. p.* 553.

Cercopithecus Sagouin Clusii *Nieremb. hist. nat. p.* 177 *fig.* Clusii.

Sagouin *Nieremb. hist. nat. p.* 177 *fig.* pessima.

Cagui minor *Marcgr. Bras. p.* 227 *fig.* mala.

Caitaia Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p.* 227.

Cercopithecus Sagouin Clus. *Ionst. quadrup. p.* 143 *tab.* 74 fig. Clusii.

Caitaia *Ionst. quadr. p.* 143 *tab.* 60 fig. mala.

Galeo-

CALLITRICHES voco animalcula antecedentibus proxima, quamvis vtique genere differant, quae vere pilis coloribusque pulchris gaudent. Veteribus Callithrix Simiae pulchrum genus erat.

Galeopithecus Sagoin: Eine Art der Meerkatzen *Gesn. Thierb. p 22 fig.* pessima.

Animalculum e genere eorum, quae Hollandi Sanguinen vocant *Ludolf. Aeth. I c.* 10 *n.* 58 *fig.* mediocr.

Cagui minor Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p.* 154.

Caitaia *Rai syn. quadr. p.* 155.

Cercopithecus Sagouin Clus. *Rai. syn. quadr. p.* 160.

Simia caudata imberbis, vnguibus pollicum subrotundis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 8.

Cercopithecus minor, dilute oliuaceus, paruo capite *Barr. Fr. équ. p.* 151.

A very small Monkey Parson: *Philos. Transact. Vol. XLVII p.* 146 *fig* mala.

Cebus Sagouin dictus *Klein. quadrup. p.* 87 *tab.* 3 *fig.* mediocris.

Cebus Moschum redolens *Klein. quadrup. p.* 88.

Simia caudata imberbis, fusca, vnguibus pollicum subrotundis. The long-tailed, brown Simia, with the claws rounded *Hill. anim. p.* 537 *tab.* 26 *fig.* mala.

Le Singe musqué: Cercopithecus ex albido flauescens, moschum redolens *Briss. regn. an. p.* 197 *n.* 7.

Le Sagouin: Cercopithecus taeniis transversis alternatim fuscis et e cinereo albis variegatus, auriculis pilis albis circumdatis *Briss. regn. an. p.* 202. *n.* 14.

Das kleinste Sangouinchen *Hall. vierf. p.* 561.

Simia (Iacchus) caudata, auribus villosis patulis, cauda hirsutissima longissima, vnguibus subulatis: pollicum rotundatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 27 *n.* 12.

The Sanglin or Cagui minor *Edw. glean. I p.* 15 *tab.* 218 fig. opt.

Gestaarte Aap, met wyde ruige Ooren, een zeer lange en zeer ruige Staart, de Nagelen Elswyze doch die der Duimen rond aan 't end *Houtt. nat. hist. I p.* 364.

Simia (Iacchus) caudata, auribus villoſis patulis, cauda hirſutiſſima curuata, vnguibus ſubulatis: pollicum rotundatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 40 *n.* 24.
L'Ouiſtiti *Buff. hiſt. nat. XV p.* 96 *tab.* 14 fig. bona.
The ſtriated Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 132 *n.* 200.
Giacco *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 193 fig. Buff.
Der Sagoin Ouiſtiti genannt *Berl. Samml. IV p.* 78.
Der Biſamaffe *Müll. Naturſ. I p.* 132.
Der Sanglin oder kleinere Cagui *Edw. monogr.*
Der Sagoin: Simia Iacchus. *Shreb. Säugth. I p.* 126 *n.* 38 *tab.* 33 fig. Buff.
Akarima *Guianienſibus.*
Fonkes *aethiopice.*
Guereza *ambarice.*

Longitudo corporis poll. 6 - 7, caudae poll. 11 et vltra. Caput minimum; rotundum. Facies e nigro incarnata. Naſus paruus craſſus. Irides rubicundae. Auriculae rotundatae, magnae. Faſciculi pilorum longiſſimi, albi circa aures. Supra naſum inter oculos macula alba ſiue flaueſcens. Labia alba. Corpus pilis molliſſimis, cinereo, rufo et fuſco transuerſim ſtriatum. Cauda admodum villoſa, cinereo et nigro annulata, ſubcuruata. Manus pilis breuioribus. Vngues ſublati, pollicum rotundati.

Habitat in Braſilia, videturque etiam eſſe in Aethiopia, veteribus forſitan nota.

Agilis, irrequieta, ſcandens more Sciuri, cauda incuruata. Rodit ligna vt Mures, edit inſecta, fructus, lacticinia, panes triticeos martiosque, Theam, Paſſeres, Piſces. Indomita, morſitans, Felibus infeſtiſſima, quarum ventri ſe affigit. Sonus ſtridor ſibilans. Odor Moſchi. Velociſſime ſalit. Frigoris impatientiſſima. Parit tamen in Luſitania.

Oedi-

Oedipus. 3. C. imberbis, capillo dependente, cauda rubra.

Cercopithecus non barbatus *II Cluſ. exot. p.* 371.

Cercopithecus non barbatus 2 Cluſii *Rai. ſyn. quadr. p.* 160.

Simia caudata imberbis, collo pectoreque iubatis *Linn. ſyſt. nat. 6 p.* 3 *n.* 11.

Cebus inberbis 2 Cluſii *Klein. quadrup. p.* 89.

Cebus Liocephalus, Leoniceps, Löwenmeerkatze *Klein. quadrup. p.* 90.

The little Lion Monkey *Edw. birds IV tab.* 195.

Simia caudata collo pectoreque iubatis. The tailed Simia, with a mane on the neck and the breaſt *Hill. anim. p.* 538.

Le Tamarind: Cercopithecus pilis cineraſcentibus, nigro mixtis, veſtitus, cauda rufa *Briſſ. regn. an. p.* 199 *n.* 10.

Le Singe-Lion: Cercopithecus collo pectoreque iubatis *Briſſ. regn. an. p.* 204 *n.* 16.

Le petit Singe du Mexique: Cercopithecus pilis ex fuſco et rufo veſtitus, facie vltra auriculas vsque nigra et nuda, vertice longis pilis albis obſito *Briſſ. regn. an. p.* 210 *n.* 28.

Der Löwenaffe *Hall. vierf. p.* 560.

Das gröſſere Sangouinchen *Hall. vierf. p.* 561.

Simia (Oedipus) caudata imberbis, capillo dependente *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 28 *n.* 13.

Geſtaarte Aap zonder Baard, met neerhangend Hoofdhair *Houtt. nat. hiſt. I p.* 364 *tab.* 6 *fig.* 3 Edw.

Simia (Oedipus) caudata imberbis, capillo dependente, cauda rubra, vnguibus ſubulatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 41 *n.* 25; *III append. p.* 227.

Le Pinche *Buff. hiſt. nat. XV p.* 114 *tab.* 17.

The red-tailed Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 133 *n.* 102.

Pinco *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 195 fig. Buff.

Der

Der kleine Löwenaffe oder Pinche *Berl. Samml. IV p.* 86. cum fig. Edw.

Der kleine Löwenaffe *Müll. Naturf. I p.* 133 *tab.* 6 *fig.* 3 Edw.

Der Pinche: Simia Oedipus *Schreb. Säugth. I p.* 128 *n.* 39 *tab.* 34 fig. Edw.

Longitudo corporis 9 pollicum. Caput rotundatum. Facies nigra, pilis raris albis. Oculi nigri: irides ferrugineae. Naſus craſſus. Verruca in vtraque bucca. Auriculae ſubrotundae, nigrae, nudae. Corpus profunde aurantium, fere rubrum. Cauda longitudine dupla corporis, nigra, a baſi ad medium rubra, parum piloſa. Pectus, venter et pedes albi. Gula nigra. Manus intus nigrae. Vngues ſubulati, excepto pollice palmarum breui. Caput capillitio dependente longo albo. Ani regio rubra. Cutis corporis totius nigra.

Habitat in Mexico, Braſilia, Guiania.

Animal tenerum, agile. Vox Muris ſiue auiculae. Odor Moſchi.

Roſalia. 4. C. capite piloſo, faciei circumferentia pedibusque rubris.

Le petit Singe-Lion: Cercopithecus ex albo flauicans, faciei circumferentia ſaturate rufa *Briſſ. reg. an. p.* 200 *n.* 11.

Simia (Roſalia) caudata imberbis, capite piloſo, faciei circumferentia pedibusque rubris, vnguibus ſubulatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 41 *n.* 26.

Le Marikina *Buff. hiſt. nat. XV p.* 108 *tab.* 16.

The ſilky Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 133 *n.* 101 *tab.* 15.

Simiotto Leone *Alcſſ. quadrup. IV tab.* 194 fig. Buff.

Der kleinköpfige Löwenaffe *Berl. Samml. IV p.* 83.

Der Roſenaffe *Müll. Naturf. I p.* 134.

Der

Der Marikina: Simia Rofalia *Schreb. Säugth. I p.* 130 *n.* 40 *tab.* 35 fig. Buff.
Le petit Singe-Lion *Gallis vulgo.*

Longitudo corporis 8-9 pollicum, caudae 12-14 poll. Caput rotundum. Facies fufca, circumferentia longius pilofa, rubra, qua auriculae rotundatae nudae occultantur. Nafus craffus. Oculi rufi. Corpus pilis denfis, longis, fericeis, fplendentibus, pallide flauis, fere albis. Manus obfcure purpureae. Vngues fubulati, pollicum rotundati. Cauda apice floccofa.

Habitat in Brafilia. Agilis.

argentata. 5. C. imberbis exalbida, facie rubra, cauda fufcefcente.

Singes - - - on les nomme Pinches à Maynas, et à Cayenne Tamarins *Condam. voy. p.* 165.
Micos *Vlloa voy. I p.* 50.
Le petit Singe de Para: Cercopithecus ex cinereo albus argenteus, facie auriculisque rubris fplendentibus, cauda caftanei coloris *Briff. regn. an. p.* 201 *n.* 12.
Sagouin *Bom. dictionn. IV p.* 70.
Le Mico *Buff. hift. nat. XV p.* 121 *tab.* 18.
The fair Monkey *Penn. fyn. quadr. p.* 134 *n.* 103.
Simia (argentata) caudata imberbis exalbida, facie rubra, cauda fufcefcente *Linn. mant. II p.* 521.
Mico *Aleff. quadrup. IV tab.* 196 fig. Buff.
Die kleine Meerkatze von Para *Berl. Samml. IV p.* 90.
Der Miko: Simia argentata *Schreb. Säugth. I p.* 131 *n.* 41 *tab.* 36 fig. Buff.
Der Mico *Müll. Naturf. Suppl. p.* 11 *tab.* 2 *fig.* 6 Buff.

Longitudo corporis 8 pollicum, caudae 12 poll. Caput paruum rotundatum. Facies cum auriculis fanguinea

guinea ſiue cinnabarina. Roſtrum breue. Auriculae magnae, nudae. Oculi diſtantes. Corpus pilis longis, ſplendentibus, argenteis, pulcherrimis. Cauda ſplendens, tenuis, caſtanea. Vngues incurui: pollicum plantarum rotundati.

Habitat in Braſilia.

Midas. 6. C. imberbis, labio ſuperiore fiſſo, auribus quadratis nudis, pedibus croceis.

Cercopithecus minimus, niger, leontocephalus, auribus Elephantinis *Barr. Fr. équ. p.* 151.

The little black Monkey *Edw. birds IV tab.* 196.

Die lächerliche Meerkatze aus America *Hall. vierf. p.* 560?

Simia (Midas) caudata imberbis, labia ſuperiore fiſſo, auribus quadratis nudis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 28 *n.* 15.

Geſtaarte Aap zonder Baard, met de bouenlip geſpleeten en kaale vierkante Ooren *Houtt. nat. hiſt. I p.* 366 *tab.* 6 *fig.* 4 Edw.

Cercopithecus imberbis, caudatus, niger; labio ſuperiore fiſſo; auriculis quadratis nudis; pedibus croceis *Gronov. zooph. I p.* 5 *n.* 20.

Simia (Midas) caudata imberbis, pedibus rufis, vnguibus ſubulatis *Linn. muſ. Ad. Frid. II p.* 4.

Simia (Midas) caudata imberbis, labio ſuperiore fiſſo, auribus quadratis nudis, vnguibus ſubulatis, pedibus croceis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 42 *n.* 27.

Le Tamarin *Buff. hiſt. nat. XV p.* 92 *tab.* 13.

Der ſchwarze Saguin mit gelben Füſſen *Fermin Surin. II p.* 117.

The great eared Monkey *Penn. ſyn. quadr. p.* 131 *n.* 99.

Tamarino *Alaſſ. quadrup. IV tab.* 192 fig. Buff.

Der kleine Mydasaffe *Berl. Samml IV p.* 75.

Der

Der Langohr *Müll. Naturf. I p.* 135 *tab.* 6 *fig.* 4 Edw.
Der Tamari: Simia Midas *Schreb. Säugth. I p.* 132 *n.* 42 *tab.* 37 fig. Edw.

Longitudo corporis 7 - 8 pollicum. Caput rotundum, incarnato-nigricans. Facies nuda. Pili frontis erectiores. Auriculae quadratae, magnae, nudae, incarnato-nigricantes. Nafus craffus. Oculi caftanei. Labium fuperius fiffum. Corpus pilis mollioribus, atris, poftice in dorfo paullo flauefcentibus. Manus et pedes crocei fiue rubri. Vngues arcuati, acuminati, compreffi, fed in pollice plantarum parui, rotundati, plani. Cauda corpore duplo longior, cylindrica, pilis breuioribus nigris tecta.

Habitat in calidioribus Americae auftralis. Agilis. Manfuefcit. Non facile fert noftrum clima.

7. LEMVR.

Dentes Primores fuperiores IV: intermediis remotis.
inferiores VI longiores porrecti, compreffi, paralleli, approximati.
Laniarii folitarii, approximati.
Molares plures, fublobati: antici longiores acutiores.
Manus in palmis plantisque (*plerisque*).

tardigradus. 1. L. ecaudatus.

Animal elegantiffimum Robinfoni *Rai. fyn. quadr. p.* 161.

Animal-

LEMVRES praecedentibus proximi, figura, moribus, cibo. Faciem vulpinam habent.

Animalculum cynocephalum ceilonicum, Tardigradum dictum, Simii species *Seb. thes. I p.* 55 *tab.* 35 *fig.* 1 mas, *fig.* 2 femina: figg. bonae.

Cercopithecus ceilonicus, seu tardigradus dictus, maior, mas *Seb. thes. I p.* 75 *tab.* 47 *fig.* 1 bon.

Simia mammis quaternis, capite ad aures crinito *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 42.

Simia ecaudata, vnguibus indicis subulatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 2.

Simia acauda, digitorum indicum vngue subulato *Linn. amoen. acad. I p.* 558.

Der Faule mit dem Hundskopf, beyderley Geschlechts *Meyer Thiere III tab.* 3 fig. Seb.

Simia ceylonica, superiori labio leporino *Klein. quadrup. p.* 86.

Simia rostro canino, capite elato *Klein. quadrup. p.* 86.

Simia acauda, vnguibus indicis subulatis. The tailless Simia, with the claws of the fore - toes subulated *Hill. anim. p.* 536.

Lemur (tardigradus) ecaudatus *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 3.

Le Singe de Ceylan: Simia (ceylonica) vnguibus indicis pedum posteriorum longis, incuruis et acutis *Briss. regn. an. p.* 190 *n.* 3.

Le Singe cynocephale de Ceylan: Simia cynocephala (ceylonica) vnguibus indicis longis, incuruis et acutis *Briss. regn. an. p.* 191 *n.* 2.

Der langgestreckte röthliche Affe *Hall. vierf. p.* 551.

Der Affe von Ceilon *Hall. vierf. p.* 552.

Lemur (tardigradus) ecaudatus *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 29 *n.* 1.

Makis *Dictionn. anim. III p.* 11 (cum congeneribus).

Spookdier zonder Staart *Houtt. nat. hist. I p.* 398 *tab.* 7 *fig.* 1 Sebae.

Der kleine ostindische Affe, ohne Schwanz, mit dem Hundskopf, Menschenhänden und langen spitzigen

gen Nägeln an dem zweyten Zehen des Fuſſes *Muſ. baruth. p.* 19 *tab.* 9 *fig.* 1 bona.

Der allerkleinſte oſtindiſche röthliche Affe ohne Schwanz, mit dem Hundskopf, Menſchenhänden, und langen ſpitzigen Nägeln am zweyten Zehen des Fuſſes, ſo man noch nicht beſchrieben oder abgebildet findet. *Muſ. baruth. p.* 19 *tab.* 9 *fig.* 2.

Loris *Bom. dictionn. II p.* 716.

Le Loris *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 210 *tab.* 30.

Lemur (tardigradus) ecaudatus *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 44 *n.* 1.

The tailleſs Maucauco *Penn. ſyn. quadr. p.* 135 *n.* 104 *tab.* 16 *fig.* 1.

Lori *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 160 fig. Buff.

Der Langſchleicher *Müll. Naturſ. I p.* 147 *tab.* 7 *fig.* 1 Sebae.

Der ceyloniſche Affe *Mart. Naturlex. I p.* 563.

Der Loris: Lemur tardigradus *Schreb. Säugth. I p.* 134 *n.* 1 *tab.* 38 fig. propria.

Statura Sciuri. Caput paruum, rotundatum, roſtro acuminato. Facies tecta. Naſus acuminatus. Orbitae oculorum nigro circumdatae. Oculi magni, approximati. Linea longitudinalis alba oculis interiecta. Auriculae ſubnudae, breues, vrceolatae, intus bifoliatae: interius ſcilicet aures inſtruuntur lamellis duabus membranaceis obtuſis, exſtantibus, longitudine auriculae. Corpus longum, gracile, pilis breuibus, mollibus, ſericeis, cinereo ferrugineis, linea dorſali ſubfuſca, in fronte bifurcata, gula albidiore. Mammae duae pectorales, duae in abdomine verſus pectus. Artus tenuiores. Pedum palmae plantaeque nudae. Vngues rotundati: indicum plantarum vero ſubulati. Cauda fere nulla.

In femina colores dilutiores in dorfo, faturatiores in ventre; in mare vice verfa *Briff.* Femina meit e clitoride perforata, quod maxime fingulare *Buff.*

Habitat in Zeylona.

Tardigradus Linneo ex auctoritate fufpecta Sebae, negantibus id Buffonio, Pennanto Schrebero. Tener, olfactu audituque excellens, phytiphagus, monogamus.

Mongoz. 2. L. caudatus grifeus, cauda vnicolore pilofa.

Simius Zambus *Nieremb. hift. nat. p.* 176 *cum fig.* mala.

The Macaffar Fox *Nieuh. Eaft. Ind. p.* 361 *cum fig.*

Singes bruns de couleur des caftors *Cauche Madag. p.* 127.

Vary *Flacourt Madag. p.* 153 *fig.* peffima.

The Chitote *Barbot Guin. p.* 560 *tab.* 7 fig. mala.

Simia-Sciurus lanuginofus fufcus ex Iohannae infula *Petiv. gazoph. tab.* 17 *fig.* 5 mediocris.

Le Maki aux pieds fauves: Profimia fufca, rufo admixto, facie nigra, pedibus fuluis *Briff. regn. an. p.* 221 *n.* 3.

Le Maki aux pieds blancs: Profimia fufca, nafo, gutture et pedibus albis *Briff. regn. an. p.* 221 *n.* 2.

Der Biberaffe *Hall. vierf. p.* 559?

The Mongooz *Edw. glean. I p.* 12 *tab.* 216.

Maki *Bom. dictionn. III p.* 7 cum fequentibus.

Le Mongous *Buff. hift. nat. XIII p.* 174 *tab.* 26.

Lemur (Mongoz) caudatus grifeus, cauda vnicolore *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 44 *n.* 2.

The woolly Maucauco *Penn. fyn. quadr. p.* 136 *n.* 105.

Mongus *Alefſ. quadrup. III tab.* 149 fig. Buff.

Das Ringauge *Müll. Naturf. I p.* 147.

Der Mongus: Lemur Mongoz *Schreb. Säugth. I p.* 137 *n.* 3 *tab.* 39 *A* fig. Buff. *tab.* 39 *B* fig. Edw.

Der Mongus *Müll. Naturf. Suppl. p.* 12.

Ein

Ein Monkos *Walch. Naturf. VIII p.* 26 *tab.* 1 fig. mala.

Magnitudo Cati. Corpus griseum subtus album, pilis longis, densis, mollibus, crispis. Cauda concolor, elongata. Fascia ocularis fusca. Nasus albus, apice nigro. Irides aurantiae. Auriculae breues, rotundatae. Pedum palmae plantaeque nudae, nigricantes. Vngues rotundati, excepto indicis plantarum subulato.

Variat pedibus albis vel fuluis; facieque tota fusca.
Habitat in Madagascar insulisque adiacentibus vsque ad Celebes. Dormit in arboribus, phytiphagus. Caput contra pluuiam cauda obtegit. Salax, ludibundus, mitis, tener. Vox porcelli.

Macaco. 3. L. caudatus niger, collari barbato, cauda pilosa.
Les Antauarres *Cauche Madag. p.* 127.
Cercopithecus indicus Bugée dictus *Rai. syn. quadr. p.* 158? vix videtur.
Cercopithecus indicus Bugee dictus *Sloan. Jam. II p.* 329? vix.
Le Maki: Prosimia fusca *Briss. regn. an. p.* 220 *n.* 1.
The black Maucauco *Edw. glean. I p.* 13 *tab.* 217.
Lemur cauda floccosa, corpore fusco *Gronov. zooph. I p.* 5 *n.* 22.
Le Vari *Buff. hist. nat. XIII p.* 174 *tab.* 27.
Lemur (Macaco) caudatus niger, collari barbato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 44 *n.* 3.
The ruffed Maucauco *Penn. syn. quadr. p.* 138 *n.* 107.
Vari *Aless. quadrup. III tab.* 150 fig. Buff.
Der Bartkragen *Müll. Naturf. I p.* 147.
Der Vari: Lemur Macaco *Schreb. Säugth. I p.* 142 *n.* 4 *tab.* 40 *A* fig. Edw. *tab.* 40 *B* fig. Buff.

Longitudo corporis 11 pollicum, caudae 16 poll. et vltra. Rostrum elongatum, acutum. Irides aurantiae, fere rubrae. Auriculae breues, pilis longioribus caput circumdantibus fere occultatae. Color totius niger vel fuscus, interdum albus nigro maculatus pedibus nigris, vel etiam totus albus. Pili mollissimi. Vngues indicis plantarum fere subulati.

Habitat in Madagascar. Bene masuescit. Cubile purum seruat; radiis solis delectatur; dormit in loco tenebricoso. Phytiphagus respuit oua, carnes, pisces. Vox fortissima pro corporis mole parua.

Catta. 4. L. caudatus, cauda albo nigroque annulata pilosa.

Vary *Flacourt Madag. p.* 153.

The Maucauco *Edw. birds IV tab.* 197.

Cebus capite vulpino, Füchsel-Männchen *Klein. quadrup. p.* 90.

Le Maki à queue annelée: Prosimia cinerea, cauda cincta annulis alternatim albis et nigris *Briss. regn. an. p.* 222 *n.* 4.

Lemur Catta *Toreen Surat. p.* 440.

Der Fuchsaffe *Hall. vierf. p.* 560.

Lemur (Catta) cauda annulata *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 30 *n.* 2.

Spookdier met een gebandeerde Staart *Houtt. nat. hist. I p.* 399 *tab.* 7 *fig.* 2 Edw.

Lemur (Catta) cauda nigro-annulata *Linn. mus. Ad. Frid. II p.* 5.

Le Mocock ou Mococco *Buff. hist. nat. XIII p.* 173 *tab.* 22.

Lemur

Lemur Catta et *Tarsier* recedunt paullulum dentium structura a congeneribus.

Lemur (Catta) caudatus, cauda albo nigroque annulata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 45 *n.* 4.
The ring-tail Maucauco *Penn. ſyn. quadrup. p.* 137 *n.* 106.
Mococo *Alcſſ. quadrup. III tab.* 148 fig. Buff.
Der Maukauko *Berl. Samml. V p.* 376 fig. Edw.
Der Eichhornaffe *Müll. Naturſ. I p.* 148 *tab.* 7 *fig.* 2 Edw.
Der Mokoko: Lemur Catta *Schreb. Säugth. I p.* 143 *n.* 5 *tab.* 41 fig. Edw.

Corpus magnitudine et ſtatura felis, griſeum, ſubtus album totum, vna cum temporibus, auribus, frontisque albedine bifida. Vellus omne denſiſſimum, molliſſimum, rectiuſculum. Dentes primores ſuperiores ſex obtuſi: intermediis remotis; inferiores ſex paralleli, ſubulati, prominentes, approximati: anterioribus ſenſim longioribus. Laniarii ſupra tres, ſubulati: primo maiore exſerto; infra ſolitarii absque ſpatio remouente. Molares vtrinque nonnulli, obtuſi. Caput naribus acuminatum, labio ſuperiore prominulo, vt in cane. Vibriſſae ad os ſiue nares, et antice ſupra oculos. Lingua glabra, mollis. Os nigricans. Area oculorum nuda. Oculi magni. Sutura perpendicularis palpebrae ſuperioris. Irides brunneae. Auriculae erectae. Aurium vellus anticum longius piloſum. Verrucae in medio temporum, et antico ſuperciliorum. Macula nuda in vlna interiore. Pedes Simiae, talis incedentes: pollice omnium ſpatio remoto; ſubtus nigri et nudi. Poſtici longitudine corporis, ſupra albi. Vngues digitis anguſtiores; pollicum omnes ouati; reliquorum, magis acuti, ſubcarinati. Cauda longitudine dupla corporis, erecta, ſemper mouenda, obtuſa, craſſiuſcula, villoſa, picta annulis pluribus albis alternisque nigris, ſedenti ſaepe circa corpus caputque flexa. Vulua propendens.

Recedit itaque dentibus paullulum a congeneribus, neque tamen ideo ſeparandus.

In Linneano exemplo oculus dexter diurnus pupilla lineari perpendiculari; ſiniſter nocturnus pupilla orbiculata magna.

Habitat in Madagaſcar et proximis inſulis, gregarius. Victitat fructibus, oleribus, radicibus. Cibos tenet manibus; mundus, mitiſſimus, tardiuſculus, placidus et tranquillus murmurat vt Felis. Vidi Caſſellis, in viuario Sereniſſimi Principis.

flauus. 5. L. flauus, cauda prehenſili.

Cercopithecus indicus Bugee dictus *Sloan. Iam. II p.* 329?

The yellow Maucauco *Penn. ſyn. quadr. p.* 138 *n.* 108 *tab.* 16 *fig.* 2.

Der Maki mit dem Wickelſchwanze: Lemur flauus *Schreb. Säugth. I p.* 145 *n.* 6 *tab.* 42 fig. Penn.

Der Wickelſchwanz *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 13 *tab.* 2 *fig.* 7 Penn.

Longitudo corporis 19 pollicum, caudae 17 poll. Caput planum largumque. Oculi parui. Naſus breuis, fuſcus. Auriculae breues, largae, pendulae, valde diſtantes. Buccae tumidae. Lingua longiſſima. Pedes breues, craſſi, digitis 5-5, pollicibus non remotis a reliquis. Vngues ſubouati, incarnati. Pili corporis breues, molles, ſplendentes denſique, ſupra ex nigro flaui, in buccis, crurum interiore latere ventreque albi. In medio ventre ſtria lata fuſca vsque ad caudam, aliaque per dorſum a capite ad caudam. Cauda ſplendens, nigro fuſca, teres, prehenſilis.

Habitat in montoſis Iamaicae.

Mitis, ludibundus, omnia cauda arripit, eaque ſe ſuſpendit.

ſpendit. Caput recondit ſub ſemoribus abdomineque.

Tarſier. 6. L. cauda gracili nuda apice ſubfloccoſa, tibiis poſticis nudis.

Le Tarſier *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 87 *tab.* 9.
The woolly Ierboa *Penn. ſyn. quadr. p.*298 *n.* 225.
Tarſiere *Aleſſ. quadrup. III tab.* 145 fig. Buff.

Soli Buffonio viſum animal anomalon, ſedis incertae: Pennanto videtur Iaculo affine, clar. Blumenbachius Lemurem potius putat; ego aut Lemurem, aut Didelphidem credo.

Maior Muſculo. Corpus pilis longis, mollioribus, fuſcis, capite cinereo. Naſus acuminatus. Auriculae longae, erectae, nudae, pellucidae. Oculi magni. Dentes primores duo ſupra et infra, acuminati; laniarii ſolitarii ſupra et infra: inferioribus longioribus; molares vtrinque ſex. Pedes poſtici longiores anticis (quod et in Lemure Mongoz, Macaco et Catta). Tibiae graciles nudae. Pedes manus ſunt, digitis longis 5-5 Simiae. Vngues pollicum rotundati, digitorum reliquorum acuminati. Cauda elongata, gracilis, nuda, apice pilis longioribus.

Habitat - - - - -

volans. 7. L. caudatus, membrana ambiente volitans.

Veſpertilio admirabilis *Bont. Ind. or. p.* 68 *fig. p.* 69 mala.
Cato Simius volans Cameli *Petiv. gazoph. tab.* 9 *fig.* 8 peſſima.
Cato-Simius volans Cameli *Philoſ. Transact. n.* 277 *p.* 1065.

Felis volans Ternatana *Seb. thes. I p.* 93 *tab.* 58 *fig.* 2 femina, *fig.* 3 mas.

Die fliegende Katze von Ternate, das Weiblein *Meyer Thiere III tab.* 37 das Männlein *tab.* 38 figg. Sebae.

Die fliegende Katze *Hall. vierf. p.* 453.

Lemur (volans) caudatus, membrana ambiente volitans *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 30 *n.* 3.

Vliegend Spookdier met een Staart *Houtt. nat. hist. I, p.* 401 *tab.* 7 *fig.* 3 Sebae.

Lemur (volans) caudatus, membrana ambiente volitans *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 45 *n.* 5.

The flying Maucauco *Penn. syn. quadr. p.* 139 *n.* 109.

Die fliegende Katze *Müll. Naturs. I p.* 149 *tab.* 7 *fig.* 3 Sebae.

Der fliegende Maki: Lemur volans *Schreb. Säugth. I p.* 146 *n.* 7 *tab.* 43 fig. Sebae.

Longitudo 3 ped. latitudo volantis eadem. Caput oblongum. Os paruum, dentibus minutis. Oculi magni. Auriculae paruae, rotundatae, membranaceae. Membrana a capite ad palmas, a palmis per latera ad plantas, a plantis ad apicem caudae expansa. Corpus et membrana supra pilis mollibus griseis, subtus membrana nuda, venulosa. Crura vellere molli, flauo. Digiti 5-5. Vngues graciles, acuti, curui, quibus adhaeret. Cauda gracilis, spithamea. Mammae duae pectorales.

Habitat circa Guzurat, in Moluccis, Philippinisque insulis. Victitat fructibus arborum. Videtur esse huius generis, certe affinis. Dentes autoptis accuratius examinandi.

8. DIDEL-

8. DIDELPHIS.

Dentes Primores ſuperiores X.
inferiores VIII: intermediis duobus breuiſſimis.
Laniarii longi, plures.
Molares denticulati.
Lingua ſubciliata.
Plantae manus, pollice mutico.
Cauda longa, gracilis, ſubnuda.

marſupialis. 1. D. mammis intra folliculum abdominalem.

Tlaquatzin *Hernand. Mex. p.* 330.

Simiuulpa *Gesn. quadrup. p.* 981 fig. peſſima.

Carigue *Laet Amer. p.* 551.

Tlaquatzin *Nieremb. hiſt. nat. p.* 156 *fig.* nimis piloſa.

Vulpiſimia vel Simiuulpa *Aldrov. digit. p.* 223 *fig.* peſſima.

Carigueya Braſilienſibus, aliquibus Iupatiima *Marcgr. Braſ. p.* 222 *cum fig.* mediocri. (*Femina.*)

Tai-ibi Braſilienſibus, Luſitanis Cachorro do mato, Belgis een Boſchratte *Marcgr. Braſ. p.* 223. (*Mas.*)

Carygueia et Taibi *Ionſt. quadrup. p.* 135 *tab.* 63 fig. Marcgr.

Semiuulpa *Ionſt. quadrup. tab.* 58 fig. Gesn.

Tlaquatzin *Ionſt. quadrup. tab.* 73 fig. Nieremb.

Carigueyá *Piſ. Ind. p.* 323 *cum fig.* mediocri.

L'Opaſſum *Rochef. Antill. p.* 137 *cum fig.* mediocri.

Le Manitoü de la Grenade *Du Tertre Antill. II p.* 301.

DIDELPHIDES calcaneis incedunt. Edunt vegetabilia, auiculas, oua. Species nondum ſatis bene determinatae.

Simiulpa, Fuchsaff *Gesn. Thierb. p.* 21 *cum fig.* pessima.

Maritacáca Pison. *Rai. syn. quadr. p.* 182.

Tai-ibi Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p.* 185.

Carigueya seu Marsupiale americanum, or the anatomy of an Opossum, *Tyson: Philos. Transact. n.* 239 *p.* 105.

Carigueya seu Marsupiale americanum masculum *Cowper: Philos. Transact. n.* 290 *p.* 1565.

The Possum *Lawson Carolin. p.* 120 *cum fig.* mediocri.

(Filander *Bruin Reiz. p.* 374 *tab.* 213 *fig. bona* exceptis pedibus.)

Le Manicou *Feuill. Iourn. III p.* 206.

(De Filander *Valent. Amboin. III p.* 275.)

Marsupiale americanum. The Opossum *Catesb. Carol. append. p. XXIX.*

Philander, Opassum siue Carigueja brasiliensis mas *Seb. thes. I p.* 56 *tab.* 36 *fig* 1.

Philander americanus seu Carigueja, cum catulis saccum ventris intrantibus femina *Seb. thes. I p.* 57 *tab.* 36 *fig.* 2.

Carigueja iunior, seu Opassum, cum sacco aperto *Seb. thes. I p.* 57 *tab.* 36 *fig.* 3.

Philander orientalis cum catulis suis in sacco ventris haerentibus, femina *Seb. thes. I p.* 61 *tab.* 38 *fig.* 1.

Philander maximus orientalis femina *Seb. thes. I p.* 64 *tab.* 39 *fig.* 1.

The Possum *Brick. North-Car. p.* 125.

Didelphis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 44.

Le Rat de Bois *Charlev. nouv. Fr. III p.* 134.

Fara ò Ravale *Gum. Orin. II p.* 311.

Die Beutelratze das Männlein *Meyer Thiere III tab.* 4. Das Weiblein *tab.* 5 figg. Sebae.

Die orientalische Beutelratze *Meyer Thiere III tab.* 7 fig. Sebae.

Die

Die gröſte orientaliſche Beutelratze *Meyer Thiere III tab.* 8 fig. Sebae.

Didelphis mammis intra abdomen *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 1.

Didelphis mammis intra abdomen *Linn. amoen. acad.* I *p.* 559.

Vulpes maior, putoria, cauda tereti et glabra, Aouaré, Puant *Barr. Fr. équ. p.* 166.

Mus marſupialis; ſylueſtris, Braſileenſis *Klein. quadrup. p.* 59.

Mus marſupialis. Philander Orientalis *Klein. quadrup. p.* 59.

Mus marſupialis maximus *Klein. quadrup. p.* 59.

Didelphis mammis intra abdomen. The Didelphis with the paps within the abdomen: The Opoſſum *Hill. anim. p.* 530 *tab.* 25 fig. mediocr.

Didelphis (Opoſſum) mammis intra abdomen *Linn. muſ. Ad. Frid.* I *p.* 10.

Le Philandre: Philander (. . . . . .) ſaturate ſpadiceus in dorſo, in ventre flauus, maculis ſupra oculos flauis *Briſſ. regn. an. p.* 286 *n.* 1.

Le Philandre oriental: Philander (orientalis) ſaturate fuſcus in dorſo, in ventre flauus, maculis ſupra oculos flauis *Briſſ. regn. an. p.* 288 *n.* 2.

Le Philandre d'Amboine: Philander (Amboinenſis) atroſpadiceus in dorſo, in ventre ex albido cinereo flauicans, maculis ſupra oculos obſcure fuſcis *Briſſ. regn. an. p.* 289 *n.* 3.

The Opoſſum: Didelphis mammis bulga ventrali tectis, capite vulpino ſimile *Brown. Iam. p.* 486.

Die amerikaniſche Beutelratte *Hall. vierf. p.* 436 *tab.* 25.

Die braſiliſche Beutelratte *Hall. vierf. p.* 441.

Der morgenländiſche Philander *Hall. vierf. p.* 441.

Der gröſte Philander *Hall. vierf. p.* 441.

Didelphis (marſupialis) mammis 8 intra abdomen *Linn. ſyſt. nat.* 10, I. *p.* 54 *n.* 1.

Didel-

Didelphis (Opoſſum) cauda ſemipiloſa, ſuperciliorum regione pallidiore, mammis binis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 55 *n.* 3.

Le Rat de Bois *Du Pratz Louiſ. II p.* 94 *cum fig.* mediocri.

Carygueya *Dictionn. anim. I p.* 439.

Didelphe *Dictionn. anim. II p.* 28 cum congeneribus.

Buidel-Rot: Philander met agt Prammen in een Zak aan den Buik *Houtt. nat. hiſt. II p.* 317.

Philander met de halve Staart hairig, de plaats der Wenkbraauwen bleeker, twee Prammen in een Zak aan den Buik *Houtt. nat. hiſt. II p.* 322 *tab.* 18 *fig.* 2 Sebae.

Le Sarigue ou l'Opoſſum *Buff. hiſt. nat. X p.* 279 *tab.* 45 mas, *tab.* 46 femina.

Didelphe *Bom. dictionn. II p.* 38 cum congener.

Didelphis (marſupialis) mammis 8 intra abdomen *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 71 *n.* 1.

Didelphis (Opoſſum) cauda ſemipiloſa, ſuperciliorum regione pallidiore, mammis binis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 72 *n.* 3.

Didelphidis Opoſſum varietas orientalis *Pallas miſcell. p.* 62.

Der Philander *Fermin Surin. II p.* 100.

The virginian Opoſſum *Penn. ſyn. quadr. p.* 204 *n.* 144 *tab.* 21 *fig.* 1.

Carigueya maſchio e femmina *Aleſſ. quadrup. III tab.* 127 figg. Buff.

Die Beutelratze *Müll. Naturſ. I p.* 288.

Die Waldratze *Müll. Naturſ. I p.* 292 *tab.* 18. *fig.* 2 Sebae.

Cuſſu-Aru *Amboinenſibus.*

Pelandoc-Aru *Maleitis.*

Aijir *in inſula Aru.*

Awari *Surinamenſibus.*

Carigueya *Braſilienſibus litoralibus.*

Zorra mochillera (vulpes marſupialis) Hispanis novae Gra[illegible] chucha id. Muca-muca Peruanis [Ulloa]

Iupa-

Iupatiima *Brasiliensibus mediterraneis.*
Rapoza *Lusitanis.*

Magnitudo Felis maioris. Caput acuminatum, rostro conico longo, Suis instar carinato, rictu longissimo Vulpis. Facies fusca. Nares perpendiculares lunares. Oculi minuti, nigri, splendentes. Supra oculum vtrumque macula alba. Genae albicantes. Auriculae magnae, rotundatae, nudae, tenuissimae, erectae, atrae, apicibus albis. Vibrissae quinque ordinum, longae, setae pone oris rictum octo, sub gula quinque. Lingua apice papillis ciliata. Collum ad latera sordide flauum, supra postice et dorsum pilis longioribus, mollibus, erectis, basi flauo-albis, medio nigris, apice albicantibus. Corpus superne fuluum, subtus exalbidum. Tibiae nigrae, laeues, pilis breuibus. Digiti 5-5, teretes, nudi, aequales, in plantis pollice remoto. Vngues compressi, arcuati. Plantarum pollex muticus. Cauda vix longitudine corporis, basi pilosa, quasi segmentis ex rugis prehensilis, dimidio nigro, altero dimidio versus apicem albo.

Feminae saccus abdominalis ossibus propriis ex ossibus pubis oriundis fultus, in quo mammae 4-8.

Didelphidem marsupialem et Opossum *Linnei* eandem speciem vtique puto. Distinguit tamen doctiss. *Pallas miscell. p.* 63.

Abundat in Virginia, Louisiana, Mexico, Brasilia, Peru; nec non in India orientali, male id negante Buffonio.

Orientalem varietatem esse colore dilutiore, quasi griseo ferrugineo, subtus albidam, nigredine nulla circa oculos *Pallas.*

Victitat Sacchari culmis, radicibus, fructibus, ouis, Gallinarum sanguine. Sat mitis. Arbores scandit.

In-

Inceſſus lentus. Mortem ſimulat capta. Vita tenax. Cauda ſe appendet arboribus, corpusque vibrando in aliam arborem ſe transiicit. Nidum parat e gramine ſicco inter frutices. Parit pullos minutiſſimos 4-6 coecos nudosque, quaſi ſemifoetus, mox ſaccum abdominalem intrantes, in quo lacte matris nutriendi excreſcunt, donec maturi fiant, ſacco interim perpetuo contracto. Poſt alterum partum ex iſto ſacco pulli denuo eum intrant quoties terrefacti. Foetet animal, canibus non eſculentum, ob pellem; caro tamen laudatur a nonnullis porcellique carnis ſimilis dicitur.

Philander. 2. D. auriculis pendulis, mammis quaternis.

Tlaquatzin ſeu Tai-ibi Braſilienſibus dicta, femina *Seb. theſ. I p. 57 tab. 36 fig. 4.*

Die Boſchratte *Meyer Thiere III tab. 6* fig. Sebae.

Mus Tlaquatzin *Klein. quadrup. p. 59.*

Le Philandre du Breſil: Philander (Braſilienſis) pilis in exortu albis, in extremitate nigricantibus veſtitus *Briſſ. regn. an. p. 290 n. 4.*

Didelphis (Philander) cauda baſi piloſa, auriculis pendulis, mammis quaternis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p. 54 n. 2.*

Philander met de Staart by den wortel hairig, hangende Ooren en vier Prammen *Houtt. nat. hiſt. II p. 321 tab. 18 fig.* 1 Sebae.

Didelphis (Philander) cauda baſi piloſa, auriculis pendulis, mammis quaternis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p. 72 n. 2.*

Der Philander *Müll. Naturſ. I p. 291 tab. 18 fig.* 1 Sebae.

Longitudo corporis 14 poll. Cauda longiſſima, baſi piloſa. Saccus abdominalis nullus. Vbera duo, mammis in ſingulis duabus. Parit quatuor.

Habitat in Braſilia. Species obſcura.

orien-

orientalis. 3. D. digitis duobus intermediis plantarum coadvnatis.

De Coescoes *Valent. Amboin. III p. 272 fig.* in pedibus vitioſa.

Mus ſeu ſorex americanus maior, agreſtis, capite grandi pullus *Seb. theſ. I p. 50 tab. 31 fig. 8.*

Mus americanus maior, agreſtis, capite grandi *Klein. quadr. p. 58.*

Le Philandre à groſſe tête: Philander (capite craſſo) ex ruſo luteus in dorſo, in ventre ex albo flauicans, capite craſſo *Briſſ. regn. an. p. 293 n. 8.*

Die groſse amerikaniſche dickköpfige Waldmaus *Hall. vierf. p. 434.*

Phalanger *Bom. dictionn. III p. 442.*

Le Phalanger *Buff. hiſt. nat. XIII. p. 92* femelle *tab. 10* mâle *tab. 11.*

Didelphis orientalis *Pallas miſcell. p. 59.*

The Surinam Opoſſum *Penn. ſyn. quadr. p. 209 n. 148.*

Falanger *Aleſſ. quadrup. III tab. 146* fig. Buff.

Der Amboineſer: Didelphis indica *Müll. Naturſ. Suppl. p. 35.*

Cuſſu *Maleitis.* w. Piso p. 323 —
Lesju curae posteriores p. 126. Cousa in Banda ins.

Longitudo corporis fere 9 poll. caudae 10 poll. Corpus ſupra rufum, ſubtus ſordide flaueſcenti album. Caput craſſum (ſecundum Sebam, qui tamen pullum modo habuit oculis adhucdum clauſis), poſtice linea nigra ab occipite per dorſi medium porrecta. Auriculae breues, piloſae. Dentes primores ſupra octo, intermediis et exterioribus acutis et longioribus, ſecundi paris breuibus et latis, tertiis minimis. Primores infra duo. Pollex plantarum remotus, muticus, digitis ſecundo et tertio coadunatis, phalange extrema ſeparata, vt ſint vngues quatuor. Plica transverſalis cutis in ventre. Cauda baſi piloſa, pre-

Cook voyag. to the northern hemisphere pacific ocean. Lond. 1785. vol. 1. p. 108. tab. 8

prehenſilis vt videtur. Saccum abdominalem et huic tribuit Valentyn.

Habitat in Moluccis. Manſueſcit. Editur in Amboina, quamuis foeteat.

In Surinamo reperiri dubium maxime.

breuicaudata. 4. D. cauda abbreuiata craſſa.

Muris ſilueſtris americani ſemina *Seb. theſ. I p.* 50 *tab.* 31 *fig.* 6.

Le Philandre à courte queue: Philander (cauda breui) obſcure rufus in dorſo, in ventre heluus, cauda breui et craſſa *Briſſ. regn. an. p.* 294 *n.* 9.

Die amerikaniſche Waldmaus *Hall. vierf. p.* 435.

Philander mammis extra abdomen; cauda breui, craſſa, piloſa *Gronov. zooph. I p.* 9 *n.* 35.

The Rat of Guiana *Bancr. Guian. p.* 143?

The ſhort tailed Opoſſum *Penn. ſyn. quadr. p.* 208 *n.* 147.

Auriculae nudae. Dorſum rufo ſuſcum, venter pallidior. Cauda vix longitudine dimidia corporis, baſi craſſa, apice attenuato.

Habitat in Americae auſtralis ſiluis. Parit 9-12. Neophyti ſtatim a partu perpetuo adhaerent mammis, vsque dum matureſcant. Saccus matris abdominalis nullus.

murina. 5. D. roſtro acutiuſculo, vngue pollicum palmarum acuto, cauda ſemipiloſa.

Mus ſilueſtris americanus mas, Scalopes dictus *Seb. theſ. I p.* 48 *tab.* 31 *fig.* 1.

Muris ſilueſtris americani ſemina *Seb. theſ. I p.* 49 *tab.* 31 *fig.* 2.

Mus Scalopes *Klein. quadrup. p.* 58.

Le

Le Philandre d'Amérique: Philander (americanus) ſaturate ſpadiceus in dorſo, in ventre dilute flauus, pedibus albicantibus *Briſſ. regn. an. p.* 291 *n.* 5.

Die langfüſsige amerikaniſche Waldmaus *Hall. vierf.* p. 432 *tab.* 24, *B.*

Didelphis (murina) cauda ſemipiloſa, mammis ſenis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 55 *n.* 4.

Philander met de halve Staart hairig en zes Tepels *Houtt. nat. hiſt. II p.* 324 *tab.* 18 *fig.* 3 Seb.

Philander mammis extra abdomen; cauda longiſſima tereti, nuda, corpore longiore *Gronov. zooph. I p.* 9 *n.* 33.

La Marmoſe *Buff. hiſt. nat. X p.* 335 mâle *tab.* 52, femelle *tab.* 53.

Didelphis (murina) cauda ſemipiloſa, mammis ſenis *Linn. muſ. Ad. Frid. II p.* 8.

Manicou *Bom. dictionn. III p.* 18.

Marmoſe ou Rat Manicou *Bom. dictionn. III p.* 32.

Scalopes *Bom. dictionn. IV p.* 141.

Didelphis (murina) cauda ſemipiloſa, mammis ſenis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 72 *n.* 4.

Noch eine andere wilde Ratze *Fermin Surin. II p.* 99.

The murine Opoſſum *Penn. ſyn. quadr. p.* 207 *n.* 145.

Marmoſa maſchio e femmina *Aleſſ. quadrup. III tab.* 128 figg. Buff.

Die Buſchratze *Müll. Naturſ. I p.* 293 *tab.* 18 *fig.* 3 Sebae.

Magnitudo Ratti. Auriculae longae lataeque, tenues, nudae, acutiores quam in didelphide marſupiali. Oculorum orbitae nigrae. Corpus ſupra canum, ſubtus flaueſcenti-album. Roſtrum ſulco bilobo, nec vt in marſupiali ſtria laeui vix totum peraratum. Folliculus abdominalis nullus, at plica in vtroque latere longitudinalis, inter quas mammae ſex interdumque plures. Tibiae pilis breuibus albicantibus tectae. Vnguis pollicum palma-

rum acutus, nec vt in reliquis obtuſus. Vnguis pollicum plantarum nullus, extimo articulo rotundato. Cauda longitudine corporis, gracilis, ad baſin vsqne ſquamis paruis tecta, prehenſilis.

Habitat in calidioribus Americae auſtralis.

Cum reliquis conuenit cibo et moribus. Parit ad 10-14. Pulli ſtatim poſt partum mammis fortiſſime adhaerent, donec matureſcant.

Cum hac perperam a nonnullis confundi dicit Gronouius aliam, quam vocat:

Philander mammis extra abdomen; cauda longiſſima, tereti, hiſpida, corporis longitudine *Gronv. zooph. I p.* 9 *n.* 34.

Maior ſuperiore, forma conuenit. Cauda pilis raris, breuibus. Manus et pedes validiores, pentadactyli.

Habitat cum antecedente.

Affinis, niſi propria forte ſpecies:

Coyopollin *Fernand. anim. p.* 10.

Animal caudimanum ſeu coyopollin *Nieremb. hiſt. nat. p.* 158.

Coyopollin *Ionſt. quadrup. p.* 170.

Mus indicus *Ionſt. quadrup. tab.* 67 fig. mala.

Mus indicus, dictus Coyopollin *Charlet. exerc. p.* 25.

Mus africanus Kayopolin dictus mas *Seb. theſ. I p.* 49 *tab.* 31 *fig.* 3.

Didelphis mammis extra abdomen *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 2.

Mus africanus Kajopolin *Klein. quadrup. p.* 58.

Didelphis mammis extra abdomen. The Didelphis with the teats without the abdomen: the african Rat *Hill anim. p.* 530.

Le Philandre d'Afrique: Philander (africanus) faturate fpadiceus in dorfo, in ventre ex albido flauicans, cauda ex faturate fpadiceo maculata *Briff. regn. an. p.* 292 *n.* 6.

Die afrikanifche Maus Kayopolin *Hall. vierf. p.* 433.

Le Cayopollin *Buff. hift. nat. X p.* 350 *tab.* 55.

The mexican Opoffum *Penn. fyn. quadr.* 208 *n.* 146.

Kayopollino *Aleff. quadrup. III tab.* 129 fig. Buff.

Der Cajopolin *Müll. Naturf. Suppl. p.* 35.

Capite grandiore, nafo craffiore, auribus angulatis. Cauda fufco et flauo variegata, bafi pilofa.

Habitat in montofis Mexici, pariens in arboribus. Erronee Seba africanum animal fecit, et ex hoc poftea alii auctores.

dorfigera. 6. D. cauda bafi pilofa corpore longiore, digitis manuum muticis.

Een Soort van een Bos-rot *Merian. Surin. tab.* 66 fig. bon.

Mus feu Sorex filueftris americanus mas *Seb. thef. I p.* 49 *tab.* 31 *fig.* 4 bon.

Muris filueftris americani femina *Seb. thef. I p.* 49 *tab.* 31 *fig.* 5 bon.

Glis filueftris americanus cum catulis fuis *Seb. thef. II p.* 90 *tab.* 84 *fig.* 4. bon.

Mus filueftris americanus, femina; catulos fuos fupra dorfum ferens *Klein. quadrup. p.* 58.

Le Philandre de Surinam: Philander (Surinamenfis) ex rufo heluus in dorfo, in ventre ex flauo albicans *Briff. regn. an. p.* 292 *n.* 7.

Der furinamifche Aeneas *Hall. vierf. p.* 433 *tab.* 24 *A.*

Didelphis (dorfigera) cauda bafi pilofa corpore longiore, digitis manuum muticis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 55 *n.* 5.

Rat de bois *Dictionn. anim. III p.* 666.

Philander met de Staart aan den wortel hairig en langer dan 't Lyf, de Vingeren der Voorpooten ſtomp genageld *Houtt. nat. hiſt. II p.* 325 *tab.* 18 *fig.* 4 Sebae.

Didelphis (dorſigera) cauda baſi piloſa corpore longiore, digitis manuum muticis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 72 *n.* 5.

Le Philandre de Surinam *Buff. hiſt. nat. XV p.* 157.

Die Waldmaus *Fermin Surin. II p.* 101.

The Merian Opoſſum *Penn. ſyn. quadr. p.* 210 *n.* 149.

Die Schwanzratze *Müll. Naturſ. I p.* 293 *tab.* 18 *fig.* 4 Sebae.

Magnitudo Ratti. Auriculae longae, acutae, nudae. Caput et corpus ſupra e flauo fuſcum. Venter e flauo albidus. Digiti 5-5, pollice plantarum remoto. Vngues plani. Cauda elongata, gracilis, tota nuda, praeter baſin piloſam, mari maculata.

Habitat in Surinamo intra terram.

Parit 5-6. Pulli parentem ſequuntur, terrefacti eius dorſo inſitiunt caudisque matris caudam comprehendunt pullos in caueam ſic deportantis.

9. BRADYPVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii? obtuſi, ſolitarii, molaribus longiores, occurſantes.

Molares vtrinque V cylindrici, obtuſi.

Corpus pilis tectum.

Crura antica multo longiora poſticis.

Vngues longiſſimi.

tridactylus. 1. B. pedibus tridactylis, cauda breui.

Ignauus, ſiue per αντιφρασιν Agilis *Cluſ. exot. p.* 110 *fig. p.* 111. mala.

Igna-

Ignauus *Cluſ. exot. p.* 372 *fig. p.* 373 paullulum melior.
Hay *Laet Amer. p.* 554 fig. peſſima.
Vnau *Laet Amer. p.* 618 fig. Cluſii altera.
Animal Pigritia ſiue Haut *Nieremb. hiſt. nat. p.* 164 figg. Cluſii. Figura Laetii *p.* 163.
Ai *Nieuh. Braſil. p.* 18.
Ignauus Cluſii *Aldrov. digit. p.* 262.
Ai ſiue Ignauus *Marcgr. Braſ. p.* 221 *fig.* mediocris.
Ignauus *Ionſt. quadrup. p.* 145 *tab.* 62, 74 figg. Cluſii.
Papio 2 *Ionſt. quadrup. tab.* 61 fig. Laetii.
Ai repens minor *Piſ. Ind. p.* 321 *fig.* mala.
Ai erectus maior *Piſ. Ind. p.* 322 *cum fig.* Marcgr.
Haut, eine beſondere Art Affen, Arctopithecus *Geſn. Thierb. p.* 178.
Ignauus *Olear. Gott. Kunſtk. p.* 6 *tab.* 7 *fig.* 2 mediocr. Cluſ.
Ai ſiue Ignauus, the Sluggard *Charlet. exercit. p.* 17.
The Sloath Ignauus ſiue Pigritia *Grew. muſ. reg. ſoc. p.* 11.
Ai ſiue Ignauus Marcgr. *Rai. ſyn. quadr. p.* 245.
Ignauus ſeu Pigritia *Iacob. muſ. reg. p.* 10 *Laur. muſ. reg. quadrup. n.* 91.
Le Sloth ou le Pareſſeux *Dampier voy. III p.* 305.
Pericos ligeros *Cieza Peru p.* 20.
Ai ou Pareſſeux *Des March. voy. III p.* 285.
Ai ſeu Tardigradus gracilis americanus *Seb. theſ. I p.* 53 *tab.* 33 *fig.* 2 bon.
Bradypus manibus tridactylis, cauda breui *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 42.
Pericoligeros *Gum. Orin. I p.* 298.
Der amerikaniſche Faule *Meyer Thiere III tab.* 1 fig. Sebae.
Bradypus manibus tridactylis, cauda breui *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 1.
Bradypus manibus tridactylis, cauda breui *Linn. amoen. acad. I p.* 495.
Ignauus Marcgr. Ouaikaré. Pareſſeux *Barr. Fr. équ. p.* 154.

Ignauus Americanus risum fletu miscens *Klein. quadrup. p.* 43.

Ignauus Marcgrauii *Klein. quadrup. p.* 43.

Ignauus Americanus somniculosus *Klein. quadrup. p.* 44.

Bradypus manibus tridactylis, cauda breui. The Bradypus with three toes on the fore-feet, and a short tail: the Sloth *Hill anim. p.* 534.

Bradypus (tridactylus) manibus tridactylis, cauda breui *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 4.

Le Pareffeux: Tardigradus (....) pedibus anticis et posticis tridactylis *Briff. regn. an. p.* 34 *n.* 1.

The Sloath: Bradypus crinitus, palmis tridactylis, vnguibus arcuatis longissimis *Brown. Iam. p.* 489.

Das schmächtige weissgraue amerikanische Faulthier *Hall. vierf. p.* 391 *tab.* 15.

Markgrafs Faulthier *Hall. vierf. p.* 392.

Bradypus (tridactylus) manibus tridactylis, cauda breui *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 34 *n.* 1.

Ai ou le Pareffeux *Dictionn. anim. I p.* 59.

Unau *Dictionn. anim. IV p.* 559.

Luijaard met drievingerige Handen en een korte Staart *Houtt. nat. hist. I p.* 480 *tab.* 9 *fig.* 1 Sebae.

The Sloth *Edw. glean. II tab.* 310.

Tardigradus pedibus anticis et posticis tridactylis *Gronov. zooph. I p.* 2 *n.* 4.

Pareffeux *Bom. dictionn. III p.* 376.

L'Aï *Buff. hist. nat. XIII p.* 34. Ieunes Ais *tab.* 5. L'Ai adulte *tab.* 6.

Bradypus (tridactylus) pedibus tridactylis, cauda breui *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 50 *n.* 1.

Amerikanisches Faulthier *Knorr. delic. II. tab. K fig.* 1 caput, *fig.* 2 pedes, *fig.* 3 pullus.

Das Faulthier *Fermin Surin. II p.* 94.

The three-toed Sloth *Penn. syn. quadr. p.* 319 *n.* 250 *tab.* 29 *fig.* 1.

Ai *Aleff. quadrup. III tab.* 143 fig. Buff.

Das

Das dreyfingerige Faulthier *Müll. Naturſ. I p.* 177 *tab.* 9 *fig.* 1 Sebae.
Der Ai: Bradypus tridactylus *Schreb. Säugth. II p.* 197 *n.* 1 *tab.* 64 fig. Edw. et Buff.
Ouaikaré *Guianienſibus.*
Aï *Braſilienſibus.*
Perrillo ligero, Perrico ligero *Hiſpanis.*
Priguiza *Luſitanis.*
Das Faulthier *Germanis.*
Leuy-aert, Luijaard *Belgis.*
The Sloth *Anglis.*

Magnitudo Vulpis. Corpus piloſiſſimum, griſeo fuſcum, pilis planis. Caput minimum, ſubgloboſum. Facies ſubnuda. Naſus obtuſus, niger. Oculi parui, nigri, ſomniculoſi. Auriculae nullae. Collum longum. Gula et facies ſordide alba ſiue flaua. Cauda breuiſſima, ſubouata, vndique vellere tecta, apice tamen eminente, nudiuſculo, acutiuſculo. Dentes primores nulli, niſi laniarii, ſed occurſantes, antice remotiſſimi, longiores, truncati. Molares laniariis approximati, breuiores. Pedes anteriores longiores poſterioribus, fortiſſimi, diuaricatiſſimi. Digiti combinati 3 - 3. Vngues compreſſi, validiſſimi, falcati, totidem. Pedes poſtici calcaneis incedentes. Mammae duae pectorales. Figura miſerabilis. Coſtae vtrinque quaduordecim.

Habitat in Americae meridionalis arboribus. Victitat ruminans foliis teneris, imprimis Cecropiae. Non bibit. Imbres metuit. Difficulter ſcandit, neque mouetur niſi fame coactus: deiicit ſe ex arbore conſumtis foliis eiusdem, ne deſcendat. Tardiſſime et aegre incedit; in planitie quinquaginta paſſus progrediendo integrum etiam diem inſumit. Attonitus quaſi caput flectit. Sonus ſenarius deſcendens nocturnus. Clamor horrendus, lacrymae

 miſerae.

miſerae. Famen fert diutiſſime, per menſem adeo. Parit 1 - 2.

didactylus. 2. B. palmis didactylis, cauda nulla.

The Sluggard *Barbot Guin. p.* 212.

Potto *Boſſm. Guin. p.* 296.

Tardigradus ceilonicus catulus *Seb. theſ. I p.* 54 *tab.* 33 *fig.* 4 bon.

Tardigradus ceilonicus femina *Seb. theſ. I p.* 54 *tab.* 34 *fig.* bon.

Bradypus manibus didactylis, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 42.

Der aſiatiſche Faule *Meyer Thiere III tab.* 2 fig. Seb.

Bradypus manibus didactylis, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 3 *n.* 2.

Silenus. Simia perſonata, verkleidete Affe *Klein. quadrup. p.* 42.

Ignauus orientalis minimus *Klein. quadrup. p.* 44.

Bradypus manibus didactylis, cauda nulla. The Bradypus with only two toes on the fore-feet, and without any tail: the Ceylon Sloth *Hill anim. p.* 535.

Bradypus (didactylus) manibus didactylis, cauda nulla *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 4.

Le Pareſſeux de Ceylan: Tardigradus (ceylonicus) pedibus anticis didactylis, poſticis tridactylis *Briſſ. regn. an. p.* 35 *n.* 2.

Der verkleidete Faulthieraffe mit dem Hundskopfe *Hall. vierf. p.* 390.

Bradypus (didactylus) manibus didactylis, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 35 *n.* 2.

Le Pareſſeux de l'isle de Ceylan *Dictionn. anim. I p.* 59.

Potto ou Stuggard *Dictionn. anim. III p.* 556.

Luijaard met twee-vingerige Handen, zonder Staart *Houtt. nat. hiſt. I p.* 484 *tab.* 9 *fig.* 2 Sebae.

Unau *Bom. dictionn. IV. p.* 619.

L'Unau

L'Unau *Buff. hist. nat. XIII p.* 34 *tab.* 1.

Bradypus (didactylus) manibus didactylis, cauda nulla *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 51 *n.* 2.

The twotoed Sloth *Penn. syn. quadr. p.* 321 *n.* 251.

Unau *Alesf. quadr. III tab.* 142 fig. Buff.

Das zweyfingerige Faulthier *Müll. Naturs. I p.* 179 *tab.* 9 *fig.* 2 Sebae.

Der Unau: Bradypus didactylus *Schreb. Säugth. II p.* 202 *n.* 2 *tab.* 65 fig. Buff.

Potto *Guineensibus.*

Corpus Sciuri magnitudine, vel paullo maius, pilis ferrugineis, vndulatis, mollibus, iunior autem magis griseus. Caput rotundatum. Rostrum paullo longius quam in praecedente. Facies hirsuta ad nasum vsque, qui glaber atque depressus, lateribus rugosis. Auriculae magnae, rotundatae, capiti appressae, crinibusque occultatae. Vngues fortes, in palmis duo, in plantis tres. Mammae duae pectorales. Cauda nulla. Costae vtrinque 23.

Habitat in Zeylona, iniuste id negante Buffonio; in Guinea, vix enim dubito, idem animal esse Potto Guineensium. Neque etiam Americae australis exul plane videtur.

Minus lentus praecedente, nocturnus. Misere clamat.

10. MYRMECOPHAGA.

Dentes nulli.
Lingua teres, extenſilis.
Os anguſtatum in roſtrum.
Corpus pilis tectum.
Vngues longi, arcuati.

didactyla. 1. M. palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villoſa.

Tamandua ſeu Coaty americana alba altera *Seb. theſ. I p. 60 tab. 37 fig.* 3. bona, niſi quod palmae male monodactylae ſint.

Myrmecophaga manibus monodactylis, plantis tetradactylis *Linn. ſyſt. nat. 2 p. 42.*

Der weiſſe americaniſche Ameiſenfreſſer *Meyer Thiere III tab.* 10 fig. Sebae.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis *Linn. ſyſt. n. 6 p.* 8 *n.* 2.

Tamandua minor flaueſcens: Oouatirioüacu, petit mangeur de fourmis *Barr. Fr. équ. p.* 163.

Tamandua alba altera ſeu Coati *Klein. quadrup. p.* 46.

Myrmecophaga manibus didactylis, plantis tetradactylis. The Myrmecophaga with only two toes on the fore feet, and four on the hinder feet *Hill anim. p.* 532.

Myrmecophaga (didactyla) manibus didactylis, plantis tetradactylis *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 8.

Le petit Fourmiller: Myrmecophaga (minima) roſtro breui, pedibus anticis didactylis, poſticis tetradactylis *Briſſ. regn. an. p.* 28 *n.* 4.

Der weiſſe americaniſche Ameiſenfreſſer *Hall. vierf. p.* 383.

Myrmecophaga (didactyla) palmis didactylis, plantis tetradactylis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 35 *n.* 1.

The

The little Ant-Eater *Edw. glean. I tab.* 220.

Fourmillier-Tamanoir *Diction. anim. II p.* 217 cum congener.

Tamandua *Diction. anim. IV p.* 254 cum congener.

Mieren-Eeter met twee Vingers aan de Voorpooten, vier aan de Agterpooten *Houtt. nat. hist. I p.* 487 *tab.* 10 *fig.* 1 Sebae.

Myrmecophaga rostro breui, pedibus anticis didactylis, posticis tetradactylis *Gronov. zooph. I p.* 1 n. 1.

Le Fourmiller *Buff. hist. nat. X p.* 144 *tab.* 30.

Fourmilier *Bom. diction. II p.* 244 cum congener.

Myrmecophaga (didactyla) palmis didactylis, plantis tetradactylis, cauda villosa *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 51 *n.* 1.

Die dritte Art vom Ameisenbären *Fermin Surin. II p.* 87.

The lest Ant-eater *Penn. syn. quadr. p.* 333 *n.* 262 *tab.* 30.

Mangia formiche *Aless. quadrup. III tab.* 121 fig. Buff.

Der zweyfingerige oder kleine Ameisenbär *Müll. Naturs. I p.* 180 *tab.* 10 *fig.* 1 Sebae.

Der kleine Ameisenfresser: Myrmecophaga didactyla *Schreb. Säugth. II p.* 206 *n.* 3 *tab.* 66 fig. propria bona.

Der kleine zwozeeige Ameisenfresser *Mart. Naturlex. II p.* 274 *cum fig.* Schreberi.

Owatiriwau *Guianiensibus.*

Reli-

MYRMECOPHAGAE nocturnae formicas lingua tereti lumbrici formi in os trahunt vorantque. Diu inediam ferunt. Incessu lentis omnibusque iniuriis obnoxiis vnica salus est in vitae tenacitate, vnguibusque longis, quibus pugnant in dorsum proiectae contra hostes.

Reliquis minor. Longitudo corporis 8 pollicum. Nasus conicus, paullulum deorſum curuatus. Roſtrum breuius quam in reliquis: at oris rictus amplior. Auriculae paruae, pilis occultatae. Collum breviſſimum. Totum corpus ſupra flaueſcenti fuſcum, pilis longis, mollibus, ſericeis, ſubtus griſeum. Cauda longitudine fere corporis, prehenſilis, apice infra denudato, baſi craſſa. Vnguis exterior palmarum altero maior. Vngues plantarum quatuor aequales. Mammae duae pectorales et duae ventrales.

Habitat in America auſtrali. Victitat formicis. Talis lente incedit.

tridactyla. 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villoſa.

Tamandua Murmecophaga americana *Seb. theſ. I p.* 60 *tab.* 37 *fig.* 2.

Tamandua Guacu Braſilienſis, ſeu Vrſa formicaria *Seb. theſ. I p.* 65 *tab.* 40 *fig.* 1.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 42.

Der Ameiſenfreſſer *Meyer Thiere III tab.* 9 fig. Sebae.

Der braſiliſche Ameiſenfreſſer *Meyer Thiere III tab.* 12 fig. Sebae.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 8 *n.* 1.

Myrmecophaga manibus tridactylis, plantis pentadactylis. The Myrmecophaga with three toes on the fore-feet, and five on the hinder feet: the great Ant-bear *Hill anim. p.* 531.

Le Fourmiller aux longues oreilles: Myrmecophaga (minor) roſtro longiſſimo, pedibus anticis tridactylis, poſticis pentadactylis, auriculis longis, flaccidis *Briſſ. regn. an. p.* 27 *n.* 3.

Der

Der groſſe Ameiſenbär *Hall. vierf. p.* 393 *tab.* 16.

Mieren-Eeter met drie Vingers aan de Voorpooten, vyf aan de Agterpooten *Houtt. nat. hiſt. I p.* 488 *tab.* 10 *fig.* 2. Sebae.

Myrmecophaga (tridactyla) palmis tridactylis, plantis pentadactylis, cauda villoſa *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 51 *n.* 2.

Der dreyfingerige oder groſſe Ameiſenbär *Müll. Naturſ. I p.* 181 *tab.* 10 *fig.* 2 Sebae (Figura ſub iubatae nomine).

Roſtrum longius quam praecedentis. Oris rictus paruus. Auriculae longae flaccidae. Oculi magni. Cauda longa, acuminata, ſupra fuſca. Corpus ſupra pallide caſtaneum, ſubtus magis rufum. Plaga lateralis nigra nulla, quam male et huic tribuit Linneus. Mammae pectorales duae, abdominales ſex. Vnguis medius palmarum maximus.

Habitat in Braſilia? Africa?

Victitat formicis, inſectis, quorum nidos vngue ſecat. Lente currit. Arbores etiam ſcandit.

Confuſa a plerisque auctoribus cum inſequente.

iubata. 3. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda iubata.

Tamandua *Laet Amer. p.* 551.

Myrmecophagus ſiue Tamendoa *Nieremb. hiſt. nat. p.* 190.

Tamanduai *Nieuh. Braſ. p.* 19.

The Piſmire-eater *Nieuh. Braſ. p.* 18 *fig.* peſſima.

Tamandua Guacu Braſilienſibus *Marcgr. Braſ. p.* 225 *fig.* ſat bona.

Tamandua Gvacu *Ionſt. quadrup. p.* 136 *tab.* 62 fig. Marcgr.

Taman-

Tamanduaá guaçú siue maior *Pis. Ind. p.* 320 *fig.* Marcgr.

Tamandua Guacu Brasiliensis *Charlet. exerc. p.* 17.

The great Tamandua *Grew muf. reg. soc. p.* 14.

Tamandua-guacu *Rai. syn. quadr. p.* 241.

L'Ours qui vit de fourmis *Dampier voy. III p.* 304.

Mange-fourmis *Des March. voy. III p.* 291.

Tamandua-Guacu, vulgo Myreneter *Laur. muf. reg. tab.* 7 *fig.* 71 mediocris.

Osso hormiguero *Gum. Orin. II p.* 306.

Tamandua maior, cauda paniculata: Ouariri. Gros mangeur de fourmis. *Barr. Fr. équ. p.* 162.

Tamandua-guacu *Klein. quadrup. p.* 45 *tab.* 4 fig. sat bona.

Der gröste Ameisenfresser *Meyer Thiere III tab.* 13 fig. Klein.

Le Fourmiller Tamanoir: Myrmecophaga (Tamanoir dicta) rostro longissimo, pedibus anticis tetradactylis, posticis pentadactylis, cauda longissimis pilis vestita *Briss. regn. an. p.* 24 *n.* 1.

Der grosse Ameisenbär *Hall. vierf. p.* 395.

Myrmecophaga (tridactyla) palmis tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 35 *n.* 2.

Le Tamanoir *Buff. hist. nat. X p.* 144 *tab.* 29.

Myrmecophaga (iubata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda iubata *Linn. syst. nat.* 12. *I p.* 52 *n.* 3.

Der grosse dreyzehigte Ameisenbär *Knorr. delic. II tab.* K, 9.

Myrmecophaga sciurea *Pallas miscell. p.* 65.

Die erste Art vom Ameisenbären *Fermin. Surin. II p.* 86.

The great Ant-Eater *Penn. syn. quadr. p.* 331 *n.* 260.

Tamandua *Alessi quadrup. III tab.* 20 fig. Buff.

Der langhaarige Ameisenbär *Müll. Naturf. I p.* 182 (figura ad antecedentem pertinet).

Dillon's Travels through Spain p. 76. tab. 2. Der

museum Leverianum tab. 27.

Der groſſe Ameiſenfreſſer: Myrmecophaga iubata *Schreb. Säugth. II p.* 203 *n.* 1 *tab.* 67 fig. Buff.
Der groſſe Ameiſenfreſſer *Mart. Naturlex. II p.* 271 *cum fig.* Buff.
Wariri *Guianienſibus.*
Vmbulu *Congenſibus?*

Longitudo corporis ad 4 ped. caudae 2½ ped. Roſtrum longum, gracile. Oris rictus minimus. Lingua ad 2½ ped. longa. Oculi parui, nigri. Auriculae breues, rotundatae. Totum corpus griſeum pilis nigris mixtis, poſtice magis nigreſcens. Plaga pectoralis lateralis nigra, ſupra albo cincta. Crura antica albicantia cum macula nigra. Vngues duo medii palmarum reliquis longiores. Cauda pilis longiſſimis planis, nec teretibus, nigris iubata.

Habitat in Braſilia et Guiania. Num etiam in Congo? Lente incedit. Irata caudam agitat. Formicarum nidos vnguibus effodit. Corpus contra pluuiam cauda obtegit.

tetradactyla. 4. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda calua.
Tamanduai guacu *Nieuh. Braſ. p.* 19.
Tamandua-i Braſilienſibus *Marcgr. Braſ. p.* 225 *fig. p.* 226 bona.
Tamandua-I *Ionſt. quadrup. p.* 137 *tab.* 62 fig. Marcgr.
Tamanduá minor, Tamanduá Mirí *Piſ. Ind. p.* 320 *fig. p.* 321 Marcgr.
Tamandua-i; the leſſer Ant-eater *Charlet. exerc. p.* 17.
Tamandua I Braſilienſibus *Rai. ſyn. quadr. p.* 242.
Tamandua formicis veſcens americana minor *Seb. theſ. II p.* 48 *tab.* 47 *fig.* 2 mediocris.

Der

Der americanifche kleine Ameifenfreffer *Meyer Thiere III tab.* 11 fig. Seb.

Myrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. fyft. nat. 6 p.* 8 *n.* 3.

Tamandua minor, cinerea: Mangeur de fourmis *Barr. Fr. équ. p.* 162.

Mamandua-I Brafil. *Klein. quadrup. p.* 46.

Tyrmecophaga manibus tetradactylis, plantis pentadactylis. The Myrmecophaga with four toes on the fore-feet, and five on the hinder. The leffer Ant-bear *Hill anim. p.* 532.

Le Fourmiller: Myrmecophaga (. . . .) roftro longiffimo, pedibus anticis tetradactylis, pofticis pentadactylis, cauda fere nuda *Briff. regn. an. p.* 26 *n.* 2.

Der mittlere falbe Ameifenbär *Hall. vierf. p.* 394.

Myrmecophaga (tetradactyla) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 35 *n.* 3.

Mieren-Eeter met vier Vingers aan de Voorpooten, vyf aan de Agterpooten *Houtt. nat. hift. I p.* 490.

Myrmecophaga roftro longiffimo, pedibus anticis tetradactylis, pofticis pentadactylis: cauda fere nuda *Gronov. zooph. I p.* 1 *n.* 2.

Le Tamandua *Buff. hift. nat. X p.* 144,

Myrmecophaga(tetradactyla)palmis tetradactylis,plantis pentadactylis, cauda calua *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 52. *n.* 4.

Myrmecophaga myofura *Pallas mifcell. p.* 64.

Die zwote Art vom Ameifenbären *Fermin Surin. II p.* 87.

The middle Ant-eater *Penn. fyn. quadr. p.* 332 *n.* 261.

Der vierzähige Ameifenbär *Müll. Naturf. I p.* 183.

Der mittlere Ameifenfreffer: Myrmecophaga tetradactyla *Schreb. Säugth. II p.* 205 *n.* 2 *tab.* 68 fig. Marcgr.

Der

Der mittlere vierzeeige Ameifenfreffer *Mart. Natur-lex. II p. 276.*

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ ped. et vltra. Roftrum longum, gracile, paullulum deorfum curuatum. Os paruum, nigrum. Oculi minuti, nigri. Auriculae breues, erectae. Collum craffiufculum. Corpus pilis fplendentibus durioribus, pallide flauis, in medio dorfo et cruribus pofticis obfcurioribus. Plaga pectoralis lateralis nigra. Cauda fere longitudine corporis, prehenfilis, attenuata, pilofa apice nuda. Digiti 4 - 5.

Habitat in America meridionali, victu et moribus iubatae. Cauda fe ex arborum ramis fufpendit. Nocturna die dormit, capite fub brachiis recondito. Irata baculum prehendit. Stertit pofterioribus pedibus infidens. Partem aquae potae per nares eiicit, quod et reliquis familiare.

* * *

Fetum Myrmecophagae defcribit doctiff. *Pallas mifcell. p. 64* quam *afram* vocat e promontorio bonae fpei. Aut propria fpecies eft, aut tridactyla forte. Fetus mole eft fere porcelli recens nati, nudus adhuc, praeterquam quod pili rari longiufculi nigri ad os et in pedibus fparfiffimi obferuentur, crebriores in palpebris et ad talum pedum anticorum. Corpus craffum. Caput elongatum, magis quam in tetradactyla, roftro, quod pone apicem craffum et obtufiffimum, quafi conftricto. Nares in apice roftri, approximatae, lunatae. Auriculae maiores quam in congeneribus, oblongae, acutae, planae, pendulae. Pedes humiles, fere vrfini, antici tetradactyli, digito medio longiore, extimo minore reliquis. Vngues anticorum longiores,

omnium triquetro-ſubulati, rectiuſculi. Cauda corpore breuior, attenuata, acuta.

Huc refert vir doctiſſimus Myrmecophagam Kolbii: Erdſchwein *Kolbe Vorgeb. p.* 165. Centenorum adeo pondo eſſe hic affirmat.

Est Orycteropus capensis 18 dentibus molaribus instructus. viz (in meo specimine) 10 superioribus 8 inferioribus -

11. MANIS.

Dentes nulli.
Lingua teres, extenſilis.
Os anguſtatum in roſtrum.
Corpus ſquamis tectum.
Mammae pectorales II.

brachyura. 1. M. cauda fere longitudine corporis.

Lacertus indicus ſquamoſus *Bont. Ind. or. p.* 60 *cum fig.* ſat bona.

Le grand Lézard écaillé *Perr. anim. III p.* 87 *tab.* 17 *fig.* bon.

Lacerta ſquamoſa ingens *Iacob. muſ. reg. p.* 9 *tab.* 9 *fig.* 3 *Laur. muſ. reg. tab.* 6 *fig.* 82 figg. mediocr.

Kquoggelo *Barbot Guin. p.* 114.

Lacertus ſquamoſus minor ſetulis aſperſis *Petiv. gazoph. tab.* 20 *fig.* 8 mediocr.

De Panggoeling *Valent. Amb. III p.* 278.

Quogelo *Des Marcb. voy. I p.* 179.

Armadillus ſquamatus maior, ſeu Diabolus Tajovanicus Siamenſium, ex inſula Formoſa *Seb. theſ. I p.* 87 *tab.* 53 *fig.* 5 iunior.

Arma-

MANIS a Myrmecophaga ſolo veſtimento differt.

Armadillus squamatus maior, ceylanicus, seu diabolus Tajovanicus dictus *Seb. thes. I p.* 88 *tab.* 54 *fig.* 1: adulta.

Manis manibus pentadactylis, palmis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 8 *n.* 1.

Manis manibus pentadactylis, plantis pentadactylis *Dahlmann: Act. holmiens.* 1749 *p.* 274 *tab. fig.* 3 bona.

Tatu mustelinus *Klein. quadrup. p.* 47.

Le Pholidote: Pholidotus (. . . .) pedibus anticis et posticis pentadactylis, squamis subrotundis *Briss. regn. an. p.* 29 *n.* 1.

Das formosische Teufelchen *Hall. vierf. p.* 396, 397 *tab.* 18.

Manis (pentadactyla) pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 36 *n.* 1.

Diable de Tavoyen *Dictionn. anim. II p.* 25.

Lézard ecailleux *Dictionn. anim. II p.* 621 cum congen.

Quoggelo *Dictionn. anim. III p.* 646.

Tayanan *Dictionn. anim. IV p.* 295.

Schubhaagdis of Mier-Haagdis *Houtt. nat. hist. I p.* 494.

Das mit Schuppen gepanzerte Thier, Manis oder Armodillus genannt *Mus. baruth. p.* 4 *tab.* 2 fig. iunioris.

Pholidotus pedibus anticis et posticis pentadactylis, squamis subrotundis *Gronov. zooph. I p.* 2 *n.* 3.

Le Pangolin *Buff. hist. nat. X p.* 180 *tab.* 34.

Manis (pentadactyla) pedibus pentadactylis *Linn. mus. Ad. Frid. II p.* 7.

Pangolin *Bom. dictionn. III p.* 349 cum sequente.

Quoggelo *Bom. dictionn. III p.* 697.

Manis (pentadactyla) pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 52 *n.* 1.

The short-tailed Manis *Penn. syn. quadr. p.* 329 *n.* 259.

Pangolino *Aless. quadrup. III tab.* 122 fig. Buff.

...ie in the Asiatick researches or Transact. of the Bengal ...ety. T. I. calcutta 1788. 4 pag. 376. cfr. ... in the ...moirs of Science & the arts N.° 1. 1793. p. 42.

Das fünffingerige Schuppthier, der Iavaiſche Teufel *Müll. Naturſ. I p.* 186 *tab.* 29 *fig.* 1 fere Sebae.
Das kurzgeſchwänzte Schuppenthier: Manis pentadactyla *Schreb. Säugth. II p.* 210 *n.* 1 *tab.* 69 fig. Buff.
Alungu *in Coromandel.*
Pangulling *Iauenſibus.*
Tchin Chian Kiäpp *Sinenſibus.*
Quoggelo *Guineenſibus.*

Corpus tectum ſquamis obtuſis, glabris, verſus baſin ſtriatis, intermixtis pilis craſſis, rufis. Subtus abdomen, pectus vſque ad gulam, manus et pedes latere interiore piloſa. Caput oblongum. Squamae verticis minores. Roſtrum mediocre. Oris rictus minimus. Narium foramina inſtar lunae recuruata. Lingua teres, lumbriciformis. Auriculae paruae, rutundatae. Collum diſtinctum fere nullum. Pedes ſquamoſi. Palmae pentadactylae: vnguibus tribus mediis magnis, duobus lateralibus paruis. Plantae pentadactylae: vnguibus breuioribus, magis curuis. Digiti omnium pedum coadunati, nec fiſſi. Cauda longitudine fere corporis, ſupra conuexa, ſubtus planiuſcula, lateribus carinata, imbricata, vtrinque ſquamoſa. Longitudo animalis ad pedes octo. Color fuſcus, iunioribus flaueſcens. Mammae duae pectorales.

Habitat in inſulis indicis, Formoſa, Iaua, Ceylona; Guinea.

Victitat inſectis, vermibus, lacertis. Naſo terram fodit ſubterranea. Incedens vngues retrahit, ne obtundantur. Vox debilis. Inceſſus lentus. Irata ſquamas erigit horrende, territa in globum ſe contrahit capite caudaque ventrem verſus adductis,

ctis, vt nil conspici queat, nisi squamosus globus. Valde pinguescit, cauda epulis expetita.

macroura. 2. M. cauda corpore longiore.

Lacertus peregrinus squamosus *Clus. exot. p.* 374 *fig.* mediocr.

Lacerta indica Iuannae congener *Aldrov. dig. ouip. p.* 667 *fig.* mediocr. absque capite.

Le Lézard de Clusius *Perr. anim. III p.* 89.

Lacertus peregrinus squamosus *Olear. Gott. Kunstk. p.* 7 *tab.* 7 *fig.* 1 mediocris.

The Scaly-Lizard *Grew. mus. reg. soc. p.* 46.

Lacertus peregrinus squamosus Clus. *Rai. syn. quadr. p.* 274.

Phatagen *Hist. de l'acad.* 1703 *p.* 39. Malaico voce nomine jam apud Aelianum venit. 16. 6.

Lacertus indicus squamis vndique munitus et armatus *Mus. Besler. p.* 39 *tab.* 11.

Manis. The scaly Lizard *Hill. anim. p.* 533 fig. bon.

Le Pholidote à longue queue: Pholidotus (longicaudatus) pedibus anticis et posticis tetradactylis, squamis mucronatis, cauda longissima *Briss. regn. an. p.* 31 *n.* 2.

Viervingerig Schubdier *Houtt. nat. hist. I p.* 496.

Mus. baruth. tab. 14, 15 figg. bon.

Le Phatagin *Buff. hist. nat. X p.* 180 *tab.* 35.

Manis (tetradactyla) pedibus tetradactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 53 *n.* 2.

The long-tailed Manis *Penn. syn. quadr. p.* 328 *n.* 258.

Fatagino *Aless. quadrup. III tab.* 123 fig. Buff.

Das vierfingerige Schuppthier *Müll. Natursf. I p.* 187.

Das langgeschwänzte Schuppenthier: Manis tetradactyla *Schreb. Säugth. II p.* 211 *n.* 2 *tab.* 70 fig. Buff.

Minor praecedente, cauda longitudine dupla corporis et vltra. Longitudo corporis $14\frac{1}{2}$ poll. caudae ad 40 poll. Corpus, crura et cauda ſquamis magnis, acutis, ſtriatis. Caput cum roſtro gracili laeue, ſquamis minoribus. Crura breuia, poſteriora paullo longiora, antica piloſa. Vngues 5 - 5 palmarum pollicis minimo vix apparente (inde tetradactyla male dicta auctoribus). Canda attenuata, apice obtuſo. Corpus ſubtus piloſum.

Habitat in Braſilia? Formoſa? Guinea?

Mores praecedentis. Mitis.

12. DASYPVS.

Dentes molares plures, VII - VIII vtrinque, absque primoribus, absque laniariis.

Corpus cataphractum teſta oſſea, zonis interſecta.

Vngues acuti.

tricinctus. 1. D. cingulis tribus, pedibus pentadactylis, cauda breui.

Armadillo ſiue Tatou genus alterum *Cluſ. exot. p.* 109 *fig.* mediocr. in pedibus vitioſa.

Armadillo genus alterum Cluſii *Nieremb. hiſt. nat. p.* 158 *fig.* Cluſii.

Tatu apara *Marcgr. Braſ. p.* 232 *fig.* bon.

Tatus *Ionſt. quadrup. p.* 174 *tab.* 80 *fig.* peſſima.

Tatu

Fodiunt DASYPODES ſubterranei, nocturni, mites. Arbores non aſcendunt. Victitant radicibus, melonibus, baccis, carnibus, piſcibus, inſectis, lumbricis. Multum potant. Terrefacti corpus conglomerant inuulnerabiles.

Tatu Apara *Ionst. quadrup. tab.* 63 *fig.* Marcgr.
Tatú - apará *Pis. Ind. p.* 100 *fig.* Marcgr.
Le Tatou *Rochef. Antill. p.* 139 *cum fig.* Marcgr.
Armadilho *Red. opusc. II p.* 76 *cum fig.* Marcgr.
Gesn. Thierb. p. 231 figura altera Clusii, altera Marcgr.
The great shell'd Hedghog *Grew. mus. reg. soc. p.* 17.
Tatu apara *Rai. syn. quadr. p.* 234.
Tatu seu Armodillo orientalis, lorica ossea toto corpore tectus *Seb. thes. I p.* 62 *tab.* 38 *fig.* 2.
Tatu seu Armodillo minor conuolutus *Seb. thes. I p.* 62 *tab.* 38 *fig.* 3.
Erinaceus loricatus, cingulis tribus *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.
Cachicàmos ò Armadillos *Gum. Orin. II p.* 301.
Der orientalische Armadill *Meyer Thiere III tab.* 25 *fig.* Sebae.
Dasypus cingulis tribus *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 2.
Tatus Gesn. *Barr. Fr. équ. p.* 163.
Tatu porcinus *Klein. quadrup. p.* 48.
Dasypus cingulis tribus. The Dasypus with three belts: the oriental Armadilla *Hill anim. p.* 560.
L'Armadille oriental: Cataphractus (Armadillo orientalis) scutis duobus, cingulis tribus *Briss. regn. an. p.* 38 *n.* 2.
Der schönste orientalische Armodillo *Hall. vierf. p.* 399 *tab.* 17.
Dasypus (tricinctus) cingulis tribus, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 51 *n.* 2.
Cataphractus scutis duobus, cingulis tribus *Dictionn. anim. I p.* 170.
Tatou *Dictionn. anim. IV p.* 276 cum congeneribus.
Armadil met drie Gordels en vyf- vingerige Pooten *Houtt. nat. hist. II p.* 280 *tab.* 16 *fig.* 2 Sebae.
L'Apar ou le Tatou à trois bandes *Buff. hist. nat. X p.* 206.
Armadille ou Tatou *Bom. dictionn. I p.* 185 cum congener.

Dafypus (tricinctus) cingulis tribus, pedibus pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 53 *n.* 2.

The three-banded Armadillo *Penn. fyn. quadr. p.* 323 *n.* 252.

Der dreygürtelige Armadill *Müll. Naturf. I p.* 190 *tab.* 16 *fig.* 2 Sebae.

Das Gürtelthier mit drey Gürteln: Dafypus tricinctus *Schreb. Säugth. II p.* 215 *n.* 1 *tab.* 71 *A* fig. Sebae.

Armadill mit drey Ringen, Apar, Aparathier *Mart. Naturlex. III p.* 224.

Longitudo corporis cum cauda pedis vnius. Lorica capitis dorfique diuifa in fegmenta pentagona et hexagona tuberculata, cingulis tribus in medio dorfo, ex fquamis parallelogrammis compofitis. Roftrum acuminatum. Auriculae breues, nudae, rotundatae. Oculi parui. Cauda breuiffima, fquamis hexagonis tecta, paullulum depreffa. Pedes 5-5, palmarum vnguibus duobus intermediis maioribus, exteriore minimo, duobus interioribus paruis. Plantarum vngues aequales (Secundum Sebam et Kleinium pedes funt 4-4, digito vnico poftico). Penis infignis.

Habitat in America auftrali. In India orientali vix videtur reperiri.

Valde pinguefcit. Iunioris caro delicatula, fenioris fapore mofchi ingrato. Parit quouis menfe pullos quatuor. Mitis.

quadricinctus. 2. D. cingulis quatuor.

Χελωνίσκος, fiue Χελωνεχῖνος, Teftudinatus Porcellio, vel Teftudinatus Echinus, exoticum animal *Columm. aquat. p. XV fig. fcuti p. XVI.*

Dafypus cingulis quatuor *Linn. fyft. nat.* 6. *p.* 6 *n.* 3.

Dafypus

Dasypus cingulis quatuor. The Dasypus with four belts: the water Armadillo *Hill anim. p.* 561.

L'Armadille des Indes: Cataphractus (Armadillo indicus) scutis duobus, cingulis quatuor *Briss. reg. an. p.* 39 *n.* 3.

Dasypus (quadricinctus) cingulis quatuor *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 51 *n.* 3.

Cataphractus scutis duobus cingulis quatuor *Dictionn. anim. I p.* 170.

Armadil met vier Gordels om 't Lyf *Houtt. nat. hist. II p.* 281.

Dasypus (quadricinctus) cingulis quatuor *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 54 *n.* 3.

Der viergürtelige Armadill *Müll. Natursf. I p.* 190.

Das Gürtelthier mit vier Gürteln *Schreb. Säugth. II p.* 217 *n.* 2.

Armadill mit vier Ringen, Schildkrötenigel, Sehildkrötenschwein *Mart. Naturlex. III p.* 225.

Species obscura, aut si mauis dubia adeo, soli Columnae visa, qui nil nisi loricam habuit conglutinatis fragmentis. Est haec scutis duobus, posteriore maiore, squamis hexagonis, pentagonis, quadratis etc. tuberculatis; inter haec cingula quatuor.

Habitat - - - - - - -.

sexcinctus. 3. D. cingulis senis, pedibus pentadactylis.

Tatou *Bellon obs. p.* 204 *cum fig.* mediocri, cingulis nimiis.

Armadillo siue Tatou *Clus. exot. p.* 330 *cum fig.* Bellon.

Tatu: Armadillo *Laet Amer. p.* 552 *cum fig.* Bellon.

Armadillo Clusii *Nieremb. hist. nat. p.* 158 *cum fig.* Bellon.

Shield-hogs *Nieuh. Bras. p.* 19.

Tatu et Tatu-peba Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p.* 231 *cum fig.* Bellon.

Tatu seu Armadillo *Ionst. quadrup. tab.* 62 *fig.* Bellon.

Gesn. Thierb. p. 230 *fig. inferior* Bellon.

Tatu *Charlet. exerc. p.* 18.

Tatu siue Armadillo prima *Rai. syn. quadr. p.* 233.

Dasypus cingulis sex *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 5.

Dasypus cingulis sex. The Dasypus with six belts *Hill anim. p.* 559.

Dasypus (sexcinctus) cingulis senis, pedibus pentadactylis *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 7.

L'Armadille du Mexique: Cataphractus (Armadillo mexicanus) scutis duobus, cingulis sex *Briss. regn. an. p.* 40 *n.* 4.

Das hundsköpfige Panzerthier *Hall. viers. p.* 401?

Dasypus (sexcinctus) cingulis senis, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 51 *n.* 4.

Cataphractus scutis duobus, cingulis sex *Dictionn. anim. I p.* 170.

Armadil met zes Gordels en vyf-vingerige Pooten *Houtt. nat. hist. II p.* 282.

L'Encoubert, ou le Tatou à six bandes *Buff. hist. nat. X p.* 209 *tab.* 42 (figura loricae solius).

Dasypus (sexcinctus) cingulis senis, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 54 *n.* 4.

The sixbanded Armadillo *Penn. syn. quadr. p.* 324 *n.* 253.

Der sechsgürtelige Armadill *Müll. Natursf. I p.* 191.

Das Gürtelthier mit dem Halsschilde: Dasypus sexcinctus *Schreb. Säugth. II p.* 218 *n.* 3 *tab.* 71 *B* fig. propria (quae mihi videtur octodecimcincti figura potius).

Armadill mit sechs Reifen, der Enkubert *Mart. Naturlex. III p.* 226. *cum fig.* Schreb.

Chirquinchum *Mexicanis.*

Armadillo *Hispanis.*

Encu-

Encuberto, Encubertado *Lufitanis.*
Schildverken *Belgis.*

Magnitudo Cati. Lorica fcutis duobus, cingulisque intermediis fex e fquamis triangularibus compofitis. Setae inter cingula pofitae. Squamae fcutorum figurae variae. Corpus fubtus pilis rarioribus albicantibus. Os acutum. Lingua acuminata angufta. Oculi parui, profundi. Auriculae nudae, breues. Digiti 5-5, vnguibus fubrotundis, in palmis longiores. Cauda longior quam in praecedentibus, corpore tamen breuior, ex bafi craffa attenuata. Color ex luteo fubrufus.

Habitat in Brafilia et Mexico.

feptemcinctus. 4. D. cingulis feptenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

Ayotochtli feu Dafypus cucurbitinus, ab aliis Tatou vel Armadillo dictus *Hernand. Mex. p.* 314 *cum fig.* mediocr.

Armadillo fiue Aiatochtli *Nieremb. hift. nat. p.* 158 *fig.* mediocr.

Tatus feu echinus brafilianus *Aldrov. digit. p.* 478 *fig. p.* 480 Nieremb. nifi quod cingula fex tantummodo pingat Aldrouandus, Nierembergius vndecim.

Armadillo fiue Aiatochtli *Ionft. quadrup. tab.* 74 fig. Nieremb.

Tatus quadrupes, Eine frembde Gattung Igel *Gesn. Thierb. p.* 229 *fig. p.* 230 *fuperior* Nieremb.

Dafypus cingulis feptem *Linn. fyft. nat.* 6 *p* 6 *n.* 6.

Erinaceus loricatus, cingulis feptenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. amoen. acad. I p.* 560.

Dafypus cingulis feptem. The Dafypus with feven belts: the Tatuete *Hill anim. p.* 560.

L'Ar-

L'Armadille du Bresil: Cataphractus (Armadillo Brasilianus) scutis duobus, cingulis octo *Briss. regn. an. p.* 41 *n.* 5.

Dasypus (septemcinctus) cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 51 *n.* 5.

Cataphractus scutis duobus, cingulis octo *Dictionn. anim. I p.* 171.

Armadil met zeven Gordels, de Voorpooten vier-de Agterpooten vyf-vingerig *Houtt. nat. hist. II p.* 283.

Le Tatuéte ou Tatou à huit bandes *Buff. hist nat. X p.* 212.

Dasypus (septemcinctus) cingulis septenis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 54 *n.* 5.

Schildferkel oder Armadill aus America *Knorr. delic. II tab. K,* 3. *fig.* 2.

The eight-banded Armadillo *Penn. syn. quadr. p.* 325 *n.* 254.

Der siebengürtelige Armadill *Müll. Naturs. I p.* 191.

Das Gürtelthier mit sechs geflammten Gürteln: Dasypus septemcinctus *Schreb. Säugth. II p.* 220 *n.* 4 *tab.* 72 fig propria. Mihi hic omnino sexcinctus videtur.

Das Gürtelthier mit acht Gürteln: Dasypus octocinctus *Schreb. Säugth. II p.* 222 *n.* 5 *tab.* 73 fig. propria.

Der achtgürtelige Armadill *Müll. Naturs. Suppl. p.* 23.

Armadill mit sechs geflammten, imgleichen mit 7 oder 8 Gürteln, Tatuette *Mart. Naturlex. III p.* 228.

Longitudo corporis 10 pollicum, caudae 9 poll. Caput paruum, ouatum, glabrum, suturis numerosissimis reticulatum. Rostrum productum, acutum. Oculi parui, nigri. Narium foramina lunaria. Aures subouatae, erectae, punctis papillosis tectae. Testa corpus tegens, ossea, cuius prima pars lata, marginata,

ginata, punctis subrotundis, latiusculis, eleuatis, transuersim striata. Cingula septem angusta, ouato-lanceolatis characteribus transuersim striata; postica pars testae magnitudine primae, punctis callosis eleuatis notata. Penis exsertus, subtus carinatus. Cauda cingulis numerosis verticillata, nuda, corpore paullo breuior, acuminata. Pedes anteriores palmis tetradactylis, profunde fissis, digitis teretiusculis, interioribus duobus longioribus et fere aequalibus, exterioribus breuibus et inter se fere aequalibus. Vngues magni, erectiusculi, subulati, acutissimi. Pedes posteriores pentadactyli, digitis lateralibus profundius, vt in palmis, separatis et breuioribus, intermediis minus diuisis et longioribus. Vngues obtusiores quam in palmis. Color ferrugineus. Venter pilosus albus.

Habitat in Brasilia. Caro deliciosior quam reliquorum.

An sufficienter a sequente distinctus?

nouem-cinctus. 5. D. cingulis nouem, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.

Tatu-ete Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p.* 231.

Armadillo *Mus. Worm. p.* 335.

Armadillo *Olear. Gott. Kunstk. p.* 7 *tab.* 6 *fig.* 4 sat bona.

The pigheaded Armadillo *Grew mus. reg. soc. p.* 18.

Tatuete Brasiliensibus *Rai. syn. quadr. p.* 233.

Armadillo seu Tatou Brasiliensium *Iacob. mus. reg. p.* 8 *tab.* 9 *fig.* 4 *Laur. mus. reg. tab.* 6 *fig.* 79 mala.

Armadillus siue Tatou *Mus. Besler. p.* 40 *tab.* 11 fig. sat bona.

Tatu seu Armodillo americanus *Seb. thes. I p.* 45 *tab.* 29 *fig.* 1 bona.

Tatu iuuenis seu Armadillus minor americanus *Seb. thes. I p.* 87 *tab.* 53 *fig.* 6 pulli.

Erina-

Erinaceus loricatus, cingulis nouem, manibus tridactylis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.

Der Armadill *Meyer Thiere I tab.* 59.

Der americanische Armadill *Meyer Thiere III tab.* 26 fig. Sebae.

Dasypus cingulis nouem *Linn. syst. nat* 6 *p.* 6 *n.* 7.

Tatus maior moschum redolens: Tatou-Kabassou *Barr. Fr. équ. p.* 163.

Tatu porcinus *Klein. quadrup. p.* 48.

Dasypus cingulis nouem. The Dasypus with nine belts: the three-toed Armadilla *Hill anim. p.* 562 *tab.* 27.

Dasypus (nouemcinctus) cingulis nouem, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 6.

L'Armadille de Cayenne: Cataphractus (Armadillo Guianensis) scutis duobus, cingulis nouem *Briss. regn. an. p.* 42 *n.* 6.

Das amerikanische Schildferkelchen *Hall. vierf. p.* 398.

Dasypus (nouemcinctus) cingulis nouem, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 51 *n.* 6.

Cataphractus scutis duobus, cingulis nouem *Dictionn. anim. I p.* 171.

Armadil met negen Gordels, de Voorpooten vier- en de Agterpooten vyf-vingerig *Houtt. nat. hist. II p.* 284 *tab.* 16 *fig.* 3 Sebae.

Ein gepanzertes americanisches Thier, Tatu oder Tatou genannt, mit einem Schweinskopf und sechs *(errore typographico pro* neun*)* Panzergelenken auf dem Rücken *Mus. baruth. p.* 23 *tab.* 11 fig. bon.

Cataphractus scutis duobus, cingulis nouem *Gronov. zooph. I p.* 2 *n.* 5.

Le Cachicame, ou Tatou à neuf bandes *Buff. hist. nat. X p.* 215 *tab.* 37.

An

An american Armadilla *Watson: Philos. Transact. vol. LIV p.* 57 *tab.* 7 fig. bona.

Dasypus (nouemcinctus) cingulis nouem, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 54 *n.* 6.

The Tattu or Armadillo of Guiana *Bancr. Guian. p.* 145.

The nine-banded Armadillo *Penn. syn. quadr. p.* 325 *n.* 255.

Armadiglio *Aless. quadrup. III tab.* 124 fig. Buff.

Der neungürtelige Armadill *Müll. Naturs. I p.* 192 *tab.* 16 *fig.* 3 Sebae.

Das Gürtelthier mit neun Gürteln: Dasypus nouemcinctus *Schreb. Säugth. II p.* 223 *n.* 6 *tab.* 74 fig. propria.

Armadill mit 9 Ringen, der Kachikame *Mart. Naturlex. III p.* 230.

Verdadeiro *Lusitanis.*

Longitudo corporis 2 pedum. Rostrum acutum. Auriculae longae, paruis squamis tectae. Lorica figuris hexagonis exarata, cingulis 8-9. Pectus et venter pilis longis. Cauda fere ped. 1 longa, gracilis, basi crassa, acuminata, cingulis 10-12. Digiti 4-5; palmarum duobus intermediis maioribus aequalibus, plantarum medio longiore.

Habitat in America australi. Seniorum caro sapore moschi ingrata.

duodecimcinctus. 6. D. cingulis duodecim, pedibus pentadactylis.

Tatu seu Armodillo africanus mas *Seb. thes. I p.* 47 *tab.* 30 *fig.* 3.

Tatu seu Armodillo africana femina *Seb. thes. I p.* 48 *tab.* 30 *fig.* 4.

Erina-

Erinaceus loricatus, tegmine tripartito *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.

Der africanische Armadill, das Männlein *Meyer Thiere III tab.* 27. Das Weiblein *tab.* 28. figg. Sebae.

Dasypus tegmine tripartito *Linn. syst. nat.* 6 *n.* 4.

Tatu caninus, capite pedibusque anomalis *Klein. quadrup. p.* 49.

Dasypus tegmine tripartito. The Dasypus with the covering tripartitely divided: the african Armadilla *Hill anim. p.* 561.

L'Armadille d'Afrique: Cataphractus (Armadillo africanus) scutis duobus, cingulis duodecim *Briss. regn. an. p.* 43 *n.* 7.

Cataphractus scutis duobus, cingulis duodecim *Dictionn. anim. I p.* 171.

Houtt. nat. hist. II tab. 16 *fig.* 1 Sebae, sub nomine sequentis.

Le Kabassou, ou Tatou à douze bandes *Buff. hist. nat. X p.* 218 *tab.* 40.

Autre Kabassou *Buff. hist. nat. X tab.* 41.

The twelve-banded Armadillo *Penn. syn. quadr. p.* 326 *n.* 256.

Kabasson *Alesf. quadrup. III tab.* 125 *fig.* 1 Buff.

Armadiglio *Alesf. quadrup. III tab.* 125 *fig.* 2 Buff. altera.

Müll. Natursf. I tab. 16 *fig.* 1. Sebae, sub nomine sequentis.

Das Gürtelthier mit zwölf Gürteln: Dasypus duodecimcinctus (vnicinctus) *Schreb. Säugth. II p.* 225 *n.* 7 *tab.* 75 fig. Buff.

Der zwölfgürtelige Armadill *Müll. Natursf. Suppl. p.* 23.

Armadill mit zwölfg Gürteln, der Kabassu, afrikanischer Armadill *Mart. Naturlex. III p.* 232.

Maximus congenerum. Caput crassum. Rostrum obtusum. Auriculae longae, apice rotundato. Lorica cin-

cingulis duodecim compofita, bipartita. Squamae cingulorum parallelogrammae, fcutorum medio tetragonae, pentagonae, hexagonae. Digiti 5-5, vnguibus tribus intermediis palmarum longioribus. Mas cauda nuda, femina fquamata; fere longitudine corporis.

Habitat in Africa? (non effe in Africa *Buff.*)

Hunc Linneus coniungit cum fequente, qui maxime differre videtur.

octodecimcinctus. 7. D. fcuto poftico nullo, cingulis octodecim.

The weefle-headed Armadillo. Tatu muftelinus *Grew muf. reg. foc. p.* 19 *tab.* 1.

Tatu muftelinus *Rai. fyn. quadr. p.* 235.

Dafypus cingulo fimplici *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 1.

Dafypus cingulo fimplici. The Dafypus with a fingle belt: the weafel-headed Armadillo *Hill anim. p.* 559.

L'Armadille: Cataphractus (Armadillo) fcuto vnico, cingulis octodecim *Briff. regn. an. p.* 37 *n.* 1.

Der gepanzerte Ameifenbär *Hall. vierf. p.* 396.

Dafypus (vnicinctus) tegmine tripartito, pedibus pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 50 *n.* 1.

Cataphractus fcuto vnico, cingulis octodecim *Diction. anim. I p.* 170.

Armadil met het Schild drieën verdeeld, de Pooten vyf-vingerig *Houtt. nat. hift. II p.* 279.

Le Cirquinçon, ou Tatou à dix-huit bandes *Buff. hift. nat. X, p.* 220.

Dafypus (vnicinctus) tegmine tripartito, pedibus pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 53 *n.* 1.

The eighteen-banded Armadillo *Penn. fyn. quadr. p.* 327 *n.* 257.

Der eingürtelige Armadill *Müll. Naturf. I p.* 189.

Das Gürtelthier mit achtzehen Gürteln *Schreb. Säugth. II p.* 227 *n.* 8. (Figura tab. 71 B huc pertinere mihi videtur.)

Der achtzehngürtelige Armadill *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 24.

Armadill mit achtzehn Gürteln, Cirquinçon, Tatuwieſel *Mart. Naturlex. III p.* 234 *cum fig.* Schreberi.

Longitudo corporis decem pollicum, caudae ſeptem. Caput tenue. Frons lata plana. Oculi parui. Auriculae paruae, erectae, nudae. Scutum vnicum in humeris, reliquum corpus cingulis octodecim; ſcutum poſticum nullum. Squamae anteriores maiores, quadratae, poſteriores ex quadratis rotundisque mixtae. Cauda baſi annulis ſex, acuminata. Pedes vt in antecedente.

Habitat in America auſtrali.

13. TALPA.

Dentes Primores ſuperiores VI.
inferiores VIII.
Laniarii maior I; minores IV.
Naſus elongatus.
Palmae foſſoriae.

europaea. 1. T. cauda breuiore, pedibus pentadactylis.

Ἀσπάλαξ *Ariſt. hiſt. anim. I c.* 2 *n.* 15. *IV c.* 8 *n.* 240.

Talpa *Plin. hiſt. nat. XI c.* 37 *(c.* 52 *Hard.) XXX c.* 3 *(c.* 7 *Hard.) c.* 69 *(c.* 88 *Hard.)*

Ἀσπάλαξ *Aelian. anim. XVII c.* 10.

Ἀσπάλαξ *Oppian. cyneg. II,* 612.

Talpa *Agric. an. ſubt. p.* 70.

Talpa *Geſn. quadrup. p.* 1055 *cum fig.* mediocr.

Talpa

Talpa *Schwenckf. theriotr. p.* 129.
Talpa *Aldrov. digit. p.* 449 *fig. p.* 451 mala.
Talpa *Ionſt. quadr. p.* 170 *tab.* 66 fig. Gesn.
Talpa. Ein Maulwurff, Schär oder Schärmauſs *Geſn. Thierb. p.* 257 *fig.* mala.
Talpa *Charlet. exerc. p.* 25.
Talpa *Sibb. Scot. an. p.* 11.
Talpa *Paullini monogr.*
Talpa *Rai. ſyn. quadr. p.* 236.
Talpa *Rzacz. Polon. p.* 236.
Talpa caudata *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 45.
Talpa caudata *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 7 *n.* 17.
Ein Maulwurff *Meyer Thiere I tab.* 2 fig. bona.
Talpa caudata *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 1.
Talpa noſtras *Klein. quadrup. p.* 60.
Talpa caudata. The tailed Talpa: the Mole *Hill anim. p.* 562.
La Taupe: Talpa (vulgaris) caudata, nigricans, pedibus anticis et poſticis pentadactylis *Briſſ. regn an. p.* 280 *n.* 1.
Talpa caudata *Kram. Auſtr. p.* 314.
Der gemeine Maulwurf *Hall. vierf. p.* 445 *tab.* 26 *A.*
Talpa (europaea) caudata, pedibus pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 52 *n.* 1.
Taupe vulgaire *Dictionn. anim. IV p.* 282.
La Taupe *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 81 *tab.* 12.
Europiſche Mol: Mol met een Staart, de Pooten vyf-vingerig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 300.
Talpa (europaea) caudata, pedibus pentadactylis *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 9 *n.* 23.
Talpa caudata, pedibus pentadactylis *Gronov. zooph. I p.* 9 *n.* 32.
The Mole *Penn. brit. zool. p.* 52.
Muldvarpe *Pontopp. Dan I p.* 611.

TALPAE ſubterraneae cuniculos agunt palmis foſſoriis; victitant inſectis vermibusque.

Taupe *Bom. dictionn. IV p.* 303.

Talpa (europaea) caudata, pedibus pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 73 *n.* 1.

Talpa europaea *Forster: Philos. transact. LVII. p.* 342.

The european Mole *Penn. syn. quadr. p.* 311 *n.* 241.

Talpa *Aless. quadrup. III tab.* 105 *fig.* 1 Buff.

Der europäische Maulwurf *Müll. Naturs. I p.* 295.

Talpa (europaea) caudata pedibus pentadactylis *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 18.

Talpa *Italis.*

Topo *Hispanis.*

Toupeira *Lusitanis.*

Taupe *Gallis.*

Gwadd, Twrch daear *Cambrensibus.*

Maulwurf *Germanis.*

Scheer, Scheermauss *Austriacis.*

Mol *Belgis.*

Mole, Moldwarp, Want *Anglis.*

Muldvarp *Danis.*

Vond, Muldvarp *Noruegis.*

Mullvad *Suecis.*

Surck *Smolandis.*

Kret *Polonis.*

Кротъ (Krot), Земляная сосѣдка *vel* сусѣдка (Zemlanaja sosedka *vel* susedka) *Russis.*

Каменный медвѣдь (Kamennyi medwed'), Каменная сосѣдка (Kamennaja sosjedka) *in Sibiria.*

Longitudo corporis circiter quinque pollicum, caudae vix poll. 1. Caput rostro attenuato, rufescente. Oculi minuti, pilis occultati. Auriculae nullae. Corpus antice crassum, musculosum, postice vix gracilius. Pili breues, densi, mollissimi, nigricantes. Cutis tenax. Pedes antici oblique positi, lati et quasi manus, fossorii, digitis quinque, vnguibus fortioribus. Pedes postici minores, digitis quinque. Penis omnium animalium longissimus

mus. Teſtes maximi, paraſtatae ampliſſimae. Calcaneis incedit cum congeneribus.

Habitat in Europae apricis humoſis cultis. In Hibernia nulla.

Subterranea, antro cuniculi clauſo. Terram fodit celerrime palmis, plantis terram remouet retrorſum. Praecipue actiua paullo ante pluuiam: tempore ſicco magis deſcendit intra terram. Victitat vermibus, inſectis, radicibus. Olfactu fortiſſimo gaudet. Nidum parat e muſco paullulum infra ſuperficiem terrae, in loco eleuato. Parit Maio menſe quatuor pullos aut quinque, et forte pluries per annum. Coit fine hiemis.

Varietates:

α. albo-maculata.

Talpa maculata Ooſtfriſia *Seb. theſ. I p.* 68 *tab.* 41 *fig.* 4.

Talpa maculata, Ooſt-Friſia *Klein. quadrup. p.* 60.

La Taupe variée: Talpa (variegata) caudata, ex albo et nigro variegata, pedibus anticis et poſticis pentadactylis *Briſſ. regn. an. p.* 282 *n.* 3.

Der marmorfarbige oſtfriſiſche Maulwurf *Hall. vierf. p.* 448.

Taupe variée *Dictionn. anim. IV p.* 288.

The ſpotted Mole *Edw. glean. II tab.* 268.

Der fleckichte Maulwurf *Berl. Samml. VI p.* 319 *cum fig.* Edw.

Der gofleckte Maulwurf: Talpa friſius *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 36.

β. tota alba.

Talpa alba *Wagn. Heluet. p.* 185.

Talpa alba noſtras *Seb. theſ. I p.* 51 *tab.* 32 *fig.* 1.

Talpa alba *Rzacz. auct. p.* 329.

La Taupe blanche: Talpa (alba) caudata, alba, pedibus anticis et posticis pentadactylis *Briss. regn. an. p.* 282 *n.* 2.

Taupe blanche *Dictionn. anim. IV p.* 288.

γ. flauescens.

Talpa virginianus niger, supinus, *Seb. thes. I p* 51 *tab.* 32 *fig.* 3?

Der virginische Maulwurf *Hall. vierf. p.* 447?

The yellow Mole *Penn. syn. quadr. p.* 311 *n.* 241 *β.*

Similis haec vulgari, at paullo maior. Pili molles, sericei, splendentes, basi profunde grisei, apice flauescenti-fusci, maxime flauent versus caput, obscuriores magis versus posteriora. Venter profunde cinnereo-fuscus. Pedes et cauda alba.

Habitat in America boreali.

δ. supra splendens grisea, subtus flauescens.

Eine bisher unbekannte Art von Maulwürfen, der graue eifelische Maulwurf *Hübsch: Naturf. III p.* 98.

Habitat circa Luciliburgum, rarior. Propriam speciem putat generos. de Hübsch.

longicaudata. 2. T. cauda mediocri, pedibus pentadactylis, posticis squamosis.

The long-tailed Mole *Penn. syn. quadr. p.* 314 *n.* 244 *tab.* 28 *fig.* 2.

Paullo minor T. europaea. Cauda longitudine dimidia corporis. Palmae valde latae, structurae vt in europaea. Pedes postici valde squamosi, pilis rarioribus breuibus, digitis longis, gracilibus. Pili

Pili corporis molles, longi, ferrugineo-fusci. Cauda pilis breuibus.

Habitat in America boreali.

rubra. 3. T. cauda breuiore, palmis tridactylis, plantis tetradactylis.

Tucan seu Talparum indicarum quoddam genus *Fernand. anim. p.* 7.

Talpa rubra americana *Seb. thes. I p.* 51 *tab.* 32 *fig.* 2.

Talpa rubra americana *Klein. quadrup. p.* 60.

La Taupe rouge d'Amerique: Talpa (americana rufa) caudata, ex dilute cinereo rufa, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis *Briss. regn. an. p.* 283 *n.* 5.

Der amerikanische rothe Maulwurf *Hall. vierf. p.* 447.

Taupe rouge d'Amerique *Dictionn. anim. IV p.* 288.

Le Tùçan *Buff. hist. nat. XV p.* 159.

The red Mole *Penn. syn. quadr. p.* 315 *n.* 246.

The mexican Shrew *Penn. syn. quadr. p.* 309 *n.* 240?

Der Purpurmaulwurf: Talpa virginea *Müll. Natursf. Suppl. p.* 35.

Der rothe Maulwurf: Talpa americana *Müll. Natursf. Suppl. p.* 36.

Paullo maior T. europaea, cui similis corpore et cauda. Pinguis, carnosa. Auriculae paruae, rotundatae. Oculi minimi. Color dilute ex cinereo ruber. Digiti 3-4, vngue palmarum exteriore maximo, reliquis magnitudine decrescentibus. Vngues plantarum aequales.

Habitat in America. Caro proba, esculenta.

Num forte Sorex?

asiatica. 4. T. ecaudata, palmis tridactylis.

Talpa Sibericus versicolor, Aspalax dictus *Seb. thes. I p.* 51 *tab.* 32 *fig.* 4 mas.

Talpa Siberica supina *Seb. thes. I p.* 51 *tab.* 32 *fig.* 5 femina.

Talpa cauda nulla *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.

Talpa ecaudata *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 2.

Talpa Sibiricus versicolor *Klein. quadrup. p.* 60.

Talpa acauda. The tailless Talpa: the painted Mole *Hill anim. p.* 563.

La Taupe dorée de Siberie: Talpa (siberica aurea) ecaudata, ex viridi aurea, pedibus anticis tridactylis, posticis tetradactylis *Briss. regn. an. p.* 284 *n.* 6.

Der bunte Siberische Maulwurf *Hall. vierf. p.* 447 *tab.* 26.

Talpa (asiatica) ecaudata, palmis tridactylis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 53 *n.* 2.

Taupe dorée de Sibérie *Dictionn. anim. IV p.* 289.

Siberische Mol: Mol zonder Staart, de Voorpooten drievingerig *Houtt. nat. hist. II p.* 311 *tab.* 17 *fig.* 2.

Talpa (asiatica) ecaudata, palmis tridactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 73 *n.* 2.

La Taupe dorée *Buff. hist. nat. XV p.* 145.

The Siberian Mole *Penn. syn. quadr. p.* 313 *n.* 242.

Der asiatische Maulwurf *Müll. Natursf. I p.* 299 *tab.* 17 *fig.* 2.

Magnitudine circiter Talpae europaeae. Corpus crassitiei aequalis. Nasus breuior. Auriculae nullae. Digiti 3-4: digito palmarum exteriore maiore (Plantis digiti quinque secundum Sebam.). Cauda nulla. Pili pulchre virides et aurei, luce variabiles.

Habitat ~~in Sibiria.~~ ad caput bonae Spei

14. SO-

14. SOREX.

Dentes Primores ſuperiores II bifidi.
inferiores IV: intermediis breuioribus (interdum II).
Laniarii vtrinque plures.
Naſus elongatus gracilis.
Pedes digitati.

criſtatus. 1. S. naribus carunculatis, cauda breuiore.

Sorex (criſtatus) naribus criſtatis, cauda corpore breviore *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 53 *n.* 2.

Gekamde Spitsmuis: Spitsmuis met gekamde Neusgaten, de Staart korter dan het Lighaam *Houtt. nat. hiſt. II p.* 315.

Sorex (criſtatus) naribus carunculatis, cauda breviore *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 73 *n.* 1.

The radiated Mole *Penn. ſyn. quadr. p.* 313 *n.* 243 *tab.* 28 *fig.* 1.

Die Haarnaſe *Müll. Naturſ. I p.* 300.

Corpus facie Talpae, atrum, pilis mollioribus, palmis niueis. Roſtrum elongatum. Nares ſingulae caruncula ſtellato-palmata, radiis 10-15 ſubulatis, nudis, vt in Erinaceo. Dentes Primores ſuperiores duo, inferiores quatuor. Laniarii vtrinque quatuor. Pedes antici breues, lati, vnguibus quinque longis albis. Pedes poſtici ſquamati, digitis quinque. Crura fortiſſima. Cauda ſubnuda, concolor, corpore dimidio breuior. Longitudo corporis $3\frac{3}{4}$ poll.

Sorex criſtatus atque *aquaticus* figura corporis et moribus valde accedunt ad Talpae genus: ex dentium tamen ſtructura Sorices ſunt.

Habitat in America boreali. Victitat radicibus. Cuniculos Talpae more agit ſubterraneos in terra inculta, variis directionibus.

minutus. 2. S. roſtro longiſſimo, cauda nulla.

Sorex (minutus) roſtro longiſſimo, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 73 *n.* 2.

Sorex (Pygmaeus) roſtro longiſſimo, pedibus pentadactylis, cauda nulla *Laxm. Sibir. Br. p.* 72.

The minute Shrew *Penn. ſyn. quadr. p.* 308 *n.* 237.

Die Zwergmaus *Müll. Naturſ. I p.* 301.

Minutum animal, longitudinis 2 poll. ponderis gran. 38. Caput magnitudine fere reliqui corporis: roſtro attenuato ſubtus exarato. Myſtaces oculos attingentes. Oculi parui retractiles. Auriculae dilatatae, breues, fere nudae. Pedes 5-5. Cauda nulla. Totum corpus pilis tenerrimis nitidum, ſupra obſcure griſeum, ſubtus albicans.

Habitat in Sibiriae locis humidiuſculis ſub arborum radicibus, nido e lichenibus confecto. Colligit ſemina; fodit; cito currit; vrinatur. Vox veſpertilionis.

puſillus. 3. S. auriculis rotundatis, cauda breui ſubdiſticha.

Sorex puſillus *S. G. Gmel. Reiſ. III p.* 499 *tab.* 75 *fig.* 1.

Longitudo corporis 3 poll. 7 lin. caudae poll. 1 lin. 1. Roſtrum attenuatum. Myſtaces canae. Auriculae rotundatae. Dentes primores ſuperiores duo ſubulati, inferiores quatuor breues, obtuſi, truncati. Laniarii ſupra tres, primo longiore; inferiores duo. Molares vtrinque quatuor. Pedes 5-5. Corpus ſupra

supra canum, subtus cinereum. Cauda pilis albidis subdisticha.

Habitat in desertis Persiae borealis.

aquaticus. 4. S. plantis palmatis, palmis caudaque breuiore albis.

Talpa virginianus niger, supinus *Seb. thes. I p.* 51 *tab.* 32 *fig.* 3? videtur potius varietas Talpae europaeae.

La Taupe de Virginie: Talpa (virginiana) caudata, nigricans, ex saturate purpureo mixta, pedibus anticis et posticis pentadactylis *Briss. regn. an. p.* 283 *n.* 4.

Der virginische Maulwurf *Hall. vierf. p.* 447?

Sorex (aquaticus) plantis palmatis, palmis caudaque corpore breuiore albis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 53 *n.* 3.

Taupe de Virginie *Dictionn. anim. IV p.* 288.

Water-Spitsmuis: Spitsmuis met gepalmde Agterpooten, de Voorpooten en Staart, die korter dant 't Lighaam is, wit *Houtt. nat. hist. II p.* 315 *tab.* 17 *fig.* 4 Sebae.

Sorex (aquaticus) plantis palmatis, palmis caudaque breuiore albis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 74 *n.* 3.

The brown Mole *Penn. syn. quadr. p.* 314 *n.* 245.

A Mole from North America *Barrington: Phil. trans. LXI p.* 292?

Die Wassermaus *Müll. Naturs. I p.* 302 *tab.* 17 *fig.* 4 Sebae.

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ poll. Corpus cinereum siue fuscum, pilis mollibus, splendentibus. Nasus gracilis. Maxilla superior longior inferiore. Dentes primores supra duo, infra quatuor, intermediis breuissimis. Laniarii vtrinque plures, discreti (Pennanto nulli). Palmae albae, latae, vnguibus fortioribus.

tioribus. Pedes postici parui. Digiti 5-5. Cauda gracilis, alba, corporis quarta parte breuior.

Habitat in America septentrionali.

Daubentonii. 5. S. cauda mediocri subnuda, corpore nigricante subtus cinereo, digitis ciliatis.

Vne autre espèce de musaraigne: Musaraigne d'eau *Daubenton*: *Mém. de l'acad.* 1756 *p.* 211 *tab.* 1 *fig.* 2.

La Musaraigne d'eau *Buff. hist. nat. VIII p.* 64 *tab.* 11 *fig.* 1.

Musaraigne d'eau *Bom. dictionn. III p.* 172.

The Water - Shrew *Penn. syn. quadr. p.* 308 *n.* 236.

Toparagno acquatico *Aless. quadrup. III tab.* 104 *fig.* 2 Buff.

Die Wasserspitzmaus *Mart. Buff. viers. IV p.* 265 *tab.* 75.

Die Wasserspitzmaus: sorex aquaticus *Müll. Natursf. Suppl. p.* 36.

Paullo maior S. Araneo: longitudine corporis 3 $\frac{1}{4}$ poll, caudae 2 poll. Rostrum longum, gracile, at crassius quam in Araneo. Auriculae minutae. Oculi exigui, pilis occultati. Caput et corpus nigricans supra, gula, pectore et ventre pallide cinereis. Infra caudam macula nigricans triangularis. Cauda subnuda grisea. Mammae decem ventrales. Digiti fissi, ciliati margine pilis rigidis.

Habitat in Europa ad fontes, mane et vesperi; interdiu latet in fissuris rupium et intra terram. Parit vere nouem pullos.

murinus. 6. S. cauda mediocri, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis.

Sorex (murinus) cauda mediocri, corpore fufco pedibus caudaque cinereis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 74 *n.* 4.

The murine Shrew *Penn.fyn.quadr.p.* 309 *n.* 238.

Der Maufekopf *Müll. Naturf. I p.* 302.

Corpus magnitudine Muris Mufculi. Roftrum elongatum, fubtus canaliculatum, cinereum, vibriffis longis. Auriculae rotundatae, nudiufculae. Dentes primores duo acuti, paralleli. Pedes pentadactyli vnguiculati. Cauda corpore paullo breuior, minus pilofa.

Habitat in Iaua.

Araneus. 7. S. cauda mediocri, corpore fubtus albido.

Mus araneus *Plin. hift. nat. VII c.* 58 (*c.* 83 *Hard.*) *XXIX c.* 4 (*c.* 27 *Hard.*).

Μυγαλη *Aelian. anim. II c.* 37.

Mus araneus *Agric.an. fubt.p.* 35.

Mus araneus *Gesn. quadrup.p.* 844 *cum fig.* mediocri.

Mus araneus Gesn. *Schwenckf. theriotr.p.* 114.

Mus araneus *Aldrov. digit.p.* 441 *fig. p.* 442 mala.

Mus araneus *Ionft. quadrup. p.* 168 *tab.* 66 *fig.* mala.

Mützer, Spitzmaus *Gesn. Thierb.p.* 271 *cum fig.* mal.

Mus araneus *Charlet. exerc. p.* 25.

Mus araneus *Rai.fyn.quadr. p.* 239.

Sorex *Linn.fyft.nat.* 2 *p.* 48.

Sorex *Linn. fn.fuec.* 1 *p.* 11 *n.* 33.

Sorex *Linn.fyft. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 1.

Mus Araneus, roftro productiore *Klein. quadrup. p.* 58.

Sorex. The Shrew-moufe *Hill anim. p.* 522.

Sorex vulgaris *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 10.

La Mufaraigne: Mufaraneus (. . . . .) fupra ex fufco rufus, infra albicans *Briff. regn. an.p.*178 *n.* 1.

La

La Musaraigne *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1756 *p.* 211 *tab.* 1 *fig.* 1.
Sorex *Kram. Austr. p.* 317.
Die Spitzmaus *Hall. vierf. p.* 435.
Sorex (Araneus) cauda corpore longiore *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 53 *n.* 1.
Musaraigne *Dictionn. anim. III p.* 202.
La Musaraigne *Buff. hist. nat. VIII p.* 57 *tab.* 10 *fig.* 1.
Spitsmuis: Spitsmuis met de Staart langer dan 't Lyf *Houtt. nat. hist. II p.* 312 *tab.* 17 *fig.* 3.
Sorex (Araneus) cauda corpore longiore *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 9 *n.* 24.
The Shrew Mouse *Penn. brit. zool. p.* 54 *cum fig.*
Angel-Muus *Pontopp. Dan. I p.* 613.
Musaraigne *Bom. dictionn. III p.* 172.
Sorex (Araneus) cauda mediocri, corpore subtus albido *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 74 *n.* 5.
The faetid Shrew *Penn. syn. quadr. p.* 307 *n.* 235.
Toporagno *Aless. quadr. III tab.* 104 *fig.* 1 Buff.
Foetid Shrew *Forster: Philos. trans. LXII p.* 380.
Die Spitzmaus *Müll. Naturs. I p.* 302 *tab.* 17 *fig.* 3.
Sorex (Araneus) cauda mediocri, corpore subtus albido *Müll. Dan. prodr. p* 4 *n.* 19.
Die Spitzmaus *Mart. Buff vierf. IV p.* 263 *tab.* 74.
Toporagno *Italis.*
Musaraigne *Gallis.*
Musgaño, Musaraña, Raton pequeño *Hispanis.*
Murganho, Musaranho *Lusitanis.*
Llygoden goch, Chwistlen, Llyg *Cambrensibus.*
Spitzmaus *Germanis.*
Spitsmuis *Belgis.*
Shrew, Shrew mouse *Anglis.*
Näbbmus *Suecis.*
Angel-Muus *Danis.*
Nebbe-Muus, Museskiœr *Noruegis.*
Zibak *Lapponibus.*

Paullo

Paullo minor Mufculo, longitudine corporis ad $2\frac{1}{2}$ poll. caudae $1\frac{1}{2}$ poll. Roftrum elongatum, gracile, vibriffatum. Oculi parui, pilis occultati. Auriculae breues, rotundatae. Caput et corpus fupra canum vel cinereo-nigricans, venter fordide albus. Cauda pilis breuiffimis. Crura breuia, digitis 5-5. nudis. Mammae fex ventrales.

Habitat in Europae filuis, ruderatis, cryptis fubterraneis, prope fimeta: eft quoque in freto Hudfonis.

Edit femina, infecta, quisquilias. Teter venenumque olens occiditur a Felibus, fed non editur. Parit quatuor ad fex. Morfus venenatus a vulgo creditur. Vox acuta. Paullo lentior Mufculo.

brafilienfis. 8. S. Fufcus, dorfo ftriis tribus nigris.

Mus araneus figura muris *Marcgr. Braf. p.* 229.

La Mufaraigne du Brésil: Mufaraneus (Brafilienfis) fufcus, tribus taeniis in dorfo nigris *Briff. regn. an. p.* 180 *n.* 2.

La Mufarigne de Brafil *Buff. hift. nat. XV p.* 160.

The Brafilian Shrew *Penn. fyn. quadr. p.* 309 *n.* 239.

Die brafilianifche Spitzmaus: Sorex americanus *Müll. Naturf. Suppl. p.* 36.

Longitudo corporis 5 pollicum, caudae 2 poll. Nafus acutus. Corpus fufcum, ftriis dorfi longitudinalibus tribus nigris. Scrotum pendulum.

Habitat in Brafilia. Haud timet catum, neque ab eo laeditur.

mofchatus. 9. S. pedibus palmatis, cauda compreffo-lanceolata.

Mus aquaticus *Cluf. exot. p.* 375 *cum fig.* mediocr.

Mus aquatilis *Aldrov. digit. p.* 447 *fig. p.* 448 Cluf.

Mus

Mus aquaticus *Ionst. quadrup. p.* 169 *tab.* 73 fig. Clus.
Mus aquaticus Clusii *Muf. Worm. p.* 334.
Sorex moscouiticus *Charlet. exerc. p.* 25.
Mus aquaticus exoticus *Clus. Rai. syn. quadr. p.*217.
Castor cauda lineari plana *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 47.
Castor cauda longa lanceolata plana *Linn. fn. suec.* I *p.* 9 *n.* 24.
Die Biesamratte, Castor moschatus *Linn. Westgoth. p.* 161.
Castor cauda longa lanceolata plana *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 2.
Glis moschiferus; odore Moschi *Klein. quadrup. p.* 57.
Mus capite paruo, cauda lata. The broad-tailed Mus, with a small head: the Musk-Rat *Hill anim. p.* 518.
Mus aquaticus exoticus Clus. *I. G. Gmelin*: *Nov. comm. petrop. IV p.* 383.
Mus aquaticus moschum redolens *Nov. comm. petrop. V tab.* 13 fig. bon.
Le Rat musqué: Castor (Mus moschiferus) cauda verticaliter plana, digitis omnibus membranis inter se connexis *Briss. regn. an. p.* 135 *n.* 3.
Die wohlriechende Wasserratte *Hall. vierf. p.* 426.
Castor (moschatus) cauda longa lanceolata plana *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 59 *n.* 2.
Rat musqué *Dictionn. anim. III p.* 667.
Muskus-Rot: Bever met een lange, platte, Lancetswyze Staart *Houtt. nat. hist. II p.* 435.
Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceolata, pedibus palmatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 11 *n.* 28.
Die Bisem-Ratze an der Wolga *Schober*: *Müll. Samml. VII p.* 41.
Le Desman *Buff. hist. nat. X p.* 1 *tab.* 2.
Castor (moschatus) cauda longa compresso-lanceolata, pedibus palmatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 79 *n.* 2.

Wycho-

Wychochol, Waſſer oder Biſamratze *Rytſchk. Orenb. I p.* 229.

Die Biſamratze *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 28 *tab.* 3, 4 figg. bon.

The longnoſed Beaver *Penn. ſyn. quadr. p.* 260 *n.* 192.

Desman *Aleſſ. quadrup. III tab.* 114 *fig.* 2 Buff.

Die Biſamratte, Sorex moſchatus *Pallas Reiſ. I p.* 156.

Die Biberratze *Müll. Naturſ. I p.* 332.

Däſman *Suecis.*

Выхоxолъ (Wychochol), Выхухоль (Wychuchol') *Ruſſis.*

Longitudo corporis ad 14 poll. cauda corpore paullo breuior. Naſus elongatus, gracilis, apice ſupra nigro, ſubtus rufo. Oculi minutiſſimi, pilis albicantibus breuibus cincti. Auriculae nullae. Collum breue. Corpus elongatum. Crura antica breviſſima, poſtica paullulum longiora, digitis 5-5 palmatis. Cauda lanceolata compreſſa, ſquamis rotundis tecta, intermixtis pilis breuibus. Caput et corpus ſupra ex cinereo nigricans, venter ex cinereo albidus. Pili molliſſimi. Veſica fellea nulla.

Ex dentium et roſtri figura omnino Sorex eſt, non Caſtor.

Habitat in Lapponia, Ruſſia ad Wolgam alibique, in caueis litoris, introitu ſub ipſa aqua. Victitat inſectis, vermibus, piſcibus. Moſchum ſpirat praecipue verſus caudam, ex cuius folliculis exprimi poteſt moſchus vulgari valde ſimilis ad grana 20. Editur a piſcibus maioribus, quorum carnem inficit odore moſchi forti, vt cibo ingratiſſima ſit. Inceſſus lentus. Coit verno tempore. Vox Muſculi.

Species obscurae.

* Mus araneus capensis maximus *Petiv. gazoph. tab.* 23 *fig.* 9.

Nasus longissimus. Auriculae magnae. Cauda longitudine corporis.

** Eine Art unglaublich kleiner Spitzmäuse *Pallas Reis. II p.* 664.

Minutissimum omnium Quadrupedum, ponderis granorum 30. Magis fuscus Araneo. Cauda crassa, basi tenuiore contracta.

Habitat in Sibiria, ad Ieniseiam alibique ad aquas.

*** Shrew *Forster: Philos. trans. LXII p.* 381.

Corpus supra obscure griseum, subtus sordide album. Nasus gracillimus. Longitudo corporis ad 2 ½ poll. caudae 1¼ poll. Cauda rarius pilosa, corpori concolor.

Habitat ad Fretum Hudsonis.

15. PTEROPVS.

Dentes Primores IV vtrinque.

Palmae corpore longiores, pollicibus breuissimis, membrana inter digitos expansa et ad crura postica extensa, pro volatu.

Mammae duae pectorales.

Vampyrus. 1. P. ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora diuisa.

Vespertilio Borsippae *Gesn. av. p.* 739.

Vesper

Vespertilio ingens *Clus. exot. p.* 94 fig. mediocr.
Strange Bats *Argens. Molucc. p.* 158.
Vespertilio admirabilis *Bont. Ind. or. p.* 68 *fig. p.* 69 pessima.
Chauvesouris *Dampier voy. II p.* 70.
Chauve-Souris *Des March. voy. II p.* 208.
Canis volans ternatana orientalis femina *Seb. thes. I p.* 91 *tab.* 57 *fig.* 1.
Canis volans mas *Seb. thes. I p.* 91 *tab.* 57 *fig.* 2.
Vespertilio cauda nulla *Linn syst. nat.* 2 *p.* 45.
Der fliegende Hund von Ternate beyderley Geschlechts *Meyer Thiere III tab.* 35 fig. Seb.
Vespertilio cauda nulla *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 1.
Vespertilio Cynocephalus, Ternatanus *Klein quadrup. p.* 61.
The great Bat from Madagascar *Edw. birds IV tab.* 180.
Vespertilio cauda nulla. The Vespertilio, without a tail: The Eagle Bat *Hill anim. p.* 564.
La Roussette: Pteropus rufus aut niger, auriculis brevibus acutiusculis *Briss. regn. an. p.* 216 *n.* 1.
La Roussette à col rouge: Pteropus fuscus, auriculis breuibus acutiusculis, collo superiore rubro *Briss. regn. an. p.* 217 *n.* 2.
Der fliegende Hund *Hall. vierf. p.* 452 *tab.* 28.
Vespertilio (Vampyrus) ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora diuisa *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 31 *n.* 1.
Chien volant *Dictionn. anim. I p.* 616 cum congeneribus.
Roussette *Dictionn. anim. III p.* 724.
Chien volant *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 384.
Roussette *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 385.
Vliegende Hond van Ternate: Vledermuis zonder Staart, met een enkele Neus, het Vlies tusschen

 de

de Beenen verdeeld *Houtt. nat. hist. I p.* 407 *tab.* 8 *fig.* 1 Seb.

La Roussette *Buff. hist. nat. X p.* 55 *tab.* 14.

La Rougette *Buff. hist. nat. X p.* 55 *tab.* 17.

Chauvesouris *Bom. dictionn. I p.* 510 cum congeneribus.

Vespertilio (Vampyrus) ecaudatus, naso simplici, membrana inter femora diuisa *Linn. syst. nat.* 12. *I p.* 46 *n.* 1.

Die Roussette und Rougette *Berl. Samml. II p.* 423 *cum figg.* Buff.

The Ternate Bat *Penn. syn. quadr. p.* 359 *n.* 274.

The lesser Ternate Bat *Penn. syn. quadr. p.* 362 *n.* 274 *β. tab.* 31 *fig.* 1.

Pipistrelli americani *Aless. quadrup. III tab.* 108 fig. Buff.

Der fliegende Hund *Müll. Naturs. I p.* 152 *tab.* 8 *fig.* 1 Seb.

Der Blutsauger: Vespertilio Vampyrus *Schreb. Säugth. I p.* 153 *n.* 1 *tab.* 44 fig. Buff.

Corpus magnitudine Sciuri. Dentes primores vtrinque quatuor, erecti, obtusiusculi. Laniarii superiores solitarii, antice ab inferiore dente sulcati. Inferiores bini, cum dente primore paruo obtuso inter vtrosque. Molares obtusiusculi, quinque vtrinque, supra primo maiore, reliquis ordine decrescentibus. Oculi magni. Membrana nictitans in cantho oculi maiore. Auriculae breues, acutiusculae. Nares vix diuisae. Lingua acuta, papillis

PTEROPI cum *Vespertilionibus*, a quibus differunt dentium numero rostroque longiore, conueniunt praeter membranam volitantem rictu oris ingente, dentibus acutis, collo breuiusculo, pectore musculoso, digitis palmarum muticis; exceptis paucis, in quibus primus digitus vnguinatus est. Plantae digitis quinque breuibus, aequalibus, vnguinatis.

pillis aculeatis terminata. Palmarum digitus primus ſeparatus, vnguiculatus; ſecundus membranae affixus. Plantae fiſſae, vnguiculatae, digitis quinque, calcaneis poſtice exeuntibus in ſubulatam cartilaginem, membranae annexam. Vngues fortes, arcuati. Cauda nulla. Penis ingens, propendens. Caput obſcure ferrugineum. Collum, humeri et corpus ſubtus pallidius rufa. Dorſum pilis breuioribus, nigricantibus, mollibus. Membrana volatilis nigricans, inter femora diuiſa. Aſt variat color, alii toti rufo-fuſci, alii nigricantes.

Habitat in Guinea, Madagaſcar, inſulisque omnibus in oceano indico. Gregarium animal, aerem obſcurans, dum volat, ob copiam, apum examinis inſtar arboribus adhaerens.

Victitat fructibus. Dicitur et piſcari. Inebriat ſe ſucco palmarum. Pingueſcit valde, carne Indis expetita. Vox fortiſſima. Vehementer mordet. Foetet. Forte Harpyia *veterum.*

Varietas triplex:

α. La Rouſſette *Buffonii*, Chien volant *Daubentonii.* Hanc pinxit *Edwardsius.* Corpore rufo.

β. La Rougette *Buffonii*, la Rouſſette *Daubentonii*: paullo minor praecedente, roſtro acutiore, corpore fuſco-griſeo, collari fuluo, fere aurantio.

γ. The leſſer Ternate Bat *Pennanti*: minor prioribus, colore ſtramineo.

Spectrum. 2. P. ecaudatus, naſo infundibuliformi lanceolato.

Arboribus inhaerent in calidioribus, in frigidioribus latent interdiu rimis rupium, murorum etc. penduli ex pedibus poſticis vel ex pollice palmarum; veſpere euolant. Victitant praecipue inſectis. Monogami.

Andira aca Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p.* 213.
Andira guacu *Pis. Ind. p.* 290.
Vespertilio rostro appendice auriculae forma donato *Sloan. Iam. II p.* 330.
Canis volans maxima aurita femina ex noua Hispania *Seb. thes. I p.* 92 *tab.* 58 *fig.* 1.
Murcielago carnicero *Gum. Orin. II p.* 223.
Chauve-souris *Condam. voy. p.* 171.
Les Chauvesouris *Viloa voy. I p.* 53.
Die gröste fliegende Hündinn aus Neuspanien *Meyer Thiere III tab.* 36 fig. Seb.
The Cave-Bat *Hugh. Barbad. p.* 68.
Vespertilio Cynocephalus, maximus, auritus, ex noua Hispania *Klein. quadrup. p.* 62.
La Rousette à longues oreilles: Pteropus auriculis longis, patulis, naso membrana antrorsum inflexa aucto *Briss. regn. an. p.* 217 *n.* 3.
The Bat: Vespertilio minor angulis et extremitatibus alarum vnguiculis vncinatis ornatis *Brown. Iam. p.* 486.
Der gröste fliegende Hund mit Ohren *Hall. vierf. p.* 453.
Vespertilio (Spectrum) ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 31 *n.* 2.
Vliegende Hond van Nieuw Spanje: Vledermuis zonder Staart, met een treyterswyze Neus, die gelancet is *Houtt. nat. hist. I p.* 408 *tab.* 8 *fig.* 2 Seb.
Le Vampire *Buff. hist. nat. X p.* 55.
Andira-guachu *Bom. dictionn. I p.* 112.
Vespertilio (Spectrum) ecaudatus, naso infundibuliformi lanceolato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 46 *n.* 2.
Surinamische Fledermäuse *Berl. Samml. I p.* 53.
Der Vampyr *Berl. Samml. II p.* 423.
The Spectre Bat *Penn. syn. quadr. p.* 362 *n.* 275.
Der Flatterer *Müll. Naturs. I p.* 153 *tab.* 8 *fig.* 2 Seb.

Die

Die Trichternase: Vespertilio Spectrum *Schreb Säugth. I p.* 159 *n.* 3 *tab.* 45 fig. Seb.

Longitudo corporis 5½ poll. Nasus elongatus, antice appendice longa infundibuliformi siue conica erecta, superne in foliolum lanceolatum adscendente. Auriculae ouatae, interius lacinia subulata membranacea, longitudine auriculae. Laniarii solitarii, magni, approximati reliquis. Molares anteriores breuiores, obtusiores. Palmarum pollex breuis, vngue arcuato extra membranam: Digiti quatuor membrana connexi. Plantae digitis quinque aequalibus, vnguibus arcuatis. Cauda nulla. Membrana inter femora non diuisa. Corpus pilis cinereis longioribus. Membrana fibris ramosis.

Habitat in America australi, Palmis inhaerens. Valde pinguescit.

Sanguinem dormientium noctu haurit haec, et praecedens forte, alis flabelli instar ventos iucundissimos mouens, ne expergefiant.

Spasma. 3. P. ecaudatus, naso foliato obcordato.

Glis volans ternatanus *Seb. thes. I p.* 90 *tab.* 56 *fig.* 1.

Vespertilio caudatus, naso foliato obuerse cordato *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.

Die fliegende Katz von Ternate *Meyer Thiere III tab.* 39 *fig.* Seb.

Vespertilio caudatus, naso foliato obuerse cordato *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 5.

Vespertilio Rattus Ternatanus *Klein. quadrup. p.* 61.

Vespertilio caudatus naso foliato obuerse cordato. The tailed Vespertilio, with a foliated and obversely cordated nose: The flying Mouse *Hill anim. p.* 565.

La grande Chauve-souris de Ternate: Vespertilio (maior Ternatanus) subrufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus, naso gemino *Briss. regn. an. p.* 226 *n.* 4.

Die fliegende Ratte *Hall. vierf. p.* 451 *tab.* 27 *B.*

Vespertilio (Spasma) caudatus, naso foliato obcordato *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 32 *n.* 4.

Vliegende Rot van Ternate: Vledermuis zonder Staart, de Neus bladerig in de gedaante vam twee Harten, 't een met de punt in 't ander *Houtt. nat. hist. I p.* 409 *tab.* 8 *fig.* 4 Seb.

Vespertilio cauda nulla: naso foliato: auriculis maximis appendiculatis *Gronov. zooph. I p.* 7 *n.* 27.

Vespertilio (Spasma) ecaudatus, naso foliato obcordato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 47 *n.* 4.

The cordated Bat *Penn. syn. quadr. p.* 364 *n.* 278.

Die fliegende Ratze *Müll. Natursf. I p.* 154 *tab.* 8 *fig.* 4 Seb.

Die Herznase: Vespertilio Spasma *Schreb. Säugth. I p.* 158 *n.* 2 *tab.* 48 fig. Seb.

Longitudo corporis 4 poll. latitudo extenti 12 poll. Dens laniarius vtrinque vnicus supra et infra, molares vtrinque sex. Auriculae longae lataeque, ouatae, erectae, intus appendice foliacea complicata lata. Nasus apice membrana cordiformi instructus. Cauda nulla. Membrana inter femora postica. Color faciei pallide rufus, corporis pallidior.

Habitat in Ceylona, Ternate.

hastatus. 4. P. ecaudatus nigricans, naso foliato hastato.

La Chauve-souris d'Amerique: Vesertilio (americanus) murini coloris, pedibus anticis tetradactylis. posticis pentadactylis, naso cristato *Briss. regn. an. p.* 228 *n.* 6.

La chauve-souris fer-de-lance *Buff. hist. nat.* XIII *p.* 226 *tab.* 33.
Vespertilio hastatus *Pallas spicil. III p.* 7.
The Iavelin Bat *Penn. syn. quadr. p.* 363 *n.* 276.
Pipistrello ferro di lancia *Aless. quadrup. tab.* 166 *fig.* 1 Buff.
Die Kleeblattnase: Vespertilio hastatus *Schreb. Säugth. I p.* 161 *n.* 5 *tab.* 46 *B* fig. Buff.
Die Kleeblattnase *Müll. Natursf. Suppl. p.* 14.

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ poll. Nasi foliolum angustius margine narium, simileque folio trifolii absque petiolo. Auriculae capite breuiores, cum lacinia interiore acuta. Color e fusco nigricans.

Habitat in America australi.

perspicillatus. 5. P. subecaudatus rufus, naso foliato plano acuminato.
Vespertilio americanus vulgaris *Seb. thes. I p.* 90 *tab.* 55 *fig.* 2.
Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.
Vespertilio caudatus, naso foliato acuminato *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 4.
Vespertilio Americanus vulgaris, longioribus auriculis, et e naso erecta cristula *Klein. quadrup. p.* 61.
Vespertilio caudatus naso foliato acuminato. The tailed Vespertilio, with a foliated, acuminated nose *Hill anim. p.* 564.
Vespertilio (perspicillatus) ecaudatus naso foliato acuminato *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 7.
Die gemeine amerikanische Fledermaus *Hall. vierf. p.* 541.
Vespertilio (perspicillatus) ecaudatus, naso foliato plano acuminato *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 31 *n.* 3.

Gebrilde Vledermuis: Vledermuis zonder Staart, met een bladerige vlakke gefcherbte Neus *Houtt. nat. hift. I p.* 409 *tab.* 8 *fig.* 3 Seb.

Vefpertilio (perfpicillatus) ecaudatus, nafo foliato plano acuminato *Linn fyft. nat.* 12, *I p.* 47 *n.* 3.

Brillnafe *Müll. Naturf. I p.* 154 *tab.* 8 *fig.* 3 Seb.

Die Schaufelnafe: Vefpertilio perfpicillatus *Schreb. Säugth. I p.* 160 *n.* 4 *tab.* 46 *A* fig. propria.

Minor praecedente, cui fimilis. Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ poll. Os breue, latum, quafi truncatum, atque in hoc fegmento nares angufto marginatae; fupra foliolum figura folii Teucrii Mari, obtufius quam in antecedente. Auriculae longitudine capitis, rotundatae, anguftiores quam in P. haftato, lacinia interiore breuiore obtufioreque. Cauda breuis, intra membranam. Membrana finuata ad caudam. Color animalis rufus.

Habitat in America auftrali.

foricinus. *6.* P. fubecaudatus canus, nafo foliato ouali acuminato.

Small Bat *Edw. birds IV tab.* 201 *fig.* 1.

Feuille *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 388.

Vefpertilio cauda breuiffima: nafo foliato, acuminato: auriculis fubfimplicibus rotundatis *Gronov. zooph. I p.* 7 *n.* 26.

Une autre chauve-fouris *Buff. hift. nat. XIII p.* 227.

Vefpertilio foricinus *Pallas mifcell. p.* 51 *tab.* 5.

Vefpertilio foricinus *Pallas fpicil. III p.* 24 *tab.* 3.

Der Vampyr *Berl. Samml. II fig.* Pallaf.

The leaf Bat *Penn. fyn. quadr. p.* 364 *n.* 277.

Die Spernafe: Vefpertilio foricinus *Schreb. Säugth. I p.* 161 *n.* 6 *tab.* 47. fig. Pall.

Die Sperrnafe *Müll. Naturf. Suppl. p.* 14.

Lon-

Longitudo corporis vltra 2 poll. Roftrum conicum, longius acutiusque quam in praecedentibus. Nares marginatae, cum foliolo ouali, acuminato. Lingua cylindrica, acuta, papillis aculeatis. Auriculae paruae, rotundatae, lacinia interiore minuta, femirotunda. Cauda breuiffima. Color murinus fubrufus, fubtus albicans: mares autem fupra magis rufefcunt, fubtus magis grifei funt ac feminae. Dentes primores nullos habet fecundum Daubentonium.

Habitat in Iamaica, Surinamo, reliqua auftrali America, nec non ad Senegal fluuium, in caueis filvarum, quas ftercore nitrofo replet.

leporinus. 7. P. caudatus, labio fuperiore fiffo.

Vne Chauve-Souris de la vallée d'Ylo *Feuill. Iourn. II p.* 623.

Vefpertilio cato fimilis americanus mas *Seb. thef. I p.* 89 *tab.* 55 *fig.* 1.

Vefpertilio caudatus, labio fuperiore bifido *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 45.

Die einer Katze ähnliche americanifche Fledermaus, das Männlein *Meyer Thiere III tab.* 40 fig. Seb.

Vefpertilio caudatus, labio fuperiore bifido *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 3.

Vefpertilio Americanus, capite globofo; ore leporino *Klein. quadrup. p.* 61.

Vefpertilio caudatus labio fuperiore bifido. The tailed Vefpertilio, with the upperlip bifid *Hill. anim. p.* 564.

Verfpertilio (leporinus) caudatus, labió fuperiore bifido *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 7.

La Chauve-fouris rouffe d'Amerique: Vefpertilio (americanus rufus) dilute rufus, pedibus anticis tetradactylis, pofticis pentadactylis *Briff. regn. an. p.* 227 *n.* 5.

Die

Die fliegende Katze *Hall. vierf. p.* 450.
Vefpertilio (leporinus) caudatus, labio fuperiore bifido *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 32 *n.* 5.
Geftaarte Vledermuis, met de Bovenlip in tweeën gefpleeten *Houtt. nat. hift. I p.* 410.
Noctilio (americanus) labio inferiore varicofo *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 88 *n.* 1.
Vefpertilio leporinus *Pallas fpicil. III p.* 8.
The peruvian Bat *Penn. fyn. quadr. p.* 365 *n.* 279.
Amerikanifche katzenartige Fledermaus *Müll. Naturf. I p.* 361.
Die Fledermaus mit der Hafenfcharte: Vefpertilio leporinus *Schreb. Säugth. I p.* 162 *n.* 7 *tab.* 61 fig. propr.
Die Hafenfcharte *Müll. Naturf. Suppl. p.* 15.

Magnitudo Ratti mediocris. Longitudo extenfi 2 ped. 5 poll. Caput rotundatum, fere Canis fricatoris. Auriculae magnae, acuminatae, nudae. Oculi minuti, nigri. Labium fuperius diuifum, inferius varicofum lacunis tribus. Dentes primores fuperiores quatuor: interioribus maioribus, conicis; exterioribus minutiffimis, remotiufculis, obtufis. Inferiores duo? didymi, retufi, laniariis? approximati, nifi hi ipfi fint primores. Nares prominulae, cylindricae, approximatae. Cauda membrana breuior, longitudine dimidia corporis. Color ferrugineo-grifeus, cum ftria albicante in dorfo.

Habitat in America auftrali.

Varietatem β habet Pennantus, minorem, longitudine corporis 5 poll. capite magno, labiis pendulis, fuperiore diuifo, nafo bilobato, auriculis rectis anguftis longis acuminatis, cauda breui, vnguibus plantarum magnis curuatis compreffis, membrana nigri-

nigricante valde tenui, capite dorsoque fuscis, ventre cinereo.

Habitat in Peru.

16. VESPERTILIO.

Dentes Primores supra et infra numero inaequales, variantes.

Palmae corpore longiores, pollicibus brevissimis, membrana inter digitos expansa et ad crura postica extensa, pro volatu.

Mammae duae pectorales.

a) *Dentibus primoribus supra quatuor, infra sex.*

auritus. 1. V. naso oreque simplici, auriculis capite maioribus.

La Sourichauue *Belon. oiʃ. p.* 146.

Nicteris en grec Vespertilio en latin *Belon. oiʃ. fig. p.* 147 mediocr.

Vespertilio *Aldrov. ornith. I p.* 571 *fig. p.* 575 mal.

Vespertilio *Ionʃt. av. p.* 49 *tab.* 20 *fig. inferior*, mediocr.

Vespertilio *Muʃ. Worm. p.* 308.

Die Fledermaus Vespertilio la Chauve Souris *Friʃch Vögel tab.* 103 fig. mediocr.

The Batt or Flutter-Mouse *Albin birds III p.* 95.

The

- - - - minimam pro corpore vocem
Emittunt, peraguntque leues stridore querelas;
Tectaque, non siluas celebrant, lucemque perosae
Nocte volant, seraque trahunt a vespere nomen.

OVID.

The double eared Bat *Albin birds III tab.* 101.
Vespertilio minor vulgaris *Klein. quadrup. p.* 61.
Long-eared Bat *Edw. birds IV tab.* 201 *fig.* 3.
La petite Chauve-souris de nôtre pays: Vespertilio (minor) murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis duplicibus *Briss. regn. an. p.* 226 *n.* 3.
Vespertilio (auritus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite maioribus *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 32 *n.* 6.
Chauve-souris *Dictionn. anim. I p.* 509 cum congeneribus.
L'oreillar *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 379 *tab.* 1 *fig.* 2 capitis.
La seconde espece, la chauve-souris à grandes oreilles, l'oreillar *Buff. hist. nat. VIII p.* 118 *tab.* 17 *fig.* 1.
Gestaarte Vledermuis, met enkele Neus en Bek, de Ooren dubbeld en grooter dan de Kop *Houtt. nat. hist. I p.* 410 *tab.* 8 *fig.* 5.
Vespertilio (auritus) naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite maioribus *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 2 *n.* 3.
Vespertilio caudatus, naso simplici; auriculis maximis inappendiculatis *Gronov. zooph. I p.* 6 *n.* 23.
The long-eared Bat *Penn. brit. zool. p.* 56.
Vespertilio (auritus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis capite maioribus *Linn. syst nat.* 12, *I p.* 47 *n.* 5.
The long-eared Bat *Penn. syn. quadr. p.* 371 *n.* 292.
Orecchione *Aless. quadrup. III tab.* 110 *fig.* 1 Buff.
Langohr *Müll. Naturs. I p.* 154 *tab.* 8 *fig.* 5 Houtt.
Die langöhrige Fledermaus: Vespertilio auritus *Schreb. Säugth. I p.* 163 *n.* 8 *tab.* 50 *fig.* Buff. et Daubent.

Vesper-

VESPERTILIONVM incessus singularis ob pedum structuram. In frigidioribus hibernant gregarii in caueis et ruderatis.

Vespertilio (auritus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis duplicatis, capite maioribus *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 22.

Longitudo corporis ad 2 poll. Rostrum elongatum, acutum. Nasus simus. Oculi parui, rotundi. Pili longiores molles supra oculos. Auriculae fere longitudine corporis, ouales, tenues, fere pellucidae, rotundatae, in fronte coalitae, cum valuula siue lacinia interiore maiore, forte pro somno. Fissura in membrana ad digitum palmarum secundum et tertium. Cauda longitudine corporis, apice paullulum extra membranam prominente. Color e flauo canus, subtus ex flauescente albidoque griseus. Membrana subtus cinerea.

Habitat in Europa, vespera volans. Victitat phalaenis aliisque nocturnis insectis; penarias cellas intrat arroditque lardum aliaque varia. Saltans quasi volat. Parit duo. Hibernat in caueis, ruderatis, cauis arboribus gregatim, pedibus posticis suspensus, alis obuoluto corpore. Cibus strigum. Vox debilis.

murinus. 2. V. naso oreque simplici, auriculis longitudine capitis.

Νυκτερις *Arist. hist. anim. I c.* 2 *n.* 12. *c.* 6 *n.* 46.
Vespertilio *Plin. hist. nat. X c.* 61 *(c.* 81 *Hard.) XI c.* 37 *(*62 *Hard.) c.* 39 *(c.* 94, 95 *Hard.)*
Vespertilio *Agric. an. subt. p.* 24, 25.
Vespertilio *Aldrov. ornith. I p.* 571 *fig. p.* 574 mal.
Vespertilio *Ionst. av. p.* 49 *tab.* 20 *figg. mediae* mediocr.
Vespertilio *Charler. exerc. p.* 80.
Vespertilio *Rai. syn. quadr. p.* 243.
Die Fledermaus, Vespertilio, la Chauve Souris *Frisch Vögel tab.* 102 mediocr.

Vesper-

Vefpertilio caudatus, nafo oreque fimplici *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 45.

Vefpertilio caudatus, nafo oreque fimplici *Linn. fn. fuec.* 1 *p.* 7 *n.* 18.

Eine Fledermaufs *Meyer Thiere I tab.* 3 fig. mediocr.

Vefpertilio caudatus, nafo oreque fimplici *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 7 *n.* 2.

Small Bat *Edw. birds IV tab.* 201 *fig.* 2.

Vefpertilio maior vulgaris *Klein. quadrup. p.* 61.

Vefpertilio caudatus, ore nafoque fimplici. The Vefpertilio, with a tail and with the mouth and nofe fimple: the Bat *Hill anim. p.* 563.

La grande Chauve-fouris de nôtre pays: Vefpertilio (maior) murini coloris, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis fimplicibus *Briff. regn. an. p.* 224 *n.* 1.

Vefpertilio caudatus, ore nafoque fimplici *Kram. Auftr. p.* 314.

Die gemeine Fledermaus *Hall. vierf. p.* 449.

Vefpertilio (murinus) caudatus, nafo oreque fimplici, auriculis capite minoribus *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 32 *n.* 7.

La chauve-fouris *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 378 *tab.* 1 *fig.* 1 capitis.

La chauve-fouris commune, ou la chauve-fouris proprement dite *Buff. hift. nat. VIII p.* 118.

La chauve-fouris *Buff. hift. nat. VIII tab.* 16 *fig.* 1, 2.

Geftaarte Vledermuis, met enkele Neus en Bek, de Ooren kleiner dan de Kop *Houtt. nat. hift. I p.* 411 *tab.* 8 *fig.* 6.

Vefpertilio (murinus) caudatus, nafo oreque fimplici, auriculis capite minoribus *Linn fn. fuec.* 2 *p.* 1 *n.* 2.

The fhort-eared Bat *Penn. brit. zool. p.* 55 *cum fig.* Seb.

Flagermuus *Pontopp. Dan. I p.* 612.

Vefper-

Vespertilio (murinus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 47 *n.* 6.

The common Bat *Penn. syn. quadr. p.* 371 *n.* 291.

Mauseohr *Müll. Naturs. I p.* 154 *tab.* 8 *fig.* 6 Houtt.

Die gemeine Fledermaus: Vespertilio murinus *Schreb. Säugth. I p.* 165 *n.* 9 *tab.* 51 figg. Buff. et Daubent.

Vespertilio (murinus) caudatus, naso oreque simplici, auriculis capite minoribus *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 21.

Nottolo, Nottola, Sportiglione, Vispistrello, Vilpestrello, Pipistrello *Italis.*

Murcielago, Morcielago, Murciegalo, Murceguillo *Hispanis.*

Morcego *Lusitanis.*

Chauve-souris *Gallis.*

Ystlum *Cambrensibus.*

Fledermaus, Speckmaus *Germanis.*

Vledermuys *Belgis.*

Bat, Flittermouse, Rearmouse, Reremouse *Anglis.*

Läderlapp, Flädermus *Suecis.*

Nattblacka *Smolandis.*

Flaggermuus, Aftenbakke *Danis.*

Skind-Vinge *Noruegis.*

Nietopersz *Polonis.*

Нетопырь (Netopyr), Летучая Мышь (Letuczaja mysch') *Russis.*

Kanatle-Tskan *Tataris.*

Omokolotsch *Tungusis.*

Irmisch *Burätis.*

Tschongischtische-Kolja *Tscheremissis.*

Sonatli Schüschi *Tschuwaschis.*

Kédi-Milaù *Morduanis.*

Kúschbort *Permice.*

Kubort *Sirjänice.*

Maior praecedente, longitudine corporis $2\frac{1}{2}$ poll. Rostrum longum, largiusculum, crassius quam in aurito. Maxilla inferior prominens extra superiorem. Oculi minuti. Auriculae longitudine capitis, rotundatae, valuulis angustis, acuminatis, auricula dimidia breuioribus. Cauda fere longitudine corporis, tota intra membranam. Color corporis murinus subrufus, subtus pallide griseus, rostro ex flauo griseo, auricularum apicibus et membrana volitante fuscis.

Dentes primores supra 4 sunt, infra 6; at secundum Linneum inuerso ordine supra 6 acuti, distantes, inferiores 4 acuti contigui. Laniarii superiores duo, anteriore maiore; inferiores tres, antico maximo. Molares vtrinque tres tricuspidati.

Habitat in Europa. Noctu volat. Foetet. Victitat imprimis phalaenis, praedatur a Strigibus. De terra non euolat.

Hibernat in cauis arboribus, intra muros, in ruderatis, e pedibus posticis pendulus alis inuolutus. Parit duo.

Noctula. 3. V. naso oreque simplici, auriculis capite breuioribus, corpore cano.

Vespertilio *Gesn. av. p.* 733 *cum fig.* mal.

Vespertilio *Aldrov. ornith. I p.* 571 *fig. p.* 576 mal.

La noctule *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 380 *tab.* 2 *fig.* 1 capitis.

La Noctule *Buff. hist. nat. VIII p.* 118, 128 *tab.* 18 *fig.* 1.

The Noctule Bat *Penn. syn. quadr. p.* 369 *n.* 287.

Die Speckmaus: Vespertilio Noctula *Schreb. Säugth. I p.* 166 *n.* 10 *tab.* 52 *fig.* Buff. et Daubent.

Die

Die Speckmaus: Vespertilio lardarius *Müll. Naturs. Suppl. p.* 15.

Magnitudo V. murini. Rostrum breuius. Nasus subbilobatus. Frons minus conuexa. Oculi minuti, remotissimi. Auriculae breuiores quam in murino, at latae, rotundatae, valuula parua, lata, rotundata. Verruca parua in mento. Pedes breuiores. Cauda tota intra membranam. Corpus ex ruso cinereum, subtus pallidius, sed nasus, auriculae, membranaque cum pedibus splendide nigra.

Habitat in Gallia vulgaris, in Anglia, Germania.

Alte volat, non prope terram. Maxime foetet.

serotinus. 4. V. naso oreque simplici, auriculis capite minoribus, corpore ferrugineo.

La sérotine *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 380 *tab.* 2 *fig.* 2 capitis.

La Serotine *Buff. hist. nat. VIII p.* 119, 129 *tab.* 18 *fig.* 2.

The serotine Bat *Penn. syn. quadr. p.* 370 *n.* 288.

Serotina *Alessi. quadrup. III tab.* 110 *fig.* 2.

Die blasse Fledermaus: Vespertilio serotinus *Schreb. Säugth. I p.* 167 *n.* 11 *tab.* 53 fig. Buff. et Daubent.

Die blasse Fledermaus *Müll. Naturs. Suppl. p.* 16.

Paullo minor murino. Rostrum elongatum. Auriculae breues, at basi latae. Valuulae paruae, rotundatae. Corpus supra ferrugineo-fuscum, subtus pallidius. Membrana nigricans. Cauda longitudine fere corporis.

Habitat in Gallia atque Germania.

Pipistrellus. 5. V. naso oreque simplici, auriculis longitudine capitis, corpore subtus nigricante.

La pipistrelle *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 381 *tab.* 1 *fig.* 3 capitis.

La Pipistrelle *Buff. hist. nat. VIII p.* 119, 129 *tab.* 19 *fig.* 1.

The pipistrelle Bat *Penn. syn. quadr. p.* 370 *n.* 289.

Pipistrello *Aless. quadrup. III tab.* 107 fig. Buff.

Eine Art kleiner Fledermäuse *Pallas Reis. I p.* 41.

Die Zwergfledermaus: Vespertilio Pipistrellus *Schreb. Säugth. I p.* 167 *n.* 12 *tab.* 54 fig. Buff. et Daubent.

Die Zwergfledermaus *Müll. Naturs. Suppl. p.* 16.

Omnium minimus, longitudine corporis circiter $1\frac{1}{2}$ poll. Rostrum breue. Labium superius tumidum ad latera. Oculi parui, profundi. Auriculae capite vix longiores, ouatae, latae, valuulis minutis, obtusis. Frons pilis longis. Cauda vix longitudine corporis, tota intra membranam. Color corporis supra ex flauo fuscus, subtus nigricans, apicibus pilorum flauis. Nasus, labia, auriculae, pedes, cauda, cum membrana volitante nigricantia.

Habitat in Gallia, Germania, passimque in Europa. Odor ingratus debilior. Vox minima.

Barbastellus. 6. V. buccis barbatis, auriculis longioribus frontem tegentibus.

La barbastelle *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 381 *tab.* 2 *fig.* 3 capitis.

La Barbastelle *Buff. hist. nat. VIII p.* 119, 130 *tab.* 19 *fig* 2.

The Barbastelle Bat *Penn. syn. quadr. p.* 370 *n.* 290.

Das Kurzmaul: Vespertilio Barbastellus *Schreb. Säugth. I p.* 168 *n.* 13 *tab.* 55 fig. Buff. et Daubent.

Das Kurzmaul *Müll. Naturs. Suppl. p.* 17.

Longi-

Longitudo corporis 2 poll. Rostrum breuissimum. Buccae tumidae, valde pilosae. Nasus planus. Auriculae longae lataeque, supra rotundatae, marginibus interioribus approximatis, vt frontem tegant; valuulis longitudine dimidia auricularum. Oculi fere in auriculis, minuti. Cauda corpore paullulum breuior, nonnihil prominens extra membranam. Corpus supra nigro-fuscum, subtus griseo-fuscum. In dorso pili longiores.

Habitat in Gallia.

hispidus. 7. V. auriculis longitudine capitis, fronte sulcata longius pilosa.

Le campagnol-volant *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 387.

Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p.* 88.

Chauve-souris etrangere *Buff. hist. nat. X tab.* 20 *fig.* 1, 2.

The bearded Bat *Penn. syn. quadr. p.* 367 *n.* 282.

Die Bartfledermaus: Vespertilio hispidus *Schreb. Säugth. I p.* 169 *n.* 14 *tab.* 56 fig. Buff.

Die Bartfledermaus *Müll. Natursf. Suppl. p.* 17.

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ poll. Rostrum longum, valde depressum sub fronte. Cartilago nasi fere nulla. Nares in sulco peculiari, cuius margo exterior quasi auritus, continuato vsque in frontis fossam nudam profundamque, margine pilis longioribus obuallato. Auriculae longae angustaeque. Cauda fere longitudine corporis. Caput et corpus supra rufo-fuscum, subtus sordide ex flauo album.

Habitat circa Senegal fluuium.

b) Dentibus primoribus supra quatuor, infra octo.

pictus. 8. V. auriculis longitudine capitis, membrana volitante nigro striata.

Vespertilio ternatana femina *Seb. thes. I p.* 91 *tab.* 56 *fig.* 2.

Vespertilio ternatanus mas *Seb. thes. I p.* 91 *tab.* 56 *fig.* 3.

Vespertilio Rattus Ternatanus *Klein. quadr. p.* 61 ?

La petite Chauve-souris de Ternate: Vespertilio (minor Ternatanus) rufus, pedibus omnibus pentadactylis, auriculis simplicibus *Briss. regn. an. p.* 226 *n.* 2.

Die asiatische Fledermaus *Hall. vierf. p.* 452 *tab.* 27 *A.*

Le muscardin-volant *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 388.

Vespertilio caudatus, naso simplici; auriculis infundibuliformibus appendiculatis *Gronv. zooph. I p.* 7 *n.* 25.

Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p.* 92 *tab.* 20 *fig.* 3.

Vespertilio pictus *Pallas spicil. III p.* 7.

The striped Bat *Penn. syn. quadr. p.* 368 *n.* 284.

Die Fledermaus mit bunten Fittigen: Vespertilio pictus *Schreb. Säugth. I p.* 170 *n.* 15 *tab.* 49 fig. Buff.

Der Buntflügel *Müll. Naturs. Suppl. p.* 17.

Kiriwula *Ceylonensibus.*

Longitudo corporis 2-2½ poll. Rostrum breue. Auriculae longitudine capitis, latae, ouato-acuminatae, antorsum versae, margine exteriore sinuatae; valuulis angustis, filiformibus, auricula dimidia breuioribus. Cauda longitudine corporis, tota intra membranam. Corpus supra rufo-fuscum, subtus

ſubtus ſordide albidum. Membrana fuſca ſiue nigricans, ſegmentis ſingulis pallide marginatis. Laniarii ſolitarii, molares ſex vtrinque.

Habitat in Ceylona et Moluccis.

c) *Dentibus primoribus ſupra duobus, infra ſex.*

Nigrita. 9. V. auriculis breuioribus, caudae apice extra membranam prominente, valuulis aurium acuminatis.

Marmotte-volante *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 385.

Vne Chauve-ſouris *Buff. hiſt. nat.* X *p.* 82.

Chauve-ſouris étrangere *Buff. hiſt. nat.* X *tab.* 18.

The Senegal Bat *Penn. ſyn. quadr. p* 366 *n.* 281.

Die ſpitzöhrige Fledermaus: Veſpertilio Nigrita *Schreb. Säugth. I p.* 171 *n.* 16 *tab.* 58 fig. Buff.

Das Spitzohr: Veſpertilio Marmotte *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 18.

Longitudo corporis 4 poll. Caput oblongum. Naſus craſſus, apice ſubacutus. Auriculae breues, acuminatae, valuulis anguſtis, auricula dimidia breuioribus acuminatis. Cauda longitudine 3 poll., apice extra membranam prominente. Corpus ſupra canum, ſubtus pallidius, membrana nigricans. Laniarii ſolitarii, molares quatuor vtrinque. Primores inferiores lobati.

Habitat circa Senegal fluuium.

d) *Dentibus primoribus ſupra duobus, infra quatuor.*

Moloſſus. 10. V. auriculis breuioribus, valuulis rotundatis, labiis pendulis.

Le mulot-volant *Daubenton: Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 387.
Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p.* 84.
Chauve-souris étrangere *Buff. hist. nat. X tab.* 19 *fig.* 1.
Autre chauve-souris *Buff. hist. nat. X p.* 87.
Chauve-souris étrangere *Buff. hist. nat. X tab.* 19 *fig.* 2.
Vespertilio Molossus *Pallas spicil. III p.* 8 *tab.* 4 *fig.* 11 cranii.
The bull-dog Bat *Penn. syn. quadr. p.* 366 *n.* 280.
Die hundsmäulige Fledermaus: Vespertilio Molossus *Schreb. Säugth. I p.* 171 *n.* 17 *tab.* 59 fig. Buff.
Das Hundsmaul *Müll. Natursf. Suppl.* p. 18.

Longitudo corporis 2 poll. Nasus crassus. Labia pendula. Auriculae breuiores, latae, rotundatae, marginibus interioribus supra frontem approximatis. Valuula breuis, lata, rotundata. Cauda longitudine fere corporis, tertia parte extra membranam prominente. Corpus supra fusco-cinereum, subtus pallidius, ventre fusco. Membrana nigricans. Dentes laniarii solitarii; molares supra vtrinque quatuor, infra quinque.

Habitat in America.

e) *Dentibus primoribus supra duobus, infra nullis.*

Cephalotes. 11. V. labio superiore fisso, naribus cochleatis, valuulis auricularum nullis.
Vespertilio Cephalotes *Pallas spicil. III p.* 10 *tab.* 1.
The Molucca Bat *Penn. syn. quadr. p.* 368 *n.* 285.
Die grosköpfige Fledermaus: Vespertilio Cephalotes *Schreb. Säugth. I p.* 172 *n.* 18 *tab.* 60 fig. Pall.
Der Groskopf *Müll. Natursf. Suppl. p.* 19.

Lon-

Longitudo corporis fere 4 pollicum. Caput magnum. Roftrum craffum, retufum. Nares tubulofae, divergentes, extus cochleatae. Labia craffa, laxa, intus villis fubulatis. Labium fuperius diuifum. Lingua papillis aculeisque tecta. Oculi maiufculi, protuberantes, pupilla lineari-oblonga horizontali. Auriculae breues, ouales, absque valuulis. Pollex palmarum longior, membrana reliquis digitis iunctus. Digitus primus palmarum vnguiculatus. Membrana inter femora profunde excifa, cauda breui extra membranam propendente, furfum curuata. Corpus fupra grifeo-cinereum, fubtus fordide album. Venter canus. Membrana rufo-fufca. Dentes laniarii folitarii, inferiores approximati.

Habitat in Moluccis.

f) Dentibus primoribus fupra nullis, infra quatuor.

Leptu-rus. 12. V. membrana ad cubitum faccata.

Die Beutelfledermaus: Vefpertilio Lepturus *Schreb. Säugth. I p.* 173 *n.* 19 *tab.* 57.

Der Beuteltrager: Vefpertilio marfupialis *Müll. Naturf. Suppl. p.* 19.

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ poll. Roftrum mediocre, antice latiufculum, fetis fubtilibus adfperfum. Mentum foffula diuifum. Nares tubulatae, aperturis approximatis. Auriculae longae, obtufae, rotundatae, valuulis breuiffimis obtufis. Dentes primores fupra nulli, infra quatuor, denticulati. Laniarii longiores. Ad cubitum in membrana volitante faccus paruus. Caudae apex ex membrana

prominulus. Corpus supra canum, subtus pallidius; auriculae atque membrana obscure fusca.

Habitat in Surinamo.

Ferrum equinum. 13. V. naso foliato ferri equini aemulo.

Le fer-à-cheval *Daubenton*: *Mém. de l'acad.* 1759 *p.* 382 *tab.* 2 *fig.* 4 capitis.

La chauve-souris fer à cheval *Buff. hist. nat. VIII p.* 120, 131.

Le petit fer-à-cheval *Buff. hist. nat. VIII tab.* 17 *fig.* 2.

Le fer-à-cheval *Buff. hist. nat. VIII tab.* 20.

The horse-shoe-Bat *Penn. syn. quadr. p.* 369 *n.* 286.

Ferro da Cavallo *Aless. quadrup. IV tab.* 166 *fig.* 2 Buff.

Die Hufeisennase: Vespertilio ferrum equinum *Schreb. Säugth. I p.* 174 *n.* 20 *tab.* 62 fig. Buff. et Daubent.

Die Hufeisennase: Vespertilio equinus *Müll. Natursf. Suppl. p.* 20.

Longitudo corporis 2½ poll. et vltra. Rostrum crassum. Foliolum supra labium superius et nares, forma ferri equini. Oculi minuti, profundi. Auriculae longitudine capitis, basi latae, acuminatae, retrorsum versae, valuulis nullis. Cauda longitudine dimidii corporis, tota intra membranam. Corpus supra ex rufo cinereum, subtus albicans; auriculae et membrana nigricantes.

Varietas minor, maiori perfecte similis.

Habitat in Gallia vulgaris, in Anglia, Germania.

g) *Den-*

g) *Dentibus primoribus nullis.*

noueboracensis. 14. V. apice nasi subbifido, macula alba ad basin membranae volitantis.

The New-York-Bat *Penn. syn. quadr. p.* 367 *n.* 283 *tab.* 31 *fig.* 2.

Die nordamerikanische Fledermaus *Schreb. Säugth. I p.* 176 *n.* 21.

Der Neujorker: Vespertilio borealis *Müll. Naturs. Suppl. p.* 20.

Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ poll. caudae $1\frac{4}{5}$ poll. Caput murinum. Apex nasi subbifidus. Auriculae, breves, latae, rotundatae. Dentes primores plane nulli, laniarii solitarii. Cauda longa, tota intra membranam, acuminata. Crura postica gracillima. Totum corpus cum membrana circa caudam supra pilis longis mollibus pallide fuscis, antice pallidioribus. Venter magis pallescit. Ad basin membranae volitantis macula alba. Membrana nuda, nigricans.

Habitat in America boreali.

17. VRSVS.

17. VRSVS.

Dentes Primores ſuperiores VI, intus excauati alterni.
inferiores VI: laterales II longiores lobati; ſecundarii baſi interiores.
Laniarii ſolitarii, conici.
Molares V ſ. VI: primo laniariis approximato.

Lingua laeuis.
Membrana nictitans.
Naſus prominens.
Penis ſcatens oſſe curuato.

Arctos. 1. V. fuſco - nigricans, cauda abrupta.

Αρκτος *Ariſt. hiſt. anim. II c.* 5 *n.* 23. *V c.* 2 *n.* 18. *VI c.* 30 *n.* 384-392. *VIII c.* 9 *n.* 103. *c.* 22 *n.* 181, 182. *IX c.* 7 *n.* 90, 91.

Vrſus *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 35 (*c.* 53 *Hard.*) *c.* 36 (*c.* 54 *Hard.*) *c.* 58 (*c.* 83 *Hard.*) *X c.* 63 (*c.* 83 *Hard.*) *c.* 72 (*c.* 93 *Hard.*) *c.* 73 (*c.* 94 *Hard.*) *XI c.* 37 (*c.* 48, 86 *Hard.*) *c.* 40 (*c.* 95 *Hard.*) *c.* 45 (*c.* 102, 105 *Hard.*) *c.* 49 (*c.* 109 *Hard.*) *c.* 50 (*c.* 111 *Hard.*).

Αρκτος *Aelian. anim. II c.* 19. *V c.* 49. *VI c.* 3, 9.

Αρκτος *Oppian. Cyneg. III,* 139.

Vrſus *Agric. an ſubt. p.* 43.

Vrſus *Geſn. quadrup. p.* 1065 *cum fig.* mediocr.

Vrſus *Schwenckf. theriotr. p.* 131.

Vrſus *Aldrov. digit. p.* 117 *fig. p.* 119 Geſn.

Vrſus *Ionſt. quadrup. p.* 123 *tab.* 55 fig. bon.

Vrſus *Muſ. Worm. p.* 318.

Bär *Geſn. Thierb. p.* 25 *cum fig.* Geſn.

L'Ours

L'Ours *Perr. anim. I p.* 81 *tab.* 9 fig. bon.
Vrſus *Charlet. exerc. p.* 14.
Vrſus, Vrſa *Wagn. Heluet. p.* 187.
Vrſus *Rai. ſyn. quadr. p.* 171.
Bear *Lawſon Carolin. p.* 116 *cum fig.*
Vrſus *Rzacz. Polon. p.* 225 *auct. p.* 321.
The Bear *Catesb. Carol. app. p. XXV.*
L'animal Gin-hiung, l'homme-ours *Du Halde Chin. I p.* 33.
The Bear *Brick. North-Car. p.* 110.
Vrſus cauda abrupta *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 43.
Der Bär *Riding. jagdb. Th. tab.* 3 fig. bon.
Ours *Condam. voy. p.* 163.
Vrſus cauda abrupta *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 1 *n.* 2.
Der Bär *Meyer Th. I tab.* 26 fig. bon.
Vrſus cauda abrupta *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 1.
Vrſus noſtras, Polonus *Klein. quadrup. p.* 82.
Vrſus cauda abrupta. The Vrſus, with an abrupt tail: the common Bear *Hill anim. p.* 541 *tab.* 26 fig. mediocr.
Der Bär *Kalm. Amer. II p.* 265.
L'Ours: Vrſus (. . . .) niger, cauda vnicolore *Briſſ. regn. an. p.* 258 *n.* 1.
Vrſus cauda abrupta *Kram. Auſtr. p.* 310.
Vrſus maior pullus: the black Bear *Brown. Iam. p.* 485.
Vrſus medius canus: the grey Bear *Brown. Iam. p.* 485.
Der gemeine Bär *Hall. vierf. p.* 541.
Vrſus (Arctos) cauda abrupta *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 47 *n.* 1.
L'Ours *Du Pratz Louiſ. II p.* 77.
Ours *Dictionn. anim. III p.* 296.
L'ours *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 248.
L'ours brun des Alpes *Buff. hiſt. nat. VIII tab.* 31.
L'ours blanc terreſtre *Buff. hiſt. nat. VIII tab.* 32.
Beer met een geknotte Staart *Houtt. nat. hiſt. II p.* 213.

Vrſus (Arctos) cauda abrupta *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 7 *n.* 19.
Biörn *Pontopp. Dan. I p.* 607.
Ours *Bom. dictionn. III p.* 314.
Vrſus (Arctos) cauda abrupta *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 69 *n.* 1.
Vrſus Arctos *Forſter: Philoſ. transact. LVII p.* 342.
The black Bear *Penn. ſyn. quadr. p.* 190 *n.* 138.
Orſo *Aleſſ. quadrup. II tab.* 60 fig. Buff.
Orſo bianco *Aleſſ. quadrup. II tab.* 61 fig. Buff.
Bär *S. G. Gmelin it. III p.* 293.
Der gemeine Bär *Müll. Naturſ. I p.* 277.
Schwarzer Bär *Stell. Kamtſch. p.* 113.
Vrſus *Forsk. fn. orient. p. IV.*
Vrſus (Arctos) cauda abrupta *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 16.
Orſo *Italis.*
Oſſo (*mas*); Oſſa (*femina*) *Hiſpanis.*
Urſo, Uſſo (*mas*); Urſa, Uſſa (*femina*) *Luſitanis.*
Ours *Gallis.*
Bär (*mas*); Bärinn (*femina*) *Germanis.*
Beer *Belgis.*
Bear *Anglis.*
Biörn *Suecis et Danis.*
Biörn, Ilgiersdyr, Græs-Dyr, Myre-Biörn *Noruegis.*
Guouzhia (*ſpecies*); Aenak (*mas*); Aeſte (*femina*) *Lapponibus.*
Niedźwiedź *Polonis.*
Медвѣдь (Medwe͡d') (*mas*); Медвѣдица (Medwe͡ditza) (*femina*) *Ruſſis.*
Ukſchuk *Tunguſis.*
Kara-Gurſu *Burätis.*
Ajù *Tataris.*
Maskjä *Tſcheremiſſis.*
Obàh *Tſchuwaſchis.*
Gondir *Wotiakis.*
Oluſta *Morduanis.*

Oſch

Oſch *Permice et Sirjänice.*
Gaas, Gaſa *Kamtſchadalis.*
دب (Dubb) *Arabibus.*
Chors *Perſis.*
Aju *Turcis.*
Ucumari *Peruanis.*

Longitudo corporis 5½ ped. et vltra. Caput longum. Oculi parui, membrana nictitante torui. Auriculae breues, rotundatae. Artus fortes craſſique, palmis plantisque magnis. Digiti 5 - 5. Pollex digitis anguſtior. Mammae quatuor pectorales, duae ventrales fere inguinales. Cauda breviſſima abrupta. Corpus pilis longioribus flocco-ſum, hiſpidum, deforme. Cranium tenuius, cerebrum maius.

Variat colore:

α. *Niger,* minor.
β. *Fuſcus* aut ferrugineo-fuſcus. Hic forte ſpecie differt a praecedente α, vti Buffonio videtur.
γ. *Albus*, vel niger admixtis pilis albis, vulgo Germanis *der Silberbär.*
In Perſia ex albo flaueſcit, minor.

Habitat ſolitarius in vliginoſis ſiluaticis regionum borealium Europae, Aſiae atque Americae (vbi ſola varietas α); nec non in alpinis regionibus Heluetiae, Galliae (praecipue varietas β), Perſiae, Iaponiae, Ceylonae, regnique Peruani.

Victitat radicibus, baccis, aliisque vegetabilibus; formicis, piſcibus; amat maxime mel. Varietas β interdum carniuora, non α. Eſcam lubenter lavat, reſiduam in paludibus deſodit. Aquam morſu vorat. Segnis niſi laceſſetur, neque ſine iniuria hominem adoritur; tum agiliſſime erectus ambabus

bus palmis pugnat, raro dentibus. Ante pugnam pullos adfcendere arbores cogit. Defcendit praeeunte cauda, cui valde metuit. Pediculis caret. Palmas cubans continuo lambit. Coit fine octobris menfis. Grauida latet, cum mares prolem edant. Vterum gerit 112 diebus. Parit pullos duo ad quinque, informes. Autumno pinguefcit, carne proba efculenta. Hibernat abftemius a medio nouembris in initium regelationis. Aetas 20 - 25 annorum. Vox grunniens. Iunior manfuefcit. Bene natat. Olfactus fortiffimus.

+ neutiquam !

maritimus. 2. V. albus, cauda abrupta, capite colloque elongatis.

Vrfus albus *Ionft. quadr. p.* 126.
Vrfus albus *Muf. Worm. p.* 319.
Weiffer Bär *Mart. Spitzb. p.* 73 *tab. O fig.* C mediocr.
Ours *Egede Grönl. p.* 42.
The white Bear *Catesb. Carol. app. p. XXVI.*
Der weiffe Bär *Ellis Hudf. p.* 39.
Vrfus albus Martenfii *Klein. quadrup. p.* 82.
L'Ours blanc: Vrfus (albus) albus, cauda vnicolore *Briff. regn. an. p.* 260 *n.* 2.
Der nordliche weiffe Bär *Hall. vierf. p.* 546.
Vrfus (maritimus) albus maior, arcticus *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 47 cum praecedente.
Ours blanc *Dictionn. anim. III p.* 292.
Witte Beeren in Groenland *Houtt. nat. hift. II p.* 219.
Die weiffen Bären *Cranz Groenl. I p.* 98.
Vrfus (maritimus) albus maior, arcticus *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 70 cum praecedente.
Ours blanc *Buff. hift. nat. XV p.* 128.
Buff. Suppl. T. III. tab. 34.
The polar Bear *Penn, fyn. quadr. p.* 192 *n.* 139 *tab.* 20 *fig.* 1 bona.
Weiffe Bären *Müll. Naturf. I p.* 279.

Vrfus

Captn Cook's voyage to the northern hemisphere vol. III. p. 252. tab. 7

Pallas Spicileg. Fasc. - - -

Vrſus albus *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 16 *b.*
Nennok *Groenlandis.*

Multo maior praecedente, ad pedes 13 longus. Caput magis elongatum, collumque tenuius. Corpus gracilius. Auriculae breues, rotundatae. Artus fortes. Pili longiſſimi, molles, albi, hinc inde flaueſcentes, naſi apice vngulisque nigris. Cranium durius quam Arcto.

Diſtinguendus vtique a varietate alba praecedentis.

Habitat intra circulum arcticum polarem, caſu interdum a glacie defertur in regiones magis auſtrales. Ad litora degit, inque glaciei inſulis. Bene natat atque vrinatur. Victitat piſcibus, phocis, cadaueribus cetorum, humanisque, auibus, voraciſſimus. Atrox magis hominem ſponte adoritur. Hibernat ſub niue in foſſis profundis. Parit duo, eosque ſtrenue defendit. Caro alba, ſapore veruecinae. Vox canis rauca.

Meles. 3. V. cauda concolore, corpore ſupra cinereo, ſubtus nigro, faſcia longitudinali per oculos auresque nigra.

Melis *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 38 (*c.* 58 *Hard.*).
Meles *Geſn. quadr. p.* 778 *fig. p.* 1103 mala.
Taxus *Schwenckf. theriotr. p.* 129.
Taxus *Aldrov. digit. p.* 263.
Taxi canini foetus *Aldrov. digit. fig. p.* 266 mala.
Taxi ſuilli icon *Aldrov. digit. fig. p.* 267 mediocr.
Taxus *Ionſt. quadrup. p.* 146.
Dachs *Ionſt. quadrup. tab.* 63 fig. mediocr.
Taxus ſuillus *Ionſt. quadrup. tab.* 64 fig. mala.
Porcus pumilo Taxus porcinus *Ionſt. quadrup. tab.* 48 fig. peſſima, Porci potius.
Dachs *Geſn. Thierb. p.* 63 *cum figg.* mediocr.

Taxus *Charlet. exerc. p.* 18.
Taxus, Melis *Wagn. Heluet. p.* 186.
Taxus ſuillus *Sibb. Scot. an. p.* 11.
Taxus ſiue Meles *Rai. ſyn. quadr. p.* 185.
Melis *Rzacz. Polon. p.* 233. *auct. p.* 327.
Meles *Rzacz. auct. p.* 315.
Meles vnguibus anticis longiſſimis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 45.
Tachs *Riding. jagdb. Th. tab.* 17 fig. bon.
Meles vnguibus anticis longiſſimis *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 6 *n.* 15.
Der Dachs *Meyer Thiere II tab.* 31 fig. bon.
Meles vnguibus anticis longiſſimis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 1.
Coati cauda breuì; Taxus, Meles *Klein. quadrup. p.* 73.
Meles vnguibus anticis longiſſimis. The Meles with the anterior claws very long: the Badger *Hill anim. p.* 555.
Dachs *Kalm Amer. II p.* 332.
Le Blaireau ou Taiſſon: Meles (. . . .) pilis ex ſordide albo et nigro variegatis veſtita, capite taeniis alternatim albis et nigro variegato *Briſſ. regn. an. p.* 253 *n.* 1.
Meles vnguibus anticis longiſſimis *Kram. Anſtr. p.* 313.
Der Dachs *Hall. vierf. p.* 515.
Vrſus (Meles) cauda concolore, corpore ſupra cinereo ſubtus nigro, faſcia longitudinali per oculos aureſque nigra *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 48 *n.* 3.
Le Blaireau *Buff. hiſt. nat. VII p.* 104 *tab.* 7, 8.
Blaireau *Dictionn. anim. I p.* 295.
Das: Beer met de Staart van eenerhande Kleur, het Lyf van boven Aſchgraauw, van onderen zwart, een breede ſtreep in de langte over de Oogen en Ooren heen *Houtt. nat. hiſt. II p.* 228.
Vrſus (Meles) cauda concolore, corpore ſupra cinereo,

reo, ſubtus nigro, faſcia trans oculos aureſque nigra *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 7 *n.* 20.

The Badger *Penn. brit. zool. p.* 30.

Brok eller Græv ling *Pontopp. Dan. I p.* 609.

Badger *Bell trav. II p.* 74.

Blaireau *Bom. dictionn. I p.* 291.

Vrſus (Meles) cauda concolore, corpore ſupra cinereo, ſubtus nigro, faſcia longitudinali per oculos aureſque nigra *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 70 *n.* 2.

Barſuk, Dachſe *Rytſchk Orenb. I p.* 226.

The common Badger *Penn. ſyn. quadr. p.* 201 *n.* 142.

Taſſo *Aleſſ. quadrup. II tab.* 76 fig. Buff.

Der Dachs *Müll. Naturſ. I p.* 281.

Der Dachs *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 123 *tab.* 59.

Vrſus (Meles) cauda concolore, corpore ſupra cinereo, ſubtus nigro; faſcia longitudinali per oculos aureſque nigra *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 17.

Taſſo *Italis.*

Texon, Bivaro *Hiſpanis.*

Teixugo, Texugo *Luſitanis.*

Blaireau, Taiſſon *Gallis.*

Pryf Llwyd, Pryf penſrith *Cambrenſibus.*

Dachs, Tachs *Germanis.*

Das *Belgis.*

Badger, Brock, Gray *Anglis.*

Pate *in Anglia ſeptentrionali.*

Gräf ſvin *Suecis.*

Grævling, Brok *Danis.*

Grævling, Sviin-Sax *Noruegis.*

Iazwiec, Borſuk *Polonis.*

Барсукъ (Barſuk), Язвецъ (Iazwetz) *Ruſſis.*

Dorrakon *Tunguſis.*

Longitudo corporis $2\frac{1}{2}$ ped. caudae 8 poll. Caput vulpinum. Oculi parui. Membrana nictitans ampla, totum oculum tegens. Auriculae breues ro-

 tunda-

tundatae. Collum breue, craſſum. Crura breuia, craſſa, digitis 5 - 5. Vngues palmarum longi, recti. Mammae ſex: in pectore verſus abdomen duae, in medio abdominis duae, ad inguina duae. Cavitas ſupra anum, ſub cauda, magna, ſubrotunda, ſecernens liquorem album, ſebaceum, leuiter graueolentem. Pili corporis longi, rigidi, baſi ſordide albi, medio nigri, apice cinerei. Corpus ſubtus nigrum. Cauda corpori concolor. Faſcia nigra in capite per oculos et aures. Setae ſupra oculos tres nigrae.

Habitat in Europa, Aſia (perperam id negante Buffonio) vsque in Sinam et ad mare caſpium; in ſiluis vmbroſis, depreſſis, lapidoſis. Victitat inſectis, ouis, radicibus, gramine, fructibus, carne. Subterraneus plures camaras effodit vnico introitu. Hibernat ſuper gramine. Admodum pingueſcit, Calmyccis Sinenſibusque edulis. Somniculoſus quietem valde amat. Nocturnus venatur cuniculos. Stercus in diſtincto et determinato loco deponunt inhabitantes extra antrum ſinguli. Folliculum putorium! ſupra anum haurit hibernans. Lente currit, at defendit ſe ſtrenue, morſu periculoſo vehementique. Parit quatuor aut quinque ſemel in anno. Manſueſcit iunior, non adultus.

Diuiſio in *caninum* et *ſuillum* haud neceſſaria.

Varietas alba noueboracenſis:
Le Blaireau blanc: Meles (alba) ſupra alba, infra ex albo flauicans *Briſſ. regn. an. p.* 255 *n.* 2.
Blaireau blanc *Dictionn. anim. I p.* 298.

Eiusdem forte ſpeciei eſt.
The American Badger *Penn. ſyn. quadr. p.* 202 *n.* 143.

Minor

Minor vulgari. Linea alba ab apice nafi inter aures vsque ad initium dorfi, cui adftat vtrinque nigra vsque ad occiput, huic alia alba, tunc vero fequitur alia nigra inter praecedentem et aurem. Pili longi. Dorfum vt in vulgari. Latera flauicant. Venter cinereus. Crura nigricantia. Cauda pilis longis, fordide flauis, apicibus pilorum albis, caudae apice nigricante.

Habitat ad fretum Hudfonis.

Lotor. 4. V. cauda annulata, fafcia per oculos transuerfali nigra.

Mapach feu animal cuncta praetentans manibus *Fernand. anim. p.* 1.
Coaty *Thevet cofmogr. II fol.* 937 *a.*
Cuati *Laet Amer. p.* 553.
Mapach *Nieremb. hift. nat. p.* 175 *cum fig.* mediocr.
Coati *Marcgr. Braf. p.* 228 *cum fig.* mediocr.
Coati *Ionft. quadrup. p.* 137.
Mapach *Ionft. quadrup. tab.* 74 fig. Nieremb.
Coati *Muf. Worm. p.* 319 *cum fig.* bon.
Vulpes Americana, Mapach dicta *Charlet. exerc. p.* 15.
Vulpi affinis Americana; Coati Brafilienfibus Marcgr. *Rai. fyn. quadr. p.* 179.
The Raccoon *Lawfon Carolin. p.* 121 *cum fig.* mediocr.
Vulpi affinis americana *Sloan. Iam. II p.* 329.
Vulpi affinis americana. The Raccoon *Catesb. Carol. app. p.* XXIX.
Quanhpecotli feu felis montana americana *Seb. thef. I p.* 68 *tab.* 42 *fig.* 2.
The Raccoon *Brick. North-Carol. p.* 123.
Vrfus cauda elongata *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 43.
Ein americanifches Thier *Linné: Act. holmienf.* 1747 *p.* 300 *tab.* 9.

Die

...loff in Mem. de l'ac. de Berlin 1758. ... t. XII. fig. c. anat. ...

... Schulze in Mayer's Magaz. für Thiergesch. 1 B. 2 St.
a. t. Goeze Natur, Menschenleben u. Vorsehung V B. p. 101 – 118.

Die wilde amerikaniſche Katze *Meyer Thiere III tab.* 18 fig. Seb.

Vrſus cauda elongata *Linn. ſyſt. nat. 6 p.* 4 *n.* 2.

Coati Braſilienſium *Klein. quadrup. p.* 72.

Vrſus cauda elongata. The Vrſus with an elongated tail *Hill anim. p.* 542.

Der Bär mit dem langen Schwanze, Rakkoon *Kalm Amer. II p.* 246.

Der Raccoon den wir Sjupp nennen *Kalm Amer. II p.* 351.

Der Bär der Raccoon oder Eſpan genannt wird *Kalm Amer. III p.* 31.

Le Coati: Vrſus (Coati) cauda annulatim variegata *Briſſ. regn. an. p.* 261 *n.* 4.

Das Koati *Hall. vierf. p.* 506.

Amerikaniſche Bär *Hall. vierf. p.* 596.

Vrſus (Lotor) cauda annulata, faſcia per oculos transuerſali *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 48 *n.* 4.

Vrſus cauda annulatim variegata *Dictionn. anim. I p.* 659.

Le Raton *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 337 *tab.* 43.

Beer met een geringde Staart en een dwarſe Streep langs de Oogen hen *Houtt. nat. hiſt. II p.* 237 *tab.* 15 *fig.* 1 Linn.

Raton *Bom. dictionn. III p.* 722.

Vrſus (Lotor) cauda annulata, faſcia per oculos transuerſali nigra *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 70 *n.* 3.

The Raccoon *Penn. ſyn. quadr. p.* 199 *n.* 141.

Volpe americana *Aleſſ. quadrup. III tab.* 111 fig. Buff.

Der Coati *Müll. Naturſ. I p.* 284 *tab.* 15 *fig.* 1 Linn.

Attigbro *Iroqueſis.*

Paullo minor Vulpe, pedibus breuioribus. Digiti 5-5. Corpus cinereum, pilis erectis, ferrugineis, apice nigris, vt vmbra nigra cinctus vndique appareat.

pareat. Caput fuſcum. Frons alba. Faſcia nigra trans oculos, in medio interrupta, cum linea nigra perpendiculari interiecta. Naſus acutus, niger. Labium ſuperius longius inferiore. Auriculae breues, rotundatae. Oculi magni, ſubuirides. Collum breue. Cauda longitudine corporis, pilis longioribus nigris annulata. Folliculus putorius vtrinque ad anum. Penis oſſe incuruato ſcatet.

Habitat in Americae maritimis. Edit lubenter oua, gallinas, piſces, conchas, cancros, diciturque cauda piſcari. Cibum lauat, palmis ori eum admovet. Odoratu tactuque excellit. Mentis tenaciſſimus. Dormit in arbore caua ab hora duodecima noctis in meridiem. Pellitur ſetis porcinis. Lubenter ſcandit. Agilis, mitis, facile manſueſcit, ludibundus. Omnia palmis examinat. Amat vehementer dulcia atque liquores ſpirituoſos, quibus ſe inebriat. Parit maio menſe in arboribus cauis pullos duo ad tres. Caro edulis. Pili boni pro pileis conficiendis.

Affinis nonnihil Lemuribus caudatis.

luſcus. 5. V. cauda elongata, corpore ferrugineo, roſtro fuſco, fronte plagaque laterali corporis longitudinali pallida.

Vrſulo affinis americana. The Quickhatch *Catesb. Carol. app. p. XXX.*

The Carcajon or Queequehatch *Dobbs Hudſ. p.* 40.

The Quick-hatch or Wolverene *Edw. birds II tab.* 103.

Der Quick-Hatch oder Wolverene *Ellis Hudſ. I p.* 40 *tab.* 4. fig. mala.

Coati Vrſulo affinis, americanus *Klein. quadrup. p.* 74.

L'Ours de la Baye de Hudſon: Vrſus (Freti Hudſonis) caſtanei coloris, cauda vnicolore, roſtro pedibusque nigris *Briſſ. regn. an. p.* 260 *n.* 3.

Der gröſte amerikaniſche Halbſuchs *Hall. vierf p.* 518.

Vrſus (luſcus) cauda elongata, corpore ferrugineo, roſtro fuſco, fronte faſciaque laterali longitudinali albida *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 47 *n.* 2.

Ours de la baye d'Hudſon *Dictionn. anim. III p.* 297.

Quick-hatch *Dictionn. anim. III p.* 645.

Wolfbeer: Beer met een lange Staart, het Lighaam Roſtkleurig, de Snoet bruin, het Voorhoofd met een witagtige Streep, overlangs, op zyde *Houtt. nat. hiſt. II p.* 227.

Carcajou *Bom. dictionn. I p.* 423.

Vrſus (luſcus) cauda elongata, corpore ferrugineo, roſtro fuſco, fronte plagaque laterali corporis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 71 *n.* 4.

The Wolverene *Penn. ſyn. quadr. p.* 195 *n.* 140 *tab.* 20 *fig.* 2.

Der Wolfsbär *Müll. Naturſ. I p.* 285.

Caubvic Eskimotis.

Longitudo corporis 28 poll. et vltra, caudae 13 poll. Facies nigra. Naſus acutus. Oculi parui. Auriculae breues, rotundatae, pilis fere occultatae. Pili capitis, dorſi et ventris longi denſique rufi, apicibus nigris, vt primo aſpectu nigrum animal videatur. Latera e flauo fuſca, cum ſtria concolore continuata ſupra caudam. Gula macula alba. Lunula alba in pectore. Pedes valde breues, fortes atque craſſi, atri, digitis 5-5 (Pennanto et Catesbeio, 4-5 Edwardsio) non profunde diuiſis. In palmis maculae aliquot albae. Pedes poſtici talis incedentes. Vngues acuti, fortes, apice albi. Cauda pilis longis, rigidis, baſi rufis, apice nigris. Color corporis variat pro anni tempore.

Habitat in Freto Hudſonis et Canada.

18. ERI-

18. ERINACEVS.

Dentes Primores superiores II distantes.
inferiores II minus distantes.
Laniarii vtrinque II recumbentes.
Corpus spinis tectum.

europaeus. 1. E. auriculis rotundatis, naribus cristatis.

Εχινος *Arist. hist. anim. I c. 7 n. 62. III c. 1 n. 6. V c. 2 n. 19. IX c. 9 n. 107.*

Herinaceus *Plin. hist. nat. VIII c. 37 (c. 56 Hard.) c. 58 (c. 83 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.).*

Εχινος χερσαιος *Aelian. anim. III c. 10. IV c. 17. VI c. 54, 64.*

Εχινος *Oppian. cyneg. II, 598.*

Erinaceus *Agric. an. subt. p. 10.*

Echinus terrestris *Gesn. quadrup. p. 399 fig. p. 400* bona.

Herinaceus *Schwenckf. theriotr. p. 96.*

Echinus terrestris *Aldrov. digit. p. 459.*

Echinus terrestris *Ionst. quadrup. p. 171.*

Herinaceus, Igel, Sewigel *Ionst. quadrup. tab. 68* fig. bona.

Echinus terrestris *Mus. Worm. p. 334.*

Herisson *Flacourt Madag. p. 152.*

Herinaceus. Ein Igel *Gesn. Thierb. p. 227 cum fig.* bona.

Le Herisson *Perr. anim. II p. 31 tab. 41* fig. bona.

Erinaceus *Charlet. exerc. p. 19.*

Erinaceus terrestris, Echinus *Wagn. Heluet. p. 175.*

Erinaceus *Sibb. Scot. an. p. 11.*

Echinus s. Erinaceus terrestris *Rai. Syn. quadr. p. 231.*

Herinaceus *Rzacz. Polon. p. 233. auct. p. 326.*

Erinaceus paruus nostras *Seb. thes. I p. 78 tab. 49 fig.* 1, 2 bonae.

Erinaceus spinosus auriculatus *Linn. syst. nat. 2 p. 45.*

Erinaceus europaeus *Linn. Gothland. p.* 264.
Erinaceus ſpinoſus auriculatus *Linn. fn. ſuec.* I *p.* 6 *n.* 16.
Der Igel *Meyer Thiere I tab.* 95, 96 figg. bonae.
Erinaceus auriculatus *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 6 *n.* I.
Acanthion vulgaris noſtras *Klein quadrup. p.* 66.
Erinaceus auriculatus. The Erinaceus with larger ears: the Hedge-hog *Hill anim. p.* 558 *tab.* 27 fig. mediocr.
Erinaceus (vulgaris) auriculatus *Linn. muſ. Ad. Frid.* I *p.* 6.
Le Hériſſon: Erinaceus (. . . .) auriculis erectis *Briſſ. regn. an. p.* 181 *n.* I.
Erinaceus auriculatus Kram. Auſtr. p. 313.
Der gemeine Schweinigel *Hall. vierf. p.* 463.
Erinaceus (europaeus) *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 52 *n.* I.
Heriſſon *Dictionn. anim. II p.* 425.
Le Hériſſon *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 28 *tab.* 6.
Europiſche Egel *Houtt. nat. hiſt. II p.* 289 *tab.* 17 *fig.* I.
Erinaceus (europaeus) auriculis rotundatis, naribus criſtatis *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 8 *n.* 22.
The Hedge-hog or Urchin *Penn. brit. zool. p.* 51 *cum fig.* bona.
Pindſviin *Pontopp. Dan. I p.* 610.
Heriſſon terreſtre *Bom. dictionn. II p.* 451.
Erinaceus (europaeus) auriculis rotundatis, naribus criſtatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 75 *n.* I.
Igel oder Schweinigel *Knorr delic. II tab. K,* 3 *fig.* I bona.
Erinaceus europaeus *Forſter: Philoſ. transact. LVII p.* 342.
The common Hedge-hog *Penn. ſyn. quadr. p.* 316 *n.* 247 *tab.* 28 *fig.* 3 bona.
Iſtrice *Aleſſ. quadrup. II tab.* 85, 86 figg. Buff.

Der

Der europäiſche Igel *Müll. Naturſ. I p.* 305 *tab.* 17 *fig.* 1 Houtt.

Erinaceus *Forsk. fn. orient. p. III.*

Erinaceus (europaeus) auriculis rotundatis, naribus criſtatis *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 20.

Erizo *Hiſpanis.*

Ourizo *Luſitanis.*

Riccio *Italis.*

Heriſſon *Gallis.*

Draenog, Draen y coed *Cambrenſibus.*

Igel, Zaunigel, Schweinigel, Sauigel *Germanis.*

Egel, Yzervarken *Belgis.*

Hedge-hog *Anglis:* Urchin *obſolete.*

Pindſviin *Danis.*

Buſtivil *Noruegis.*

Igelkott *Suecis.*

Iez *Polonis.*

Ежъ (Ieſh') *Ruſſis.*

حربه (Haerbe, Ganſud) *Aegyptiis.*

Sora *in Madagaſcar.*

Longitudo corporis 10 pollicum, caudae pollicis vnius. Naſus acutus: narium foramina exteriore latere appendiculo membranaceo-carnoſo criſpo inſtructa. Auriculae rotundatae, latae, nudae. Oculi parui, nigri. Totum corpus ſubtus et lateribus tectum ſetis flauicanti-cinereis; dorſum vero ſpinis albidis vel ſubcinereis, zonis fuſcis variis notatis. Cauda ſpinis occultata. Crura breuia, ſubnuda, fuſca. Digiti 5-5, pollicibus breuioribus. Vngues longi, at molles. Plantae talis inſiſtentes. Praeputium propendens. Mammae octo ad decem: ventralibus quatuor, pectoralibus ſex. Teſtes intus latent. Clauiculis inſtructus eſt.

Diuiſio in *caninum* et *ſuillum* videtur imaginaria.

Habitat

Habitat in Europa, Sibiria, Aegypto, Madagascar. Rarior in Suecia; in Norlandia vix occurrit. Domesticus cati loco ad Tanain.

Monogamus nidificat e musco in fruticibus sepibusque. Hibernat in cauis arboribus. Nocturnus. Victitat busonibus, vermibus, coleopteris insectis, conchis, fructibus, auiculis, cadaueribus, radicibus. Natat facile. Mitis innocuusque, meticulosus iratusque mingit, inque globum decussatis spinis se contrahit inuulnerabilis. Compressis pedibus eiulat. Odor ambrosiacus, etiam stercoris. Pinguescit. Parit 3 - 5 initio aestatis. Coeunt verno tempore stantes ambo inter se complexi.

sibiricus. 2. E. auriculis planis, naso simplici.

Erinaceus sibericus, superne conspicuus, capite ad pedes contracto *Seb. thes. I p.* 79 *tab.* 49 *fig.* 4.

Erinaceus sibericus mas supinus *Seb. thes. I p.* 79 *tab.* 49 *fig.* 5.

Acanthion echinatus. Echinus sibiricus *Klein. quadrup. p.* 66.

Le Hérisson de Siberie: Erinaceus (sibericus) auriculis planis *Briss. regn. an. p.* 182 *n.* 2.

Der sibirische Igel *Hall. vierf. p.* 465.

Hérisson de Sibérie *Dictionn. anim. II p.* 426.

Siberische Egel *Houtt. nat. hist. II p.* 296.

Der geöhrte Igel *S. G. Gmelin Reis. II p.* 174?

Auriculae breues, planae. Spinae saturate rufae, apicibus quasi deauratis. Pili subtus dilute cinerei, deaurati.

Habitat in Sibiria. Forte varietas est europaei.

inauris.

inauris. 3. E. auriculis nullis.

Echinus indicus albus *Rai. syn. quadr. p.* 232.

Erinaceus americanus albus *Seb. thes. I p.* 78 *tab.* 49 *fig.* 3.

Erinaceus spinosus vix auriculatus *Linn. syst. nat* 2 *p.* 45.

Erinaceus subauriculatus *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 2.

Acanthion echinatus; erinaceus americanus albus *Klein. quadrup. p.* 66.

Erinaceus subauriculatus. The Erinaceus, with very small ears: the white Hedge-hog *Hill anim. p.* 558.

Le Hérisson d'Amerique: Erinaceus (americanus) auriculis nullis *Briss. regn. an. p.* 184 *n.* 4.

Der weisse americanische Igel *Hall. vierf. p.* 464 *tab.* 31.

Hérisson d'Amerique *Dictionn. anim. II p.* 427.

Amerikaansche Egel *Houtt. nat. hist. II p.* 289, 297.

Erinaceus (inauris) auriculis nullis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 75 *n.* 2.

The american Hedgehog *Bancr. Guian. p.* 144.

Der Igel: Erinaceus surinamensis *Fermin Surin. II p.* 103.

The Guiana Hedge-hog *Penn. syn. quadr. p.* 318 *n.* 249.

Der Kahlohr *Müll. Natursf. I p.* 307.

Auriculae nullae, foramina tamen auditoria. Magis albescit quam nostras, cuius forte est varietas. Longitudo octo pollicum.

Habitat in Guiania.

malaccensis. 4. E. auriculis pendulis.

Porcus aculeatus, seu Hystrix Malaccensis *Seb. thes. I p.* 81 *tab.* 51 *fig.* 1.

Porci

Porci aculeati Malaccenſes, catuli *Seb. theſ.* 1 *p.* 81 *tab.* 51 *fig.* 2.

Hyſtrix pedibus pentadactylis, cauda exſerta *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.

Hyſtrix pedibus pentadactylis, cauda truncata *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 4.

Acanthion aculeis longiſſimis *Klein. quadrup. p.* 66.

Le Hériſſon de Malacca: Erinaceus (malaccenſis) auriculis pendulis *Briſſ. regn. an. p.* 183 *n.* 3.

Das Stachelſchwein *Hall. vierf. p.* 468 *tab.* 30.

Hyſtrix (brachyura) pedibus pentadactylis, cauda abbreuiata *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 57 *n.* 5.

Hériſſon de Malacca *Dictionn. anim. II p.* 426.

Malakſe Stekelvarken: Stekelvarken met vyf-vingerige Pooten en een korte Staart *Houtt. nat. hiſt. II p.* 367 *tab.* 19 *fig.* 2 Sebae.

Erinaceus (malaccenſis) auribus pendulis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 25 *n.* 3.

Der malacciſche Igel *Müll. Naturſ. I p.* 308 *tab.* 19 *fig.* 2. Sebae.

Longitudo corporis octo pollicum. Oculi magni, lucidi. Auriculae fere nudae, pendulae. Digiti 5-5, vnguibus breuibus. Spinae longae dorſi, ad 6 poll. longae, ex albo et nigro vel ſubrufo variegatae, intermixtis ſetis minoribus. Corpus ſubtus pilis rufis breuibus.

Habitat in Iaua, Sumatra, praecipueque in Malacca. Ex hoc concrementum biliarium, *Pedro del Porco* dictum, de quo pluribus vide *Schultz. bil. p.* 5.

Videtur vtique Erinaceus, nec Hyſtrix. Neque varietas eſt Hyſtricis criſtatae, quod Pennantus putat, cum ſit pedibus 5-5, criſta nulla, auribus pendulis.

Species

Species obſcurae.

* Tendrac *Flacourt Madag. p.* 152.
Tendrac *Dictionn. anim. IV p.* 319.
Le Tendrac *Buff. hiſt. nat. XII p.* 438 *tab.* 57.
Tendrac *Bom. dictionn. IV p.* 338.
Tendrac *Aleſſ. quadrup. III tab.* 241 *fig.* 2 Buff.

Magnitudine Ratti maioris. Naſus longus, gracilis. Auriculae breues, rotundatae. Crura breuia. Corpus ſupra ſpinis breuibus, albis, medio ferrugineis tectum, ſubtus, vt facie et pedibus, pilis raris albicantibus. Cauda breuiſſima, ſpinis tecta. Vibriſſae aliquot longiores verſus naſum. Digiti 5-5.

Forte eadem cum:

** Certaines beſtes en l'isle Saincte Marie *Cauche Madag. p.* 127.
Le Tanrec *Buff. hiſt. nat. XII p.* 438 *tab.* 56.
Tanrec *Bom. dictionn. IV p.* 294.
The aſiatic Hedge-hog *Penn. ſyn. quadrup. p.* 317 *n.* 248 coniunctim cum Tendrac.
Tanrec *Aleſſ. quadrup. III tab.* 141 *fig.* 1 Buff.

Maior praecedente: magnitudine Erinacei europaei. Roſtrum longius quam in praecedente. Auriculae magis apparentes. Corpus minus ſpinoſum, tectum ſetis flauicantibus, admixtis nigris aliquot longioribus. Spinae non niſi in vertice et occipite, in collo ſupra et lateralibus, nec non in humeris: in collo ſupra longiores, erectae. Digiti 5-5.

Habitat vterque in inſulis indicis, Madagaſcar. Amat humida. Fodit. Vox Porci. Pingueſcit valde. Fertilis.

tilis. Hibernat ſubterraneus per ſex menſes, et tunc pilos mutat. Caro inſipida, Indis cibo vſitata.

19. SVS.

Dentes Primores Superiores IV conuergentes.
Inferiores VI prominentes.
(*Variante paullulum numero in variis.*)
Laniarii Superiores II breuiores.
Inferiores II exſerti.
Roſtrum truncatum, prominens, mobile.
Pedes biſulci.

Scrofa. *Aper.* 1. S. dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa.

α. *Ferus.* (Vna cum ſynonymis totius ſpeciei.)

Ὑς *Ariſt. hiſt. anim. II c.* 5 *n.* 23. *c.* 7 *n.* 23. *V c.* 13 *n.* 121-124. *VI c.* 8 *n.* 242-249. *c.* 28 *n.* 361-365. *VIII c.* 9 *n.* 109.

Ὑς αγριος *Ariſt. hiſt. anim. I c.* 2 *n.* 23.

Καπρος *Ariſt. hiſt. anim. II c.* 9 *n.* 45. *c.* 11 *n.* 71. *V c.* 13 *n.* 137.

Sus ferus *Plin. hiſt. natur. VIII c.* 51 (*c.* 78 *Hard.*).

Porcus *Plin. hiſt. natur. XVIII c.* 35 (*c.* 88 *Hard.*).

Ὑς *Aelian. anim. III c.* 3. *X c.* 16.

Συς αγριος *Aelian. anim. V c.* 45.

Καπρος *Oppian. cyneg. III,* 364.

Aper *Geſn. quadrup. p.* 1039 *fig. p.* 1040 mediocr.

Aper *Schwenckf. theotr. p.* 54.

Aper *Aldrov. biſulc. p.* 1013 *fig. p.* 1025 mediocr.

Aper *Ionſt. quadrup. p.* 105.

Aper, Wildſchwein *Ionſt. quadr. tab.* 47.

Aper Wildſchwein *Ionſt. quadrup. tab.* 48.

Porcus pumilo Taxus porcinus *Ionſt. quadrup. tab.* 48.

Wild

Wild Schwein *Gesn. Thierb. p.* 336 *cum fig.* mala.
Sus *Charlet. exerc. p.* 13.
Sus agreſtis ſiue Aper *Rai. ſyn. quadr. p.* 96.
Aper ſeu Verres ſiluaticus *Rzacz. Polon. p.* 213. *auct. p.* 305.
Cochons ſauvages, ou marons, ou Sanglier *Des March. voy. III p.* 296.
Sus dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.
Wildes Schwein *Riding. jagdb. Th. tab.* 6.
Sus dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Linn. fn. ſuec. I p.* 12 *n.* 36.
Sus dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 12 *n.* 1.
Porcus *Klein. quadrup. p.* 25.
Sus dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa. The Sus, with a briſty back, and a hairy tail: the common Hog *Hill anim. p.* 571 *tab.* 28.
Le Sanglier *Buff. hiſt. nat. V p.* 99 *tab.* 14.
Le Marcaſſin *Buff. hiſt. nat. V tab.* 17 *fig.* 1.
Le Sanglier: Sus (Aper) caudatus, auriculis breuibus, ſubrotundis, cauda piloſa *Briſſ. regn. an. p.* 108 *n.* 3.
Sus dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Kram. Auſtr. p.* 318.
The Hog and wild Hog: Sus dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Brown. Iam. p.* 487.
Das wilde Schwein *Hall. vierf. p.* 359.
Sus (Scrofa) dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 49 *n.* 1.
Cochon *Dictionn. anim. I p.* 676.
Sanglier *Dictionn. anim. IV p.* 27.
Sus Scrofa *Linn. amoen. acad. V p.* 461.
Zwyn met het voorſte van de Rug geborſteld, de ſtaart hairig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 250.
Sus (Scrofa) dorſo antice ſetoſo, cauda piloſa *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 8 *n.* 21.

Sus caudatus, auriculis oblongis acutis, cauda pilosa *Gronov. zooph. I p. 3 n. 11.*

Vild-Sviin *Pontopp. Dan. I p. 603.*

Sanglier *Bom. dictionn. IV p. 87.*

Sus (Scrofa) dorso antice setoso, cauda pilosa *Linn. syst. nat. 12, I p. 102 n. 1.*

Sus Scrofa *Forster: Philos. transact. LVII p. 342.*

The common Hog *Penn. syn. quadr. p. 68 n. 54.*

Cignale *Aless. quadrup. II tab. 81* fig. Buff.

Das gemeine zahme, das Siamische und wilde Schwein *Mart. Buff. vierf. II p. 35.*

Der wilde Eber *Mart. Buff. vierf. II tab. 18 fig. 1.*

Der Frischling oder das junge wilde Schwein *Mart. Buff. vierf. II tab. 19 fig. 1.*

Die Sau *Müll. Naturf. I p. 462.*

Sus (Scrofa) dorso antice setoso, cauda pilosa *Müll. Dan. prodr. p. 6 n. 43.*

Puerco, Cochino *(mas)*; Puerca, Cochina *(femina) Hispanis (tota species).*

Puerco montés, Puerco silvestre, Iabalí, Iavalí, Xavalí *(aper)*; Iabalina, Xavalina *(femina)*; Lechon de Iabalí *(pullus) Hispanis.*

Porco *(mas)*; Porca *(femina) Lusitanis (tota species).*

Porco montez, Iabalí, Xavalí *(aper)*; Leitão de Porco montez *(pullus) Lusitanis.*

Porco *Italis (tota species).*

Porco silvatico, Cinghiale *(aper) Italis.*

Porc, Cochon *Gallis (tota species).*

Sanglier *(mas)*; Laye *(femina)*; Marcassin *(pullus) Gallis.*

Schwein *Germanis (tota species).*

Wild Schwein, Hauer, Käuler *(aper)*; Wilde Sau, Bache *(femina)*; Frischling *(pullus) Germanis.*

Zwyn, Varken *Belgis (tota species).*

Wild Zwyn *(aper) Belgis.*

Hog *Anglis (tota species).*

Wild

Wild Boar *(aper) Anglis.*
Swin *Suecis (tota species).*
Will-Swin *(aper) Suecis.*
Sviin *Danis (tota species).*
Vild-Sviin *(aper) Danis.*
Wieprz *Polonis (tota species).*
Wieprz les'ny, Dz'ik *(aper) Polonis.*
Свинья (Swin'ja), Пороcя (Porofja) *Ruffis (tota species).*
Вепрь (Wepr'), Дикая свинья (Dikaja fwin'ja), Дикїй боровъ (Dikii borov) *(aper) Ruffis.*
Кнуръ (Knur) *(aper) in Vcrania.*
Tukalanda *Tungufis.*
Chagni *Burätis.*

domefticus. β. Manfues.

Sus, Verres *Plin. hift. nat. VIII c. 51 (c. 77 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.) c. 73 (c. 93 Hard.). XI c. 37 (c. 61 Hard.) c. 39 (c. 95 Hard.).*
Sus *Gefn. quadrup. p. 982 fig. p. 983* mediocris.
Sus *Schwenckf. theriotr.* 123.
Sus *Aldrov. bifulc. p. 937 fig. p.* 1006 bona.
Sus *Ionft. quadrup. p. 99.*
Verres, Eber *Ionft. quadrup. tab. 47.*
Scrofa, Mock *Ionft. quadrup. tab. 47.*
Das Schwein *Gefn. Thierb. p. 331 cum fig.* mala.
Sus *Sibb. Scot. an. p. 9.*
Sus feu Porcus domefticus *Rai. fyn. quadr. p. 92.*
Porci *Rzacz. Polon. p. 243 auct. p. 333.*
Sus feu porcus domefticus *Sloan. Iam. II p. 328.*
Das Schwein *Meyer Thiere I tab. 49.*
Le Cochon *Buff. hift. nat. V p. 99.*
Le Verrat *Buff. hift. nat. V tab. 16.*
Le Cochon de lait *Buff. hift. nat. V tab. 17 fig. 2.*
Le Cochon domeftique: Sus (domefticus) caudatus, auriculis oblongis, acutis, cauda pilofa *Briff. regn. an. p. 106 n. 1.*

Hausſchwein *Hall. vierf. p.* 346.
The Hog *Penn. brit. zool. p.* 19.
Sviin *Pontopp. Dan. I p.* 602.
Porco da Razza *Aleſſ. quadrup. II tab.* 83 *fig.* Buff.
Der zahme Eber *Mart. Buff. vierf. II tab.* 17.
Das Spanferkel, Sogſchwein *Mart. Buff. vierf. II tab.* 19 *fig.* 2.
Das Maſtſchwein *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 58.
Barraco, Berraco, Verraco, Cerdo (*mas*); Puerca, Cochina (*femina*); Cochinillo (*pullus*); Lechon, Lechoncillo, Lechoncito (*pullus lactens*) *Hiſpanis.*
Porco barrão (*mas*); Porca (*femina*); Porquinho, Bacoro, Bacorinho (*pullus*); Leytão, Leitão, Marrão (*pullus lactens*) *Luſitanis.*
Verrat (*mas*); Truye (*femina*); Cochon de lait (*pullus*) *Gallis.*
Verro (*mas*): Porca, Scrofa (*femina*) *Italis.*
Baedd (*verres*); Hwch (*femina*); Mochyn (*maialis*) *Cambrenſibus.*
Eber, Kempe (*verres*); Sau (*ſcrofa*); Barg, Bork, Börcheln (*maialis*); Ferken, Ferkel (*pullus*); Sogferken, Spanferkel (*pullus lactens*) *Germanis.*
Beer (*verres*); Zeug (*femina*); Big, Speenvarken (*pullus*) *Belgis.*
Boar (*verres*); Sow (*ſcrofa*); Pig (*pullus*) *Anglis.*
Rone, Orne (*mas*); Soe, Purke (*ſcrofa*); Griis (*pullus*) *Danis.*
Swin *Suecis.*
Wieprz *Polonis.*
Боровъ (Borov) (*verres*); Свинья (Swin'ja) (*ſcrofa*); Кабанъ(Kaban) (*maialis*); Поросенокъ(Poroſenok) (*pullus*) *Ruſſis.*
Dóngus (*adultus*); Dóngus-bállas (*pullus*) *Tataris.*
Sisnàh (*adultus*); Sisnà-ſga (*pullus*) *Tſcheremiſſis et Tſchuwaſchis.*
Parſs (*adultus*); Párspi (*pullus*) *Wotiakis.*
Túa (*adultus*) Púrſos, Tuläüx (*pullus*) *Morduanis.*
Sinen-

Sinensis. γ. *Sinensis.*

Iavanische Schweine *Kolbe vorgeb. p.* 165.
Chinesisches Schwein *Linn. Westgoth. p.* 62.
Chinesisches Schwein *Linn. Schon. p.* 99.
Le Cochon de Siam *Buff. hist. nat. V p.* 99 *tab.* 15.
Le Cochon de la Chine: Sus (sinensis) caudatus, ventre ad terram vsque propendente, cauda pilosa *Briss. regn. an. p.* 108 *n.* 2.
Cochon de la Chine *Dictionn. anim. I p.* 677.
The Chinese Hog *Penn. syn. quadr. p.* 70 *n.* 54 β.
Porco di Siam *Aless. quadrup. II tab.* 82 fig. Buff.
Das Sinesische Schwein *Mart. Buff. vierf. II tab.* 18 *fig.* 2.
a Cabinet of quadrupeds by Jn. Church p. 2d. fig. bona

Aper α nigro canescens, lana nulla inter setas. Auriculae breuiores, subrotundae. Rostrum productius. Dentes laniarii longiores. Setae profundius radicatae. Lardum nullum. Iunior flauescente et fusco longitudinaliter striatus.

Habitat in Europae australioris siluis. In Oelandiam introductus a Friderico I, Succiae rege. Non est in insulis britannicis terrisque borealibus maris balthici. In Asia reperitur a Syria ad lacum Baikal vsque. Est quoque in Africa boreali.

Les Cochons marons Americae, apri sunt e domesticis porcis feri rursus facti, passim copiosissimi.
The Warree hog *Wafer voy. p.* 223. *Bancr. Guian. p.* 126 non videtur differre.

Domesticus β auriculis longioribus, acutis, subpendulis, colore saepe albicante, sed et luteo, nigro, rubro, cinereo, vnicolor discolorue.

Hospitatur vbique, exceptis regionibus frigidissimis. In australioribus maior.

Sinensis γ minor, dorſo ſubnudo, abdomine ad terram vsque dependente, pedibus breuioribus, cauda pendula. Ex albo nigroque variegatus, aut ex nigro paullulum caneſcens. Mundum magis animal. Caro albidior, ſapidiorque. Nutritur paſſim et in Europa.

Monungula varietas domeſtica, Vpſaliae alibique frequens. Etiam Ariſtoteli *(Hiſt anim. II c. 7 n. 29.)* atque Plinio *(Hiſt. natur. XI c. 46 (c. 106 Hard.)* nota in Illyrico.

Sus cornutus (Ionſt. quadrup. tab. 48) fabuloſus videtur. Forte fabula orta ex vitioſa Babyruſſae figura.

Caput oblongum, declinatum, definens in proboſcidem, cum ſulco ab oculis verſus proboſcidem vtrinque ducto. Auriculae ouatae, acuminatae, integrae, lateribus ſeminudae, marginibus barbatis, intus rugis ſaepius quaternis profundis. Oculi parui, minus prominentes: pupilla atro-caerulea, orbiculari, dilatabili; iris obſcure cinerea. Membrana nictitans, ſubgriſea. Palpebra ſuperior ciliata; inferior mutica. Supercilia pilis longis ornata. Proboſcis ſenſim attenuata, oblonga, pilis breviſſimis tecta: apice truncato, cordato, ſubcartilagineo, margine prominulo, nudo, laeui, punctis excauato, naribus perforato. Nares rotundae, paruae. Labia proboſcide breuiora, laeuia, ſuperius ad dentes laniarios inflexa, verſus baſin rugoſam. Labium inferius breuius, acutius. Vibriſſae nullae. Dentes molares ſuperiores ſex: quorum tres interiores obtuſi, tres vero exteriores cuneati, ſubtrilobi. Inferiores quini; duobus molaribus interioribus, tribus cuneiformibus, ſubtrilobis. Laniarii ſuperiores bini, breuiores; inferiores bini,

remoti

remoti a ſe et reliquis: exteriore maiore, elongato, ſaepe extra labium prominente, recuruo, ſubtriangulari. Primores ſuperiores quatuor, breviores: intermediis diſtantibus. Inferiores magis prominentes, ſex: lateralibus minoribus. Verruca ſub gula, ſetis quinque longioribus rigidioribus inſtructa. Collum craſſum, compreſſum, dorſo magis nutans, ad duo vel tres pollices depreſſum. Truncus dorſo rotundatus. Dorſum et collum ſupra ſetis rigidioribus, longioribus, erectis, confertis, ſubfaſtigiatis ſubiubatum. Corpus reliquum veſtitum pilis rigidiuſculis, ad poſteriora verſis, at vero ſub collo, a iugulo ad mentum, antrorſum reuerſis. Cauda ad genua vsque pendula, ſaepius oblique curuata verſus alterum latus, villis tecta. Mammae decem abdominales, ſaepe etiam duae papillae ſpuriae ſubiugulares. Pedes breuiores, pilis tenuioribus veſtiti, biungulati, et poſtice vngulis ſuccenturiatis. Digiti duo anteriores longiores, poſtice connexi; duo poſteriores breuiores, interius annexi anterioribus. Suturae quintuplices: a) dorſalis longitudinalis a capite ad caudam. b) abdominalis longitudinalis a iugulo a regionem pubis. c) inguinalis vtrinque extrorſum arcuata, ab vmbilico ad femora. d) pedum anticorum poſtice a cubito ad vngulam ſuccenturiatam exteriorem. e) pedum poſticorum, poſtice a genu ad vngulam ſuccenturiatam exteriorem.

Animal odore pollens, naribus fodiens terram; quisquilias, ſtercus, ſucculenta, radices variaque ſpurcata ipſamque prolem vorans; multa ſeligens; pinguiſſimum, adipe inter cutem et panniculum carnoſum collecto, ſtupidum, ſomnolentum, lente feſtinans, tempeſtatum praenuncium et impatiens; apricatur in ſole, non fert frigus, in coeno ſe volutat, immundum, grunniens agreſteque fren-

 dens,

dens, accurrit clamanti affini aduerſus hoſtem ſpumante ore dentibusque immane, Crotalis infeſtum; libidine ſubat; tardum venere: pene laxo longo; mammis numeroſiſſimis, prole multa ad viginti. Aetas annorum 25 - 30. Dentes non amittit. Grauida menſes quatuor. Fera Sus parit Maio et Iunio menſe.

Porcus. 2. S. dorſo poſtice ſetoſo, cauda longitudine pedum, vmbilico cyſtifero.

Porcus guineenſis *Marcgr. Braſ. p.* 230 *cum fig.* bona.
Porcus Guineenſis *Ionſt. quadrup. tab.* 46 fig. Marcgr.
Porcus guineenſis *Rai. ſyn. quadr. p.* 96.
Sus dorſo pone ſetoſo, cauda nuda *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.
Sus dorſo pone ſetoſo, cauda nuda *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 12 *n.* 2.
Porcus guineenſis *Klein. quadrup. p.* 26.
Sus dorſo pone ſetoſo, cauda nuda. The Sus, with the back briſtly behind, and with a naked tail: the american Hog *Hill anim. p.* 572.
Le Cochon de Guinée: Sus (guineenſis) caudatus, auriculis longis et acuminatis, cauda nuda *Briſſ. regn. an. p.* 109 *n.* 4.
The Guinea Hog: Sus dorſo pone ſetoſo, cauda ſubnuda *Brown. Iam. p.* 487.
Das langöhrige Guineeiſche Schwein *Hall. vierſ. p.* 366.
Sus (Porcus) dorſo poſtice ſetoſo, cauda longitudine pedum, vmbilico cyſtifero *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 50 *n.* 2.
Cochon de Guinée *Dictionn. anim. I p.* 677.
Guineeſch Varken: Zwyn met het agterſte van de Rug geborſteld, de Staart ter langte van de Pooten, een blaasje aan de Navel *Houtt. nat. hiſt. II* p. 269.
Porc de Guinée *Bom. dictionn. III p.* 629.

Sus

Sus (Porcus) dorſo poſtice ſetoſo, cauda longitudine pedum, vmbilico cyſtifero *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 103 *n.* 2.

Le Cochon de Guinée *Buff. hiſt. XV p.* 146.

The Guinea Hog *Penn. ſyn. quadr. p.* 69 (varietatem putat praecedentis).

Das guineiſche Schwein *Müll. Naturſ. I p.* 465.

Affinis priori, vt adeo eiusdem varietatem putent Buffonius atque Pennantus. Corpus rufum, pilis breuibus rubris ſplendentibus; ſetis caret, niſi ſupra clunes. Caput minus Scrofae. Auriculae elongatae, acuminatae. Cauda nuda, ad talos vsque propendens. Paullo minor Scrofa.

Habitat in Guinea, inde in Braſiliam translatus, vbi hodie copioſiſſimus cicur.

Tajaſſu. 3. S. dorſo cyſtifero, cauda nulla.

Quauhtla coymatl. Quapizotl *Hernand. Mex. p.* 637 *cum fig.* mediocri.

Coyametl ſeu Quauhcoyametl *Fernand. anim. p.* 8.

Tajaſſoub, Sanglier *Thevet coſmogr. II fol.* 936 *b.*

Zainus *Nieremb. hiſt. nat. p.* 170 *cum fig.* mala.

Sues quibus vmbilicus in dorſo *Aldrov. biſulc. p.* 939.

Tajacu Caaigoara *Marcgr. Braſ. p.* 229 *fig.* mediocris: caudatum male pingit.

Zainus ſ. Tajacu, Porcus ſilueſter *Ionſt. quadrup. p.* 107 *tab.* 46 *fig.* Marcgr.

Aper indicus, Zainus, aliis Coja Metl *Muſ. Worm. p.* 340.

Tajaçu *Piſ. Ind. p.* 98 *cum fig.* Marcgr.

Le Iavaris *Rochef. Antill. p.* 138.

Tajacu ſeu aper mexicanus moſchiferus, or the anatomy of the Mexico Muſk-hog *Tyſon: Philoſ. transact. num.* 153 *p.* 359.

Porcus americanus *Charlet. exerc. p.* 14.

Tajacu *Rai. ſyn. quadr. p.* 97.

Eſpece de cochon, qu'on appelle Peccary *Wafer voy. p.* 222.

Sangliers appellez Pecaris *Des March. voy. III p.* 296.

Sus dorſo cyſtifero, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.

Iavalìes o paquiras *Gum. Orin. I p.* 293.

Sus dorſo cyſtifero, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 12 *n.* 3.

Sus minor, vmbilico in dorſo, Taiacu. Cochon noir *Barr. Fr. équ. p.* 161.

Porcus moſchiferus *Klein. quadrup. p.* 25.

Sus dorſo cyſtifero, cauda nulla. The Sus, with a cyſt on the back, and with no tail: the Muſk hog *Hill anim. p.* 572.

Le Sanglier du Mexique: Sus (Aper mexicanus) ecaudatus, folliculum inchoroſum in dorſo gerens *Briſſ. regn. an. p.* 111 *n.* 6.

Das kurzgeſchwänzte mexikaniſche Muſkusſchwein *Hall. vierf. p.* 364 *tab.* 10.

Sus (Tajacu) dorſo cyſtifero, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 50 *n.* 3.

Iavaris *Dictionn. anim. II p.* 523.

Tajacu *Dictionn. anim. IV p.* 250.

Muſkus Zwyn: Zwyn met een Beursje op de Rug, zonder Staart *Houtt. nat. hiſt. II p.* 270.

Sus dorſo omnino ſetoſo, cauda nulla *Gronov. zooph. I p.* 3 *n.* 10.

Le Pecari ou le Tajacu *Buff. hiſt. nat. X p.* 21 *tab.* 3, 4.

Paquires *Bom. dictionn. III p.* 332.

Tajacu ou Pecari *Bom. dictionn. IV p.* 283.

Sus (Tajacu) dorſo cyſtifero, cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 103 *n.* 3.

The Picary *Bancr. Guian. p.* 125.

Pingo *Fermin Surin. II p.* 79.

The Mexican Hog *Penn. ſyn. quadr. p.* 72 *n.* 56.

Pecari o Cingiale d'America *Aleſſ. quadrup. III tab.* 115 fig. Buff.

Das

Das Mufcus oder Bifamfchwein *Müll. Naturf. I p.* 465.
Paquiras *Americanis.*

Longitudo corporis ped. 3. Figura Scrofae finenfis. Dentes primores fupra quatuor, infra fex; laniarius vtrinque fupra et infra vnicus; vix apparentibus fuperioribus ore claufo, reliquis tectis. Auriculae breues, erectae, acuminatae. Oculi parui. Collum breue, craffum. Corpus fetis maioribus quam Scrofae, ad fpinas Erinacei accedentibus, nigro-canefcentibus, albo annulatis, in collo fupra et in dorfo longiffimis. Ab humeris verfus pectus ftria alba. Cauda nulla. Dorfum pone cyftiferum liquore graueolente, odore fere Caftorei. Ventriculi tres fecundum Tyfonium, quod negat tamen oculatiffimus Daubentonius.

Habitat in calidiffimis Americae auftralis, in Mexico, Guiania, Brafilia, Antillisque infulis, in filuis montofis, gregarius. Non amat coenum, vt Scrofa. Ferus, at manfuefcit. Victitat fructibus, radicibus, ferpentibus, amphibiis; minus pinguefcit ac Scrofa. Caro proba, modo ftatim exfcindatur poft mortem animalis glandula dorfalis.

aethiopicus. 4. S. facculo molli fub oculis.
Porc Sanglier *Flacourt Madag. p.* 151.
Engalla *Meroll. Cong. p.* 667.
Sanglier hideux *Dampier voy. I p.* 405.
Emgalo or Engulo *Barbot Guin. p.* 487.
Enorme fanglier d'Afrique *Adanf. Seneg. p.* 76.
Emgalo *Dictionn. anim. II p.* 99.
Emgalo *Bom. dictionn. II p.* 102.
Aper aethiopicus *Pallas mifc. p.* 16 *tab.* 2.

Sus

Sus (aethiopicus) ſacculo molli ſub oculis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *III p.* 223.

Aper aethiopicus *Pallas ſpicil. II p.* 3 *tab.* 1 fig. animalis *XI p.* 84 *tab.* 5 *fig.* 7 capitis.

Le Sanglier du cap vert *Buff. hiſt. nat. XV p.* 148. *XIV p.* 409.

The aethiopian Hog *Penn. ſyn. quadr. p.* 70 *n.* 55.

Das Schwein aus Aethiopien *Müll. Naturſ. I p.* 464.

Das aethiopiſche Schwein *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 59 *tab.* 3 *fig.* 2 Pallas.

Hardlooper *Belgis ad caput bonae ſpei.*

Kaunaba Hottentottis. Sparrm.

Longitudo, nondum adulti quidem, 4 ped. 9 poll. Huic dentes primores nulli (aliis duo ſupra, ſex infra), at gingiuae antice durae, conuexae, laeves. Laniarii infra minores, ſupra maiores, apice ſurſum verſo. Molares vtrinque ſex.* Corpus craſſum latumque. Caput ingens. Roſtrum truncatum, deorſum flexum, fere corneum. Os paruum. Oculi in ſummo capite, parui, propiores inter ſe auribusque, quam in Scrofa. Sub oculis ſaccus mollis, cute laxa nigra, cum appendice duriore zygomatica vtrinque. Auriculae ſubacutae. Corpus nudiuſculum, ſetis faſciculatis fuſco-nigris, in dorſo longioribus, in nucha longiſſimis. Cauda nuda.

* In aethiopico apro molares fere elephantini dantur quatuor, in nostrate viginti, in americano cysthifero 24, in Babyroussa 20. ita Camper in act. petropolit. 1777. p. 2. pag. 222.

Habitat in calidiſſimis Africae, Madagaſcar.

Ferox, celer. Odorem fere Lamii purpurei ſpargit. Viuidior, agilior, aſtutiorque Scrofa. Non coit cum Scrofa, cuius varietatem putat Buffonius.

Babyruſſa. 5. S. dentibus caninis verſus frontem reclinatis.

Aper in India *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 52 *(c.* 78 *Hard.).*

Ὓς τετρακερως *Aelian. anim. XVII c.* 10.

Strange hogs *Purch. Pilgr. II p.* 1693.

Hogges

Hogges with hornes *Purch. Pilgr. V p.* 566.

A certain ſtrange creature *Nieuh. Eaſt-Ind. p.* 195 *fig. p.* 196 mediocris.

Baby rouſſa *Bont. Ind. or. p.* 61 *cum fig.* mediocri.

Babirouſſa ſeu porcus indicus *Charlet. exerc. p.* 14.

The horned hog *Grew muſ. reg. ſoc. p.* 27 *tab.* 1 fig. cranii.

Porcus indicus Babyrouſſa dictus *Rai. ſyn. quadr. p.* 96.

Babyruſa *Iacob. muſ. reg. p.* 5 *tab.* 2 *fig.* 5. *Laur. muſ. reg. tab.* 3 *fig.* 28. cranii.

Babi-Roeſa *Valent. Amb. III p.* 268 *cum fig.* mediocri.

Aper indicus orientalis, Babi Roeſa dictus *Seb. theſ. I p.* 80 *tab.* 50 *fig.* 2 bona.

Sus dentibus duobus fronti innatis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.

Sus dentibus duobus fronti innatis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 12 *n.* 14.

Porcus Babirouſſa *Klein. quadrup. p.* 25.

Sus dentibus duobus fronti innatis. The Sus, with two teeth growing on the forehead: the Babyrouſſa *Hill anim. p.* 573.

Le Sanglier des Indes orientales: Sus (Aper orientalis) caudatus, dentibus caninis ſuperioribus ab origine ſurſum verſis, arcuatis, cauda floccoſa *Briſſ. regn. an. p.* 110 *n.* 5.

Das Babiroeſa *Hall. vierf. p.* 366.

Sus (Babyruſſa) dentibus duobus caninis fronti innatis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 50 *n.* 4.

Babi-Roeſa *Dictionn. anim. I p.* 196.

Hoorn-Varken: Zwyn met twee Slagtanden op het Voorhoofd *Houtt. nat. hiſt. II p.* 274.

Sus caudatus, dentibus caninis ſuperioribus ab origine ſurſum verſis, arcuatis; cauda floccoſa *Gronov. zooph. I p.* 3 *n.* 12.

Le Babirouſſa *Buff. hiſt. nat. XII p.* 379 *tab.* 48 fig. cranii.

Barbi-

Barbi-Ronſa *Bom. dictionn. I p.* 243.

Sus (Babyruſſa) dentibus duobus caninis fronti innatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 104 *n.* 5.

Eberhirſch oder Hirſcheber *Knorr delic. II tab. K,* 7 fig. cranii.

The indian Hog *Penn. ſyn. quadr. p.* 73 *n.* 57 *tab.* 11 *fig.* 1 a Lotenio allata ex India orient.

Der Hirſcheber *Müll. Naturſ. I p.* 467.

Babi-ruſa *Malaiis.*

Magnitudo Cerui. Dentes laniarii ſuperiores duo perforantes maxillam ſuperiorem, recuruati velut duo cornua; inferiores vtrinque ſolitarii, magni, prioribus adſtantes, minus recurui. Primores ſuperiores quatuor, inferiores ſex. Molares quinque vtrinque. Auriculae paruae, erectae, acutae. Corpus paullo tenuius quam in congeneribus, fere lanatum, at dorſum ſetis mollibus. Caput oblongum, anguſtum. Oculi minuti. Crura longa, gracilia. Cauda longa, apice floccoſa, contorta. Color fuſco-griſeus. Feminam carere dentibus elongatis habet Valentyn.

Habitat in inſula Buero ſ. Bouro prope Amboinam, nec non in Celebes; haud in continente.

Gregarius, odore pollet, victitat herbis foliisque. Bene natat et vrinatur. Dicitur dentibus vnciformibus innixus quieſcere in ramis arborum. Caro proba. Vox Scrofae.

20. HY-

20. HYDROCHAERVS.

Dentes Primores II - X.
Laniarii nulli.
Palmae vngulis quatuor, *plantae* vngulis tribus.

Tapir. 1. H. dentibus primoribus vtrinque decem.
Tapihires *Thevet cosmogr. II fol.* 937 *b.*
Beori animal *Laet Amer. p.* 328.
Danta *Nieremb. hist. nat. p.* 187.
Antes *Nieuh. Brasil. p.* 23.
Tapiirete Brasiliensibus, Lusitanis Anta *Marcgr. Bras. p.* 229 *cum fig.* mediocri.
Danta *Ionst. quadrup. p.* 216.
Tapiireté *Pis. Ind. p.* 101 *cum fig.* Marcgr.
Tapiierete Brasiliensibus, Anta Lusitanis *Rai. syn. quadr. p.* 126.
La vache montagnarde *Dampier voy. III p.* 356 *cum fig.* mala.
Dantas *Cieza Peru p.* 20.
Anta, la gran bestia *Gum. Orin. I p.* 300.
L'Elan *Condam. voy. p.* 163.
Sus aquaticus multisulcus, Tapir, Maypoury *Barr. Fr. équ. p.* 160.
Animal Tapiierete *Klein. quadrup. p.* 36.
Hippopotamus acaudatus capite graciliore. The slender-headed Hippopotamus, without a tail: the Tapijerete *Hill anim. p.* 569.
Le Tapir ou Manipouris: Tapirus *Briss. regn. an. p.* 119 *n.* 1.
Hippopotámus (terrestris) pedibus posticis trisulcis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 74 *n.* 2.
Anta *Dictionn. anim. I p.* 139.
Dante *Dictionn. anim. II p.* 7.
Manipouris *Dictionn. anim. III p.* 19.

Tapiirete

sp. Barlaei hist. rer. in Brasil. gesser. tab. 1.

Dobrizhoffer Gesch. der Abiponer T. 1. p. 334.

Tapiirete *Dictionn. anim. IV p.* 267.

Rivierpaard met de Agterpooten in drieen gefpleeten *Houtt. nat. hift. III p.* 420.

Le Tapir ou l'Anta *Buff. hift. nat. XI p.* 444 *tab.* 43.

Anta *Bom. dictionn. I p.* 131.

Beori *Bom. dictionn. I p.* 277.

Manipouris *Bom. dictionn. III p.* 21.

Wafferfchwein *Knorr. delic. II tab. K,* 13 fig. bona vti videtur, roftro minus acuto quam in Buffoniana.

A fpecies of the Hippopotamus or Water horfe *Bancr. Guian. p.* 127?

Sus aquaticus mufticulus *Fermin Surin. II p.* 80.

The longnofed Tapir *Penn. fyn. quadr. p.* 82 *n.* 60.

Tapir o Manipuris *Alcff. quadrup. I tab.* 23 fig. Buff.

Landhippopotamus *Müll. Naturf. I p.* 460.

Antathier *Mart Naturlex. II p.* 616 *cum fig.* Buff.

Anta *Lufitanis.*

Maipuri, Manipuri *Guianienfibus.*

Tapiira *Brafilienfibus.*

Uagra *Peruanis.*

Magnitudo vaccae minoris. Corpus fuillum. Nafus elongatus quafi in probofcidem tenuem, vltra maxillam inferiorem prominentem, extenfilem, lateribus fulcatis; apicibus vtriusque maxillae acuminatis. Oculi minuti. Auriculae erectae, fubrotundae, maiufculae. Dentes primores decem vtrinque, molares quinque fupra et infra vtrinque, laniarii nulli. Collum craffum, breue. Dorfum arcuatum. Pedes breues. Vngulae breues, antice quatuor, exteriore minima; poftice tres, nigrae, cauae. Cauda breuiffima, nuda. Pili in toto corpore breues, fufci, in iunioribus autem corpus albo maculatum. Cutis valde tenax.

Habitat in filuis et fluuiis regionum orientalium Americae auftralis ab ifthmo Darien vsque ad Amazonum

num fluuium. Gregarius. Animal Americae maximum.

Dormit interdiu in ſiluis obſcuriſſimis denſiſſimisque, noctu cibum quaerit. Victitat gramine, ſaccharo, fructibus. Timefactus aquam intrat. Natat bene et vrinatur, inque aquae fundo incedit. Salax. Mitis et meticuloſus: pugnax tamen ſecundum Gumillam. Caro Americanis in cibo expetita, ingratam dicit Barrere.

Capybara. 2. H. dentibus primoribus vtrinque duobus.

Capy-bara Braſilienſibus *Marcgr. Braſ. p.* 230 *cum fig.*

Capy-bara Porcus fluuiatilis Braſ. *Ionſt. quadrup. tab.* 60 fig. Marcgr.

Capybára *Piſ. Ind. p.* 99 *cum fig.* Marcgr.

Capy-Bara Braſilienſibus porcus fluuiatilis Marcgrauii *Rai. ſyn. quadr. p.* 126.

Chien d'eau *Dampier voy. IV p.* 72? (Cuchora de agua *Luſitanis.*)

Capivard *Froger voy. p.* 123 *cum fig.* mediocri.

Cochon d'eau *Des March. voy. III p.* 298.

Irabùbo *Gum. Orin. II p.* 311.

Sus maximus paluſtris. Cabiai. Cabionara *Barr. Fr. équ. p.* 160.

Hippopotamus acaudatus capite craſſo. The thick-headed Hippopotamus, with no tail: the Copy-Bara *Hill anim. p.* 569.

Le Cabiai: Hydrochaerus *Briſſ. regn. an. p.* 117 *n.* 1.

Amerikaniſches Waſſerſchwein *Hall. vierf. p.* 368.

Cabiai *Dictionn. anim. I p.* 364.

Capiverd ou Capivar *Dictionn. anim. I p.* 425.

Braſiliaanſche Water-Zwyn *Houtt. nat. hiſt. III p.* 421.

arlai Lip rez ir Bras. gefaar. tab. I.

Le Cabiai *Buff. hist. nat. XII p.* 384 *tab.* 49.
Cabiai ou porc de riviere *Bom. dictionn. I p.* 358.
Capiverd *Bom. dictionn. I p.* 417.
Sus (Hydrochaeris) plantis tridactylis cauda nulla *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 103 *n.* 4. *III p.* 228.
The Laabba *Bancr. Guian. p.* 128?
Porcus fluuiatilis s. Sus maximus paluſtris *Fermin Surin. II p.* 80.
The thicknoſed Tapir *Penn. ſyn. quadr. p.* 83 *n.* 61.
Cabionara *Aleſſ. quadrup. III tab.* 138 fig. Buff.
Das Sumpfſchwein *Müll. Naturſ. I p.* 467.
Die americaniſche Maus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 40. (Ignorantia auctoris, non ſtudio, in Murem hic transfiguratur animal.)
Cabiai, Capibara, Cabionara *Americanis.*

Magnitudo Porci bimuli. Caput magnum, craſſum, naſo tumido, vibriſſis longis, durioribus. Auriculae paruae, rotundatae. Oculi magni, nigri. Maxilla ſuperior longior inferiore. Dentes primores duo vtrinque, molares quatuor vtrinque, tripartiti. Pedes breues, vngulis 4 - 3 longis, palmatis. Cauda nulla. Corpus pilis breuibus, durioribus, ex rufo fuſcis. Folliculus excretorius pone, ſed iuxta vmbilicum, et porus excretorius ſupra clunes. Mammae decem: pectorales quatuor, ventrales ſex.

Habitat in America auſtrali ad fluuios maiores, gregarius atque nocturnus.

Lente currit, bene natat et diu ſub aqua degit. Victitat fructibus aliisque vegetabilibus, nec non piſcibus. Erectus cibos palmis ori admouet. Valde pingueſcit. Caro bona, tenera, at piſcino ſapore infecta. Mitis. Facile manſueſcit. Vox aſini.

21. HIP-

21. HIPPOPOTAMVS.

Dentes Primores superiores IV, per paria remoti.
inferiores IV prominentes: intermediis longioribus.
Laniarii solitarii, inferiores maiores, recuruati, oblique truncati.
Pedes margine vnguiculati.

amphibius. 1. HIPPOPOTAMVS.

Behemoth. *Iob. c.* 40.

Ποταμιος ἵππος *Arist. hist. anim. II c.* 7 *n.* 29. *c.* 12 *n.* 81, 82.

Hippopotamus *Plin. hist. nat. VIII c.* 25 (*c.* 39 *Hard.*) *c.* 26 (*c.* 40 *Hard.*). *XI c.* 12 (*c.* 14 *Hard.*). *c.* 37 (*c.* 61 *Hard*) *c.* 39 (*c.* 93 *Hard.*) *XXXII c.* 11 (*c.* 53 *Hard.*).

Ἵππος ποτάμιος *Aelian. anim. V c.* 53.

Hippopotamus *Belon poiss. p.* 47 *fig. p.* 50 mediocris.

Hippopotamus *Bellon. obs. p.* 104. *Petr. Gyllii descriptio elephanti c. 3.*

Hippopotamus *Gesn. aquat. p.* 494 *cum fig.*

L'hippopotame ou Cheval marin *Thevet cosmogr. I fol.* 64.

Cheropotamus et Hippopotamus *Alpin. Aeg. I p.* 245 *tab.* 22 *fig.* 1, 2; *tab.* 23, 24, 25 figg. mal.

Hippopotamo *Zerenghi monogr. † 1603* –

Hippopotamus antiquorum *Column. aquat. p. XXVIII fig. p. XXX* mala.

Hippopotamus *Aldrov. digit. p.* 181 *fig. p.* 183 *maris* mala, *p.* 184 *feminae* pessima, *p.* 185 *capitis* pessima.

Hippopotamus *Ionst. quadrup. p.* 108 *tab.* 49 *fig. infima* mediocris.

Hippopotamus Wasserochs *Ionst. quadrup. tab.* 49 *fig. media* pessima.

Boymii flora Sinensis Vienn. 1665. fol. icon me[illegible]

Boerhaave van den Behemot en Leviathan. Leid. 1737. 4. icon hippopotami in museo acad. Leidensis.

[illegible] af Buffon T. XII d. amst. icon melior eiusdem [illegible]is Leidensis.

Hippopotame ou cheval marin *Thevenot. voy. I p.* 491.
Le Cheval marin *Marmol Afr. I p.* 51.
Hippopotamus *Charlet. exerc. p.* 14.
Hippopotamus *Ludolf Aeth. L. I c.* 10 *n.* 1 *cum fig. mal. comment. p.* 155.
The River-horfe or Hippopotamus *Grew muf. reg. foc. p.* 14 *tab.* V fig. cranii.
Hippopotamus *Rai. fyn. quadr. p.* 123.
L'Hippopotame *Dampier voy. III p.* 359 *cum fig.* mala.
Hippopotami or river horfes *Barbot Guin. p.* 73.
Water-Elephants, Ker-kamonou *Barbot Guin. p.* 117.
Seekuh *Kolb. Vorgeb. p.* 168 *tab.* 6 *fig.* 1 mal.
Hippopotame *Juffieu: Mém. de l'acad.* 1724 *p.* 209 defcriptio et figura cranii.
Le cheval marin ou l'hippopotame *Lobo Abiff. I p.* 288.
L'Hippopotame *Maill. Aeg. II p.* 31.
The Hippopotamus *Shaw trav. p.* 427.
Hippopotamus *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 48.
Hippopotamus *Linn. fyft nat.* 6 *p.* 11 *n.* 1.
Hippopotamus *Klein. quadr. p.* 34 *tab.* 3 fig. peffima.
Hippopotamus cauda breui. The Hippopotamus, with a fhort tail: the Sea-horfe *Hill anim. p.* 568 *tab.* 28 fig. mala.
L'Hippopotame: Hippopotamus *Briff. regn. an. p.* 122 *n.* 1.
Hippopotamus *Haffelqu. Palaeft. p.* 280.
Hippopotame ou cheval marin *Adanf. Seneg. p.* 73.
Das Nilpferd *Hall. vierf. p.* 372.
Hippopotamus (amphibius) pedibus quadrilobis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 74 *n.* 1.
Hippopotame *Dictionn. anim. II p.* 449.
Rivier-Paard: Rivier-Paard met de Voeten in vieren verdeeld *Houtt. nat. hift. III p.* 405 *tab.* 28 fig. bon.

L'Hip-

adolescentis ex museo principis de Condé ap. Buffon, Suppl... ent T. III. tab. 62,

L'Hippopotame *Buff. hiſt. nat. XII p.* 22 *tab.* 3 fig. pulli *tab.* 6 *fig.* 1 cranii, *fig.* 2, 3 ped.
Hippopotame *Bom. dictionn. II p.* 466.
Hippopotamus (amphibius) pedibus quadrilobis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 101 *n.* 1.
Waſſerochs *Knorr delic II tab. K,* 12 fig. bona.
Das Nilpferd *Berl. Samml. I p.* 514 *cum fig.*
The Hippopotame *Penn. ſyn. quadr. p.* 78 *n.* 59.
Ippopotamo *Aleſſ. quadrup. II tab.* 65 fig. Buff.
Der Behemoth *Müll. Naturſ. I p.* 457 *tab.* 28 fig. Houtt.
Hippopotamus *Forsk. fn. orient. p. IV.*
Foras l'bar, Abu mner *Aegyptiis.*
Bihât *aethiopice.*
Gomari *ambarice.*
Nilpferd, Seepferd *Germanis.*
Морская лошадь (Morſkaja toſchad') *Ruſſis?*

Longitudo corporis 17 pedum, circumferentia 15, altitudo fere ped. 7: femina paullo minor. Corpus ſuis. Caput magnum, bubulinum. Oris rictus ingens. Dentes duriſſimi, labiis craſſis tecti, eburnei, aetate non flaueſcentes. Vibriſſae breues ad os. Nares paruae. Oculi exigui. Auriculae paruae acutae, intus pilis breuibus mollibusque repletae. Cutis craſiſſima duriſſimaque nigricans, pilis rarioribus albidis. Iubae loco pili copioſiores in collo. Cauda longitudine pedis vnius, craſſa, compreſſa, nuda, ſubſquamoſa. Pedes tetradactyli vngulati, cruribus breuibus, craſſis. Mammae duae inguinales. Mandibulam ſuperiorem mobilem eſſe dicunt, quod ſingulare, ſi vera fabula.

Habitat in fluuiis Africae a Nigro vsque ad caput bonae ſpei, nec non in Nilo ſuperiore inque lacubus Aethiopiae, quos transfluit Nilus; rarior in oſtiis fluuiorum. In Aſia reperiri dubium.

 Mitis,

Mitis, nisi lacessitus. Natat capite extra aquam protenso, obambulatque sub aqua. Noctu terram ingreditur, vt edat saccharum, milium, oryzam, radices Colocasiae; vorat quoque pisciculos. Lupino occiditur. Lente incedit in terra, meticulosus; territus in aquam fugit, intra quam laesus vulneratusque furit vehementer. Dormit in Insulis arenosis fluuiorum. Vox fortissima. Polygamus. Parit extra aquam vnicum pullum, quem lactat intra aquam. Bene mansuescit. Crocodili hostis. Caro a vulgo editur.

22. RHINOCEROS.

Dentes Primores vtrinque II, remotissimi, obtusi; *nisi forte laniarii sint absque primoribus.*

Cornu solidum, conicum, naso insidens.

Pedes vngulati.

vnicornis. 1. RHINOCEROS.

Rhinoceros *Plin. hist. nat. VIII c.* 20 (*c.* 29 *Hard.*) *XVIII c.* 1 (*c.* 1 *Hard.*).

Ῥινόκερως *Aelian. anim. XVII c.* 45.

Ῥινόκερως *Oppian. cyneg. II,* 551.

Rhinoceros *Gesn. quadrup. p.* 952 *fig. p.* 953 *Alb. Düreri*, mala.

The Abada or Rhinoceros *Borri Cochinch. p.* 797.

Rhinoceros or Abadas *Purch. Pilgr. II p.* 1001, 1773.

Rhinoceros *Aldrov. bisulc. p.* 878 *fig. p.* 884 *Düreri.*

Rhinoceros *Ionst. quadr. p.* 94.

Rhinoceros, Hornnase, Rhinocer *Ionst. quadrup. tab.* 38 *fig. Düreri.*

Rhinoceros *Mus. Worm. p.* 336.

Abada

Abada ſiue Rhinoceros *Bont. Ind. or. p.* 50 *fig. p.* 51 mala.

Rhinoceros *Neuh. Geſandſch. p.* 370 *cum fig.* mediocri.

Rhinocer *Geſn. Thierb. p.* 304 *fig. p.* 305 Düreri.

Rhinoceros *Charlet. exerc. p.* 12.

Rhinoceros *Grew muſ. reg. ſoc. p.* 29.

Rhinoceros *Chardin voy. II p.* 60 *tab.* 40 fig. mediocris.

Rhinoceros *Rai. ſyn. quadr. p.* 122.

Naſhorn oder Rhinoceros *Kolbe Vorgeb. p.* 159 *tab.* 4 *fig.* 2 peſſima.

Elephas naſo cornigero *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 48.

Rhinoceros *Bergen orat.*

Naſhorn Rhinoceros *Ridinger tab. peculiari* 1748 fig. bona.

Rhinoceros *Parſons: Philoſ. transact. num.* 470 *p.* 523 *tab.* 1, 2 figg. mediocr.

Rhinoceros *Parſons monogr.*

Rhinoceros cornu vnico conico *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 11 *n.* 1.

Das Naſhorn *Meyer Thiere III tab.* 29, 30 figg. mediocr.

Rhinoceros *Klein. quadrup. p.* 26.

Rhinoceros cornu vnico. The Rhinoceros with a ſingle horn: the common Rhinoceros *Hill anim. p.* 567 *tab.* 28 fig. mala.

Le Rhinoceros: Rhinoceros *Briſſ. regn. an. p.* 114 *n.* 1.

Rhinoceros cornu vnico conico *Kram. Auſtr. p.* 317.

Das Naſenhorn *Hall. vierf. p.* 368 *tab.* 5.

Rhinoceros (vnicornis) cornu vnico *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 56 *n.* 1.

The Rhinoceros *Edw. Glean. I p.* 24 *tab.* 221 *fig.* 2.

Abada *Dictionn. anim. I p.* 1.

Rhinoceros *Dictionn. anim. III p.* 690.

Rhinoceros met een enkelen Kegelvormigen Hoorn *Houtt. nat. hiſt. II p.* 329.

Rhinoceros cornu vnico conico *Gronov. zooph. I p. 4 n.* 13.

Le Rhinoceros *Buff. hist. nat. XI p.* 174 *tab.* 7.

Abada *Bom. dictionn. I p.* 1.

Rhinoceros ou Porte-corne *Bom. dictionn. IV p.* 8.

Rhinoceros (vnicornis) *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 104. *n.* 1. *III p.* 227.

Nashorn *Knorr delic. II tab. K,* 10 fig. bon.

Rhinoceros *Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p.* 447 *tab.* 9 fig. cranii fossilis, *tab.* 10 fig. cornu fossilis.

The one corned Rhinoceros *Penn. syn. quadrup. p.* 75 *n.* 58.

Rinoceronte *Alest. quadrup. I tab.* 14 fig. Buff.

Rhinoceros *Pallas: Nou. comment. petrop. XVII p.* 585 *tab.* 15 *fig.* 1 capitis fossilis, *fig.* 2, 3 ped. fossilium, *tab.* 16 cranii.

Das einhornige Nasenhorn *Müll. Naturs. I p.* 469 *tab.* 32 *fig.* 1, 2 Parsons.

Rhinoceros *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Das Nashorn: Rhinoceros vnicornis *Schreb. Säugth. II p.* 229 *tab.* 77 fig. Riding. *tab.* 77 *B.* fig. cran. Pallas.

Chartis, Carcand, Carcadden *Arabibus.*

Carc, Gurg, Kerkedon *Persis.*

Lânduga *in regno Dekan.*

Kand' â-mürrügam *malabarice.*

Kad'ga-m'rügam *grendice.*

Abada, Numba *Iauanensibus.*

Tuabba, Nabba *Hottentottis.*

Rinoceronte *Italis.*

Rhinoceronte *Hispanis.*

Rhinoceros, Porte-corne *Gallis.*

Nashorn, Nasenhorn *Germanis.*

Nozorozec *Polonis.*

Носорогъ (Nosorog) *Russis.*

Magni-

Magnitudo Elephantis, longitudine corporis ad 12 pedes, pedibus tamen breuioribus, vt 6 - 7 ped. altus ſit. Caput ſuillum, longum, poſtice latum, occipite eleuato, verſus naſum anguſtatum. Nares transuerſae. Cornu conicum, acuminatum, ſolidum, fibroſum, fere quatuor pedes longum, nigrum, laeue, ſupra naſum. Labia rigida, ſcabra. Labium ſuperius longum, dependens, acuminatum, quaſi prehenſile, extenſile. Dentes duo in angulis maxillae vtriusque, forſan laniarii; molares ſex vtrinque (ſupra 5, infra 6 Pallas). Lingua laeuis. Auriculae maiores, erectae, acutae, piloſae. Oculi minimi verſus roſtri apicem. Collum breue, craſſum. Corpus craſſum, abdomine pendulo. Cauda attenuata, pedibus breuior, verſus apicem pilis longis, nigris, craſſis diſticha. Pedes breues, antici incurui, vngulis tribus. Cutis nuda, verrucoſa, e fuſco nigricans, duriſſima, ſetis raris fuſcis aut nigris, hinc inde faſciculatis. Plicae circa collum, humeros, femora in cute molles, colore ſubincarnato. Penis praeputio quaſi duplici.

Habitat intra tropicos in Aſiae Africaeque humidioribus vmbroſis. Solitarius, ſegnis, mitis; irritatus crudeliter ſaeuiens cornu, celer: coeno ſe volutat; victitat vepretis, ſpinis. Viſu debili laborans excellit odore et auditu. Retrorſum mingit et coit. Parit vnicum, quem adoleſcere tertio anno dicunt, quod vix credibile. Vox grunniens, quaſi Porci. Pugna cum Elephante vix veroſimilis, neque lambendo trucidare animal lingua laeui inſtructum. Manſueſcit. Caro mala raro editur. Flagella fiunt ex cute craſſa.

Ex hoc forte orta fabula de cornuto aſino apud Ariſtotelem, nec non de vnicornu terreſtri.

bicornis. β. *cornibus duobus.*

L'Abada ou Bada *Lobo Abiſſ. I p.* 290.

Rhinoceros cornibus duobus cuneiformibus *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 11 *n.* 2.

Rhinoceros cornu gemino. The double-horned Rhinoceros *Hill anim. p.* 565.

Rhinoceros bicornis *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 11.

Rhinoceros (bicornis) cornibus duobus cuneiformibus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 56 *n.* 2.

Rhinoceros met twee Beitelswyze Hoornen *Houtt. nat. hiſt. II p.* 346.

Rhinoceros *Parſons: Philoſ. transact. LVI p.* 32 *tab.* 2 fig. cornuum.

Rhinoceros (bicornis) cornibus duobus *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 104 *n.* 1 β.

The twohorned Rhinoceros *Penn. ſyn. quadr. p.* 75 *n.* 58 α.

Zweyhörniges Naſenhorn *Müll. Naturſ. I p.* 472.

Similis plane vnicorni, niſi quod alterum cornu, idque minus, in fronte inter oculos poſitum ſit. Num forte aetate differt ab vnicorni? Africanos bicornes; Aſiaticos vnicornes putat Parſons. Raro et *tricornes* viſi.

Cornua bicornis vide quoque apud *Iacob. muſ. reg. tab.* 3 *fig.* 4. *Klein. quadrup. tab.* 2.

23. ELE-

23. ELEPHAS.

Dentes Primores nulli vtrinque.
Laniarii ſuperiores elongati.
Proboſcis longiſſima, prehenſilis.
Corpus nudiuſculum.

maximus. 1. ELEPHAS.

Ελεφας *Ariſt. hiſt. anim. I c.* 9 *n.* 93. *II c.* 2 *n.* 3, 4. *c.* 3 *n.* 6. *c.* 4 *n.* 8. *II c.* 5 *n.* 24. *c.* 8 *n.* 38. *c.* 9 *n.* 46, 51. *c.* 11 *n.* 79, 80. *c.* 18 *n.* 133. *c.* 19 *n.* 155. *III c.* 1 *n.* 7. *c.* 9 *n.* 118. *IV c.* 9 *n.* 293. *V c.* 2 *n.* 24. *c.* 13 *n.* 140. *VI c.* 27 *n.* 359. *VIII c.* 12 *n.* 116, 117. *IX c.* 72 *n.* 490-495.

Elephas, Elephantus, Luca bos *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 1-14 (*c.* 1-14 *Hard.*).

Ελεφας *Aelian. anim. I c.* 38. *II c.* 11, 18. *III c.* 46. *IV c.* 10, 24, 31. *V c.* 49. *VI c.* 52, 61. *VII c.* 2, 15, 36. *VIII c.* 10, 15, 17, 27. *IX c.* 8, 56. *X c.* 1, 10, 17. *XI c.* 14, 15. *XII c.* 44. *XIII c.* 8, 9. *XIV c.* 5, 6. *XVI c.* 18. *XVII c.* 7.

Ελεφας *Oppian. cyneg. II,* 489.

Elephas *Geſn. quadrup. p.* 409 *fig. p.* 410 mala.

Elephas *Schwenkf. theriotr. p.* 87.

The Elephant *Argenſ. Molucc. p.* 122.

The Elephant *Borri Cochinch. p.* 795.

Elephants *Purch. Pilgr. II p.* 999, 1471, 1771.

Elephas *Nieremb. hiſt. nat. p.* 191.

Elephantus *Aldrov. ſolid. p.* 418 *fig. p.* 465 Geſn.

Elephantus *Ionſt. quadrup. p.* 24 *tab.* 9, 10, 11 figg. bonae.

Elephans *Boullaye voy. p.* 250.

Elephant *Neuh. Geſandſch. p.* 371 *fig. p.* 372 bona.

L'Elephant *Marmol Afr. I p.* 58.

Helfant

rstellung verschiedener Elephanten in Jo. Wolfg. Heydt anplatz v. Afr. u. Ost-Ind. Willhermsdorf. 1744. fol. transv. XCIV. p. 281.

Helfant *Gesn. Thierb. p.* 178 *figg. p.* 179, 180 mediocr. *p.* 185 mala.
L'Elephant *Perr. anim. III p.* 91 *tab.* 19 fig. bon.
Elephas *Charlet. exerc. p.* 5.
Elephantus *Ludolf. Aeth. L. I c.* 10 *n.* 18 *seqq. cum fig. comment. p.* 147.
Elephant *Knox Ceylon. p.* 21.
Elephant *Blair: Philos. trasact. num.* 326 *p.* 51 *cum figg.* partium et anatome.
Elephas *Rai. syn. quadr. p.* 131.
The Elephant *Barbot Guin. p.* 141, 206.
Elephant *Bossm. Guin. p.* 284.
Elephant *Kolbe Vorgeb. p.* 148 *tab.* 4 *fig.* 3 mala.
Elephantus *Hartens. monogr. cum figg.*
Foetus Elephantis africani ineditus *Seb. thes. I p.* 175 *tab.* 111 *fig.* 1.
Elephas naso cylindraceo elongato *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 48.
The Elephant *Moor. Afr. p.* 24.
Der Elephant *Meyer Thiere I tab.* 69 fig. bon.
Elephas *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 11 *n.* 1.
Elephas *Klein. quadrup. p.* 36.
Elephas. The Elephant *Hill anim. p.* 565 *tab.* 28 fig. bon.
Elephas indicus *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 11.
L'Éléphant; Elephas *Briss. regn. an. p.* 45 *n.* 1.
Elephant *Adans. Seneg. p.* 75.
Der Elephant *Hall. vierf. p.* 374.
Elephas (maximus) *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 33 *n.* 1.
The Elephant *Edw. glean. I tab.* 221.
Éléphant *Dictionn. anim. II p.* 86.
Olyphant *Houtt. nat. hist. I p.* 419.
Elephas *Gronov. zooph. I p.* 2 *n.* 6.
L'Éléphant *Buff. hist. nat. XI p.* 1 *tab.* 1.
Elephas (maximus) *Linn. mus. Ad. Frid. II p.* 6.
Elephant *Bom. dictionn. II p.* 86.
Elephas (maximus) *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 48 *n.* 1.

L'Elephant femelle. Buffon Suppl. T. III. t. 59.

The

The great Elephant *Penn. syn. quadr. p.* 85 *n.* 62.
Elefante *Aless. quadrup. I tab.* 11 fig. Buff.
Der Elephant *Müll. Naturs. I p.* 158 *tab.* 29 *fig.* 5.
Der Elefant: Elephas maximus *Schreb. Säugth. II p.* 241 *tab.* 78 fig. Buff. *tab.* 63 cran. Buff.
Elefante, Leofante *Italis.*
Elephante *Hispanis.*
Elephant *Gallis.*
Elephant *Germanis.*
Olyfant, Olyphant *Belgis.*
Elephant *Anglis.*
Слонъ (Slon) *Russis.*
Naeghe *Aethiopicis.*
Manzao, Manzo *Congensibus.*
Osson *Guineensibus.*
Wâranam *malabarice.*
Anei *tamulice.*

Maximum quadrupes, ad ped. 14 altum. Corpus canum aut cinereum, rarius albicans, rarissimeque maculatum. pilis raris adspersum. Cutis rugosa densissima. Caput paruum, quadratum quasi, fronte plana. Auriculae amplissimae, pendulae, dentatae. Oculi parui. Proboscis subtus plana, semicylindrica, apice truncato cum acumine digiti loco. Os paruum. Lingua bubula nonnihil maior. Dentes laniarii superiores sursum exserti, ad septem pedes longi, eburnei fibris crispis. Molares plani, quatuor vtrinque. Collum breue. Dorsum valde incuruum. Mammae duae iuxta pectus. Genua vtique flexilia. Crura crassa. Pedes indiuisi: vngues supra apices quinque loborum pedum 5 - 5. Cauda porcina, apice setis crassis quasi disticha. Testes intra corpus latentes. Costarum paria viginti. Vesica fellea nulla. Epiglottis nulla, trachea ab oesophago disclusa.

Habitat

Habitat in India eiusque insulis maioribus et Africa: abundat in Africa australiore; hic autem Elephas magnitudine cedit indico, dentibus quamuis laniariis multo longioribus praeditus, qui in ceylonensi vix prominent ex ore, excepto primogenito mare. Ceylonenses omnium minimi.

Amat paludosas siluas degitque ad amnes gregarius. Bene natat proboscide extra aquam prominente. Edit ramos, Cocos, Musae fructus, Guilandinae semina, frumentum: aquam potat turbidam. Docilis proximusque humanis sensibus, memoria benefactorum et malefactorum maxime pollens. Proboscidem longissimam, extensilem, acute odorantem loco manus habet; ea cibum potumque haurit hostemque pellit; eaque praecisa occiditur. Dormit saepe stando. Murem metuit sub somno, ob tracheae insertionem. Retro coit et mingit. Portat ad 2000 libras, proboscide eleuat 200. Obedientissimus homini, rectore collo insidente vncoque ferreo instruente animal. Vulnusculo inter axin et atlantem furiosus occiditur. Mitis, nisi vulneratus aut oestro furens: solitarius autem magis timendus. Femina fortior, at multo pauidior mare. Monogamus. Vterum gerit vltra annum, an biennium? Parit vnicum. adolescentem anno trigesimo. Aetas forsan 200-300 annorum. Celerrimus. Caro insipida molliuscula editur ab Africanis, proboscide delicatissima. Excrementa equina. Ignem timet. Quiescit supra abdomen. Vox quasi tubae.

Embryo, rarissimum exemplum, est in museo regis Succiae, olim Sebae.

Dentes et Sceleta fossilia reperiuntur in Sibiria et America passim; haec autem Pennantus deriuat

ex

ex ſpecie aliqua americana huius generis ignota, in interioribus Americae degente, quam vocat: the American Elephant *ſyn. quadr. p.* 91 *n.* 63.

Animal obſcurum, forte huius generis.

* Sucotyro or Sucotario *Nieuh. Eaſt. Ind. p.* 360 *cum fig.*

Sukotyro ou Sucotario *Bom. dictionn. IV p.* 275.

Suçotyro *Penn. ſyn. quadr. p.* 93.

Magnitudo Bouis maioris. Os porci. Auriculae magnae. Cauda craſſa iubata. Oculi in ſummo capite, loco maxime inſueto. Cornua duo longa, aut dentes exſerti, tenuiores ac in Elephante.

Habitat in Iaua. Victitat vegetabilibus. Rarius captum animal.

24. EQVVS.

Dentes Primores Superiores VI, obtuſe truncati.
Inferiores VI, prominentiores.
Laniarii ſolitarii, vtrinque remoti.
Pedes vngula indiuiſa.
Mammae II inguinales.

Caballus. 1. E. cauda vndique ſetoſa.

Ἵππος *Ariſt. hiſt. anim. I c.* 5 *n.* 35. *c.* 7 *n.* 63. *II c.* 5 *n.* 23. *c.* 8 *n.* 43. *c.* 18 *n.* 126, 130. *III c.* 10 *n.* 133. *V c.* 11 *n.* 128, 129. *VI c.* 22 *n.* 308-334. *VII c.* 17 *n.* 212-214, 228-236. *VIII c.* 11 *n.* 114, 115. *IX c.* 5 *n.* 78.

Equus, Equa *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 42 (*c.* 64-67 *Hard.*). *X c.* 63 (*c.* 83 *Hard.*). *XI c.* 37 (*c.* 64, 70 *Hard.*). *XXVIII c.* 11 (*c.* 49 *Hard.*).

Equi-

Equiferus *Plin. hist. nat.* XXVIII *c.* 10 (*c.* 45 *Hard.*).
Ἵππος *Aelian. anim. III c.* 2. *IV c.* 6, 7, 8, 11.
Ἵππος *Oppian. cyneg. I*, 166.
Equus *Gesn. quadrup. p.* 442 *fig. p.* 443.
Equus *Schwenkf. theriotr. p.* 89.
Equus *Aldrov. solid. p.* 2 *fig. p.* 21.
Equus *Ionst. quadrup. p.* 1 *tab.* 1, 2, 3, 4.
Cheval sauvage *Marmol Afr. I p.* 51.
Roſs *Gesn. Thierb. p.* 306 *fig. p.* 307.
Equus *Charlet. exerc. p.* 3.
Equus *Wagn. Helvet. p.* 174.
Equus *Sibb. Scot. an. p.* 6.
Equus *Rai. syn. quadr. p.* 62.
Equiferus *Rzacz. Polon. p.* 217 *auct. p.* 310.
Equi *Rzacz. Polon. p.* 240 *auct. p.* 332.
Equus *Sloan. Iam. II p.* 327.
Equus cauda vndique setosa *Linn. syst nat.* 2 *p.* 48.
Equus cauda vndique setosa *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 12 *n.* 34.
Das Pferd *Meyer Thiere I tab.* 24.
Equus cauda vndique setosa *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 11 *n.* 1.
Equus domesticus *Klein. quadrup. p.* 4.
Equus cauda vndique setosa. The Equus, with the tail hairy all over: the Horse *Hill anim. p.* 570 *tab.* 28.
Le Cheval *Buff. hist. nat. IV p.* 174 *tab.* 1.
Le Cheval; Equus (. . . . .) auriculis breuibus erectis, iuba longa *Briss. regn. an. p.* 100 *n.* 1.
Equus cauda vndique setosa *Kram. Austr. p.* 317.
Equus cauda vndique setosa: the Horse *Brown. Iam. II p.* 487.
Equi feri *Hasselqu. Palaest. p.* 282.

Das

EQVI pedibus posticis calcitrant. Mares vtique mammas habent.

Das Pferd *Hall. vierf. p.* 227.

Equus (Caballus) cauda vndique ſetoſa *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 73 *n.* 1.

Cheval *Dictionn. anim. I p.* 583.

Hengſt: Paard met de Staart overal Hairig *Houtt. nat. hiſt. III p.* 333.

Equus (Caballus) cauda vndique ſetoſa *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 15 *n.* 47.

The Horſe *Penn. brit. zool. p.* 1 *n.* 1.

Heſte *Pontopp. Dan. I p.* 593.

Wild horſes *Bell trav. I p.* 212.

Cheval *Bom. dictionn. I p.* 542.

Equus (Caballus) cauda vndique ſetoſa *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 100 *n.* 1.

Tarpany *Rytſchk. Orenb. I p.* 233.

Equus Caballus *Forſter: Philoſ. transact. LVII p.* 345.

Wilde Pferde *S. G. Gmel. Reiſ. I p.* 44 *tab.* 9.

The Horſe *Penn. ſyn. quadr. p.* 1. *n.* 1.

Cavallo *Aleſſ. quadrup. II tab.* 51 fig. Buff.

Wilde Pferde *Pallas Reiſ. I p.* 211.

Das Pferd *Mart. Buff. vierf. I p.* 13.

Das barbariſche Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab.* 1.

Das ſpaniſche Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab.* 2.

Das engliſche Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab.* 3.

Das neapolitaniſche Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab.* 4.

Das frieſiſche Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab.* 5.

Das Pferd *Mart. Buff. vierf. I tab.* 6.

Der Hengſt *Müll. Naturſ. I p.* 446.

Equus (Caballus) cauda vndique ſetoſa *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 42.

Cavallo (*mas*); Cavalla (*femina*); Cavallo caſtrato (*caſtratus*); Polledro (*pullus*) *Italis.*

Cavallo, Caballo (*mas*); Yegua (*femina*); Caballo caſtrado (*caſtratus*); Potranca (*pullus triennis*); Potro (*pullus quadriennis*) *Hiſpanis.*

Cavallo (*mas*); Egoa (*femina*); Cavallo caſtrado (*caſtratus*) Faca, Faquinha (*pullus*) *Luſitanis.*

Cheval (*mas*); Cavale, Jument (*femina*); Cheval ongre (*caſtratus*); Poulain (*pullus*) *Gallis.*

March, Ceffyl (*mas*); Caſeg (*femina*); Diſpaiddfarch (*caſtratus*) *Cambrenſibus.*

Pferd, Roſs (*tota ſpecies*); Hengſt (*mas*); Stute, Stutte (*femina*); Wallach (*caſtratus*); Füllen (*pullus*) *Germanis.*

Paard, Paerdt (*tota ſpecies*); Hengſt (*mas*); Mere (*femina*) *Belgis.*

Horſe (*mas*); Mare (*femina*); Gelding (*caſtratus*); Colt (*pullus*) *Anglis.*

Heſt (*tota ſpecies*); Hingſt (*mas*); Hoppe (*femina*) *Danis et Noruegis.*

Häſt *Suecis.*

Koń *Polonis.*

Конь (Kon'), Лошадь (Loſchad') (*tota ſpecies*); Жеребецъ (Sherebetz) (*mas*); Кобыла (Kobyla) (*femina*); Меренъ (Meren), Волохъ (Woloch'), Кладенои конь (kladenoi kon') (*caſtratus*); Жеребенокъ (Sherebenok) (*pullus*) *Ruſſis.*

Alaſchàh (*tota ſpecies*); Aiger (*mas*); Baitàl, Bïä (*femina*); Tai (*pullus*) *Tataris.*

Imnä (*tota ſpecies*); ôſcha (*mas*); Wüllä (*femina*); Alaſchàh (*caſtratus*); Tſcháma (*pullus*) *Tſcheremiſſis.*

Ut (*tota ſpecies*); Irjä (*mas*); Kſrjäh (*femina*); Tichàh (*pullus*) *Tſchuwaſchis.*

Wal (*tota ſpecies*); Uloſchò (*mas*); ürwal (*femina*); Tſchúni (*pullus*) *Wotiakis.*

Uſchmäh (*tota ſpecies*); Aiger (*mas*); Eldä (*femina*); Parna, Wáſchina (*pullus*) *Morduanis.*

Wüll (*tota ſpecies*); Tſchan (*pullus*) *permice.*

Wöll (*tota ſpecies*); Wöll (*mas*); Kobüllà (*femina*); Uſch (*caſtratus*); Tſchan (*pullus*) *ſirjänice.*

Habitat ferus vtique circa Tanaïn et per omnem Tatariam magnam in deſertis gregatim: *hoſpitatur* hodie

hodie fere vbique; in America ignotus ante Hispanos. Ex mansueto ferus rursus factus reperitur hodie passim gregarius, mare aliquo duce, minor, vix domandus.

Animal generosum, superbum, fortissimum in currendo (visus qui cucurrit $82\frac{1}{2}$ ped. angl. in minuti secundi tempore), portando, trahendo; aptissimum equitando, cursu furens. Siluis delectatur. Posteriora curat; cauda Conopes Tabanosque abigit. Alterum scalpit. Pullum iniuriae obnoxium reponit; hinnitu socium vocat. Calcitrando pugnat; sudans se volutat. Vegetabilia edit Boue propius; semina disseminat; ventriculo exiguo, intestino colo coecoque maximo; stercus incalescit; cystide fellea caret; non vomit. Equuleus Hippomane natus pedibus elongatis. Laeditur globulo auris, acicula pedis, nasi capistro, dentibus sebo illitis, Padi herba, Phellandrii Curculione? Conope irritante. Edit impune Aconitum. Vtero gerit 290 diebus. Laniarios dentes anno quinto acquirit, primores mutat anno secundo, tertio, quarto. Caro Tataris esculenta.

Equus cornutus, monstrosus *Mus. Worm. p.* 341 *cum fig.*

* * *

Equus Hemionus, Mongolis Dshikketaei dictus *Pallas: Nou. comm. petrop. XIX p.* 394. †

Habitat ferus in Mongolia. Caro edulis Mongolis et Tungusis. Distinguit hunc doctiss. Pallas, sed nondum vidi tomum recentissimum operis.

* * *

Aſinus. 2. E. cauda extremitate ſetoſa, cruce nigra ſupra humeros.

ferus. α) *Ferus, cum ſynonymis ſpecie.*

Aſinus ſilueſtris *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 30 (*c.* 46 *Hard.*).

Onager *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 44 (*c.* 69 *Hard.*) *c.* 58 (*c.* 73 *Hard.*).

Onagrus, Onager ſiue Aſinus ſilueſtris *Geſn. quadrup. p.* 19.

Onager *Aldrov. ſolid. p.* 352.

Aſinus cornutus *Aldrov. ſolid. p.* 382 *fig. p.* 383 peſſima.

Onager *Ionſt. quadrup. p.* 20.

Onager, Waldeſel *Ionſt. quadrup. tab.* 7 *fig.* mala cornuta.

Onager Aldro: Waldeſel *Ionſt. quadrup. tab.* 8 fig. Aldrov.

L'Aſne ſauvage *Marmol Afr. I p.* 53.

Eſel *Geſn. Thierb. p.* 91 *cum fig.* mediocri.

Aſinus *Charlet. exerc. p* 4.

Onager *Rai. ſyn. quadr. p.* 63.

Equus cauda extrema ſetoſa *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 48.

Equus cauda extrema ſetoſa *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 11 *n.* 2.

Aſinus ſilueſtris, Aſiniferus, Onager *Kleii. quadrup. p.* 7.

Tſchigitai *I. G. Gmel. Sibir. II p.* 107?

Equus cauda extrema ſetoſa. The Equus, with the tail hairy at the end: the Aſs *Hill anim. p.* 570.

L'Aſne *Buff. hiſt. nat. IV p.* 377 *tab.* 11.

L'Ane ſauvage: Equus (Onager) auriculis longis, iuba breui, pelle tuberculis paruis ſcabra *Briſſ. regn. an. p.* 104 *n.* 5.

Der wilde Eſel, Waldeſel *Hall. vierf. p.* 252.

Equus (Aſinus) cauda extremitate ſetoſa, cruce nigra ſupra humeros *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 73 *n.* 2.

Ane ſauvage *Dictionn. anim. I p.* 122.

Ezel:

Ezel: Paard met de Staart aan 't end Hairig, een zwart Kruis boven op de Rug *Houtt. nat. hist. III p.* 385.

Wild Asses *Bell trav. I p.* 212.

Ane *Bom. dictionn. I p.* 113.

Equus (Asinus) cauda extremitate setosa, cruce nigra supra humeros *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 100 *n.* 2.

Kulany *Rytschk. Orenb. I p.* 233?

The Ass *Penn. syn. quadr. p.* 3 *n.* 3.

Der Esel *Mart. Buff. vers. I p.* 187 *tab.* 8.

Der Esel *Müll. Natursf. I p.* 453.

Онагрь (Onagr) *Russis.*

domesticus. β) *domesticus.*

Ovoς *Arist. hist. anim. I c.* 7 *n.* 63 *II c.* 18 *n.* 130. *V c.* 11 *n.* 130 *VI c.* 23 *n.* 335-351.

Asinus *Plin. hist. nat. VIII c.* 43 (*c.* 68 *Hard.*).

Asinus *Gesn. quadrup. p.* 3 *fig. p.* 4 bona.

Asinus *Schwenckf. theriotr. p.* 61.

Asinus *Aldrov. solid. p.* 295.

Asinus *Ionst. quadrup. p.* 16 *tab.* 6.

Asne *Tavern. voy. I p.* 344.

Asinus *Sibb. Scot. an. p.* 6.

L'Ane *Chardin voy. III p.* 33.

Asinus *Rai. syn. quadr. p.* 63.

Asinus *Sloan. Iam. II p.* 327.

Equus cauda extremo setosa *Linn. fn. suec.* I *p.* 12 *n.* 35.

Der Esel *Meyer Thiere II tab.* 44.

Asinus *Klein. quadrup. p.* 6.

L'Ane: Equus (Asinus) auriculis longis, flaccidis, iuba breui *Briss. regn. an. p.* 102 *n.* 3.

Equus cauda extrema setosa *Kram. Austr. p.* 318.

Equus cauda extrema setosa: the Ass *Brown. Iam. p.* 487.

Der Esel *Osb. Ostind. p.* 35.

Der Esel *Hall. vierf. p.* 247.
Ane *Dictionn. anim. I p.* 121.
The Ass *Penn. brit. zool. p.* 5 *n.* 3.
Ischaki oder Esel *Rytschk. Orenb. I p.* 230.
Asino *Aless. quadrup. II tab.* 52 fig. Buff.
Asino, Miccio (*mas*); Miccia (*femina*) *Italis.*
Asno, Borrico (*mas*); Borrica (*femina*) *Hispanis.*
Burro (*mas*); Asna, Burra (*femina*) *Lusitanis.*
Ane (*mas*); Anesse (*femina*) *Gallis.*
Asyn (*mas*); Asen (*femina*) *Cambrensibus.*
Esel (mas); Eselinn (*femina*) *Germanis.*
Eezel, Ezel *Belgis.*
Ass *Anglis.*
Asna *Suecis.*
Оселъ (Osel) (*mas*); Ослица (Oslitza) (*femina*) *Russis.*

Habitat in Tataria meridionali, gregarius, celerrimus; cultus degener hospitatur hinc inde: optimus in calidioribus. In Anglia non ante regnum Elisabethae reginae.

Minor Caballo. Capud grande. Labia crassa. Auriculae magnae flaccidae. Iuba breuis. Cauda longior quam Caballo, extremitate tantum pilosa. Color cinereus aut fuscus, linea dorsali nigra, nec non transuersali scapularum. Penis ingens.

Tardus incessuque piger, mansuetus stupidusque, rudens, libidinosus, frigoris impatiens; plagarum et penuriae tolerantissimus, laboriosissimusque. Non nisi assuetos potat fontes, in cibo minus delicatus est ipsisque spinis carduisque contentus. Parit post dies 290 vnicum, raro imo rarissime gemellum. Aetas ad annum trigesimum.

Mulus.

Mulus. γ) *Hybridus ex Asino et Equa.*

Ορευς *Arist. hist. anim. I c. 7 n. 63. II c. 5 n. 23. VI c. 24 n. 352-356.*

Mula, Mulus *Plin. hist. nat. VIII c. 44 (c. 69 Hard.). XI c. 37 (c. 74 Hard.).*

Mulus *Gesn. quadrup. p. 793 cum fig.* bona.

Mulus *Schwenckf. theriotr. p. 62.*

Mulus *Aldrov. solid. p. 358.*

Mulus *Ionst. quadrup. p. 21 tab. 6* fig. bon.

Maulesel *Gesn. Thierb. p. 108 cum fig.* bon.

Mulus *Charlet. exerc. p. 4.*

Mulus *Rai. syn. quadr. p. 64.*

Mulus *Sloan. Iam. II p. 327.*

Asinus biformis *Klein. quadrup. p. 6.*

Les grands mulets *Buff. hist. nat. IV p. 401.*

Le Mulet: Equus (Mulus) auriculis longis, erectis, iuba breui *Briss. regn. an. p. 103 n. 4.*

Die Maulesel *Osb. Ostind. p. 35.*

Der Maulesel *Hall. vierf. p. 251.*

Muilezel *Houtt. nat. hist. III p. 397.*

The Mule *Penn. brit. zool. p. 6.*

Mulet et Mule *Bom. dictionn. III p. 162.*

Mulus *Linn. syst. nat. 12, I p. 101 n. 2 β.*

The Mule *Penn. syn. quadr. p. 3.*

Die grossen Maulesel *Mart. Buff. vierf. I p. 223.*

Der Maulesel *Mart. Buff. vierf. I tab. 9.*

Das Maulthier, dessen Vater der Esel, und die Mutter ein Pferd ist *Müll. Natursf. I p. 455.*

Mula *Italis.*

Mulo, Mula, Macho, Azemila (*id est*: iumentum) *Hispanis. Patrem dicunt* Garañon.

Mu (*mas*); Mula (*femina*) *Lusitanis.*

Mulet, Mule *Gallis.*

Mul (*mas*); Mules (*femina*) *Cambrensibus.*

Maulthier, Maulesel *Germanis.*

Muyl, Muylezel *Belgis.*

Mule *Anglis.*

Mulåſna *Suecis.*
Лошакъ (Loſchak), Мулъ (Mul'), Мескъ (Meſk) *Ruſſis.*

Sterilis vti reliqua hybrida animalia, rariſſime tamen parere viſa eſt. Optimus mulus hiſpanicus eſt, maximus in Sabaudia.

Hinnus. δ) *Hybridus ex Equo et Aſina.*
Γιννος *Ariſt. hiſt. anim. I c. 7 n. 63.*
Mula, Hinnus *Plin. hiſt. nat. VIII c. 44 (c. 69 Hard.).*
Hinnus, Innus et Ginnus *Geſn. quadrup. p.* 18.
Hinnus *Aldrov. ſolid. p.* 358.
Hinnulus, Hinnus *Ionſt. quadrup. p.* 21.
Hinnus *Charlet. exerc. p.* 4.
Hinnus ſeu Hinnulus *Rai. ſyn. quadr. p.* 64.
Les petits mulets *Buff. hiſt. nat. IV p.* 401.
Hinnus *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 101 *n.* 2 *γ.*
Die kleinen Mauleſel *Mart. Buff. vierſ. I p.* 223.
Das Maulthier, deſſen Vater ein Pferd, und die Mutter ein Eſel iſt *Müll. Naturſ. I p.* 455.

Minus bonus Mulo. Minor, plerumque rubicundior, auriculis equi, iuba et cauda aſini.

Zebra. 3. E. faſciis fuſcis transuerſis.
Οναγρος *Oppian. cyneg. III,* 183.
The Zebra *Purch. Pilgr. II p.* 1001.
Zebra *Nieremb. hiſt. nat. p.* 168.
Zebra indica *Aldrov. ſolid. p.* 416 *fig. p.* 417 mala.
Zebra indica *Ionſt. quadrup. p.* 21.
Zebra indica, indianiſch Maulthier *Ionſt. quadrup. tab.* 5 fig. mala.
Equus indicus, indianiſch Pferd *Ionſt. quadrup. tab.* 5 fig. mala.
Aſne de beauté extraordinaire *Thevenot voy. II p.* 473.

India-

Indianisch Maulthier, eine Art Maulthier *Gesr. Thierb. p.* 120 *cum fig.* mala.
Zebra *Charlet. exerc. p.* 4.
Zecora *Ludolf. Aeth. I c.* 10 *n.* 35. *Comment. p.* 150 *cum fig.*
Zebra *Rai. syn. quadr. p.* 64.
Equus brasiliensis *Iacob. mus. reg. p.* 3 *tab.* 2 *fig.* 1 *Laur. mus. reg. tab.* 3 *fig.* 18 figg. capitis.
Une espece de fort beaux anes *Dampier voy. II p.* 250.
Zebra *Barbot Guin. p.* 486.
Wilder Esel *Kolbe Vorgeb. p.* 146 *tab.* 3 *fig.* 2 mediocr.
Zeura ou Zecora *Lobo Abiss. I p.* 291.
Equus lineis transuersis versicolor *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 48.
Equus lineis transuersis versicolor *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 11 *n.* 3.
Equus ferus, genere suo; Zebra, Zecora *Klein. quadrup. p.* 5.
Equus lineis transuersis versicolor. The transversely streaked Equus: the Zebra or wild Ass *Hill anim. p.* 571 *tab.* 28 fig. mala.
Le Zébre ou l'ane rayé: Equus (Zebra) auriculis breuibus erectis, iuba breui, lineis transuersis versicolor *Briss. regn. an. p.* 101 *n.* 2.
Das Zebra *Hall. vierf. p.* 245 *tab.* 1.
Equus (Zebra) fasciis fuscis versicolor *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 74 *n.* 3.
The Male Zebra *Edw. glean. I tab.* 222.
The Female Zebra *Edw. glean. I tab.* 223.
Ane sauvage du cap de bonne esperance *Dictionn. anim. I p.* 123.
Zebre au âne rayé *Dictionn. anim. IV p.* 587.
Paard met Streepen dwars ower 't Lyf, van gemengelde Kleur *Houtt. nat. hist. III p.* 400.
Le Zébre *Buff. hist. nat. XII p.* 1 *tab.* 1, 2.

Zebre ou âne rayé *Bomm. dictionn. IV p. 645.*
Equus (Zebra) fasciis fuscis versicolor *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 101 *n.* 3.
Africanisches Tygerpferd oder Eselpferd *Knorr delic. II tab. K*, 8 fig. mediocr.
The Zebra *Bancr. Guian. p.* 486.
The Zebra *Penn. syn. quadr. p.* 2 *n.* 2.
Zebra *Aless. quadrup. II tab.* 89 fig. Buff.
Der gestreifte Esel *Müll. Natursf. I p.* 456.
Zebra *Congensibus.*
Burro do Matto *Lusitanis.*

Maguitudo equi mediocris. Figura magis accedit ad asinum vel potius ad mulum quam ad equum: capite grandiore, rostro crasso, auriculis longis, erectis. Iuba colli breuis fastigiata. Color feminae albidus, maris rufescens, fasciis nigris digitos tres latis per totum corpus transuersis. Cauda Asini.

Habitat in Africae meridionali parte, praecipue ad promontorium bonae spei. Gregarius, celerrimus; malignus indocilisque.

25 CAMELVS.

Dentes Primores superiores nulli.
Inferiores VI spathiformes.
Laniarii distantes: superiores III; inferiores II.
Cornua nulla.
Labium superius fissum.
Pedes subdidactyli.

Dromedarius. 1. C. topho dorsi vnico.
Καμηλος αραβιος *Arist. hist. anim. II c.* 4 *n.* 17. *c.* 6 *n.* 26. *c.* 8 *n.* 42. *c.* 9 *n.* 50. *c.* 11 *n.* 62. *V c.* 2 *n.* 23.

n. 23. *c.* 13 *n.* 139. *VI c.* 26 *n.* 358. *VIII c.* 11 *n.* 115-117. *IX c.* 73 *n.* 496, 497.

Camelus Arabiae *Plin. hist. nat. VIII c.* 18 (*c.* 26 *Hard.*) *XI c.* 41 (*c.* 96 *Hard.*).

Camelus Dromas *Gesn. quadr. p.* 171 *fig. p.* 172.

Camelus Dromas *Alpin. Aeg. I p.* 223 *tab.* 12 fig. bon.

Camelus Dromedarius *Schwenckf. theriotr. p.* 73.

Camelus *Aldrov. bisulc. p.* 889.

Camelus bactrianus *Aldrov. bisulc. p.* 908 *fig.* mala.

Camehle *Olear. Reis. p.* 570.

Camelus *Ionst. quadrup. p.* 95 *tab.* 42, 44 figg. bonae; *tab.* 43 fig. mala.

Dromedarii *Ionst. quadrup. tab.* 41 figg. mediocr.

Les Chameaux *Boullaye voy. p.* 255.

Camells *Ligon Barbad. p.* 58.

Le Chameau *Marmol Afr. I p.* 48.

Dromedary, ein Art Kamelthier *Gesn. Thierb. p.* 234 *fig. p.* 235 mediocr.

Le Chameau *Perr. anim. I p.* 69 *tab.* 7 fig. bon.

Le Chameau *Tavern. voy. I p.* 106.

Comelus arabicus *Charlet. exerc. p.* 12.

Dromedarius *Charlet. exerc. p.* 13.

Le Chameau *Chardin voy. III p.* 37.

Camelus vnico in dorso gibbo seu Dromedarius *Rai. syn. quadr. p.* 143.

The Dromedary *Barbot Guin. p.* 53.

A Cabo verde Camel *Barbot Guin. tab. B.*

The Camel *Shaw trav. p.* 239.

The Maihary, Dromas or Dromedary *Shaw trav. p.* 240.

Camelus topho dorsi vnico *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 49.

The Camel *Pocock. orient. I p.* 207.

Camelus topho dorsi vnico *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 1.

Camelus, Imel, Arabicus *Klein. quadrup. p.* 42.

Camelus minimus; Dromedarius *Klein. quadrup. p.* 42.

Camelus

Camelus topho dorſi vnico. The Camelus, with a ſingle bunch on the back: the Dromedary *Hill anim. p.* 573 *tab.* 28 fig. mala.

Le Dromadaire: Camelus (Dromedarius) vnico in dorſō tubere *Briſſ. regn. an. p.* 55 *n.* 2.

Camelus topho dorſi vnico *Kram. Auſtr. p.* 318.

Camelus topho dorſi vnico, vertice glanduloſo: the Camel *Brown. Iam. p.* 488.

The Turkman Camel *Ruſſ. Alepp. p.* 56.

The Arab Camel *Ruſſ. Alepp. p.* 57.

The Dromedary *Ruſſ. Alepp. p.* 57.

Das Kameel *Haſſelqu. Palaeſt. p.* 281.

Der Dromedar *Hall. vierf. p.* 386 *tab.* 14.

Das kleine Poſtkameel mit kleinerm Haarſattel *Hall. vierf. p.* 388.

Camelus (Dromedarius) topho dorſi vnico *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 65 *n.* 1.

Dromadaire *Dictionn. anim. II p.* 57.

Kemel met ééne Bult op de Rug *Houtt. nat. hiſt. III p.* 11.

Dromadaire *Bom. dictionn. I p.* 471.

Camelus (Dromedarius) topho dorſi vnico *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p* 90 *n.* 1.

The Arabian Camel *Penn. ſyn. quadr. p.* 60 *n.* 50.

Dromedario *Aleſſ. quadrup. I tab.* 3 fig. Buff.

Das Kameel *Müll. Naturſ. I p.* 365.

Camelus vulgaris, Djämmel *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Camelus Dromedarius, Hadjîn *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Dromedario, Dromedal *Hiſpanis.*

Dromedario *Luſitanis.*

Dromedario *Italis.*

Le Dromadaire *Gallis.*

Dromedar *Germanis.*

Dromedary *Anglis.*

Верблюдъ скоро бѣгающїй (Werblud ſkoro begajuſczii) *Ruſſis.*

Egin *Mauris.*

Altitudo

Altitudo corporis $6\frac{1}{2}$ pedum. Caput paruum. Auriculae breues. Collum longum, gracile, curuatum, pilis longioribus. Tophus in dorſo vnicus, pilis longioribus veſtitus. Calli in pedibus anterioribus quatuor, in poſterioribus duo, in ſterno vnus. Cauda pedibus breuior. Pedes bifidi. Corpus pilis mollioribus veſtitum. Color ex rufo cinereus, in topho obſcurior. Ventriculus ſecundus celluloſus pro aqua pura diutius aſſeruanda in ſiticuloſis deſertis. Os et gingiuae mira cartilagine inductae, ne noceant ſpinae plantarum deſerti, quae omnes fere armatae ſunt, quasque cetera animantia horrent, quarum vero heluo Camelus eſt.

Habitat ferus in deſertis Aſiae temperatae; cultus in Oriente, vtiliſſimus pro itineribus in deſertis arenoſis ſiticuloſis. Introductus quoque in inſulas Iamaicam et Barbados, at male cultus.

Portat ad 1200 libras. Lente feſtinat, nec vltra adſuetum procedit ſpatium, nec plus inſtituto onere recipit; laſſus iacet ſupra pectus. Famem fert patientiſſime, potuque caret facile per dies plures. Mitis, excepto oeſtri tempore, vbi furit. Amat muſicam. Caro vitulorum Arabibus in deliciis eſt.

Varietates plures propriis diſtinctae nominibus in terris orientalibus: portant aliae onera, aliae intineribus velocioribus deſtinantur. Raguahil, ſiue Elmahari Arabum per nouem dies quotidie currit vltra milliaria viginti germanica.

bactrianus. 2. C. tophis dorſi duobus.

Καμηλος βακτριανὸς *Ariſt. hiſt. anim. II c. 3 n. 17. c. 6 n. 26.*

Camelus Bactriae *Plin. hiſt. nat. VIII c. 18 (c. 26 Hard.).*

Καμηλος

Καμηλος *Aelian. anim.* III *c.* 47. IV *c.* 55. VI *c.* 60. X *c.* 3.

Καμηλος *Oppian. cyneg.* III, 482.

Camelus *Geſn. quadrup. p.* 162 *fig. p.* 163 bon.

Camelus *Schwenkf. theriotr. p.* 72.

Camelus turcicus *Alpin. Aeg.* I *p.* 223 *tab.* 13 fig. mediocr.

Camelus *Aldrov. biſulc. p.* 889.

Arabes Cameli *Aldrov. biſulc. p.* 907 *fig.* mala.

Dromedarii *Olear. Reiſ. p.* 570.

Cameli bactriani *Ionſt. quadrup. p.* 97.

Dromedarii *Ionſt. quadrup. tab.* 42 fig. mediocr.

Camelus bactrianus ſeu Dromedarius *Ionſt. quadrup. tab.* 43 fig. mala.

Dromedarius *Ionſt. quadrup. tab.* 44 fig. mediocr.

Kamelthier *Geſn. Thierb. p.* 231 *fig. p.* 232 mediocr.

Camelus bactrianus *Charlet. exerc. p.* 13.

Camelus duobus in dorſo tuberibus, ſeu Bactrianus *Rai. ſyn. quadr. p.* 145.

Camelus tophis dorſi duobus *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.

Camelus tophis dorſi duobus *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 2.

Camelus, Beſchet; Bactrianus fortiſſimus *Klein. quadrup. p.* 41.

Camelus tophis dorſi duobus. The Camelus, with two bunches on the back: the Bactrian Camel *Hill anim. p.* 574 *tab.* 28 fig. mediocr.

Le Chameau: Camelus (. . . . . .) duobus in dorſo tuberibus *Briſſ. regn. an. p.* 53 *n.* 1.

Camelus tophis dorſi duobus *Kram. Auſtr. p.* 318.

The Camel with two bunches on its back *Ruſſ. Alepp. p.* 57.

Das baktrianiſche Kameel *Hall. vierſ. p.* 384.

Camelus (Bactrianus) tophis dorſi duobus *Linn. ſyſt. nat.* 10, I *p.* 65 *n.* 2.

Chameau *Dictionn. anim.* I *p.* 478.

Kemel

Pallas [illegible] II. p. 461 [illegible]

Kemel met twee Bulten op de Rug *Houtt. nat. hist.* *III p.* 22.

Le Chameau *Buff. hist. nat. XI p.* 211, 426 *tab.* 22.

Chameau *Bom. dictionn. I p.* 471.

Camelus (bactrianus) tophis dorsi duobus *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 90 *n.* 2.

Trampelthier oder Dromedar *Knorr delic. II tab. K,* 6 fig. medioer.

Camelus Bactrianus *Forster: Philos. transact. LVII p.* 343.

The bactrian Camel *Penn. syn. quadr. p.* 63 *n.* 51.

Camello *Alessi. quadrup. I tab.* 19 fig. Buff.

Kamele *Pallas Reis. I p.* 397.

Der Dromedar *Müll. Naturs. I p.* 369.

Camelus Bactrianus, Bócht *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Camello *Italis.*

Camello *Hispanis.*

Camello *Lusitanis.*

Chameau *Gallis.*

Kameel *Germanis.*

Kemel *Belgis.*

Camel *Anglis.*

Верблюдъ (Werblu͠d) *Russis.*

Düä *Tataris.*

Tüè *Tscheremissis.*

Tüä *Tschuwaschis.*

Duì *Wotiakis.*

Ischim, Werblu͠d *Morduanis.*

Similis praecedenti, iungitque vtrosque Buffonius. Hic autem maior, tophisque dorsi duobus, postico maiore. Calli vti in Dromedario. Praeputium longissimum retro versum.

Habitat ferus in India boreali et versus Sinense imperium in desertis. Cultus in Oriente rarior occurrit.

Mores

Mores Dromedarii, vſusque iidem. Coit difficillime, Februario menſe. Ventrem fert menſes duodecim, paritque vnicum, quem lactat per duo annos. Adoleſcit anno tertio. Buxo occiditur.

Sunt quoque *hybridi Cameli* huius et praecedentis.

Llama. 3. C. dorſo laeui, topho pectorali.

Pelon Ichiatl Oquitli Ouis peruana *Hernand. Mex. p.* 660 *cum fig.* mala.
Peruichcatl *Fernand. anim. p.* 11.
Llama *Laet Amer. p.* 405.
Guanaco ſiue Huanacu *Laet Amer. p.* 406.
Aries Moromorus *Nieremb. hiſt. nat. p.* 182 fig. mala.
Sheep *Ovalle Chile p.* 44.
Guanaco's, wild Goats *Ovalle Chile p.* 44.
Ελαφοκαμηλος *Marcgr. Braſil. p.* 243 *cum fig.* bon.
Ελαφοκαμηλος *Marcgr. de Chili regn. p.* 38 *cum fig.* eadem.
Ouis peruana *Ionſt. quadrup. tab.* 46 fig.
Ceruo-camelus *Ionſt. quadrup. tab.* 29 fig.
Hirſchkamel *Geſn. Thierb. p.* 239 *cum fig.* Marcgr.
Ouis peruana *Charlet. exerc. p.* 9.
Camelus peruuianus Glama dictus *Rai. ſyn. quadr. p.* 145.
Sheep of Peru *Cieza Peru p.* 232.
Guanacos *Cieza Peru p.* 233.
Moutons *Feuill. Iourn. III p.* 23.
Moutons de Perou *Frezier voy. I p.* 264 *tab.* 22 *fig. A* bona.
Camelus dorſo laeui, pectore gibboſo *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.
Camelus dorſo laeui, pectore gibboſo *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 3.
Llama *Ulloa voy. I p.* 365 *tab.* 24 *fig.* 5 mediocr.
Le Guanaco *Ulloa voy. I p.* 366.
Huanaco, Taruga *Ulloa voy. I tab.* 24 *fig.* 5 mediocr.

Matthioli, epistolar. p. 211. ed. Basil. 1674. c. fig. bona.

Camelus

Amida ap. Ulr. Schmidel Straubingensem p. 72 ed. Norimberg 1602. 4.

Camelus fpurius, Peruanus, Glama dictus *Klein. quadrup. p.* 42.

Camelus dorfo laeui, pectore gibbofo. The Camel, with the back even, and the breaft gibbofe: the Glama *Hill anim. p.* 574.

Le Chameau du Perou: Camelus (Peruanus) pilis breuiffimis veftitus *Briff. regn. an. p.* 56 *n.* 3.

Die Kameelsziege *Hall. vierf. p.* 309.

Camelus (Glama) dorfo laeui, topho pectorali *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 65 *n.* 3.

Glama *Dictionn. anim. II p.* 267.

Guanaco *Dictionn. anim. II p.* 356.

Peruviaanfche Kemel: Kemel met een gelyke Rug en een Bult aan de Borft *Houtt. nat. hift. III p.* 26.

Glama *Bom. dictionn. II p.* 327.

Guianacoes *Bom. dictionn. II p.* 410.

Le Lama *Buff. hift. nat. XIII p.* 16.

Camelus (Glama) corpore laeui, topho pectorali *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 91 *n.* 3.

The Llama *Penn fyn. quadrup. p.* 64 *n.* 52.

Das Guianicoe *Hawkesw. Secreif. I p.* 148 *cum fig. bon.*

Das peruvianifche Schaafkameel *Müll. Naturf. I p.* 371.

Das Schafdromedar: Camelus Guanicoe *Müll. Naturf. Suppl. p.* 50.

Llama (*femina*); Urco (*mas*) *Peruanis.*

Chillehueque *Chilienfibus.*

Carnero de la tierra *Hifpanis.*

Longitudo corporis 6 pedum; altitudo 4 - 4½ ped. Caput paruum. Oculi magni, nigri. Auriculae erectae, antrorfum verfae. Collum longum arcuatum. Corpus absque lana, pilis tectum, longioribus in feris, breuibus in manfuetis. Cauda breuis. Tophus fub pectore liquorem fecernens (an fic natura aut morbo?)

bo?) Color subflauus, in ventre albicans: mansuetus albo, nigro, fuscoque variegatus.

Habitat in montibus altioribus regni Peruani, sub nomine Guanico s. Guanaco, celerrimus, gregarius: cultus Llama audit.

Frigoris impatiens. Mitis, portat ad 150 libras, sat lente, ad milliaria germanica tria quotidie per dies tres aut quatuor, tunc autem quiescit per diem vnum. Fatigatus succumbit; obstinatus compressis testiculis compellitur; vomitu siue saliua ad passus decem eiecta corrosiua hostem pellit. Sitim fert ad dies quatuor aut quinque, neque cibo delicatus est. Caro sapore veruecinae, haud bona. Salax; coit difficillime: diem consumit antequam actum ipsum venereum incipiat et absoluat. Parit vnicum vel gemellos. Adolescit anno tertio. Pili lanae loco inseruiunt.

Pacos. 4. C. tophis nullis, corpore lanato.

Alia species Pacos dicta *Hernand. Mex. p.* 663.
Paco *Laet Amer. p.* 405.
Vicunna *Laet Amer. p.* 406.
Vicuna *Nieremb. hist. nat. p.* 184 *fig. p.* 185 pessima.
Ouis chilensis *Marcgr. Brasil. p.* 244 *cum fig.*
Oui-Camelus *Marcgr. de Chili reg. p.* 37 *cum fig.*
Veruex alius peregrinus *Ionst. quadrup. tab.* 23 fig. bona exceptis pedibus anticis.
Camelus seu Camelo congener Peruuianum lanigerum Pacos dictum *Rai. syn. quadr. p.* 147.
Vicunnas *Cieza Peru p.* 233.
Les Vicognes ou Vicuñas *Frezier voy. I p.* 266.
Alpaque *Frezier voy. I p.* 267.
Camelus gibbis nullis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 49.
Camelus gibbis nullis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 4.
Vicunna *Ulloa voy. I p.* 506, 525 *tab.* 24 *fig.* 3 mala.

Camelus

Camelus laniger, peruanus, Pacos *Klein. quadrup. p.* 42.

Camelus gibbis nullis. The Camel, without any gibbosity *Hill anim. p.* 575 *tab.* 28 fig. bona.

La Vigogne: Camelus (. . . .) pilis prolixis toto corpore vestitus *Briss. regn. an. p.* 57 *n.* 4.

Das Peruanische Schaafkameel *Hall. vierf. p.* 389 confundit tamen cum antecedente.

Camelus (Pacos) tophis nullis corpore lanato *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 66 *n.* 4.

Paco *Dictionn. anim. III p.* 313.

Vigogne *Dictionn. anim. IV p.* 526.

Schaap van Chili: Kemel zonder Bulten, het Lighaam met Wol bekleed *Houtt. nat. hist. III p.* 28.

Vigogne ou Vicogne *Bom. dictionn. IV p.* 597.

Le Paco *Buff. hist. nat. XIII p.* 16.

Camelus (Pacos) tophis nullis, corpore lanato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 91 *n.* 4.

The Pacos *Penn. syn. quadr. p.* 66 *n.* 53.

Das Chilische Schaafkameel *Müll. Naturs. I p.* 372.

Minor praecedente. Caput et auriculae minores. Corpus totum lana mollissima praestantissimaque vestitum, colore profunde purpureo, subtus album. Mansuetus variegatus colore nigro, albo, rufoque, atque minor est.

Habitat in montibus altioribus regni Peruani, gregarius. Timidus celerrimusque. Non portat vltra 50-70 libras. Bezoar quoque est ex huius ventriculo. Caro minus bona. Adstupet funi cum alligatis panniculis.

 26. BOS.

26. BOS.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.
Laniarii nulli.
Cornua concaua, antrorſum verſa, lunata, laeuia.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

Taurus. 1. B. cornibus teretibus extrorſum curuatis, palearibus laxis.

Vrus. α) *Ferus, cum ſynonymis totius ſpeciei.*

Βους *Ariſt. hiſt. anim. V c.* 11 *n.* 131. *VI c.* 17 *n.* 215-218. *c.* 21 *n.* 292-307. *VIII c.* 10 *n.* 110-113. *IX c.* 5 *n.* 76, 77.

Vri *Caeſ. Gall. VI c.* 28.

Bos ferus *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 15 (*c.* 15 *Hard.*).

Βους *Aelian. anim. IV c.* 35. *XII c.* 19, 20.

Ταυρος *Oppian. cyneg. II,* 43.

Vrus *Geſn. quadrup. p.* 157 *cum fig.*

Vrus *Aldrov. biſulc. p.* 347 *fig. p.* 348.

Vrus *Ionſt. quadrup. p.* 50.

Vrus Awerochs *Ionſt. quadrup. tab.* 20.

Biſon wilder Ochs Wiſent *Ionſt. quadrup. tab.* 16?

Biſon magnus *Ionſt. quadrup. tab.* 17?

Vrus iubatus gewohnter Awerochs *Ionſt. quadrup. tab.* 19?

Auwerochs oder Uriſtier *Geſn. Thierb. p.* 299 *cum fig.* mediocr.

Bos ſilueſtris *Charlet. exerc. p.* 8.

Vrus

BOVES cornu feriunt; paſcua depreſſa amant.

Vrus, Germanis Urochs ſeu Aurochs *Rai. ſyn. quadr. p.* 70.

Vrus, Bos ſiluaticus *Rzacz. Polon. p.* 228 *auct. p.* 323.

Bos cornibus teretibus flexis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 51.

Bos cornibus teretibus flexis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 1.

Vrus, Biſon; Urochs, Auer-Ochs α) europaeus *Klein. quadrup. p.* 11.

Bos cornubus teretibus flexis. The Bos, with cylindric, crooked horns: the Bull *Hill anim. p.* 583.

L'Aurochs: Bos (Vrus) cornibus craſſis, breuibus, ſurſum reflexis, fronte criſpa *Briſſ. regn. an. p.* 80 *n.* 3.

Der Auerochs *Hall. vierf. p.* 280.

Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorſum curuatis, palearibus laxis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 71 *n.* 1.

Aurochs *Dictionn. anim. I p.* 185.

Urus *Dictionn. anim. IV p.* 568.

Stier: Koe met de Hoornen kegelrond, naar buiten gekromd, en ruime Keelkwabben of Koſſems *Houtt. nat. hiſt. III p.* 270.

The Urus or uhr-ox *Bell trav. I p.* 211.

L'Aurochs *Buff. hiſt. nat. XI p.* 284.

Aurochs *Bom. dictionn. I p.* 207.

Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorſum curuatis, palearibus laxis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 98 *n.* 1.

Bos Taurus *Forſter: Philoſ. transact. LVII p.* 345.

The Bull *Penn. ſyn. quadrup. p.* 4 *n.* 4.

Der Stier *Müll. Naturſ. I* p. 432.

Urochs, Auerochs *Germanis.*

BOVIS difficile genus, in quo vix certis limitibus circumſcriptae ſpecies. Definitu autem difficillima ſunt omnia animalia domeſtica et culta prae reliquis, quod et in Ouis et Caprae genere apparet, vbi facile varietates vnius eiusdemque ſpeciei pro diuerſis ſpeciebus habentur, et vice verſa.

Tur, Wol dziki *Polonis.*
Буйволъ (Buiwol), Буйлъ (Buil'), Лѣсный быкъ (Le'snyi byk) *Russis.*

domesticus. β) *Mansuetus, cultus.*
Bos, Taurus *Plin. hist. nat. VIII c.* 45, 46 (*c.* 70, 71 *Hard.*).
Bos *Gesn. quadrup. p.* 24 *cum fig.*
Vacca *Gesn. quadrup.* 25 *cum fig.*
Taurus *Gesn. quadrup. p.* 103 *cum fig.*
Vitulus *Gesn. quadrup. p.* 124.
Bos *Schwenckf. theriotr. p.* 63.
Taurus *Schwenckf. theriotr. p.* 63.
Vacca *Schwenckf. theriotr. p.* 65.
Vitulus *Schwenckf. theriotr. p.* 70.
Bos *Aldrov. bisulc. p.* 13 *fig. p.* 36.
Bos domesticus *Ionst. quadrup p.* 36, *tab.* 14.
Taurus castratus Bos Verschnittener Ochs *Ionst. quadrup. tab.* 13.
Taurus Ochs *Ionst. quadrup. tab.* 15.
Kuh und Kalb *Ionst. quadrup. tab.* 13.
Bos Stier junger Ochs *Ionst. quadrup. tab.* 15.
Vitulus Kalb *Ionst. quadrup. tab.* 15.
Ochs, Kuh *Gesn. Thierb. p.* 277 *cum figg.*
Stier *Gesn. Thierb. p.* 291 *cum fig.*
Kalb *Gesn. Thierb. p.* 294 *cum fig.*
Bos domesticus *Charlet. exerc. p.* 8.
Bos, Taurus, Vacca *Wagn. Heluet. p.* 167.
Bos *Sibb. Scot. an. p.* 7.
Bos domesticus *Rai. syn. quadr. p.* 70.
Boues *Rzacz. Polon. p.* 237 *auct. p.* 329.
Taurus *Sloan. Iam. II p.* 327.
Bos cornibus teretibus flexis *Linn. fn. succ.* I *p.* 15 *n.* 44.
Der Ochs *Meyer Thiere tab.* 41.
Der Stier *Meyer Thiere tab.* 42.

Taurus

Taurus domesticus cum Vacca *Klein. quadrup. p.* 10.
Le Boeuf *Buff. hist. nat. IV p.* 437 *tab.* 14.
Bos (domesticus) cornibus teretibus inflexis *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 12.
Le Boeuf domestique: Bos (domesticus) cornibus laeuibus teretibus, rursum reflexis *Briss. regn. an. p.* 78 *n.* 1.
Bos cornibus teretibus flexis *Kram. Austr. p.* 322.
Bos cornibus teretibus arcuatis: the Bull and Cow *Brown. Iam. p.* 488.
Der zahme Ochs *Hall. vierf. p.* 260.
Boeuf *Dictionn. anim. I p.* 303.
Taureau *Dictionn. anim. IV p.* 292.
Vache *Dictionn. anim. IV p.* 437.
Veau *Dictionn. anim. IV p.* 471.
Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorsum curuatis, paleanibus laxis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 15 *n.* 46.
The Ox *Penn. brit. zool. p.* 7.
Oxe, Koe *Pontopp. Dan. I p.* 597.
Bakeleys *Bom. dictionn I p.* 221?
Taureau *Bom. dictionn. IV p.* 306.
Bue *Aless. quadrup. II tab.* 53 fig. Buff.
Der Ochse *Mart. Buff. vierf. I p.* 232 *tab.* 10.
Die Kuh und das Kalb *Mart. Buff. vierf. I tab.* 11.
Der Mastochse *Müll. Naturs. Suppl. p.* 57.
Bos (Taurus) cornibus teretibus extrorsum curuatis, palearibus laxis *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 41.
Toro (*mas*); Bue (*castratus*); Vacca (*femina*); Vitello (*vitulus*) *Italis.*
Toro (*mas*); Buey (*castratus*); Vaca (*femina*); Ternera (*vitulus*) *Hispanis.*
Touro (*mas*); Boy (*castratus*); Vaca (*femina*); Vitela (*vitulus*) *Lusitanis.*
Taureau (*mas*); boeuf (*castratus*); vache (*femina*); veau (*vitulus*) *Gallis.*
Tarw (*mas*); Ych, Eidion (*castratus*); Buwch (*femina*); Llo (*vitulus*) *Cambrensibus.*

Stier (*mas*); Ochſe, Rind (*caſtratus*); Kuh (*femina*); Kalb (*vitulus*) *Germanis*.

Stier (*mas*); Os (*caſtratus*); Koe (*femina*); Kalf (*vitulus*) *Belgis*.

Bull, Steer (*mas*); Ox (*caſtratus*); Cow (*femina*); Haifer (*femina iunior*); Calf (*vitulus*) *Anglis*.

Tyr, Oxe (*mas*); Nöd (*caſtratus*); Koe (*femina*) *Danis*.

Tiur (*mas*) Nöt (*caſtratus*); Ko (*femina*); Kalf (*vitulus*) *Suecis*.

Wol *Polonis*.

Быкъ (Byk) (*mas*); Волъ (Wol) (*caſtratus*); Корова (Korowa) (*femina*); Теля (Telja) (*vitulus*) *Ruſſis*.

Юнецъ (Iunetz), Телецъ (Teletz) (*bos iunior*); Телица (Telitza), Телушка (Teluſchka), Юница (Iunitza) (*vacca iunior*) *ſlauonice*.

Uggus (*mas*); Sir (*femina*); Buſaù (*vitulus*) *Tataris*.

üſchküſch (*mas*); üſchkàl (*femina*); Prjéſe (*vitulus*) *Tſcheremiſſis*.

Wukor (*mas*); Inè (*femina*); Perù (*vitulus*) *Tſchuwaſchis*.

Oſch (*mas*); Iskàl (*femina*); Kunjan (*vitulus*) *Wotiakis*.

Búka (*mas*); ìkal (*femina*); Wâs (*vitulus*) *Morduanis*.

Müſs (*femina*); Kukan (*vitulus*) *Permice*.

öſch (*mas*); Mos, Möſs (*femina*); Kukan (*vitulus*) Sirjänice.

Animal notiſſimae figurae.

Habitat ferus in Poloniae, Lithuaniae, Pruſſiae Sibiriaeque orientalis depreſſis graminoſis; olim et in Germania, Scotia. Manſuetus minor cornibus maioribus hoſpitatur vbique. Maximus in Holſatia, Belgio atque Polonia, minimus in Scotia boreali, ſaepeque ibi ecornis in vtroque ſexu. Varietas

tas alia maior ecornis paſſim in Anglia occurrit, e Polonia oriunda: ecornis quoque in Islandia.

Laeditur a Cicuta, Aconito, Anemone. Vterum fert nouem menſibus. Viuit ad annos 14-15. Primo vitulus eſt et vitula, dein iuuencus et iuuenca, porro taurus et vacca. Sterilis vacca taura eſt, praegnans horda.

Fronte torua, criſpa validaque, praecipue valet colli et capitis robore. Animoſus, iracundus, furibundus cornibus hoſtem petit.

Iumarius hybridus ex equa vel aſina et tauro omnino fabuloſus eſt:

Peculiare quoddam mulorum genus, Iumar *Geſn. quadrup. p.* 19.

Muli vel inni genus ex aſina et tauro *Geſn. quadrup. p.* 106.

Quartum muli genus *Geſn. quadrup. p.* 799.

Jumar *Aldrov. ſolid. p.* 358.

Hippobus vel Hippotaurus *Wagn. Heluet. p.* 188.

The Kumrah *Shaw trav. p.* 239 (ex aſino et vacca).

Iumar *Bom. dictionn. II p.* 611.

Iumarra *Houtt. nat. hiſt. nat. III p.* 400.

Ochſeneſel oder Ochſenpferd *Müll. Naturſ. I p.* 455.

Maulochſen, Onotauri, Iumars, Gemars *Mart. Buff. vierf. I p.* 224.

Iumarus *Blumenb. gen. hum. var. p.* 13.

Bonaſus. 2. B. cornibus deorſum inflexis, iuba longiſſima.

Βονασσος *Ariſt. hiſt. anim. II c.* 5 *n.* 23. *c.* 7 *n.* 31. *IX c.* 71 *n.* 476-489.

Bonaſus *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 15 (*c.* 16 *Hard.*).

Μονωψ *Aelian. anim. VII c.* 3?

Bonaſus *Geſn. quadrup. p.* 145 *cum fig.* capitis.

Bonasus *Aldrov bisulc. p.* 358 *fig. p.* 361 capit. Gesneri.
Bonasus *Ionst. quadrup. p.* 51.
Bonasus Munitier. Wild Ochsengeschlecht *Ionst. quadrup. tab.* 18.
Bonasus alius *Ionst. quadrup. tab.* 19.
Munistier, oder Mänentier *Gesn. Thierb. p.* 297 *cum fig.* cap.
Bonasus *Charlet. exerc. p.* 8.
Bonasus *Rai. syn. quadr. p.* 71.
Bos iuba longissima, cornibus in se flexis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 51.
Bos iuba longissima, cornibus in se flexis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 2.
Bos iuba longissima, cornubus inflexis. The Bos, with a very long mane, and bent horns: the Bonasus *Hill anim. p.* 583 *tab.* 28 fig. mala.
Le Boeuf sauvage: Bos (Bonasus) cornibus deorsum inflexis, iuba supra collum longissima *Briss. regn. an. p.* 84 *n.* 8.
Bos iuba longissima, cornibus in se flexis *Kram. Austr. p.* 322.
Bos (Bonasus) cornibus in se flexis, iuba longissima *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 71 *n.* 2.
Bonasus *Dictionn. anim. I p.* 318.
Koe met de Hoornen naar elkander geboogen en zeer lange Maanen *Houtt. nat. hist. III p.* 322.
Le Bonasus *Buff. hist. nat. XI p.* 284.
Bos (Bonasus) cornibus in se flexis, iuba longissima *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 99 *n.* 2.
Afrikanischer wilder Ochs *Müll. Naturs. I p.* 437.

A Tauro differt corpore tumidiore, iuba colli frontisque longissima, cornuumque flexura propria. Cornua nigra, splendentia. Cauda breuis.

Habitat in Africa et Asia.

Defen-

Defendit se stercore ad aliquot passus deiecto, comburente.

Bison. 3. B. cornibus diuaricatis, iuba longissima, dorso gibboso.

Iubatus Bison *Plin. hist. nat. VIII c. 15 (c. 15 Hard.).*
Ριστωνες *Oppian. cyneg. II, 159.*
Taurus mexicanus *Hernand. Mex. p. 587 cum fig.* mediocr.
Tauri vaccaeque Quiuirae regionis *Fernand. anim. p.* 10.
Bison *Gesn. quadrup. p. 143.*
The bunchbaked Oxen *Purch. Pilgr. IV p. 1561.*
Armenta *Laet Amer. p. 303 cum fig.* Hernand.
Taurus Quiuirensis *Nieremb. hist. nat. p. 181 fig.* Hernand.
Tauri noui orbis *Nieremb. hist. nat. p. 182.*
Bison *Aldrov. bisulc. p. 353 figg. p.* 355, 356 mediocr.
Bison albus scoticus seu Calydonius *Aldrov. bisulc. p. 357.*
Bison *Ionst. quadrup. p. 51.*
Bison iubatus *Ionst. quadrup. tab. 17* fig. mediocr.
Locobardus Bison *Ionst. quadrup. tab. 17* fig. mala.
Bison wilder Ochs Wisent *Ionst. quadrup. tab. 16* fig. mal.
Bisons magnus *Ionst. quadrup. tab. 17* fig. mal.
Vrus iubatus gewohnter Awerochs *Ionst. quadrup. tab. 19* fig. mala.
Wysent *Gesn. Thierb. p. 296 fig.* mediocr.
Indianischer Ochs *Gesn. Thierb. p. 301 cum fig.* mal.
Bison iubatus *Charlet. exerc. p. 8.*
Bison scoticus *Sibb. Scot. an. p. 7.*
Bison *Rai. syn. quadr. p. 71.*
The Buffelo *Lawson Carolin. p. 115 cum fig.* mediocr.
Bison *Rzacz. Polon. p. 214.*

n. de Herberstein comm. de rebus moscoviticis. Bas. 1556. fol. p. 112 c. fig. satis bona
ennenberger Erclerung der Preuss. Landtaffel. Königsb. 1595. f. p. 250. ic.
ne. Lopez de Gomara historia general de las Indias. ed.
cip. Çaragoça 1553. fol. pag. cxvi. b c. fig. mediocr.
las vacas corcobadas que ay en Quivira.

The

The Buffalo *Catesb. Carol. app. p. XXVII fig. app. tab.* 20.

The Buffelo, or wild Beef *Brick. North-Carol. p.* 107 *cum fig.* mala.

Bos iuba longissima, dorso gibboso *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 51.

Le Boeuf du Canada *Charlev. nouv. Fr. III p.* 131.

Le Boeuf musqué *Charlev. nouv. Fr. III p.* 131.

The Musk Ox *Dobbs Hudſ. p.* 18, 25.

The American Oxen or Beeves *Dobbs Hudſ. p.* 41.

Bos iuba longissima, dorso gibboso *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 3.

Vrus, Bison β) indicus, Bison Catesbeji *Klein. quadrup. p.* 13.

Bos iuba longissima, dorso gibboso. The Bos, with a very long mane, and a gibbose back: the Bison *Hill anim. p.* 584.

Wilde Ochsen und Kühe *Kalm Amer. II p.* 350, 425 *III p.* 351.

Le Bison blanc: Bos (Bison albus) cornibus sursum reflexis, iuba longissima *Briss. regn. an. p.* 82 *n.* 5.

Le Bison: Bos (Bison) cornibus sursum reflexis, dorso gibboso, iuba barbaque longissima *Briss. regn. an. p.* 82 *n.* 6.

Le Bison d'Amerique: Bos (Bison Americanus) cornibus sursum reflexis, dorso gibboso, capite pilis longissimis obsito *Briss. regn. an. p.* 83 *n.* 7.

Der Amerikanische Auerochs *Hall. vierf. p.* 281.

Bos (Bison) cornibus diuaricatis, iuba longissima, dorso gibboso *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 72 *n.* 3.

Boeuf sauvage *Du Pratz Louiſ. II p.* 66 *cum fig.* mediocr.

Bison *Dictionn. anim. I p.* 289.

Koe met van elkander wykende Hoornen, zeer lange Maanen en een bult op de Rug *Houtt. nat. hist. III p.* 324.

Le Bison *Buff. hist. nat. XI p.* 284.

Le boeuf ou taureau sauvage. Hennepin nouvelle decouvert p. 187. icon el

Biſon *Bom. dictionn.* I *p.* 288.
Bos (Biſon) cornibus diuaricatis, iuba longiſſima, dorſo gibboſo *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 99 *n.* 3.
The American Bull *Penn. ſyn. quadrup. p.* 8 *n.* 6 *tab.* 2 *fig.* 2.
Biſon giubato *Aleſſ. quadrup. I tab.* 12.
Der Biſon *Müll. Naturſ. I p.* 439.
Biſon oder der Buckelochſe *Titius: Berl. Samml. V p.* 36 *cum fig.*
Wiſent *olim Germanis.*
Zubr *Polonis.*

Magnitudo Tauri maioris, at cornibus ampliſſimis, barba longiſſima, fronte, collo pectoreque vndique Vrſi inſtar hirſutis, dorſo gibbo, cruribus breuibus, craſſis, cauda nuda apice floccoſa. Color ex fuſco nigricans. Hieme totus pilis longioribus tectus eſt, aeſtate cute nuda, nigra, rugoſa, exceptis anterioribus partibus, quae ſemper villoſae.

Habitat in borealibus incultis Europae Americaeque. Amat loca vliginoſa. Gregarius, ferox, manſueſcit tamen. Caro odore moſchi, melior tamen bouina, praecipue ex dorſi tubere deſumta. Pedibus ſternit hoſtem.

Coire hunc cum Tauro Pennantus, eiusdemque eſſe ſpeciei Buffonius.

grunniens. 4. B. cornibus teretibus introrſum curuatis, vellere propendente, cauda vndique iubata.
Vacca grunniens, villoſa, cauda equina *I. G. Gmelin: Nou. comm. petrop. V p.* 339 *tab.* 7.
Another ſpecies of oxen, called bubuls by the Tartars *Bell trav. I p.* 212.

...eliani H. A. l. XV. c. 14.

Bos

Bos (grunniens) cornibus teretibus extrorſum curuatis, vellere propendente, cauda vndique iubata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 99 *n.* 4.
La vache de Tartarie *Buff. hiſt. nat. XV p.* 136.
The grunting Bull *Penn. ſyn. quadr. p.* 5.
Der aſiatiſche Brummochſe *Müll. Naturſ. I p.* 441.
Sarluk *Calmyccis.*

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ pedum. Similis Tauro. Cornua introrſum verſa. Dorſum eleuatum. Cauda tota iubata. Corpus Hirci inſtar totum hirtum pilis ad genua vsque propendentibus, nigrum; at album fronte, ſpina dorſi, cauda, pedibus poſterioribus.

Habitat in Aſia boreali.

Ferox. Grunnit ſuis inſtar, non mugit.

Buffonius hunc cum Biſonte conuenire putat, Pennantus pro Tauri varietate habet.

Bubalis. 5. B. cornibus reſupinatis intortis antice planis.
Bubalus *Geſn. quadrup. p.* 139 *cum fig.* mala.
Buffelus ſiue Bubalus vulgaris *Aldrov. biſulc. p.* 365. *fig. p.* 366 peſſima.
Buffelus *Ionſt. quadrup. p.* 53.
Bubalus Büffel *Ionſt. quadrup. tab.* 20 fig. bona.
Alius Bubalus Taurus ſylueſter *Ionſt. quadrup. tab.* 20 fig. mala.
Büffel Bubalus *Geſn. Thierb. p.* 58 *fig.* mala.
Buffelus *Charlet. exerc. p.* 8.
Boues inuſitatae magnitudinis: Taurelephantes *Ludolf. Aeth. I c.* 10 *n.* 1 *Comment. p.* 145.
Bubalus *Rai. ſyn. quadr. p.* 72.
Buffalo *Barbot Guin. p.* 209, 486.
Büffelochſen *Kolbe Vorgeb. p.* 143 *tab.* 5 *fig.* 2 bona.
Bos cornibus vaſtis intortis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 51.

Der

Der Büffel *Meyer Thiere II tab.* 43.
Bos cornibus vaſtis intortis reſupinatis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 4.
Buffelus, Büffel *Klein. quadrup. p.* 10.
Bos cornubus vaſtis, intortis, reſupinatis. The Bos, with very large, crooked, and reſupinated horns: the Buffaloe *Hill anim. p.* 584.
Le Buffle: Bos (Bubalus) cornibus compreſſis, ſurſum reflexis, reſupinatis, fronte criſpa *Briſſ. regn. an. p.* 81 *n.* 4.
Bos cornibus vaſtis intortis reſupinatis *Kram. Auſtr. p.* 322.
Der Büffelochs *Hall. vierf. p.* 278.
Bos (Bubalis) cornibus reſupinatis intortis antice planis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 72 *n.* 4.
Buffle *Dictionn. anim. I p.* 349.
Buffel: Koe met agterover leggende gedraaide Hoornen die van vooren plat zyn *Houtt. nat. hiſt, III p.* 327.
Le Buffle *Buff. hiſt. nat. XI p.* 284 *tab.* 25.
Bufle *Bom. dictionn. I p.* 349.
Bos (Bubalis) cornibus reſupinatis intortis antice planis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 99 *n.* 5.
Buffalus *Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p.* 460 *tab.* 11, 12 fig. cran. foſſil.
The Buffalo *Penn. ſyn. quadr. p.* 7 *n.* 5.
Buffalo *Aleſſ. quadrup I tab.* 20 fig. Buff.
Der Büffel *Müll. Naturſ. I p.* 441.
Bufalo *Italis.*
Bufalo *Hiſpanis.*
Buffle *Gallis.*
Büffel *Germanis.*
Buffalo *Anglis.*

Maior Tauro, corpore craſſiore, robuſtiore, cute duriſſima, capite paruo, fronte criſpa. Cornua nigra, craſſa, paullulum compreſſa, ſurſum reflexa, parum-

parumper resupinata. Pili corporis nigri aut rubri.

Habitat in Asia; cultus hodie ab anno inde 600 in Italia ad trahendum atque lacticinia, nec non in Hungaria. Mugitus fortis animalis iracundi, annulo narium regendi. Ossa fossilia in Sibiria.

Varietas nuda ex India orientali *Penn. syn. quadr. tab.* 2 *fig.* 1.

indicus. 6 B. cornibus aure breuioribus, dorso gibbo, iuba nulla.

Bos scythicus gibbosus *Charlet. exerc. p.* 8.

The little Indian Buffalo *Edw. birds IV tab.* 200.

Bos (indicus) cornibus aure breuioribus, dorso gibbo, iuba nulla *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 72 *n.* 5.

Koe met de Hoornen korter dan de Ooren, een Bult op de Rug, dog zonder Maanen *Houtt. nat. hist. III p.* 329 *tab.* 27.

Le Zebu *Buff. hist. nat. XI p.* 285.

Un Zebu *Buff. hist. nat. XI p.* 439 *tab.* 42.

Zébu *Bom. diction. IV p.* 647.

Bos (indicus) cornibus aure breuioribus, dorso gibbo, iuba nulla *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 99 *n.* 6.

The Indian Bull *Penn. syn. quadr. p.* 6 *tab.* 1 *fig.* 2 (varietatem Tauri putat.)

Bue da soma africano *Aless. quadrup.* 1 *tab.* 21 fig. Buff.

Der kleine indianische Büffelochs *Berl. Samml. IV p.* 310 *cum fig.* Edw.

Zwergbüffel *Müll. Naturs.* 1 *p.* 442 *tab.* 27.

Magnitudo vituli semestris. Cornua minuta auriculis nudis breuiora. Pili corporis ex caeruleo cinerei, pectore albo. Venter subnudus. Pedes nigro maculati.

Habitat

Habitat in India.

Pentinere huc omnino videtur:

Elegans et paruus africanus bos, quem veteres Graeci Bubalum appellarunt *Bellon. obſ. p.* 119 *cum fig.*

Iuuenca ſilueſtris *Alpin. Aeg. I p.* 233 *tab.* 14 *fig.* 2.

The Dante *Purch. Pilgr. II p.* 1002.

Africanus bos *Aldrov. biſulc. p.* 363 *fig. p.* 364 Bellon.

Afticanus bos *Ionſt. quadrup. p.* 52.

Bubalus africanus *Ionſt. quadrup. tab.* 18 fig. Bellon.

Le Dante *Marmol Afr. I p.* 52.

Der africaniſche Büffel *Geſn. Thierb. p.* 60 *cum fig.* Bellon.

Bos africanus *Rai. ſyn. quadr. p.* 73.

The Bekker el Waſh *Shaw trav. p.* 242?

Exiguus africanus bos *Klein. quadrup. p.* 11.

Le Buffle d'Afrique: Bos (Bubalus Africanus) cornibus teretibus, ſurſum reflexis, in ſeſe recuruis *Briſſ. regn. an. p.* 79 *n.* 2.

Der kleine afrikaniſche Zwergochs *Hall. vierf. p.* 278.

Le petit boeuf de Belon *Buff. hiſt. nat. XI p.* 299.

The dwarf Bull *Penn. ſyn. quadr. p.* 9 *n.* 7 *tab.* 1 *fig.* 1 animal, *tab.* 2 *fig.* 3 cornuum. (Propriam ſpeciem putat.)

Magnitudine inter Ceruum et Capreolum eſt. Cornua nigra, teretia, baſi plana, lunata, in ſe flexa. Collum craſſum, breue, palearibus exiguis. Humeri elati, pleni. Crura breuia. Cauda ad poplites vsque pilis nigris obſita, equinis duplo craſſioribus. Corpus pilis flauis ſplendentibus laeue; venter magis rufeſcit, dorſum ſubfuſcum eſt.

Habitat in Africa, mitis.

Non eſt Bubalus veterum.

 27. OVIS.

27. OVIS.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.
Laniarii nulli.
Cornua concaua, retrorſum verſa, intorta, rugoſa.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

Aries. 1. O. cornibus compreſſis lunatis.

Προβατον *Ariſt. hiſt. anim. V c.* 11 *n.* 134. *VI c.* 19 *n.* 250-263. *VIII c.* 13 *n.* 118-123. *IX c.* 4 *n.* 70-74.

Pecus, Aries, Ouis *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 47, 48 *(c.* 72-75 *Hard.)*.

Προβατον *Aelian. anim. VII c.* 27.

Ouis *Geſn. quadrup. p.* 872 *fig. cornutae p.* 873.

Aries *Geſn. quadrup. p.* 912.

Veruex *Geſn. quadrup. p.* 925.

Agnus *Geſn. quadrup. p.* 927.

Aries *Schwenckf. theriotr. p.* 55.

Ouis *Schwenckf. theriotr. p.* 56.

Agnus *Schwenckf. theriotr. p.* 60.

Veruex *Schwenckf. theriotr. p.* 60.

Ouis *Aldrov. biſulc. p.* 370.

Ouis *Ionſt. quadrup. p.* 54.

Aries Wieder *Ionſt. quadrup. tab.* 22.

Veruex Hamel *Ionſt. quadrup. tab.* 22.

Agnus Lam *Ionſt. quadrup. tab.* 22.

Schaaf *Geſn. Thierb. p.* 320 *fig. p.* 321.

Widder

OVES cornibus arietant, pedibus calcitrant; aprica ſiticuloſa amant.

Widder *Gesn. Thierb. p.* 327 *cum fig.*
Hammel *Gesn. Thierb. p.* 329.
Lamb *Gesn. Thierb. p.* 329 *cum fig.*
Ouis *Charlet. exerc. p.* 8.
Ouis *Sibb. Scot. an. p.* 8.
Ouis domestica *Rai. syn. quadr. p.* 73.
Ouis *Rzacz. Polon. p.* 242 *auct. p.* 332.
Ouis domestica, cuius mas aries dicitur, foetus agnus *Sloan. Iam. II p.* 328.
Ouis cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 51.
Ouis cornibus compressis lunatis *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 15 *n.* 43.
Der ungarische Widder *Meyer Thiere I tab.* 50.
Das Schaaf *Meyer Thiere I tab.* 51.
Ouis cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 1.
Aries Widder Ouis Schaaf *Klein. quadrup. p.* 13.
Ouis cornubus compressis lunatis. The Ovis, with compressed and lunated horns: the Sheep *Hill anim. p.* 582.
Ouis *Linn. monogr. Amoen. acad. IV p.* 169.
La Brebis *Buff. hist. nat. V p.* 1 *tab.* 2.
Le Belier *Buff. hist. nat. V tab.* 1.
La Brebis domestique: Aries (ouis domestica) laniger, cauda rotunda breui *Briss. regn. an. p.* 74 *n.* 1.
Ouis cornibus compressis lunatis *Kram. Austr. p.* 321.
Ouis cornibus compressis lunatis: the Sheep *Brown. Iam. p.* 488.
Widder, Schaf *Hall. vierf. p.* 281 *tab.* 11.
Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 70 *n.* 1.
Agneau *Dictionn. anim. I p.* 54.
Belier *Dictionn. anim. I p.* 270.
Brebis *Dictionn. anim. I p.* 332.
Mouton *Dictionn. anim. III p.* 187.

Ram: Schaap met de Hoornen platagtig, halfmaanswyze krom *Houtt. nat. hist. III p.* 221.
Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 15 *n.* 45.
The Sheep *Penn. brit. zool. p.* 10.
Faar *Pontopp. Dan. I p.* 600.
Agneau *Bom. dictionn. I p.* 65.
Belier *Bom. dictionn. I p.* 263.
Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 97 *n.* 1.
Ouis Aries *Forster: Philos. transact. LVII p* 344.
The Ram *Penn. syn. quadr. p.* 10 *n.* 8.
Ariete *Alessf. quadrup. II tab.* 54 fig. Buff.
Pecora *Alessf. quadrup. II tab.* 55 fig. Buff.
Der Widder und das Schaaf *Mart. Buff. vierf. I p.* 286 *tab.* 12.
Der Widder *Müll. Naturf. I p.* 422.
Ouis (Aries) cornibus compressis lunatis *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 40.
Montone, Ariete (*mas*); Castrone (*veruex*); Pecora (*femina*); Agno, Agnello, Agna (*agnus*) *Italis.*
Carnero, Carnero entero, Carnero cajudo, Morueco (*mas*); Carnero castrado (*veruex*); Oveja (*femina*); Cordero (*agnus*) *Hispanis.*
Carneiro (*mas*); Ovelha (*femina*); Cordeiro (*agnus*) *Lusitanis.*
Belier (*mas*); Mouton (*veruex*); Brebis (*femina*); Agneau (*agnus*) *Gallis.*
Hwrdd, Maharen (*mas*); Dafad (*femina*); Oen (*agnus*) *Cambrensibus.*
Widder, Schaafbock (*mas*); Hammel, Schöps (*veruex*); Schaaf (*femina*); Lamm (*agnus*) *Germanis.*
Ram (*mas*); Schaep (*femina*); Lam (*agnus*) *Belgis.*
Ram (*mas*); Sheep (*femina*) *Anglis.*
Faar, Lam, Gimmer-Lam *Danis.*
Soud, Smale, Kaas *Noruegis.*
Wadur (*mas*); Får (*femina*); Lamb (*agnus*) *Suecis.*

Owca,

Owca, Owieczka *Polonis.*

Баранъ (Baran), Овенъ (Owen) (*mas*); Кладеныи баранъ (Kladenii baran) (*veruex*); Овца (Owza) (*femina*); Агнецъ (Agnetz) (*agnus*); Ярка (Iarka) (*agna*) *Russis.*

Takàh (*mas*); Saràk (*femina*); Bäran (*agnus*) *Tataris.*

Tagàh (*mas*); Schórok (*femina*); Schórok Paràn (*agnus*) *Tscheremissis.*

Tagàh (*mas*); Sóroch (*femina*); Potjak (*agnus*) *Tschuwaschis.*

Tackàh (*mas*); Isch (*femina*); Ischpi (*agnus*) *Wotiakis.*

Baràn (*mas*); Réwä (*femina*); Wirös, Rewelaux (*agnus*) *Morduanis.*

Baràn (*mas*); Bala (*femina*); Dschàla (*agnus*) *Permice.*

Mesch (*mas*); üsch (*femina*); Balápi, Baljápi (*agnus*) *Sirjänice.*

Rostrum compressum, anterius nudum. Dentes primores infra VIII, supra nulli. Laniarii nulli. Molares sinuato-acuti. Os papillis albis cartilagineis interne vestitum. Labium superius a naribus ad os nudiusculum, lacuna exaratum. Mentum subrotundum, conuexum, molle, margine labii inferioris inflexo, denticulato. Vibrissae oris quatuor ordinum. Pilus distinctus supra nares, longus. Narium foramina oblonga, sinu vel margine superiore medio gibbo; posteriore obtusiore. Oculi subcaerulei, glauci, in prominentia syncipitis ouali. Pupilla de die oblonga. Cauitas ante canthum oculi anteriorem profunda, gluten secernens; aliaque minus profunda pone canthum oculi posteriorem. Lingua mollis, sulco longitudinali notata. Vertex prominens, inter cauitates depressas pone oculos. Auriculae oblongae, margine integro: superiore versus basin inflexo; intra auriculas lineae tres, cleuatae, longitudinales. Cornua spiraliter retorta, rugosa, introrsum angulata,

 plana,

plana, apice complanata. Collum compreſſum, capite longius, lanatum. Dorſum latum, teretiuſculum, circa lumbos tamen latius. Pectus prominulum, pilis breuibus tectum. Abdomen plano-conuexum. Mammae inguinales, nudae binae, coalitae, cum papillis duabus ſpuriis ad baſin anticam. Scrotum mamillis duabus notatum. Cauda teres, genubus breuior, pilis tecta. Femora compreſſa. Genua craſſiora in anticis pedibus; in poſticis prominentia. Tibiae anticae teretiuſculae, poſticae magis compreſſae. Vngulae geminae: margine exteriore conuexo; interiore acuto, concauo. Vngulae ſuccenturiatae geminae, minores, rugoſae. Liquor glutinoſus ſecernitur e foramine paruo intra ſinum ſupra vngulas anticas, fere ad earum baſin. Vellus pilis contortis ſiue criſpatis, molliſſimis: longis in dorſo, lateribus et collo; at breuioribus, rectis, imbricatis et laevibus in capite ante oculos et cornua, in auribus, pectore, ventre et pedibus. Sutura in inguinibus ſpiralis.

Hoſpitatur vbique, maximeque variat:

anglica. α) Mutica, cauda ſcrotoque ad genua vsque pendulis *Linn.*
Ouis anglicana *Linn. amoen. acad. IV p.* 174.
The hornleſs Sheep *Penn.*
Das engländiſche Schaaf *Müll. Naturſ. I p.* 422.

Vulgaris hinc inde in Anglia, alibique; maxima in Lincolnſhire.

ruſtica. β) Cornuta *Linn.*
Ouis ruſtica *Linn. amoen. acad. IV p.* 174.
The common Sheep *Penn.*
Nordiſches Schaaf *Müll. Naturſ. I p.* 422.

Ouis

Ouis brachyura *Pallas spicil. XI p.* 61.

Passim et mutica est; at cauda et scrotum non attingunt genua. Lana breuior, minus crispa et rigidior. Degit in Europa boreali.

hispanica. γ) Cornuta, cornuum spira extrorsum tracta *Linn.*
Die spanischen Schaafe *Linn. Westgoth. p.* 58.
Die spanischen Schaafe *Linn. Schon. p.* 90.
Die spanischen Schaafböcke *Linn. Schon. p.* 172.
Ouis hispanica *Linn. amoen. acad. IV p.* 174.
Das spanische Schaaf *Müll. Naturs. I p.* 423.

Cornibus contortis, spira extrorsum dilatata, lana circa oculos copiosa, vt ea fere operti sint. Lana molliore atque copiosiore gaudet.

polycerata. δ) Polycerata *Linn.*
Ouis sexcornis *Aldrov. bisulc. p.* 397 *fig.*
Ouis tricornis *Aldrov. bisulc. p.* 397 *fig.*
Schaafe *Linn. Gothland. p.* 248.
Ouis polycerata *Linn. amoen. acad. IV p.* 174.
Brebis à plusieurs cornes *Buff. hist. nat. XI p.* 354.
Le Belier d'Islande *Buff. hist. nat. XI p.* 387 *tab.* 31.
La Brebis d'Islande *Buff. hist. nat. XI tab.* 32.
The manyhorned Sheep *Penn. syn. quadr. tab.* 3 *fig.* 2 animal. *fig.* 3 cornuum.
Montone d'Islanda *Aless. quadrup. I tab.* 28 fig. Buff.
Pecora d'Islanda *Aless. quadrup. I tab.* 30 fig. Buff.
Das Gothländische Schaaf *Müll. Naturs. I p.* 423.

Cornua quatuor, rarius sex; duobus interioribus erectis, lateralibus reuolutis. Cauda breui, lana duri-

duriufcula rudi. Vulgaris in Islandia terrisque reliquis borealibus.

africana. ε) Africana *Linn.*

Ouis aethiopica *Charlet. exerc. p.* 9.

Ouis africana *Rai. fyn. quadr. p.* 75.

Ouis africana pro vellere lanofo pilis breuibus hirtis veftita *Sloan. Iam. II p.* 328.

Ouis africana *Linn. amoen. acad. IV p.* 173.

La Brebis d'Afrique: Aries (ouis africana) pilofus, pilis breuibus veftitus *Briff. regn. an. p.* 76 *n.* 4.

Das africanifche Schaaf *Müll. Naturf. I p.* 423.

Pro lana pilis breuibus hirta eft. In Africa.

laticaudata. ζ) Arabica platyura *Linn.*

Οἰς ἀῤῥάβιος *Aelian. anim. X c.* 4.

Schaaff deren Schwäntz gar feiſſt *Rauwolf Reif. III p.* 26.

Arabiae oues *Aldrov. bifulc. p.* 404 *fig. p.* 405 mala.

Perfifche und Tartarifche Schafe *Neub. Gefandfch. p.* 369.

Ein arabifches Schaaf mit einem breiten Schwantz oben an den Rippen *Gefn. Thierb. p.* 326 *cum fig.* peffima.

Ouis Turcica *Charlet. exerc. p.* 9.

Ouis cauda obefa *Ludolf Aeth. I c.* 10 *n.* 14 *cum fig. Comment. p.* 146.

Moutons de Barbarie ou à groffe queue *Chardin voy. III p.* 37.

Ouis laticauda *Rai. fyn. quadr. p.* 74.

The broad-tailed Sheep *Shaw trav. p.* 241.

Aries f. Ouis πλατυκερκος orientalis *Klein. quadrup. p.* 14.

Ouis

Ovis Krymica vellribus [illegible] grisis
Pallas [illegible] Reise [illegible] II. p. 464. t. 2

Ouis laticauda, Platyceros f. arabica *Linn. amoen. acad. IV p.* 173.

Ouis laticauda *I. G. Gmelin: Nou. comment. petrop. V p.* 343 *tab.* 8.

La Brebis à large queue: Aries (ouis laticauda) laniger, cauda latiffima *Briff. regn. an. p.* 75 *n.* 2.

The other fheep *Ruff. Alepp. p.* 51.

Die hiefigen Schaafe *Osb. Oftind. p.* 188.

Das arabifche breitfchwänzige Schaaf *Hall. vierf. p.* 301.

Mouton de Barbarie, mouton d'Arabie *Buff. hift. nat. XI p.* 355 *tab.* 33.

The broad tailed Sheep *Penn. fyn. quadr. p.* 4. *tab.* 1.

Montone di Barberia *Alcff. quadrup. I tab.* 25 fig. Buff.

Das arabifche Schaaf *Müll. Naturf. I p.* 423.

Ouis fteatopyga *Pallas fpicil. XI p.* 63 *tab.* 4 *fig.* 1 bicornis. *fig.* 2 *b* quadricornis, *fig.* 2 *a* ecornis.

Ouis bucharica *Pallas fpicil. XI p.* 78 (affinis certe).

Cauda craffiffima, 30-40 faepe librarum, interdum fubdidyma; pinguis adipe, non febo. Auriculae faepe pendulae. Interdum quadri-quinque-et fexcornis eft. Hofpitatur inter gentes nomadicas Afiae fere omnes, inque Perfia, Sina, Oriente, Syria, Arabia, Aegypto.

longicaudata. η) Arabiae oues *Aldrov. bifulc. p.* 404.

Schaffe *Olear. Reif. p.* 567.

Ouis arabica *Ionft. quadrup. tab.* 23.

Ein ander arabifch Schaaff *Gefn. Thierb. p.* 326 *cum fig.* peffima.

Alterum genus *Rai. fyn. quadr. p.* 74.

La Brebis à longue queue: Aries (Ouis longicauda) laniger, cauda longiffima *Briff. regn. an. p.* 76 *n.* 3.

Das arabiſche langſchwänzige Schaf *Hall. vierf. p.* 302.
Ouis dolichura ſiue tſcherkeſſica *Pallas ſpicil. XI p.* 60.

Cauda ad tres pedes longa. Hoſpitatur cum praecedente. Colitur quoque in Ruſſia auſtrali et Poloniae finitimis, ad Caucaſum atque in Mauritania occidentali.

capenſis. 9) The Cape Sheep *Penn. ſyn. quadr. in explicat. iconum tab.* 4 *fig.* 2.

Auriculae longae, pendulae. Cauda magna, ex adipe vix prominens.

Edit imprimis Feſtucam ouinam, in aruis Burſam paſtoris; laeditur a Pruno ſpinoſa, Equiſeto, Ranunculo Flammula, Antherico oſſifrago, Kalmia, Myoſotide aquatica, Anemone nemoroſa. Parum bibit. Mutat aetate dentes. Timida minatur hoſti calcitrando mingendoque, pellit eum arietando. Balat. Mas vnus ſufficit viginti feminis, grauidis 23 hebdom. Parit vnum, interdumque duo, rarius tres. Adoleſcit anno ſecundo. Stupidiſſimum maximeque imbecille forte omnium quadrupedum. Aetas 12-14 annorum.

Ammon. 2. O. cornibus arcuatis ſemicircularibus ſubtus planiuſculis palearibus laxis piloſis.
Muſmon *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 49 (*c.* 75 *Hard.*).
Ophion *Plin. hiſt. nat. XXVIII c.* 9 (*c.* 42 *Hard.*) *XXX c.* 15 (*c.* 52 *Hard.*)?
Muſmon ſ. Muſimon *Geſn. quadrup. p.* 934.
Tragelaphus *Bellon. obſ. p.* 54 *cum fig.* mediocr.
Das wilde Schaaf: eine Art frembder Böcke und Schaafe *Geſn. Thierb. p.* 155 *cum fig.* mediocr.

Der

Das Mufflthier. Seb. Münsters Cosmographie p. m. 279.

Der Weiſsars der Alten *Geſn. Thierb. p.* 154 *fig. p.* 155 mediocr.

Muſimon *Rai. ſyn. quadr. p.* 75.

Tragelaphus Bellonii *Rai. ſyn. quadr. p.* 82.

The Fiſhtâll or Lerwee *Shaw trav. p.* 243?

Tragelaphus. Mouflon *Klein. quadrup. p.* 20.

Stepnie Baranni *I. G. Gmelin Sibir. I p.* 368.

Rupicapra cornibus arietinis *I. G. Gmelin: Nou. comment. petrop. IV p.* 388 *ſummar. p.* 53 *tab.* 8 *b fig.* 2 maris, *fig.* 3 feminae mediocr.

La Chevre du Levant: Hircus (Capra orientalis) cornibus ſupra rotundatis, infra planis, ſemicirculum referentibus *Briſſ. regn. an. p.* 71 *n.* 12.

Capra (Ammon) cornibus arcuatis, collo ſubtus barbato, cauda nigra *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 70 *n.* 12.

Chevre du Levant *Dictionn. anim. I p.* 595.

Geit met boogswyze Hoornen, een Baard onder aan de Keel, de Staart zwart *Houtt. nat. hiſt. III p.* 217.

Le Mouflon *Buff. hiſt. nat. XI p.* 352 *tab.* 29.

Mouflon *Bom. dictionn III p.* 146.

Capra (Ammon) cornibus arcuatis ſemicircularibus ſubtus planiuſculis, palearibus laxis piloſis, gula imberbi *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 97 *n.* 12.

Das orientaliſche Schaaf *S. G. Gmelin Reiſ. III p.* 486 *tab.* 55 fig. mala.

The ſiberian Goat *Penn. ſyn quadr. p.* 18 *n.* 11.

Muſione *Aleſſ. quadrup. I tab.* 7 fig. Buff.

Die ſibiriſche Ziege *Müll. Naturſ. I p.* 417.

Kamenni Barani oder Muſimons *Steller Kamtſch. p.* 127.

Ouis fera ſibirica vulgo Argali dicta *Pallas ſpicil. XI p.* 3 *tab.* 1 *fig. inferior* maris annoſi, hieme; *fig. ſuperior* feminae ſenioris, hieme; *tab.* 2 *fig. inferior* feminae depilis, aeſtate; *fig. ſuperior* iunioris: bonae.

Muſio-

…uncan McGillivray on ye mountain Ram of N. America in the (A…
…can) medical Repository vol. VI. New-York 1803. p. 237 fig. c. ic. bon…

…fries in Voigt's neuem Magaz. XI 6. p. 499 fig. c. ic. capitis &
cranii

Mufione *in Corsica et Sardinia.*
Спепной Баранъ (Stepnoi Baran'), Каменной Баранъ (Kamennoi Baran'), Дикой Баранъ (Dikoi Baran') *Russis.*
Guldſhah (*mas*); Argali (*femina*) *Mongolis.*
Kyr-taka *Tataris europaeis.*
Tſchúbhuku *Iacutis.*
Dſholadſchân *Lamutis.*
Goâdinachtſch, Goadinadatſch *Kamtſchadalis.*
Kytyp *Korjäkis.*
Kulem, Kulehm *Ukinzis.*
Kotſchkui, Kotſch-kohi *Perſis.*
Dachkutſch *Turcis.*

Magnitudo Ceruae minoris. *Aeſtate:* in tergore, ceruice et palearibus cinereo-fuſceſcens, admixto griſeo. Area luteſcens circa caudam, per quam ſtriga fuſca in ipſam caudam excurrit. Foſſa ceruicalis et area pone armos fuſca. Caput cineraſcens, reliqua e cinero albida ſunt. Pili vix 4 lin. longi. *Hieme:* roſtrum apice album, area transverſa fuſca verſus frontem e griſeo cineraſcentem. Gula et collum ſubtus cineraſcente-albida, colore eodem per parotides ad aures dilatato. Ceruix et dorſum ferrugineo-griſeum, colore verſus clunes magis luteſcente. Brachia extus, vt et faſcia lata thoracis vtrinque latera occupans, anguſtior in hypochondriis, latior ad femora, nec non ipſa femora extus e fuſco nigricantia. Intus femora nigra, armi fuſco-caneſcentes. Abdomen longitudinaliter e griſeo albicans. Clunes a cauda albeſcunt, paullo inferius albiſſimae, faſcia alba poſtice per femora continuata. Pedes extremi toti a genubus ad vngulas albi, niſi in poſticis vmbra fuſceſcente leui a calcaneo diffuſa. Cauda alba, apice fuſceſcens. Pili ſeſquipollicares ſubcriſpi. Caput arietinum. Collum et thorax barbata.

bata. Auriculae acutae erectae. Cornua magna, reflexa, compreſſa, ſpiralia, annulata, albida; feminis minora, tenuia, falcata, non ſpiralia. Cauda breuiſſima. Pedes poſtici longiores anticis. Palearia laxa. Oculi magni; iride fuſca ſ. caerulea. Vere deponit pilos longiores.

Habitat in apricis rupeſtribus tractus alpini Aſiae mediae, in deſertis; in Kamtſchatka, inſulis kurilis, forte etiam in California et America reliqua occidentali; eſt quoque in Barbariae, Sardiniae, Corſicae, Graeciae montibus altiſſimis, ſubgregaria.

Celerrima, agilis, fera, cornubus peſſime ferit. Videtur Aries ferus. Caro egregia, imprimis adeps delicata. Aetas 12-14 annorum. Parit Martio menſe vnicum vel binos. Cornua tertio menſe progerminant. Adoleſcit anno ſecundo.

guineenſis. 3. O. auribus pendulis, palearibus laxis piloſis, occipite prominente.

Aries guineenſis ſeu angolenſis *Marcgr. Braſ. p.* 234 *cum fig.* bon.
Aries guineenſis *Ionſt. quadrup. tab.* 46 fig. Marcgr.
Adim-mayn *Marmol Afr. I p.* 59.
Caper Mambrinus *Charlet. exerc. p.* 10.
Ouis guineenſis ſeu angolenſis Marcgrav. *Rai. ſyn. quadr. p.* 75.
Ouis Guineenſis ſeu Angolenſis Marcgr. *Sloan. Iam. II p.* 328.
Les Moutons de Guinée *Des March. voy. I p.* 129.
The Sheep of the Sahara *Shaw trav. p.* 241.
Ouis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 51.
Ouis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 3.

Aries

Aries guineenſis *Klein. quadrup. p.* 14.

Ouis auribus pendulis, palearibus laxis, occipite prominente. The Ovis, with pendulous ears, a lax dew-lap, and with the back of the head prominent: the Angolan Sheep *Hill anim. p.* 583.

La Brebis de la Guinée: Aries (Ouis guineenſis) piloſus, pilis breuibus veſtitus, iuba longiſſima, auricalis longis pendulis *Briſſ. regn. an. p.* 77 *n.* 5.

Les Moutons *Adanſ. Seneg. p.* 37.

Das Guineiſche Schaf *Hall. vierf. p.* 301.

Ouis (guineenſis) auribus pendulis, palearibus laxis piloſis, occipite prominente *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 71 *n.* 2.

Schaap met hangende Ooren, groote Keelkwabben, het Agterhoofd uitpuilende *Houtt. nat. hiſt. III p.* 266.

Belier du Senegal *Buff. hiſt. nat. XI p.* 359.

Le Belier des Indes *Buff. hiſt. nat. XI p.* 392 *tab.* 34.

Autre Belier des Indes *Buff. hiſt. nat. XI tab.* 35.

La Brebis des Indes *Buff. hiſt. nat. XI tab.* 36.

Ouis (guineenſis) auribus pendulis, palearibus laxis piloſis, occipite prominente *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 98 *n.* 2.

The african Sheep *Penn. ſyn. quadr. p.* 12.

Montone d'India *Aleſſ. quadrup. I tab.* 26 fig. Buff.

Altro Montone d'India *Aleſſ. quadrup. I tab.* 27 fig. Buff.

Pecora Indiana *Aleſſ. quadrup. I tab.* 29 fig. Buff.

Das guineiſche Schaaf *Müll. Naturſ. I p.* 428.

Memerian bacala *Congenſibus.*

Magnitudo Arietis, cuius forte eſt varietas. Variat colore. Caput craſſum. Occiput prominens. Auriculae longae, pendulae. Cornua parua, deorſum vsque ad oculos incuruata. Cauda genua attingens. Iuba ſub collo pendula. Pili breues hircini.

hircini. Feminam ſolam cornutam haud recte dicit Marmol.

Habitat in Guinea, culta in America.

Strepſiceros. 4. O. cornibus rectis carinatis flexuoſo-ſpiralibus.

Strepſiceros *Plin. hiſt. nat. XI c.* 37 (*c.* 45 *Hard.*).
οἰς ξανθοὶ *Oppian. cyneg. II*, 376.
Cretenſis Aries Strepſiceros nominatus *Bellon. obſ. p.* 20 *fig. p.* 21.
Cretenſes Arietes *Aldrov. biſulc. p.* 406 *fig. p.* 407 Bellon.
Ouis cretenſis *Ionſt. quadrup. tab.* 45 fig. Bellon.
Die wilde Straubengeyſz, eine Art der wilden Geyſſen *Geſn. Thierb. p.* 151 *fig. p.* 152 mediocr.
Ouis Strepſiceros cretica Bellonii *Rai. ſyn. quadr. p.* 75.
Ouis cornibus rectis ſpiralibus *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 51.
Ouis cornibus erectis ſpiralibus *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 15 *n.* 2.
Aries Strepſiceros *Klein. quadrup. p.* 14.
Ouis cornibus erectis ſpiralibus. The Ovis, with erect and ſpiral horns: the Cretic Sheep *Hill anim. p.* 582.
La Chevre de la Crête: Hircus (Capra cretenſis) laniger, cornibus teretibus, erectis, ab imo ad ſummum ſpiraliter intortis *Briſſ. regn. an. p.* 73 *n.* 15.
Ouis cornibus erectis ſpiralibus *Kram. Auſtr. p.* 322.
Das hochgehörnte kretiſche Schaf *Hall. vierf. p.* 302.
Ouis (Strepſiceros) cornibus rectis ſpiralibus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 71 *n.* 3.
L'Ovis Strepſiceros *Dictionn. anim. I p.* 333.
Chevre de la Crête *Dictionn. anim. I p.* 595.
Schaap met regte, Slangswyze gedraaide Hoornen *Houtt. nat. hiſt. III p.* 267.
Strepſicheros *Buff. hiſt. nat. XI p.* 358.

Ouis

Ouis (Strepsiceros) cornibus rectis carinatis flexuoso-spiralibus *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 98 *n.* 3.
The Cretan Sheep *Penn. syn. quadr. p.* 11 *tab.* 3 *fig.* 1 cornuum.
Das cretensische Schaaf *Müll. Natursf. I p.* 429.
Zackl *Austriacis.*

Magnitudo Arietis, cui similis figura corporis: at cornua teretia, recta, erecta, spiraliter torta. Ideoque Brissonio Capra est.

Habitat in Creta, Archipelago. Colitur copiose in Hungaria et Austria.

28. CAPRA.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.
Laniarii nulli.
Cornua concaua, sursum versa, erecta, compressa, scabra.
Mentum barbatum.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

Hircus. 1. C. cornibus carinatis arcuatis.
Τραγοι *Arist. hist. anim. V* c. 11 *n.* 135.
Αιγες *Arist. hist. anim. VI* c. 15 *n.* 250-263. *VIII* c. 13 *n.* 18-23. *IX* c. 4 *n.* 70-75.
Capra *Plin. hist. nat. VIII c.* 50 (*c.* 76 *Hard.*).
Αιξ *Oppian. cyneg. II,* 326.

Capra

CAPRAE cornibus digladiant, montosa amant. Eas cum Ouibus contrahit hodie in vnicum genus doctiss. Pallas.

Capra *Gesn. quadr. p.* 270 *cum fig.* bon.
Hircus *Gesn. quadr. p.* 301 *fig. p.* 302 bon.
Hoedus *Gesn. quadrup. p.* 314.
Hircus *Schwenckf. theriotr. p.* 97.
Capra *Schwenkf. theriotr. p.* 98.
Hoedus *Schwenckf. theriotr. p.* 100.
Caper *Schwenckf. theriotr. p.* 101.
Capra et Hircus *Aldrov. bisulc. p.* 619 *fig. p.* 635 hirci et caprae bon.
Capra et Hircus domesticus *Ionst. quadrup. p.* 65.
Capra Geiss *Ionst. quadrup. tab.* 26 fig. bona.
Hircus Bock *Ionst. quadrup. tab.* 27 fig. bona.
Caper hispanicus *Ionst. quadrup. tab.* 26 ?
Die Geyss *Gesn. Thierb. p.* 127 *fig. p.* 128 bona.
Der Bock *Gesn. Thierb. p.* 135 *cum fig.* mediocr.
Hircus domesticus *Charlet. exerc. p.* 9.
Hircus *Sibb. Scot. an. p.* 8.
Capra *Rai. syn. quadr. p.* 77.
Zahme Böcke *Kolbe Vorgeb. p.* 141.
Capri et Caprae *Rzacz. Polon. p.* 239 *auct. p.* 331.
Capra domestica *Sloan. Iam. II p.* 328.
Capra cornibus carinatis arcuatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.
Capra cornibus carinatis arcuatis *Linn. fn. suec.* I *p.* 15 *n.* 42.
Der Ziegenbock mit vier Hörnern *Meyer Thiere I tab.* 67.
Die Ziege *Meyer Thiere I tab.* 68.
Capra cornibus carinatis arcuatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 1.
Tragus domesticus *Klein. quadrup. p.* 15.
Capra cornubus carinatis arcuatis. The Capra with carinated, arcuated horns: the Goat *Hill anim. p.* 579.
La Chevre *Buff. hist. nat. V p.* 59 *tab.* 9.
Le Bouc *Buff. hist. nat. V tab.* 8.

Le Bouc, la Chevre domestique: Hircus (et capra domestica) cornibus interius cultratis, exterius rotundatis, infra carinatis, arcuatis *Briss. regn. an. p.* 62 *n.* 1.

Capra cornibus carinatis arcuatis *Kram. austr. p.* 319.

Capra cornibus carinatis arcuatis: the Nanny-goat *Bron. Iam. p.* 488.

Der Ziegenbock, die Ziege *Hall. vierf. p.* 302.

Capra (Hircus) cornibus carinatis arcuatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 68 *n.* 1.

Bouc *Dictionn. anim. I p.* 323.

Chevre *Dictionn. anim. I p.* 593.

Bok: Geit met de Hoornen gekield en boogswyze krom *Houtt. nat. hist. III p.* 156.

Capra (Hircus) cornibus carinatis arcuatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 15 *n.* 44.

The Goat *Penn. brit. zool. p.* 13.

Gedder *Pontopp. Dan. I p.* 602.

Bouc *Bom. dictionn. I p.* 331.

Capra (Hircus) cornibus carinatis arcuatis, gula barbata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 94 *n.* 1.

Capra Hircus *Forster: Philos. transact. LVII p.* 344.

Unser Hausbock *S. G. Gmelin Reis. III p.* 496.

The domestic Goat *Penn. syn. quadr. p.* 14.

Becco *Aless. quadrup. II tab.* 56 fig. Buff.

Capra *Aless. quadrup. II tab.* 57 fig. Buff.

Die Ziege *Mart. Buff. vierf. II p.* 3 *tab.* 14.

Der Ziegenbock *Mart. Buff. vierf. II tab.* 13.

Der Bock *Müll. Naturs. I p.* 404.

Capra (Hircus) cornibus carinatis arcuatis, gula barbata *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 39.

Becco (*hircus*); Capra (*capra*); Capretto (*hoedus*) *Italis*.

Cabron (*hircus*); Cabra (*capra*); Cabrito (*hoedus*) *Hispanis*.

Cabram (*hircus*); Cabra (*capra*); Cabrito (*hoedus*) *Lusitanis*.

Bouc

Bouc (*hircus*); Chevre (*capra*); Chevreau (*hoedus*) *Gallis.*

Bwch (*hircus*); Gafr (*capra*); Mynn (*hoedus*) *Cambrensibus.*

Bock, Ziegenbock (*hircus*); Ziege, Geiſs (*capra*); Kitzchen (*hoedus*) *Germanis.*

Bok (*hircus*); Geit (*capra*); Bokje (*hoedus*) *Belgis.*

Goat *Anglis.*

Buk (*hircus*); Gied (*capra*) *Danis et Noruegis.*

Bock (*hircus*); Get (*capra*); Kiid (*hoedus*) *Suecis.*

Koziel *Polonis.*

Коза (Koza) (*capra*); Козелъ (Kozel) (*hircus*) *Russis.*

Kaſàh *Tataris et Tſcheremiſſis.*

Káſa *Tſchuwaſchis.*

Gurt-Ketſch *Wotiakis.*

Sſää *Morduanis.*

Pecus infidum, petulans, bellicoſum, ſaliens, ſalax, hircum olens, frigoris impatiens, arbores decorticans; corio tenaci indutum, lana caprina tectum, arunco barbatum, caſeoſum. Edit etiam Cicutam. Colore variat albo nigroque. Haud raro ecornis, ſed et quadricornis occurrit. Parit 1 - 2, rariusque 3 aut 4. Grauida quinque menſes. Adoleſcit anno ſecundo. Aetas 10 - 12 annorum.

Amat loca montoſa, victitans ramulis variis frondibusque arborum, Lichenibus. Ferus rurſus factus ex manſueto hodie copioſus reperitur in inſula Iuan Fernandez.

Angorenſis. *Varietas* Angorenſis:

Αιξ εν Λυκια *Aelian. anim. XVI c.* 30.

Chevre d'Angora *Tournef. voy. II p.* 185 *cum fig.* mediocr.

La Chevre d'Angora *Buff. hiſt. nat. V p.* 71 *tab.* 11.

Le Bouc d'Angora *Buff. hist. nat. V tab.* 10.

La Chevre d'Angora: Hircus (Capra Angorensis) pilis longissimis crispis toto corpore vestitus *Briss. regn. an. p.* 64 *n.* 2.

Capra Angolensis *Hasselqu. Palaest. p.* 285.

Der angorische Bok *Hall. vierf. p.* 307 *tab.* 12.

Geiten van Angora *Houtt. nat. hist. III p.* 163.

Capra Angorensis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 95.

Capra Hircus angorensis *Forster: Philos. transact. LVII p.* 344.

The Angora Goat *Penn. syn. quadr. p* 15.

Becco d'Angora *Alesf. quadrup. II tab.* 58 fig. Buff.

Capra d'Angora *Alesf. quadrup. II tab.* 59 fig. Buff.

Der angorische Bock *Mart. Buff. vierf. II p.* 24 *tab.* 15.

Die angorische Ziege *Mart. Buff. vierf. II p.* 24 *tab.* 16.

Ziegen von Angora *Müll. Naturs. I p.* 406.

Hospitatur circa Angoram.

Lana ad pedes vsque dependet niuea, splendens, mollissima, sericum prouocans, camelina dicta. Cornua minora, torta, ad latera protracta vt Ouis hispanicae. Auriculae planae, lanceolatae, declinatae, nec erectae, canaliculatae. Corpus breuius. Pedes longiores.

Aegagrus. Hircus domesticus ortus videtur omnino ex *Aegagro* Pallasii:

Fera quaedam montana caprini generis *Kaempf. amoen. exot. p.* 398 *fig. p.* 407 *fig.* 2.

Die Ziege, welche den Bezoar liefert *S. G. Gmelin Reis. III p.* 493.

Aega-

Aegagrus *Pallas spicil. XI p.* 45 *tab.* 5 *fig.* 2, 3 cranii cum corn.
پازن (Pasèn) *Arabibus.*

Ibice minor, maior Hirco. Caput caprinum, antice nigrum, lateribus rufescente fuscoque mixtum. Aruncus insignis vna cum gula castaneo fuscoque mixtus. Corpus ceruinum. Animal totum griseum vel cinereo-rufescens, linea dorsali longitudinali atra a collo ad caudam vsque. Cauda atra. Cornua feminae nulla vel exigua: mari magna, arcuata, reclinata, parum diuergentia, apicibus introrsum declinata; compressa, anterius carinata.

Habitat in Caucaso, Tauro; num et in Alpibus europaeis?

Ex hoc, sed non ex hoc solo, Pasahr concrementum lapideum ventriculi, nobis Bezoar dictum, sed nec vbique nec in omnibus reperiundum. Obtinetur praecipue ex prouincia Laar et Chorasan Persiae. Vid. *Bauhini monogr. Tavernier voy. II p.* 318. *Daubenton hist. nat. XII p.* 278.

Animal vtplurimum confusum cum Ibice, primus bene distinxit doctiss. Pallas.

Ibex. 2. C. cornibus lunatis rotundatis supra nodosis in dorsum reclinatis.

Ibex *Plin. hist. nat. VIII c.* 53 (*c.* 79 *Hard.*).
Αιγες αγριοι εν Λιβυῃ *Aelian. anim. XIV c.* 16.
Ibex *Gesn. quadrup. p.* 331 *cum fig.* mediocri.
Capricorni vel potius Ibicis maris figura *Gesn. quadrup. p.* 1099 melior.
Hirci feri quoddam genus Cretae familiare *Bellon. obs. p.* 26 *cum fig.* mediocr.

voir Phoebus Comte de Foix (+ 1390) livre de la chasse (in Jacqu. de Fouilloux venerie. Rouen 1650. 4) pag. 98.

Ibex *Aldrov. bisulc. p.*730 *fig. p.* 732 mala.
Ibex *Ionst. quadrup. p.* 75.
Ibex Steinbock *Ionst. quadrup. tab.* 25 fig. mediocr.
Trais vel Ibex *Ionst. quadrup. tab.* 28 fig. Gesneri altera.
Capra Lybica *Ionst. quadrup. tab.* 25?
Flirus *Ionst. quadrup. tab.* 25?
Steinbock, Ybschen oder Ybsch-Geyss *Gesn. Thierb. p.* 148 *cum fig.* mediocr.
Ibex *Charlet. exerc. p.* 10.
Ibex vulgo Capricornus *Wagn. Heluet. p.* 176.
Ibex, Germanis Steinbok *Rai. syn. quadr. p.* 77.
Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.
Steinbock *Riding. jagdb. Th. tab.* 11. An potius Aegagri figura? videtur Pallasio.
Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 6.
Ibex *Klein. quadrup. p.* 16.
Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis. The Capra, with nodose horns bending towards the back *Hill anim. p.* 580 *tab.* 28 fig. mediocr.
Le Bouc-Estain: Hircus (Ibex) cornibus supra nodosis, infra rotundatis, in dorsum reclinatis *Briss. regn. an. p.* 64 *n.* 3.
Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Kram. Austr. p.* 321.
Capra cornibus nodosis in dorsum reclinatis: the bastard Ibex *Brown. Iam. p.* 488? vix.
Der Steinbok *Hall. vierf. p.* 312.
Capra (Ibex) cornibus nodosis in dorsum reclinatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 68 *n.* 2.
Bouc sauvage ou bouc-étain *Dictionn. anim. I p.* 324.
Ibex *Dictionn. anim. II p.* 523.
Steenbok: Geit met knobbelige Hoornen, die naar de Rug omgeboogen zyn *Houtt. nat. hist. III p.* 176.

Le

Fr. Meisner's Museum der N. G. Helvetiens 1807. ...

Museum Leverianum vol. I. p. III. tab. 26.

Le Bouquetin *Buff. hist. nat. XII p.* 136 *tab.* 13 fig. mala iunioris, *fig.* 14 cornuum.
Bouc ſauvage *Bom. dictionn. I p.* 334.
Capra (Ibex) cornibus ſupra nodoſis in dorſum reclinatis, gula barbata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 95 *n.* 2.
Steinbock *Knorr delic. II tab. K,* 5 *fig.* 2 cornu.
The wild Goat *Penn. ſyn. quadr. p.* 13 *n.* 9.
Capra ſelvatica *Aleſſ. quadrup. III tab.* 131 fig. Buff.
Der Steinbock *Müll. Naturſ. I p.* 407.
Capra Ibex *Forsk. fn. orient. p. IV.*
Ibex alpium ſibiricarum *Pallas ſpicil. XI p.* 31 *tab.* 3 fig. animalis, *tab.* 5 *fig.* 4 cornu.
Capra ſelvatica *Italis.*
Bouquetin *Gallis, olim* Bouc - eſtain.
Steinbock *Germanis.*
Takja *Mongolis.*
Tau - Tökké *Kirgiſis.*
Baeden *Aegyptiis.*

Procul dubio varia ex his ſynonymis potius ad Aegagrum pertinent: ſed quisnam diſtinguet?

Maior Hirco. Caput breue, roſtro craſſo, compreſſo, ſubarcuato. Oculi minuſculi. Cornua vaſta, ſupra nodoſa, infra rotundata, magis quam in Aegagro arcuata et quaſi lunata, in dorſum reclinata, griſeo - nigricantia. Crura gracilia. Cauda breuis, ſubtus nuda, ceterum ſetis longis iubata, baſi lateribusque alba, ſupra et extremitate atra. Pili corporis longi, fului vel cani, in dorſo linea nigricans, macula magna atra ſupra et infra genua antica, quae alba. Mas arunco nigro prolixo, verſus gulam dilatato. Femina minor, cornibus minoribus, arunco minore. Iuniores ſordide griſei linea dorſali nigra obſoleta.

 Habitat

Habitat in Alpibus Penninis, Italicis, Sibiricis, Kamtſchaticis, Salisburgienſibus, Cretae; olim et in Heluetia, vbi hodie vix occurrit. Amat praerupta inacceſſa. Eſt quoque in Hedsjas.

Agillimum animal, pernicitatis mirandae; ſalit in rupibus praecipitibus. Degit in gregibus paruis. Parit 1-2.

Huius omnino *varietas* videtur, niſi forte ad Hircum pertineat:

Capricornus. Le Capricorne *Buff. hiſt. nat. XII p.* 146 *tab.* 15 fig. Sceleti.

The Capricorn Goat *Penn. ſyn. quadrup. p.* 16.

Cornua breuia, apicibus antrorſum verſis, lateribus annulatis.

mambrica. 3. C. cornibus reclinatis, auriculis pendulis.

Capra indica *Geſn. quadrup. p.* 1097 *fig.* mediocr.

Capra indica, aut mambrina, aut ſyriaca potius *Geſn. quadrup. p.* 1098 *figg.* mediocr.

Geyſſen mit hangenden Ohren *Rauwolff Reiſ. III p.* 26.

Capra auribus oblongis *Alpin. Aeg. I p.* 229.

Capra auribus demiſſis *Aldrov. biſulc. p.* 769 *fig. p.* 768 mediocris.

Capra Indica et mambrina ſyriaca *Ionſt. quadrup. p.* 81.

Caper mambrinus *Ionſt. quadrup. tab.* 26 fig. Geſn.

Capra mambrina *Ionſt. quadrup. tab.* 26 fig. Geſn.

Eine Indianiſche Geyſs *Geſn. Thierb. p.* 153 *figg. p.* 154 mediocres.

Capra Mambrina ſiue Syriaca Geſneri *Rai. ſyn. quadr. p.* 81.

Capra

Capra auribus pendulis longissimis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 51.

Capra auribus pendulis longissimis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 11.

Capra auribus pendulis longissimis. The Capra with very long, pendulous ears: the long-eared, syrian Goat *Hill anim. p.* 582.

La Chevre de Sirie: Hircus (capra syriaca) cornibus minimis, erectis, parumper retrorsum incuruis, auriculis longissimis, pendulis *Briss. regn. an. p.* 72 *n.* 13.

The other kind of goats *Russ. Alepp. p.* 52.

Das sirische Schaf mit lappigen Ohren *Hall. viers. p.* 302.

Capra (mambrica) auribus pendulis longissimis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 70 *n.* 11.

Chevre de Syrie *Dictionn. anim. I p.* 595.

Geit met zeer lange neerhangende Ooren *Houtt. nat. hist. III p.* 216.

La chèvre Mambrine ou chèvre du Levant *Buff. hist. nat. XII p.* 152, 154.

Capra (mambrica) cornibus reclinatis, auribus pendulis, gula barbata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 95 *n.* 3.

The syrian Goat *Penn. syn. quadr. p.* 15 *tab.* 5 *fig.* 1, 2.

Die syrische Ziege *Müll. Natursf. I p.* 408.

Paullo maior Hirco. Auriculae longissimae, pendulae. Cornua parua, erecta, parumper retrorsum recuruata, nigra. Pili fului.

Habitat in Syria.

Videtur antem Hirci varietas, nec propria species.

depressa. 4. C. cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus.

Capra cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.

Capra cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 2.

La petite Chevre d'Amerique: Hircus (Capra parua Americana) cornibus depressis incuruis minimis, cranio incumbentibus *Briss. regn. an. p.* 65 *n.* 4.

Capra (depressa) cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 69 *n.* 4.

Kleine Geit van Amerika: Geit met kleine, kromme, tegen't Hoofd aan leggende Hoornen *Houtt. nat. hist. III p.* 193.

L'autre petite chevre à cornes rabattues *Buff. hist. nat. XII p.* 154.

Le Bouc d'Afrique *Buff. hist. nat. XII tab.* 18.

La Chevre naine *Buff. hist. nat. XII p.* 154 *tab.* 19.

Capra (depressa) cornibus depressis incuruis minimis cranio incumbentibus, gula barbata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 95 *n.* 5.

The African Goat *Penn. syn. quadr. p.* 16.

Becco d'Africa *Aless. quadrup. IV tab.* 163 fig. Buff.

Capra nana *Aless. quadrup. III tab.* 133 fig. Buff.

Der Zwergbock *Müll. Naturs. I p.* 411.

Magnitudo hoedi Hirci. Pili longi, penduli. Cornua triangula, lunata, crassa, vix digitum longa, cranio adpressa, vt fere cutem perforent.

Habitat in Africa; culta hodie in Surinamo aliisque terris americanis.

Buffonio, Pennanto atque Pallasio Hirci varietas est.

reuersa.

reuerſa. 5. C. cornibus erectis apice recuruis.

Capra cornibus erectis apice recuruis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 50.

Capra cornibus erectis apice recuruis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 69 *n.* 5.

Le petit chamois d'Amerique: Hircus (Ibex paruus americanus) cornibus erectis apice recuruis *Briſſ. regn. an. p.* 65 *n.* 5.

Capra (reuerſa) cornibus erectis apice recuruis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 69 *n.* 5.

Kleine Gems van Amerika: Geit met opſtaande Hoornen, die aan de toppen voorwaards gekromd zyn *Houtt. nat. hiſt. III p.* 194.

La petite chevre à cornes droites et recourbées à la pointe *Buff. hiſt. nat. XII* p. 154.

Le Bouc de Iuda *Buff. hiſt. nat. XII p.* 154, 186 *tab.* 20.

La Chevre de Iuda *Buff. hiſt. nat. XII p.* 154 *tab.* 21.

Capra (reuerſa) cornibus erectis apice recuruis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 95 *n.* 6.

The Whidaw Goat *Penn. ſyn. quadr. p.* 16.

Becco die Giuda *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 164 *fig.* 1 Buff.

Capra di Giuda *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 164 *fig.* 2 Buff.

Die amerikaniſche Gemſe *Müll. Naturſ. I p.* 411.

Magnitudo hoedi Hirci vnius anni. Pili breues, cervini. Cornua vix digitum longa, antrorſum recuruata apice.

Habitat in regno Iudae Africae. Linneus et hanc americanam dicit.

Buffo-

Buffonio et Pennanto Hirci varietas eſt. Doctiſſ. Pallas refert ad Antilopen Damam; ab hac vero certe differt le Bouc de Iuda Buffonii.

Coibat cum praecedente et pullum non diu ſuperſtitem in viuario Cliffortiano producebat. *Linn.*

29. ANTILOPE.

Dentes Primores ſuperiores nulli.
inferiores VIII.
Laniarii nulli.
Cornua concaua, ſurſum verſa, teretia, annulata vel ſpiralia.
Mentum imberbe.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

a) Cornibus erectis recuruis vncinatis.

Rupicapra. 1. A. cornibus erectis vncinatis, corpore ſupra ferrugineo.

Rupicapra *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 53 (*c.* 79 *Hard.*) *XI c.* 37 (*c.* 45 *Hard.*).
Αἴξ ἄγριος *Oppian. cyneg. II,* 338.
Rupicapra *Geſn. quadrup. p.* 321 *fig. p.* 319 mediocr.
Rupicapra *Bellon. obſ. p.* 57.
Dorcos ſiue Rupicapra *Aldrov. biſulc. p.* 725 *figg. p.* 727 mal.
Rupicapra *Ionſt quadrup. p.* 74 *tab.* 27 fig. mal.
Rupicapra Gems *Ionſt. quadrup tab.* 32 fig. bon.
Die Gems *Geſn. Thierb. p.* 140 *cum fig. ſuperiore* mala, *inferiore* mediocri.
Le Chamois *Perr. anim. I p.* 201 *tab.* 29 fig bon.
Rupicapra *Charlet. exerc. p.* 9.
Rupicapra, Rupicaprea *Wagn. Heluet. p.* 183.

Rupi-

Rupicapra *Rai. syn. quadr. p.* 78.
Rupicapra *Scheuchz. it. alp. I p.* 155.
Gemse *Kolbe Vorgeb. p.* 151?
Rupicapra *Rzacz. Polon. p.* 223 *auct. p.* 319.
Capra cornibus surrectis vncinatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.
Eine Gembse *Riding. jagdb. Th. tab.* 12 fig. bon.
Die Gems *Meyer Thiere I tab.* 66.
Capra cornibus erectis vncinatis *Linn. syst. nat.* 6 *p* 14 *n.* 5.
Tragus Dorcas, Rupicapra, Caprea *Klein. quadrup. p.* 17.
Capra cornibus erectis vncinatis. The capra, with erect, uncinated horns: the Rupicapra or Camoise *Hill anim. p.* 579 *tab.* 28 fig. mala.
Le Chamois ou l'Yzard: Hircus (Rupicapra) cornibus teretibus erectis, rugosis, ad apicem leuibus et vncinatis *Briss. regn. an. p.* 66 *n.* 6.
Capra cornibus erectis vncinatis *Kram. Austr. p.* 320.
Capra cornibus erectis vncinatis, pedibus longioribus: the Rupi-goat *Brown. Iam. p.* 488?
Die Gemse *Hall. vierf. p.* 314 *tab.* 3.
Capra (Rupicapra) cornibus erectis vncinatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 68 *n.* 3.
Chamois *Dictionn. anim. I p.* 483.
Gems: Geit met regt opstaande haakswyze Hoornen *Houtt. nat. hist. III p.* 180.
Le Chamois *Buff. hist. nat. XII p.* 136, 177 *tab.* 16.
Chamois *Bom. dictionn. I p.* 476.

Capra

ANTILOPES pleraeque calidiora orbis antiqui inhabitant, Americae plane exules, inque collibus, rarius in planis degunt, Timidae, agiles celeresque, corpore pedibusque graciliores, gregariae incedunt saepe ad aliquot millia. Edunt fruticulos. Caro nonnullarum moschum redolet. Feminae haud raro ecornes.

Capra (Rupicapra) cornibus erectis vncinatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 95 *n.* 4.
Antilope Rupicapra *Pallas miſcell. p.* 4.
Antilope Rupicapra *Pallas ſpicil. I p.* 7.
The Chamois *Penn. ſyn. quadr. p.* 17 *n.* 10.
Camuza *Alcſſ. quadrup. III tab.* 132 fig. Buff.
Die Gems *Müll. Naturſ. I p.* 409.
Die Gemſe, Felſengeis *Mart. Naturlex. II p.* 656.
Die Gemſe: Antilope europaea *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 53.
Camorcia *Italis.*
Camuza, Cabra montès *Hiſpanis.*
Cabra montez *Luſitanis.*
Chamois *Gallis, obſolete* Yſard, Sarris.
Gemſe *Germanis.*
Gems *Belgis.*
Chamois *Anglis.*
Koza ſkalna, dzika *Polonis.*
Дикая коза (Dikaja koza) *Ruſſis.*

Magnitudine Hirci, at crura longiora. Corpus pilis breuioribus ruſo-fuſcum, dorſo linea nigricante, ſed album fronte, vertice, gula, auribus intus. Cornua in vtroque ſexu nigra, teretia, erecta, rugoſa, ad apicem laeuia et vncinata. Sinus cutaneus ſingularis pone cornua. Labium ſuperius ſubfiſſum. Genua barbata. Cauda breuis, etiam ſubtus nigricans. Hieme corpus longius villoſum, magis griſeum. Stat pedibus inferius maxime approximatis.

Diſtin-

Species ANTILOPVM multae, neque ſatis bene determinatae a plerisque auctoribus: difficile itaque genus. Sequutus ſum imprimis Pennantum.

Diſtinguunt Heluetii minores magis ruſeſcentes ex alpibus altiſſimis (*Gratthiere*), et maiores magis fuſcos (*Waldthiere*).

Habitat in alpibus helueticis, rhaeticis praecipue, italicis, delphinatus, Graeciae, Cretae, in Pyrenaeis, Carpatis, non tam alte ac Capra Ibex. Gregaria. Victitat arbuſculorum ramulis, radicibus, herbis. Timida excellit viſu, olfactu, auditu. Celerrima. Hieme latet in ſpeluncis rupium. Coit menſe octobris et nouembris. Parit 2-3 martio vel Aprili. Vox ſibilans. Ex huius ventriculo Aegagropilae.

Coniungit hanc cum Capra Hirco Buffonius, quod mirum maxime.

leucophaea. 2. A. cornibus erectis retrorſum flexis, corpore ſupra caeruleo.

Blaue Böcke *Kolbe Vorgeb. p.* 141.

Der himmelblaue afrikaniſche Bock *Hall. vierf. p.* 308.

Africaniſche Gems *Knorr delic. II tab. K,* 4?

Antilope leucophaea *Pallas miſcell. p.* 4.

Antilope leucophaea *Pallas ſpicil. I p. 6.*

The blue Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 24 *n.* 13 *fig.* capitis *p.* 39.

Die lichtgraue Antilope *Mart. Naturlex. II p.* 681.

Der blaue Bock: Antilope capenſis *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 52.

Maior

Separandum vtique ANTILOPVM genus diuerſiſſimum a Caprino, a quo maxime differt.

Maior Ceruo Dama. Cornua 20 poll. longa, acuta, conica, retrorſum flexa, annulis infra 20, apice laeuia. Auriculae acutae. Cauda ſeptem pollices longa, apice alba, pilis longioribus floccoſa. Color viui animalis eleganter caeruleus, mortui e caeruleo griſeus. Litura ante oculos alba. Venter et pedes albi.

Habitat ad caput bonae ſpei.

b) Cornibus rectis.

rectícor-nis. 3. A. cornibus teretibus rectiſſimis baſi annulatis.

Gazella indica cornibus rectis longiſſimis nigris, prope caput tantum annulatis *Rai. ſyn. quadr. p.* 79.

Das africaniſche Elendthier *Kolbe Vorgeb. p.* 145 *tab.* 3 *fig.* 1.

Capra cornibus teretibus rectiſſimis longiſſimis: baſi annulatis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 50.

Capra cornibus teretibus rectiſſimis longiſſimis: baſi annulatis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 8.

Capra cornubus teretibus, rectiſſimis, longiſſimis, baſi annulatis. The Capra, with cylindric, ſtraight, and very long horns, annulated at the baſe: the Indian Antelope, or Bezoar-goat *Hill anim. p.* 581.

La Gazelle des Indes: Hircus (Gazella indica) cornibus teretibus, longiſſimis, rectis, baſi tantum annulatis *Briſſ. regn. an. p.* 67 *n.* 7.

Capra Gazella africana *Haſſelqu. Palaeſt. p.* 283.

Der weiſsgeſtreifte, rundhörnige afrikaniſche Bok *Hall. vierf. p.* 309.

Capra

ANTILOPES mediae ſunt Capras inter atque Ceruos: habitu ceruino, cornibus caprinis. Cyſtide fellea inſtruuntur. Oculi pulcherrimi nigri.

Capra (Gazella) cornibus teretibus rectiſſimis longiſſimis: baſi annulatis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 69 *n.* 7.

Gazelle *Dictionn. anim. II p.* 251 cum congeneribus.

Gazelle: Geit met ronde, zeer regte en lange Hoornen, die aan 't onder-end geringd zyn *Houtt. nat. hiſt. III p.* 197 *tab.* 24 *fig.* 1.

Capra cornibus teretibus rectiſſimis longiſſimis baſi annulatis *Gronov. zooph. I p.* 3 *n.* 8.

La Gazelle du Bézoard, que les Orientaux appellent Paſan *Buff. hiſt. nat. XII p.* 212 *tab.* 33 *fig.* 3 cornuum.

Capra (Gazella) cornibus teretibus rectiſſimis longiſſimis: baſi annulatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 97 *n.* 7.

Antilope bezoartica *Pallas miſcell. p.* 8.

Antilope bezoartica *Pallas ſpicil. I p.* 14.

Gazella recticornis *Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p.* 468 *tab.* 10 *fig.* 5 cornu foſſilis.

The aegyptian Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 25 *n.* 14.

Die Gaſelle *Müll. Naturſ. I p.* 412 *tab.* 24 *fig.* 1.

Bezoarantilope, Bezoarziege *Mart. Naturlex. II p.* 640.

Capra Gazella *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Der Bezoarbock *Müll. Naturſ. Suppl p.* 55.

ظبي (Dabi), غزال (Ghazell) *Aegyptiis.*

Magnitudo Cerui Damae. Cornua fere 3 ped. longa annulata baſi; ad baſin macula nigra triangularis, aliaque alba. Linea nigra a nucha ad lumbos vsque. Corpus ſupra cinereum, pectus venterque alba. Cauda longitudine pedis vnius, apice nigra, pilis longioribus.

Habitat in Aegypto, Arabia, totoque Oriente, in India, ad caput bonae ſpei; in planis.

bezoartica. 4. A. cornibus teretibus subarcuatis totis annulatis.

Gazella quae veteribus Oryx dicta *Bellon. obs. p.* 120.

Gazella *Alpin. Aeg. I p.* 232 *tab.* 14 *fig.* 1 mala.

Capra siue Hircus Bezaarticus *Aldrov. bisulc. p.* 755 *fig. p.* 756?

Hircus bezoarticus *Charlet. exerc. p.* 11.

Animal bezoarticum orientale *Rai. syn. quadr. p.* 80.

Bock der keinen Namen *Kolbe Vorgeb. p.* 142 *tab.* 2 *fig.* 2 (*male sub nomine* der blaue Bock)?

Tragus Bezaarticus, Bezoarbock *Klein. quadrup. p.* 19.

Capra cornubus teretibus, perfecte annulatis, arcuatis. The capra, with cylindric, arched, and perfectly annulated horns: the african Antelope *Hill anim. p.* 581 *tab.* 28 fig. mala.

La Gazelle du Bezoar: Hircus (Gazella bezoartica) cornibus teretibus rectis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo laeui *Briss. regn. an. p.* 69 *n.* 9.

Der Bezoarbock, Hirschziege *Hall. vierf. p.* 318.

Algazel *Buff. hist. nat. XII p.* 211 *tab.* 33 *fig.* 1, 2 cornuum.

Gazelle *Bom. dictionn. II p.* 288 cum congener.

Capra (bezoartica) cornibus teretibus arcuatis totis annulatis, gula barbata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 96 *n.* 9.

The Bezoar Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 26 *n.* 15.

Der Bezoarbock *Müll. Naturs. I p.* 415.

Antilope mit bogenförmig gekrümmten Hörnern *Mart. Naturlex. II p.* 676.

De hac quid sentiam, fere ignoro. Confusa tantum non omnia synonyma. Forte Capra Aegagrus est.

Magni-

Magnitudo Hirci. Corpus ex cinereo rufum. Dorfum ftria longitudinali alba. Cauda nigra. Cornua ad 3 pedes longa, gracilia, erecta, fubrecuruata, magis minusue annulata. Femina ecornis. Mentum barbatum.

Habitat in montibus inacceffis Perfiae. Celer atque timida, numquam in plana defcenfura. Gregaria. Eft quoque in Aegypto. Manfuefcere facile eam Alpinus habet.

Oryx. 5. A. cornibus rectis vltra medietatem bafi fpiraliter tortis, corpore grifeo.

Oryx *Plin. hift. nat. II* c. 40 (*c.* 4 *Hard.*). *X* c. 73 (*c.* 94 *Hard.*). *XI* c. 46 (*c.* 106 *Hard.*).

Empalagna *Purch. Pilgr. II p.* 1002.

Oryx *Ionft. quadrup. p.* 81.

Les Nil-gaux ou boeufs gris *Bernier voy. II p.* 245.

Empakaffe *Dictionn. anim. II p.* 99.

Le Coudous *Buff. hift. nat. XII p.* 357 *tab.* 46 *Bis* figg. corn.

Empakaffe ou Impanguezze *Bom. dictionn. II p.* 103.

Empalagna *Bom. dictionn. II p.* 103.

Antilope Oryx *Pallas mifcell. p.* 9.

Antilope Oryx *Pallas fpicil. I p.* 15.

The indian Antelope *Penn. fyn. quadr. p.* 26 *n.* 16.

Groffe wilde Ziegenantilope *Mart. Naturlex. II p.* 685.

Der Cudu *Müll. Naturf. Suppl. p.* 55.

Maior, magnitudine Equi. Cornua 2 ped. longa, craffa, recta, nigra, cum prominentiis duabus fpiralibus ad duas tertias, apice laeuia. Color corporis dilute grifeus, linea per dorfum, et pedum extremitatibus nigricantibus. Animal itidem obfcurum.

Habitat in India et Africa. Mitis, monogama. Vox fortis. Caro proba.

Ceruum Mazame *Sebae* huius deteriorem figuram esse doctiss. Pallas indicat.

scripta. 6. A. cornibus rectis spiraliter tortis, corpore ruso-fusco striis albis.

Le Guib *Buff. hist. nat. XII p.* 305, 327 *tab.* 40 fig. animalis, *tab.* 41 *fig.* 1 cornu.
Guib *Bom. dictionn. II p.* 411.
Antilope scripta *Pallas miscell. p.* 8.
Antilope scripta *Pallas spicil. I p.* 15.
The harnessed Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 27 *n.* 17.
Guib *Alesf. quadrup. III tab.* 134 fig. Buff.
Die bunte Antilope *Mart. Naturlex. II p.* 643.
Der Creutzbock *Müll. Naturs. Suppl. p.* 55.
Oualofes, Zalofes *Aethiopibus ad Senegal fluuium.*

Magnitudo fere Cerui Damae. Cornua recta, nouem pollices longa, retrorsum versa, cum spiris duabus longitudinalibus. Auriculae latae. Color corporis obscure ex rufo fuscus. Macula alba infra vtrumque oculum. Latera corporis fasciis duabus transuersis albis, per quas transeunt forma crucis duae aliae a dorso ad ventrem vsque. Venter dorso concolor lineis tribus albis vtrinque. Femora albo maculata. Cauda longitudine decem pollicum, pilis longis.

Habitat in planis et siluis Senegaliae, gregaria.

Grimmia. 7. A. cornibus rectis basi subannulatis, inter cornua fasciculo piloso.

Capra siluestris americana *Grimm: Miscell. nat. curios. dec. II ann.* 4 *p.* 131 *fig.* 13 mala.

Capra

Capra ſilueſtris Africana Grimmii *Rai. ſyn. quadr. p.* 80.

Capra capite faſciculo piloſo, cauitate infra oculos *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 51.

Capra capite faſciculo tophoſo, cauitate infra oculos *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 10.

Tragus, Capra ſilueſtris Africana Grimmii *Klein. quadrup. p.* 19.

Capra capite faſciculo tophoſo, cauitate infra oculos. The Capra, with a tophoſe bunch on the head, and a hollow under the eyes *Hill anim. p.* 581.

Le Chevrotain d'Afrique: Tragulus (africanus) in medio capite faſciculum piloſum erectum gerens *Briſſ. regn. an. p.* 97 *n.* 4.

Die amerikaniſche Gazelle mit dem Haarbüſchel auf dem Kopfe *Hall. vierf. p.* 318.

Capra (Grimmia) capite faſciculo tophoſo, cauitate infra oculos *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 70 *n.* 10.

Geit met een knobbelagtig bondeltje Hair op 't Voorhoofd en een holligheid onder de Oogen *Houtt. nat. hiſt. III p.* 215.

La Grimme *Buff. hiſt. nat. XII p.* 307, 329 *tab.* 41 *fig.* 2, 3 capitis.

Moſchus (Grimmia) capite faſciculo tophoſo *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 92 *n.* 2.

Antilope Grimmia *Pallas miſcell. p.* 1 *tab.* 1.

Antilope Grimmia *Pallas ſpicil. I p.* 15, 38 *tab.* 3.

The Guinea Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 27 *n.* 18.

Afrikaniſche Moſchus *Müll. Naturſ. I p.* 376.

Grimmiſche Antilope *Mart. Naturlex. II p.* 668 *cum fig.* Pall.

Der Iungfernbock *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 55.

Magnitudo pulli Cerui Damae bimeſtris. Cornua 18 poll. longa, recta, nigra, gracilia, acuta, baſi longitudine trium pollicum laeuiter annulata. Auriculae largae. Oculi obſcuri. Infra eos foſſa

 cum

cum liquore oleofo graueolente. Inter cornua crifta pilorum nigrorum. Corpus fupra fufcum, admixto cinereo flauoque. Venter albus. Cauda breuis, fupra nigra, fubtus alba. Femina ecornis.

Habitat in Guinea. Timida, pernix.

regia. 8. A. cornibus breuiffimis rectiufculis, corpore rufo-fufco.

Der Hirfche ihre Könige *Boffm. Guin. p.* 294.

Biches d'une petiteffe extraordinaire *Des March. voy. I p.* 275.

Ceruus iuuencus perpufillus, Guineenfis *Seb. thef. I p.* 70 *tab.* 43 *fig.* 3.

Capra pedibus digito humano anguftioribus *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 50.

Capra pedibus digito humano anguftioribus *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 4.

Traguli Guineenfes *Klein. quadrup. p.* 21.

Capra pedibus digito humano anguftioribus. The Capra, with feet fmaller than a man's finger: the Guinea-deer *Hill anim. p.* 579.

Capra (perpufilla) pedibus digito humano anguftioribus *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 12.

Petite efpece de biches *Adanf. Seneg. p.* 114.

Das kleinfte Guineeifche Hirfchgen *Hall. vierf. p.* 321 *tab.* 6.

Capra (pygmaea) cornibus teretibus conicis obtufis curuis: latere incuruato rugofo *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 69 *n.* 6.

Guineefch Geitje: Geit met de Hoornen Kegelvormig rond, aan 't end ftomp, krom, en aan de ingeboogen Zyde rimpelig *Houtt. nat. hift. III p.* 194.

Capra? pedibus bifulcis, pilis longis obfcure fuluis *Gronov. zooph. I p.* 3 *n.* 7?

Le Chevrotain du Senegal *Buff. hist. nat. XII p.* 815 *tab.* 43 *fig.* 2 cornu.
The royal Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 28 *n.* 19.
Guevei *Guineensibus.*

Altitudo corporis vix nouem pollicum. Crura crassitie pennae anserinae. Cornua breuissima, nigra, polita, longitudine 2 pollicum. Auriculae magnae. Color corporis rufo-fuscus. Femina ecornis.

Habitat ad Senegal fluuium, inque calidissimis reliquis Africae. Agilis, mitis. Non fert nostrum clima. Vide quoque Moschum pygmaeum.

c) *Cornibus in frontem reduncis.*

Tragocamelus. 9. A. cornibus in frontem reduncis, corpore supra cinereo, fronte macula rhombea nigra.
Biggel *Mandelst. Reis. I p.* 122.
Tragelaphus Caii apud Gesnerum *Rai. syn. quadr. p.* 82?
A Quadruped brought from Bengal *Parsons: Philos. transact. num.* 476 *p.* 465 *tab.* 3 *fig.* 9.
Der Bokhirsch *Hall. vierf. p.* 319.
Antilope Tragocamelus *Pallas miscell. p.* 5.
Antilope Tragocamelus *Pallas spicil. I p.* 9.
The Indostan Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 29 *n.* 20.
Bockskameel *Mart. Naturlex. II p.* 643.
Der Kameelbock *Müll. Naturs. Suppl. p.* 53.

Altitudo circiter 5 pedum. Cornua 7 poll. longa, antice versa. Oculi pulchri nigri. Collum fere Cameli. In vertice iuba breuis. Palearia Tauri cum pilis longioribus. Cauda 22 poll. longa, pilis longioribus terminata. Crura gracilia. Corpus pilis breuibus, mollibus, supra cinereis, sub-

tus albis. Cauda corpori concolor. In fronte macula rhombea nigra.

Habitat in Bengala. Cameli more procumbit.

albipes. 10. A. cornibus in frontem reduncis, maculis albis supra vngulas.

The whitefooted Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 29 *n.* 21 *tab.* 6 *fig.* 1 feminae; *fig.* 2 maris.

The Nyl-ghau *Hunter: Philos. transact. LXI p.* 170 *cum fig.* maris.

Altitudo vsque ad humeros quatuor pedum. Cornua breuia, paullulum antrorsum versa. Auriculae magnae, striis duabus nigris. Iuba breuis in collo dimidioque dorso nigra. Crista pilosa nigra in medio collo subtus, cum macula magna alba supra eam, aliaque in pectore inter crura antica. Macula alba in vtroque pede antico supra vngulam, in posticis vtrinque duae. Cauda longa, pilis longis nigris. Color corporis obscure griseus: in femina magis fuscus. Huic cornua nulla, et pedes supra vngulas circumdati fasciis tribus nigris et duabus albis alternis.

Habitat in India. E viuis descriptionem et figuras dedit Pennatus, eodemque tempore Hunterus.

Dama. 11. A. cornibus in frontem reduncis, corpore supra fuluo, subtus albo.

Dama *Plin. hist. nat. VIII c.* 53 (*c.* 79 *Hard.*) *XI c.* 37 (*c.* 45 *Hard.*).

Dama Plinii et veterum *Gesn. quadrup. p.* 334.

Dama *Aldrov. bisulc. p.* 729 *cum fig.* mala.

Dama veterum *Ionst. quadrup. p.* 75 *tab.* 27 fig. Aldrov.

Dama veterum *Rai. syn. quadr. p.* 83.

Le

Le Nangueur ou Nanguer *Buff. hist. nat. XII p.* 213 *tab.* 34 fig. anim. *tab.* 32 *fig.* 3 cornu.
Antilope Dama *Pallas miscell. p.* 5.
Antilope Dama *Pallas spicil. I p.* 8.
The swift Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 30 *n.* 22.
Nanguer *Alest. quadrup. IV tab.* 162 fig. Buff.
Damantilope oder Damhirschantilope *Mart. Naturlex. II p.* 645.
Die africanische Gemse *Müll. Naturf. Suppl. p.* 53.
Nangueur, Nanguer *ad Senegal fluuium.*

Longitudo corporis fere quatuor pedum, altitudo 2 ped. 8 poll. Cornua teretia, octo pollices longa, apice reuersa, in vtroque sexu. Corpus supra fuluum, subtus album; pectus macula alba: videtur autem variare color.

Dentes primores infra tantum seni, quorum duo medii latissimi, subobliqui, acie recta transuersa terminati; laterales parui lineares. *Pallas.*

Habitat ad Senegal. Animal celerrimum, facile mansuescens.

redunca. 12. A. cornibus in frontem reduncis, corpore toto rufo.

Le Nagor *Buff. hist. nat. XII p.* 326 *tab.* 46.
Antilope reuersa *Pallas miscell. p.* 5.
Antilope redunca *Pallas spicil. I p.* 8.
The red Antilope *Penn. syn. quadr. p.* 30 *n.* 23.
Nagor *Alest. quadrup. III tab.* 136 fig. Buff.
Antilope mit vorwärts gebogenen Haken *Mart. Naturlex. II p.* 672.
Das Krummhorn *Müll. Naturf. Suppl. p.* 53.

Longitudo corporis 4 pedum, altitudo 2 ped. 3 poll. Cornua $5\frac{1}{2}$ pollices longa, ad basin annulo vno

vel altero laeui. Auriculae 5 poll. longae. Corpus pallide rufum totum.

Habitat ad Senegal.

Idem animal eſt iudice perill. Buffonio:

Mazame, ſeu Ceruus cornutus, ex noua Hiſpania *Seb. theſ. I p. 69 tab. 42 fig. 3.*

Der gehörnte Hirſch aus Neuſpanien *Meyer Thiere III tab.* 19 fig. Sebae.

Tragulus Mazame *Klein. quadrup. p.* 21.

La chevre de la nouvelle Eſpagne: Hircus (Capra nouae Hiſpaniae) cornibus teretibus, erectis, ab imo ad ſummum ſpiraliter intortis *Briſſ. regn. an. p.* 72 *n.* 14.

Das neuſpaniſche Mazame oder röthliche Hirſchgen *Hall. vierf. p.* 320.

Chevre de la nouvelle Eſpagne *Dictionn. anim. I p.* 595.

Sebam autem figuram ſuam mutuatum fuiſſe ex picturis capenſibus, quas olim habuit Boerhaauius, hodie Io. Burmannus vir doctiſſ. eamque ad Antilopen Orygem potius pertinere Pallas monet.

Mazame Hernandezii aliud plane animal eſt Ceruini generis.

d) Cornibus ſpiralibus.

Strepſiceros. 13. A. cornibus ſpiralibus, facie nigricante V albo notata.

Strepſiceros *Geſn. quadrup. p.* 323.

Bos Strepticeros *Aldrov. biſulc. p.* 368 *fig. p.* 369 mala.

Strepſiceros *Ionſt. quadrup. p.* 54.

Capra Strephiceros *Ionſt. quadrup. tab.* 24.

Tragus

Tragus Strepſiceros *Klein. quadrup. p.* 18. (Forte ad ſequentem pertinet.)

Houtt. nat. hiſt. III tab. 26 *fig.* 1 bona; *fig.* 2 cornu.

Le Condoma *Buff. hiſt. nat. XII p.* 301 *tab.* 39 *fig.* 1 cranii, *fig.* 2 cornu.

Un Cerf du çap de bonne eſperance *Colini: comm. palatin. I p.* 487 *cum fig.* bon.

Africaniſcher Cutu *Knorr. delic. II tab. K,* 5 *fig.* 1 capitis, *fig.* 4 cornu, *tab. K,* 11 animalis.

Antilope Strepſiceros *Pallas miſcell. p.* 9.

Antilope Strepſiceros *Pallas ſpicil. I p.* 17.

The ſtriped Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 31 *n.* 24.

Das Africaniſche Koutou oder Kututhier *Müll. Naturſ. I p.* 429 *tab.* 26 *fig.* 1 bona; *fig.* 2 cornu.

Antilope mit gewundenen Hörnern *Mart. Naturlex. II p.* 677.

Der Condoma *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 55.

Longitudo corporis 9 pedum, altitudo 4 ped. Cornua longitudine 3 ped. 9 poll. laeuia, ſpiralia, lateribus compreſſa, cum ruga longitudinali pallide fuſca, apicibus acutis 2 ped. 7½ poll. diſtantibus a ſe inuicem. Corpus gracile e griſeo rubens. Stria alba per dorſum vsque ad caudam, ſeptemque aliae transuerſae. Iuba breuis. Criſta ſupra pectus. Pectus cum ventre griſeum. Cauda longitudine duorum pedum, ſupra fuſca, ſubtus alba, apice nigro. Facies nigricans, lineis duabus albis ab angulo oculi vtriusque ad naſum vsque. Crura gracilia. Genua antica nigra.

Habitat ad caput bonae ſpei.

Ceruicapra. 14. A. cornibus ſpiralibus annulatis, corpore ſupra fuſco, ſubtus albo.

Strepſiceros, quem Addacem Africa appellat *Plin. hiſt. nat. XI c.* 37 (*c.* 45 *Hard.*)?

Gazella

Gazella *Ionst. quadrup. tab.* 29 fig. bon.

La Gazelle *Perr. anim.* I *p.* 93 *tab.* 11 fig. bon.

Gazella africana *Rai. syn. quadr. p.* 79.

Capra cornibus teretibus dimidiato annulatis arcuatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.

Die afrikanische Gazelle *Meyer Thiere III tab.* 33 fig. Perr.

Capra cornibus teretibus dimidiato annulatis arcuatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 14 *n.* 7.

Capra cornubus teretibus dimidiato arcuatis, annulatis. The Capra, with the horns cylindric, and half way arched *Hill anim. p.* 580.

La Gazelle: Hircus (Gazella) cornibus teretibus, dimidiato-annulatis, bis arcuatis *Briss. regn. an. p.* 68 *n.* 8.

Die afrikanische Gazelle *Hall. vierf. p.* 316 *tab.* 4.

Capra (Ceruicapra) cornibus teretibus dimidiato-annulatis contortis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 69 *n.* 8.

Besoarbok: Geit met ronde Hoornen, die ter halver langte geringd zyn en bogtig *Houtt nat. hist. III p.* 206 *tab.* 24 *fig.* 2?

L'Antilope *Buff. hist. nat. XII p.* 215 *tab.* 35 fig. sceleti, *tab.* 36 *fig.* 1 cranii, *fig.* 2 cornu.

Capra (Ceruicapra) cornibus teretibus dimidiato-annulatis flexuosis contortis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 96 *n.* 8.

Antilope Ceruicapra *Pallas miscell. p.* 9.

Antilope Ceruicapra *Pallas spicil. I p.* 18, 19 *tab.* 1 fig. maris, *tab.* 2 feminae.

The common Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 32 *n.* 25.

Der Hirschbock *Müll. Naturs. I p.* 414 *tab.* 24 *fig.* 2?

Der Bezoarbock *Mart. Naturlex. II p.* 673.

Die bengalische Antilope: Antilope rupicapra *Müll. Naturs. Suppl. p.* 56.

Paullo

Paullo minor Ceruo Dama. Corpus fupra e rufo obfcure fufcum, in colli lateribus et per humeros longitudinaliter fere nigrum, ceruice grifeo-fulvefcente. Caput nigricans. Orbitae albae. Os fufcum. Corpus fubtus pedesque intus albi. Cauda breuis, fupra nigra, fubtus alba. Cornua nigra, erecta, fpiralia, fere tota annulata, interdum vero laeuia (*Buff. hift. nat. XII tab.* 36 *fig.* 3), longitudine circiter quatuordecim pollicum, apicibus 16 poll. ab inuicem diftantibus. Femina ecornis, grifeo-flauefcens, ftria per dorfi latera vtrinque albicante.

Habitat in Africa. Grauida 9 menf. vnipara.

Varietas videtur:
The Lidmee *Shaw trav. p.* 243?
Antilope des Indes *Buff. hift. nat. XII p.* 217.
The brown common Antelope *Penn. fyn. quadr. p.* 32.

Magnitudo Cerui Capreoli. Corpus fupra obfcure fufcum, fubtus album. Macula nigra fupra vngulas. Cauda fupra nigra, fubtus alba. Cornua Ceruicaprae.

Habitat in Bengala.

e) Cornibus medio flexis.

Dorcas. 15. A. cornibus teretibus annulatis medio flexis apicibus approximatis.

Δορκας *Aelian. anim. XIV c.* 14.
Algazel ex Aphrica *Hernand. Mexic. p.* 893 *cum fig. mediocr.*
Gazella Africana cornibus breuioribus, ab imo ad fummum fere annulatis, et circa medium inflexis *Rai. fyn. quadr. p.* 80.

Capra

Capra cornibus teretibus perfecte annulatis arcuatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 51.

Capra cornibus teretibus perfecte annulatis arcuatis *Linn. syst nat.* 6 *p.* 14 *n.* 9.

La Gazelle d'Afrique: Hircus (Gazella africana) cornibus teretibus, arcuatis, ab imo ad summum fere annulatis, apice tantummodo laeui *Briss. regn. an. p.* 69 *n.* 10.

Capra (Dorcas) cornibus teretibus perfecte annulatis contortis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 69 *n.* 9.

Geit met ronde Hoornen, die byna tot boven toe geringd zyn en bogtig *Houtt. nat. hist. III p.* 213 *tab.* 24 *fig.* 3.

La Gazelle, la Gazelle commune *Buff. hist. nat. XII p.* 201, 249 *tab.* 23 fig. animalis, *tab.* 31 *fig.* 1 cranii.

Capra (Dorcas) cornibus teretibus perfecte annulatis recuruatis contortis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 96 *n.* 10.

Lybische Ziege *Knorr delic. II tab. K*, 5 *fig.* 3 cornu.

Antilope Gazella *Pallas miscell. p.* 7.

Antilope Dorcas *Pallas spicil. I p.* 11.

The Barbary Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 33 *n.* 26 *cum fig.* capitis in titulo libri.

Gazella *Aless. quadrup. II tab.* 90 fig. Buff.

Die afrikanische Ziege *Müll. Naturs. I p.* 416 *tab.* 24 *fig.* 3 Houtt.

Die gemeine Gazelle *Mart. Naturlex. II p.* 646.

Die Gazelle *Müll. Naturs. Suppl. p.* 54.

Ceruo Dama dimidio minor. Cornua pollices 12 longa, teretia, antrorsum versa apicibus, annulis circiter tredecim prope basin. Corpus supra rufofuscum, subtus album, linea nigricante vtrumque colorem separante in lateribus. Genua longius pilosa. Cauda supra nigra, subtus alba.

Habitat

Habitat in Barbaria, Aegypto, Oriente.

Kevella. 16. A. cornibus planis annulatis medio flexis apicibus approximatis.

Steinbock *Kolbe Vorgeb. p.* 166?

Le Kevel *Buff. hist. nat. XII p.* 204, 258 *tab.* 26 fig. animal. *tab.* 31 *fig.* 2 cranii.

Antilope Kevella *Pallas miſcell. p.* 7.

Antilope Kevella *Pallas ſpicil. I p.* 12.

The flat-horned Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 34 *n.* 27.

Afrikaniſche Antilope oder Kevella *Mart. Naturlex. II p.* 649.

Das Plathorn *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 54.

Cornua antecedentis, at lateribus plana, annulisque pluribus 14-20 circumdata, nigra; feminae minora. Corpus magnitudine Capreoli minoris. Color ſupra rufo-fuſcus, ſubtus albus. Faſcia nigricans per latera. Auriculae ſtriis tribus albis. Cauda nigra.

Habitat ad Senegal fluuium.

Antilopen Corinnam huius eſſe feminam Pallas habet *ſpicil. I p.* 12: Buffonius tamen vtrumque deſcribit ſexum. Hic varietatem potius putat Dorcadis.

Pygargus. 17. A. cornibus medio flexis apicibus approximatis, facie alba.

Antilope Dorcas *Pallas miſcell. p.* 6.

Antilope Pygargus *Pallas ſpicil. I p.* 10.

The white Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 34 *n.* 28.

Der Weiſsarſch *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 54.

Cornua vt in Kevella et Dorcade, longitudine 14½ poll. Corpus maius Hirco. Auriculae longitudine ſeptem

ſeptem pollicum. Facies alba. Dorſum cinereum admixto rubro, in medio linea nigra. Latera et humeri e nigro fuſci. Venter albus, ſupra linea nigricante terminatus. Cauda longitudine ſeptem pollicum, nigra.

Hanc cum proxime ſequente coniungit Pallasius, quod taxat Pennantus.

orientalis. 18. A. cornibus baſi annulatis medio flexis, corpore rufeſcente.

Eine Art Hirſche, Ahu genannt *Olear. Reiſ. p.* 449.

Capra Ahu *Kaempf. amoen. exot. p.* 403 *fig. p.* 407 *n.* 1.

Dſheren *I. G. Gmelin Sibir. II p.* 103.

Caprea campeſtris gutturoſa, cornibus nec ramoſis, nec deciduis *I. G. Gmelin: Nov. comm. petrop. V p.* 347 *tab.* 9 fig. mediocr.

Beſoarbok: Geit met ronde Hoornen, die ter halver langte geringd zyn en bogtig *Houtt. nat. hiſt. III p.* 206 *tab.* 24 *fig.* 2?

Le Tzeiran *Buff. hiſt. nat. XII p.* 207 *tab.* 31 *fig.* 6 cornu (niſi forte ad A. leucophaeam pertineat).

Das Thier Ahu *S. G. Gmelin Reiſ. III p.* 496? (niſi forte Ceruus Pygargus ſit.)

The Chineſe Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 35 *n.* 29.

Der Hirſchbock *Müll. Naturſ. I p.* 414 *tab.* 24 *fig.* 2?

Tzeiran *Mart. Naturlex. II p.* 652.

Джеренъ (Dſheren') (*mas*); Она (Ona) (*femina*) *Ruſſis et Mongolis.*

Ahu *Perſis.*

Tzeiran *Turcis.*

Magnitudo Cerui Capreoli, eiusdemque coloris et morum. Cornua gracilia, medio paullulum curvata, ad baſin annulata, verſus apicem laeuia nigerrimaque;

rimaque; feminis exigua vel nulla. Larynx valde prominens extus in mare.

Habitat in Persia, regno Sinensi reliquaque Asia trans Backal lacum, ad ripas fluuiorum, per quos facile natat. Caro esculenta.

scythica. 19. A. cornibus rectiusculis diaphanis, corpore albido.

Colos *Gesn. quadrup. p.* 893.
Suhak Scytharum *Aldrov. bisulc. p.* 763.
Andere Art wilder Schaafe: ein Straubschaaf *Gesn. Thierb. p.* 156 *cum fig.* mediocr.
Suhak Scytharum *Charlet. exerc. p.* 11.
Suhak animal Caprae siluestri simile *Rzacz. Polon. p.* 224.
Suhak Polonis, Akoim Turcis, Akkiik Tartaris *Rzacz. auct. p.* 320.
Saiga *I. G. Gmelin Sibir. I p.* 212.
Ibex imberbis *I. G. Gmelin: Nov. comm. petrop. V p.* 345.
Ibex imberbis *Nov. comm. petrop. VII summar. p.* 39 *tab.* 19 fig. maris et feminae.
Das Ziegeneinhorn *Hall. vierf. p.* 322.
A species of deer *Bell trav. I p.* 41.
Le Saiga *Buff. hist. nat. XII p.* 198 *tab.* 22 *fig.* 2 cornu.
Saiga *Bom. dictionn. IV p.* 71.
Capra (tatarica) cornibus teretibus rectiusculis perfecte annulatis apice diaphanis, gula imberbi *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 97 *n.* 11.
Wilde Ziegen die Saigi genannt werden *Rytschk. Orenb. I p.* 231.
Antilope Saïga *Pallas miscell. p.* 6.
Antilope scythica *Pallas spicil. I p.* 9.
Capra Sayga *Forster: Philos. transact. LVII p.* 344.

Die Ziegen Saigaki genannt *S. G. Gmelin Reiſ. II p.* 174 *tab.* 12.
Capra Saiga *S. G. Gmelin: Nov. comm. petrop. XIV p.* 512.
The ſcythian Antilope *Penn. ſyn. quadr. p.* 35 *n.* 30.
Die wilde Steppenziege *Pallas Reiſ. I p.* 211.
Die tatariſche Ziege *Müll. Naturſ. I p.* 417.
Skytiſche Antilope *Mart. Naturlex. II p.* 682.
Der Tartar: Antilope ſcytica *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 53.
Маргачь (Margacz') (*mas*); Сайга (Saiga) (*femina*) *Ruſſis.*

Magnitudo Hirci et maior. Cornua longitudine pedis vnius, flaua, ſubdiaphana, medio paullulum caruata, apicibus introrſum verſis, laeuibus, reliqua parte annulis minus eleuatis. Caput ouillum. Auriculae erectae, latiuſculae, in mucronem obtuſum deſinentes. Naſus latus arcuatus, cum linea longitudinali eleuata. Nares tubulatae, magnae. Labium ſuperius pendulum. Dentes parum fixi, vt facile excutiantur. Corpus ſupra ſordide album cum ſtria ſubfuſca in dorſo, ſubtus candidum. Cauda tenuis, longitudine trium pollicum. Mas lana caprina veſtitus, odore forti, ſemina pilis mollioribus, ecornis.

Habitat in vaſtis deſertis Tanain inter et Boryſthenem vsque ad Aſtracan; etiam in Poloniae finitimis viſa. Gregaria. Mirae pernicitatis animal. Vox ouis. Retro it dum edit. Mares defendunt feminas intra peripheriam circuli collectas, quam ipſi occupant, contra hoſtes. Iunior facile manſueſcit. Caro editur ad Irtiſch fluuium vulgatiſſima. Parit vere vnum aut gemellos.

Corin-

Corinna. 20. A. cornibus medio flexis, faciei lateribus linea alba.

Der gescheckte africanische Bok *Hall. vierf. p.* 309.

La corine *Buff. hist. nat. XII p.* 205, 261 *tab.* 27 fig. animalis; *tab.* 31 *fig.* 3, 4 cornu.

Bunter Bock *Knorr delic. II tab. K,* 1 *fig.* 1 capitis.

Antilope Corinna *Pallas miscell. p.* 7.

The spotted Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 37 *n.* 31.

Corina *Alessi. quadrup. IV tab.* 161 fig. Buff.

Minor Ceruo Capreolo. Faciei latera linea alba notata. Cornua gracilia, longitudine sexpollicum, rugosa, annulis minus eleuatis ad 60. Corpus supra rufum, subtus album, linea nigra vtrumque colorem distinguente. Genua longius pilosa. Cauda nigra. Corpus interdum albo maculatum.

Esse Kevellae feminam Pallas *spicil. I p.* 12; varietatem vero Dorcadis Buffonius.

Habitat ad Senegal fluuium.

Bunter Bock *Kolbe Vorgeb. p.* 142 Ceruo maior est. Cornua paullulum reclinata, infra annulata, supra glabra. Mentum barba insigni. Pedes infra genua nigro-fusci. Animal gregarium, ad caput bonae spei; num huius generis?

Bubalis. 21. A. cornibus medio flexis spiralibus, faciei linea nigra.

Bubalus *Plin. hist. nat. VIII c.* 15 (*c.* 15 *Hard.*).

Βουβαλος *Oppian. cyneg. II,* 300.

Bubalus *Gesn. quadrup. p.* 330.

Bubalus veterum *Aldrov. bisulc. p.* 363.

Bubalus *Aldrov. bisulc. p.* 365 *cum fig.* mala.

Bubalus veterum *Ionst. quadrup. p.* 52.

La Vache de Barbarie *Perr. anim. II p.* 24 *tab.* 39 fig. bon.

Buſelaphus Io. Caii apud Geſnerum ſeu Moſchelaphus *Rai. ſyn. quadr. p.* 81.

The Bekker el Waſh *Shaw trav. p.* 242?

Das Rindvieh aus der Barbarei *Hall. vierf. p.* 277 *tab.* 2.

Le Bubale *Buff. hiſt. nat. XII p.* 294 *tab.* 37 fig. ſceleti, *tab.* 38 *fig.* 1, 2 cranii.

Vache de Barbarie *Bom. dictionn. IV p.* 497.

Antilope Buſelaphus *Pallas miſcell. p.* 7.

Antilope Bubalis *Pallas ſpicil. I p.* 12.

The cervine Antelope *Penn. ſyn. quadr. p.* 37 *n.* 32.

Afrikaniſche Kuhantilope *Mart. Naturlex. II p.* 679.

Die Blaſengazelle *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 54.

Magnitudo Cerui Elaphi. Corpus figura fere Cerui Vaccaeque mixtum, robuſtius et formae minus elegantis, quam in congeneribus. Caput magnum bouinum. Cranium vertice inter aures alte prominulum, vnde exoriuntur cornua. Cornua extrorſum retrorſumque curuata, apicibus diſtantibus, ſpiralia annulataque, fortia, nigra, longitudine viginti pollicum. Oculi cornibus approximati. Labium inferius nigrum, ad marginem vtrinque ſingulari myſtace ſeu faſciculo pilorum nigrorum notatum. Roſtrum antice faſcia nigra, terminata ad frontem, topho pilorum vorticoſo ante cornua obſeſſam. Cauda longitudine pedis vnius et vltra, atra, apice floccoſa. Color e griſeo fuleſcens, in capite et collo magis ferrugineus, in dorſo fuſcidus, in clunibus pedibusque pallidulus. Lineae nigricantes per ceruicem vna, et per humeros antice longitudinales. Litura triangularis nigricans ad flexuram clunium.

Habitat

Habitat in Barbaria. Animal mite.

Ceruum Temamaçane Sebae huc pertinere forte Pallas.

Koba. 22. A. cornibus medio flexis, macula genuum nigricante.

Le Koba *Buff. hist. nat. XII p.* 210, 268 *tab.* 32 *fig.* 2 cornuum.

The Senegal Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 38 *n.* 33 *fig. p.* 39 capitis.

Die grosse braune Kuh von Senegal *Mart. Naturlex. II p.* 678.

La grande Vache brune *Gallis ad Senegal.*

Magnitudo Cerui. Cornua 17 poll. longa, lateribus plana, circa medium extrorsum, porro introrsum, dein rursus extrorsum flexa, apicibus distantibus ad 6 poll. annulis prominentibus 11-12, apicibus laeuibus acutissimis. Caput magnum 18 poll. longum, rostro elongato. Auriculae 7 poll. longae. Corpus supra ruso-fuscum, venter sordide albus. Genua macula nigricante notata. Vngulae paruae. Cauda longitudine pedis vnius, nigra, pilis longioribus.

Habitat ad Senegal.

Kob. 23. A. cornibus medio flexis basi annulatis, apicibus maxime approximatis.

Le Kob *Buff. hist. nat. XII p.* 210, 267 *tab.* 32 *fig.* 1 cranii.

The Gambian Antelope *Penn. syn. quadr. p.* 39 *n.* 34.

Die kleine braune Kuh von Senegal *Mart. Naturlex. II p.* 678.

La petite Vache brune *Gallis ad Senegal.*

Magnitudo Cerui Damae. Cornua 13 poll. longa, apicibus et basibus valde approximata, medio longe distantia, annulis 8 - 9, apicibus laeuibus.

Habitat ad Senegal.

Varietatem A. orientalis putat Buffonius.

30. CERVVS.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.
Laniarii nulli (*interdum solitarii superius*).
Cornua solida, annua, tenera corio hirto tecta apiceque crescentia, denudata.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

Camelopardalis. 1. C. cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis.

Camelopardalis, ouis fera *Plin. hist. nat. VIII c.* 18 (*c.* 27 *Hard.*).

Καμηλοπορδαλις *Oppian. cyneg. III,* 461.

Camelopardalis *Gesn. quadrup. p.* 160 *cum fig.* mediocr.

Gyraffa, quam Arabes Zurnapa, Graeci et Latini Camelopardalin nominant *Bellon. obs. p.* 118 *fig. p.* 119 mala.

Giraffes bestes rares et belles *Thevet cosmogr. I fol.* 388 *b fig. fol.* 389 *a* mediocr.

Came-

CERVI pedibus anterioribus calcitrant; siluis delectantur. Cystide fellea carent.

Camelopardalis quem Arabes Zurnap et noſtri Giraffam appellant *Alpin. Aeg. I p.* 236 *tab.* 14 *fig.* 4 mediocr.

Graffa *Nieremb. hiſt. nat. p.* 191.

Camelopardalis *Aldrov. biſulc. p.* 927 *fig. p.* 931 mediocr.

Camelopardalis *Ionſt. quadrup. p.* 98.

Camelo-pardus ſeu Girafra *Ionſt. quadrup. tab.* 39 fig. mala.

Camelo-pardalus *Ionſt. quadrup. tab.* 39 figg. bon.

Camelus Indicus, Indianiſeh Camel, Ind. Kamelthier *Ionſt. quadrup. tab.* 40 figg. malae.

Alius Camelus *Ionſt. quadrup. tab.* 40 fig. peſſima.

Camelus Indicus verſicolor *Ionſt. quadrup. tab.* 40 fig. peſſima.

Camelo-Pardalis *Ionſt. quadrup. tab.* 45 fig. mala.

Kamelpard *Geſn. Thierb. p.* 236 *fig. p.* 237 mal. 238 peſſima.

Camelopardalus *Charlet. exerc. p.* 13.

Camelopardalis *Ludolf Aeth. I c.* 10 *n.* 33 *comm. p.* 149.

Camelopardalis *Rai. ſyn. quadr. p.* 90.

La Giraffe *Lobo Abiſſ. I p.* 292.

Ceruus cornibus ſimpliciſſimis, pedibus anticis longiſſimis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.

Ceruus cornibus ſimpliciſſimis, pedibus anticis longiſſimis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 1.

Ceruus Camelopardalis *Haſſelquiſt: Act. vpſal.* 1750 *p.* 15.

Tragus, biſulcorum mixtus. Giraffa *Klein. quadrup p.* 22.

Ceruus cornubus ſimpliciſſimis, pedibus anticis longiſſimis. The Cervus; with the ſimple horns, and the fore-legs very long: the Camelopardalis *Hill anim. p.* 576 *tab.* 28 fig. mala.

La Giraffe: Giraffa Camelopardalis *Briſſ. regn. an. p.* 61 *n.* 1.

...e Giraffes extat in Mich. Baudier histoire generale ...
...l & de la cour du grand Seigneur. Paris 1633. 8°. pag. 175
...igraphe: cette fig. a été tirée après nature de celuy qui
...ourri à une lieue de Constantinople avec les elephans du grand
Seigneur.

Ceruus Camelopardalis *Hasselqu. Palaest. p.* 282.

Die Giraffe *Hall. vierf. p.* 322.

Ceruus (Camelopardalis) cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 66 *n.* 1.

Caméléopard *Dictionn. anim. I p.* 386.

Giraffe *Dictionn. anim. II p.* 263.

Kemel-Pardel: Hert met geheel enkele Hoornen, de Voorpooten by uitstek lang *Houtt. nat. hist. III p.* 36.

Camelcopard *Bom. dictionn. I p.* 388.

La Giraffe *Buff. hist. nat. XIII p.* 1.

Ceruus (Camelopardalis) cornibus simplicissimis, pedibus anticis longissimis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 92 *n.* 1.

Die Giraffe oder das Kameel-Parder. *Berl. Samml. I p.* 611 *cum fig.*

The Camelopard *Penn. syn. quadr. p.* 10 *n.* 12.

Camello-Pardo *Aless. quadrup. IV tab.* 199.

Das Kameelparder *Müll. Naturs. I p.* 379.

زُرَافَة (Zuraphate) *Arabibus.*

Iirataka ein *Amharice.*

Magnitudo Cameli mediocris: forma elegantissima. Caput prominens, oblongum, lateribus parum compressum, antice conuexum, fronte protuberans. Labium superius crassum, inferius tenuius. Nares oblongae, amplae, remotae, in apice labii superioris. Pili rigidi, longiusculi, sparsi in vtroque labio, anterius et ad latera. Supercilia regida, distinctissima, serie vna pilorum composita. Oculi laterales, vertici quam rostro, vt et fronti quam collo, propiores. Cornua in vtroque sexu, at feminae minora, in vertice capitis sita, parum remota, simplicissima, breuissima, cylindrica, basi crassiora, versus apicem tenuiora, pilosa, basi pilis breuissi-

breuiſſimis rigidis tecta, apice pilis longioribus, erectis, rigidiſſimis, apicem ſuperantibus, cincta. Apex cornuum intra hos pilos, obtuſus, nudus. Eminentia in fronte, infra cornua, inferius oblonga, humilior, ſuperius eleuatior, ſubrotunda, poſtice parum depreſſa, dura, ſuperficie aequalis. Auriculae ad latera capitis, pone cornua, illis paullo inferius poſitae, oblongae, haud magnae. Collum erectum, compreſſum, longiſſimum, verſus caput anguſtiſſimum, baſi latiuſculum. Dorſum ſubconuexum. Latera fere aequalia, conuexa, vix protuberantia. Linea pilorum rigidorum, longiorum, erectorum, per dorſi cacumen integrum et per collum vsque ad caput extenſa. Crura cylindrica: anteriora poſterioribus plus quam dimidio longiora, vt antice 17 ped. poſtice 9 ped. altus ſit. Tuberculum craſſum, durum in flexura genu. Vngues biſulci, vngulati. Cauda teres, lumborum dimidia longitudine, non iubata. Pili corporis breuiſſimi, rigidi, decumbentes. Color totius animalis ex maculis fuſcis et ferrugineis variegatus: maculae palmari latitudine, figura irregulari, in viuo animali ex lucidiore et obſcuriore variantes.

Habitat in regione Sennar inter Aegyptum ſuperiorem et Aethiopiam, in Aethiopia et Abiſſinia; in ſiluis frondoſis, rarior. Mitis, timidus, celerrimus, vt raro viſus a zoologis. Pronus cubat more Cameli; gramen depaſcitur diuaricatis pedibus anticis: ſed arborum imprimis veſcitur foliis.

Animal obſcurum, Briſſonio et Pennanto proprium genus efficiens. Ego etiamnum inter Ceruos pono, donec magis innoteſcat ipſum animal, praecipue vero cornuum natura.

Alces. 2. C. cornibus acaulibus palmatis.

Alces *Caes. bell. gall. VI c.* 27.

Alce *Plin. hist. nat. VIII c.* 15 (*c.* 16 *Hard.*).

Achlis *Plin. hist. nat. VIII c.* 15 (*c.* 16 *Hard.*).

Alces *Gesn. quadr. p.* 1 *cum fig.* mediocri; *fig.* cornu *p.* 2.

Alce *Schwenckf. theriotr. p.* 53.

A certain beast, that the Natiues call a Mosse *Purch. Pilgr. IV p.* 1829.

Mosse *Laet Amer. p.* 68.

Alce *Aldrov. bisulc. p.* 866 *fig.* maris *p.* 869; feminae *p.* 870 pessimae.

Alces *Ionst. quadrup. p.* 92 *tab.* 30 *fig.* fem. mediocris.

Alce. Elendgeschlecht *Ionst. quadrup. tab.* 30 fig. fem. pessima.

Alce Mas *Ionst. quadrup. tab.* 31 fig. mediocr.

Alce. Elend *Ionst. quadrup. tab.* 31 fig. maris pessima.

Alce *Mus. Wormian. p.* 336.

Elend *Gesn. Thierb. p.* 84 *figg.* maris *p.* 84, 86 *superior*, 88 pessimae; *p.* 86 *inferior* mediocris; *fig.* feminae *p.* 85, 87 *superior* mediocr.

L'Elant *Perr. anim. I p.* 178 *tab.* 25 fig. feminae.

Alces *Scheff. Lapp. p.* 336.

Alces *Charlet. exerc. p.* 12.

The Mose-Deer in America *Dudley: Philos. transact. num.* 368 *p.* 165.

The Mose-Deer of New-England *Dale: Philos. transact. num.* 444 *p.* 384 *cum fig.* corn.

Alce *Rai. syn. quadr. p.* 86.

Alce *Heins. monogr.*

The Elk *Lawson Carol. p.* 123.

L'Orignal ou l'Elan *Dierev. Acad. p.* 122.

Alce seu Alces *Rzacz. Polon. p.* 212 *auct. p.* 304.

Alce maxima americana nigra, the Moose or Elk *Catesb. Carol. app. p. XXVII.*

The Elk *Brick. North-Carol. p.* 108 *cum fig.* mal.

Ceruus

Alce canadensis. Jo Fr Miller fasc. 11. tab. K.

Ceruus cornibus acaulibus palmatis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 50.

Orignal *Charlev. nouv. Fr. III p.* 126.

Ceruus cornibus acaulibus palmatis *Linn. fn. ſuec.* I *p.* 13 *n.* 37.

Ceruus cornibus acaulibus palmatis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 2.

Ceruus Palmatus Alce; vera et legitima *Klein. quadrup. p.* 24.

Ceruus cornubus acaulibus palmatis. The Cervus, with the horns palmated, and without a ſtem: the Elk *Hill anim. p.* 577 *tab.* 28 fig. mediocris maris.

Elendsthier *Kalm Amer. III p.* 582.

L'Elan: Ceruus (Alces) cornibus ab imo ad ſummum palmatis *Briſſ. regn. an. p.* 93 *n.* 9.

Das Elendthier, Elendkuh *Hall. vierf. p.* 338 *tab.* 8.

Elende, Elendthiere *Müll. Samml. III p.* 552.

Ceruus (Alces) cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturuli *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 66 *n.* 2.

Alce *Dictionn. anim. I p.* 88.

Elan *Dictionn. anim. II p.* 82.

Moſe *Dictionn. anim. III p.* 126.

Eland: Hert met Hoornen, die van den Wortel af breed en plat zyn; en aan de Keel een Kwab hebbende *Houtt. nat. hiſt. III p.* 40.

Ceruus (Alces) cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 13 *n.* 39.

Elk *Bell trav. I p.* 5, 221.

L'Elan *Buff. hiſt. nat. XII p.* 79 *tab.* 7 fig. maris, *tab.* 8, 9 fig. cornuum.

Elan ou Ellend *Bom. dictionn. II p.* 84.

Moſe ou Moos *Bom. dictionn. III p.* 126.

Ceruus (Alces) cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 92 *n.* 2.

The Elk *Penn. ſyn. quadr. p.* 40 *n.* 35 *tab.* 7 *fig.* I feminae americanae, *fig.* 2 cornuum.

Alce

Stralsund Magaz. 1 B. 4tes St. p. 384.

Alce *Aleſſ. quadrup. III tab.* 130 fig. Buff.
Das Elendthier *Müll. Naturſ. I p.* 381.
Ceruus (Alces) cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 34.
Alce *Italis et Hiſpanis.*
Elàn *Gallis.*
Orignal *Gallis in America.*
Elend, Elendthier *Germanis*, Elk *obſolete.*
Eland *Belgis.*
Elk *Anglis.*
Mooſe-deer, black Mooſe-deer *Anglis in America.*
Elsdiur *Danis.*
Elg, Els dyr, Ellgur *Noruegis.*
Ælg *Suecis.*
Los *Polonis.*
Лось (Los') *Ruſſis.*
Сохатъ (Sochat) *in Sibiria.*
Took *Tunguſis.*
Bogu *Burätis.*
Bulàn *Tataris et Tſchuwaſchis.*
Schórda *Tſcheremiſſis.*
Puſchè *Wotiakis.*
Sjärda *Morduanis.*
Löſſ, Iöra *Sirjänice.*

Magnitudo Equi. Cornua ingentia, ponderoſa, feminae nulla. Oculi parui. Auriculae elongatae, aſininae. Nares magnae. Labia magna, craſſa. Collum breue, cum iuba dorſali, ſupra humeros erectiuſcula, nigra. Caruncula ſub gula, magnitudine pollicis, tecta barba nigra (aliis in femina ſaltim non viſa). Cauda breuiſſima, ſupra nigricans, ſubtus alba. Vngulae magnae. Vngulae ſuccenturiatae ad palmas diuaricatae, ad plantas parallelae, retroſpectantes. Corpus pilis longioribus caneſcens, verſus façiem magis griſeum.

Habitat

Habitat in borealibus Europae, Asiae, Americae; amat Populeta.

Vngula ferit; 50 milliaria de die percurrit, vngulis crepitantibus. Corium globum plumbeum fere eludit. Mitis excepto oestri tempore. Caro bona.

Elaphus. 3. C. cornibus ramosis totis teretibus recuruatis.
Ελαφος *Arist. hist. anim. II c.* 7 *n.* 37. *c.* 18 *n.* 130. *VI c.* 29 *n.* 366-382. *IX c.* 6 *n.* 79-89.
Ceruus *Plin. hist. nat. VIII c.* 32 *(c.* 50 *Hard.).*
Ελαφος *Aelian. anim. VI c.* 11, 13. *VII c.* 39. *XII c.* 18.
Ελαφος *Oppian. cyneg. II,* 176.
Ceruus *Gesn. quadrup. p.* 354 *cum fig.* mediocr.
Ceruus *Schwenckf. theriotr. p.* 81.
Ceruus *Agricola monogr.*
Ceruus *Aldrov. bisulc. p.* 769 *fig. p.* 774 mar. et fem. bon.
Ceruus *Ionst. quadrup. p.* 82 *tab.* 35 fig. maris mala.
Cerua Hinde *Ionst. quadrup. tab.* 32 fig. mala.
Ceruus *Muf. worm. p.* 338.
Ceruus *Graba monogr.*
Hirsch *Gesn. Thierb. p.* 189 *cum fig.* mediocr.
Cerui *Scheff. Lapp. p.* 337.
Ceruus *Charlet. exerc. p.* 11.
Ceruus *Wagn. Heluet. p.* 173.
Ceruus *Sibb. Scot. anim. p.* 9.
Ceruus *Rai. syn. quadr. p.* 84.
Ceruus *Rzacz. Polon. p.* 216 *auct. p.* 308.
A Species of the Deer-Kind *Shaw trav. p.* 243.
Ceruus cornibus ramosis teretibus incuruatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.
Der edle Hirsch *Riding. jagdb. Th. tab.* 4.
Ein Wild oder Thier *Riding. jagdb. Th. tab.* 5.
Ceruus cornibus ramosis teretibus incuruatis *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 13 *n.* 38.

Der

Der Hirsch *Meyer Thiere I tab.* 22.

Ceruus cornibus ramosis teretibus incuruatis *Linn. syst. nat. 6 p.* 13 *n.* 3.

Ceruus nobilis *Klein. quadrup. p.* 23.

Ceruus cornubus ramosis, teretibus, incuruis. The Cervus, with ramose, cylindric and crooked horns: the Stag *Hill anim. p.* 577 *tab.* 28 fig. bon.

Ceruus (vulgaris) cornibus ramosis teretibus incuruis *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 11.

Le Cerf *Buff. hist. nat. VI p.* 63 *tab.* 9 fig. maris.

La Biche *Buff. hist. nat. VI tab.* 10.

Le Faon du Cerf *Buff. hist. nat. VI tab.* 12.

Le Cerf: Ceruus (. . . . .) cornibus teretibus ad latera incuruis *Briss. regn. an. p.* 86 *n.* 1.

Ceruus cornibus ramosis teretibus incuruis *Kram. Austr. p.* 319.

Der Hirsch *Hall. vierf. p.* 326.

Ceruus (Elaphus) cornibus ramosis teretibus incuruis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 67 *n.* 3.

Hirsche *Müll. Samml. III p.* 553.

Cerf *Dictionn. anim. I p.* 464.

Hert met rolronde getakte Hoornen, die niet krom staan *Houtt. nat. hist. III p.* 59.

Ceruus (Elaphus) cornibus ramosis teretibus recuruatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 13 *n.* 40.

The Stag or Red Deer *Penn. brit. zool. p.* 15.

Adel-Hiorte *Pontopp. Dan. I p.* 604.

Cerf *Bom. dictionn. I p.* 458.

Ceruus (Elaphus cornibus ramosis totis teretibus recuruatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 93 *n.* 3.

The Stag *Penn. syn. quadr. p.* 49 *n.* 38.

Cervo *Aless. quadrup. I tab.* 38. fig. Buff.

Cerva *Aless. quadrup. I tab.* 39 fig. Buff.

Cerviatto *Aless. quadrup. I tab.* 41 fig. Buff.

Der Hirsch *Mart. Buff. vierf. III p.* 23 *tab.* 41.

Die Hirschkuh *Mart. Buff. vierf. III tab.* 43.

Das Hirschkalb *Mart. Buff. vierf. III tab.* 44.

Der

Der Hirſch *Müll. Naturſ. I p.* 389.

Ceruus (Elephus) cornibus ramoſis, totis teretibus recuruatis *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 35.

Ceryio (*mas*); Ceruia (*femina*) *Italis.*

Ciervo (*mas*); Cierva (*femina*) *Hiſpanis.*

Cervo (*mas*); Cerva (*femina*) *Luſitanis.*

Cerf (*mas*); Biche (*femina*); Faon (*pullus*); Daguet (*ſubulo*) *Gallis.*

Carw (*mas*); Ewig (*femina*); Elain (*pullus*) *Cambrenſibus.*

Hirſch (*mas*); Hinde, Hindinn, Wild, Thier (*femina*); Hirſchkalb, Schmalthier (*pullus*); Spieſſer (*ſubulo*); Gabelhirſch (*furcarius*) *Germanis.*

Hert (*mas*); Hinde (*femina*) *Belgis.*

Hart, Red Deer (*tota ſpecies*); Stag (*mas*); Hind (*femina*); Pricket (*ſubulo*) *Anglis.*

Hiort, Kronhiort, Adelhiort *Danis.*

Röd-Dyr (*mas*); Dyrkolle (*femina*) *Noruegis.*

Hiort, Kronhiort (*mas*); Hint (*femina*) *Suecis.*

Ielen *Polonis.*

Изубрь (Iſubr) *in Irkutsk et ad fines regni ſinenſis,* Маралъ (Maral') *ad Irtiſch fluuium,* (*mas*). Лань (Lan') (*femina*) Олень прямороrой (Olen' prămorogoi) (*ſubulo*) *Ruſſis.*

Kunaka *Tunguſis.*

Gohu *Burätis.*

Corpus 3½ ped. altum. Pulchrum animal. Color rufo-fuſcus, ſubniger in facie et in dorſo, in ventre albeſcens, raro totus albus. Caput oblongum. Oculi et auriculae maiuſculae. Foſſa lacrymalis ante oculos. Collum longum, gracile. Cauda breuis. Crura gracilia. Iuniores albo maculati. Femina ecornis, raro cornuta. Caſtrato cornua non decidunt, neque recreſcunt, ſi antea deiecta fuerint. Cornuum rami numero quotannis augentur: Rami teretes, acuminati, antrorſum verſi.

Habitat

Habitat in Europa, Africa boreali? Asia boreali, nec non in America boreali. Gregarius mare duce. Mitis, oestro furit mense Augusto et Septembri, maribus inter se ob feminam pugnantibus vehementer. Cornua amittit fine Februarii et Martio mense, crescunt Iulio. Amat fistulam. Grauida mens. 8 parit vnicum, rarius gemellos. Ceruina senectus fabulosa; aetas triginta annorum. Bene natat.

Hippelaphus. α) *Varietas* maior, pilis in collo longioribus, quasi iubata; senior:

ἱππελαφος *Arist. hist. anim. II c.* 5 *n.* 23.

τραγελαφος *Plin. hist. nat. VIII c.* 33 (*c.* 50 *Hard.*).

Tragelaphus *Gesn. quadrup. p.* 1101 *cum fig.*

Hippelaphus mas, Rosshirsch *Ionst. quadrup. tab.* 35.

Brandhirsch *Gesn. Thierb. p.* 199 *cum fig.* mala.

Ein Pferdhirsch *Gesn. Thierb. p.* 210 *cum fig.* mediocr.

Tragelaphus *Charlet. exerc. p.* 12.

Le Cerf d'Allemagne: Ceruus (germanicus) cornibus teretibus, ad latera incuruis, collo infra iubato *Briss. regn. an. p.* 87 *n.* 2.

Hippelaphe *Dictionn. anim. II p.* 447.

Duitsch en Borgondisch Hert *Houtt. nat. hist. III p.* 85.

Tragelaphe *Bom. dictionn. IV p.* 439.

Edler Hirsch mit 66 Enden *Mart. Buff. vierf. III tab.* 42.

Derf d'Ardenne *Gallis.*

Brandhirsch *Germanis.*

Ad hunc accedit der Berghirsch, Gebirghirsch *Germanorum.*

Corsicanus. β) *Varietas* corsicana, vulgari dimidio minor, fusca.

Le Cerf de Corse *Buff. hist. nat. VI p.* 95 *tab.* 11.

Klein

Klein Hert van Corsica *Houtt. nat. hist. III p.* 85 *tab.* 22 *fig.* 2.

Cervo di Corsica *Aless. quadrup. I tab.* 40 fig. Buff.

Der kleine Corsicanische Hirsch *Müll. Naturs. I p.* 394 *tab.* 22 *fig.* 2 Houtt.

Der Corsicanische Hirsch *Mart. Buff. vierf. III p.* 80 *tab.* 45.

Canadensis. γ) *Varietas* canadensis, cornibus amplissimis.

Le Cerf de Canada *Perr. anim. II p.* 65 *tab.* 45 fig. bon.

A Sort of Stag in Virginia *Dale: Philos. transact. num.* 444 *p.* 384.

The Stag of Carolina *Lawson. Carol. p.* 123.

The Stag of America *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*

The Stag *Brick. North - Carol. p.* 109.

Le Cerf de Canada: Ceruus (canadensis) cornibus teretibus ab imo ad summum cute pilosa tectis *Briss. regn. an. p.* 88 *n.* 3.

Ceruus cornibus ramosis teretibus incuruis: the red Deer *Brown Iam. p.* 488.

Hert van Kanada *Houtt. nat. hist. III p.* 83 *tab.* 22 *fig.* 1.

Hirsch von Canada *Müll. Naturs. I p.* 393 *tab.* 22 *fig.* 1 Houtt.

Grey Moose *Anglis in America.*

Moschelaphus *Wagn. Heluet. p.* 188 hybridus ex Ceruo et Vacca.

Tarandus. 4. C. cornibus ramosis recuruatis teretibus: summitatibus palmatis.

Tarandus *Plin. hist. nat. VIII c.* 34 *(c.* 52 *Hard.)?*

Ταρανδος *Aelian. anim. II c.* 16?

Rangifer *Gesn. quadrup. p.* 950 *cum fig.* mala.

Tarandus *Aldrov. bisulc. p.* 859 *fig. p.* 861 mediocr.

Rangifer *Aldrov. bisulc. p.* 863 *cum fig.* pessima.
Tarandus *Ionst. quadrup. p.* 90.
Ceruus mirabilis *Ionst. quadrup. tab.* 36 fig. mala.
Rangifer, Reinthier *Ionst. quadrup. tab.* 37 fig. pessima.
Ceruus palmatus *Ionst. quadrup. tab.* 37 fig. mala.
Tarandus Tarandthier Reinthiersgeschlecht *Ionst. quadrup. tab.* 37 fig. pessima.
Rangifer *Mus. worm. p.* 337.
Reinthier. *Gesn. Thierb. p.* 206 *figg. p.* 206, 207, 208 malae.
Tarandthier *Ges. Thierb. p.* 209 *cum fig.* mala.
Eine seltzame Art Hirsch *Gesn. Thierb. p.* 210 *cum fig.* mediocr.
Tarandus *Scheff. Lappon. p.* 321 *fig. p.* 327 mediocr.
Rangiferi siluestres *Scheff. Lappon. p.* 338.
Hirsch den man Rehe nennt *Mart. Spitzb. p.* 72 *tab.* O *fig. a* mala.
Tarandus *Charlet. exerc. p.* 12.
Rangifer *Charlet. exerc. p.* 12.
Ceruus Rangifer *Rai. syn. quadrup. p.* 88.
Caprea Groenlandica *Rai syn. quadr. p.* 90.
Rangifer *Hulden monogr.*
Rendieren *Bruin Reiz.* I *p.* 9.
Renschieron *Rzacz. auct. p.* 318.
Les Rénes *Egede Groenl. p.* 43.
The Greenland Deer *Catesb. Carol. app. p.* XXVIII.
Ceruus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.
Le Renne *Maupert. oeuvr.* III *p.* 197.
The Greenland Buck *Edw. birds* I *tab.* 51.
Le Caribou *Charlev. nouv. Fr.* III *p.* 129.
Cariboux *Dobbs Hudf. p.* 20, 22.
Ceruus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 14 *n.* 39.
Rennthiere *Höchstr. Lapp. p.* 107.

Ceruus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 4.

Ceruus Rangifer. Rennthier *Klein. quadrup. p.* 23 *tab.* I fig. capitis mala.

Ceruus cornubus ramosis teretibus, summitatibus palmatis. The Stag, with the horns ramose and cylindric, and their ends palmated: the Reindeer *Hill anim. p.* 578.

Ceruus (Rangifer) cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. mus. Ad. Frid.* I *p.* 11.

Ceruus Tarandus *Linn. amoen. acad. IV p.* 144 *tab.* 1.

Le Cerf de Groenland: Ceruus (groenlandicus) cornibus teretibus, ab imo ad summum cute pilosa tectis, naso piloso *Briss. regn. an. p.* 88 *n.* 4.

Le Karibou: Ceruus cornibus rectis, ad basin ramo vnico antrorsum verso *Briss. regn. an. p.* 91 *n.* 6.

Le Rhenne: Ceruus (Rangifer) cornuum summitatibus omnibus palmatis *Briss. regn. an. p.* 92 *n.* 8.

Ceruus cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Kram. Austr. p.* 319.

Das Rennthier *Hall. vierf. p.* 343.

Ceruus (Tarandus) cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 10, I *p.* 67 *n.* 4.

Rennthiere *Müll. Samml. III p.* 553.

Caribou *Dictionn. anim.* I *p.* 434.

Rhenne *Dictionn. anim. III p.* 687.

Groenlandsch Hert *Houtt. nat. hist. III p.* 86 *tab.* 22 *fig.* 3 mala.

Rendier: Hert met ronde takkige Hoornen, aan de top-enden plat *Houtt. nat. hist. III* 96 *tab.* 23 fig. bon.

Ceruus (Tarandus) cornibus ramosis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 14 *n.* 41.

Le Renne *Buff. hist. nat. XII p.* 79 *tab.* 10, 11 figg. cornuum, *tab.* 12 sceleti.

Caribou *Bom. dictionn.* I *p.* 427.

Stralsund. Magaz. 1 B. 5tes St. p. 294. c. ic. bona.
Mellin in Schriften der Berlin. Gesellsch. naturf. Fr. vol. 1. 1780. p. 1[illegible]
[illegible] natuurkundige Verhandelingen. Amst. 1782. 4. pag. 193 – [illegible]
Consetts tour through Sweden, Lond. 1789. 4. tab. III. p. 67.

Rhenne ou Renne, Rhantier, ou Ranglier, ou Ramfier *Bom. dictionn. IV p.* 1.

Rennthier *Cranz Groenl. I p.* 95.

Ceruus (Tarandus) cornibus ramosis recuruatis teretibus: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 93 *n.* 4.

The Rein *Penn. syn. quadr.* p. 46 *n.* 36 *tab.* 8 *fig.* 1.

Tarando *Aless. quadrup. IV tab.* 200.

Der Groenländische Hirsch *Müll. Naturs. I p.* 394 *tab.* 22 *fig.* 3 Houtt.

Das Rennthier *Müll. Natur s. I p.* 394 *tab.* 23 fig. Houtt.

Rennthier *Stell. Kamtsch. p.* 113.

Ceruus (Tarandus) cornibus ramosis recuruatis teretibus: summitatibus palmatis *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 36.

Renne *Gallis.*

Rennthier *Germanis.*

Ren, Rens-Dyr, Hrein-Dyr, Graa-Dyr, Halsbuk *Noruegis.*

Rhen *Suecis.*

Godde *Lapponibus danicis.*

Påtso, Påtsai ~~Boëtsoi~~ *Lapponibus suecicis.* v. Eric Lindahl & Jo. Öhrling lexicon Lapponic. Holm. 1780

Оленъ (Olen') (*mas*); Оленица (Olenitza) (*femina*) *Russis.*

Sagau *Tungusis et Burätis.*

Pschi *Tataris.*

Pütsche *Tscheremissis.*

Bulàn *Tschuwaschis.*

Pusché *Wotiakis.*

Olèn *Morduanis.*

Kür *permice.*

Kör *sirjänice.*

Tukto *Groenlandis.*

Caribu *in America septentrionali.*

Altitu-

Altitudo domeſtici 3 ped. longitudo 4 ped. at feri multo maiores, magnitudine bouis biennis. Corpus pilis denſiſſimis fuſcis, aeſtate ſenſim caneſcentibus, tandem fere albis; ſubtus album. Oculorum regio ſemper nigricans. Collum ſubtus pilis longioribus. Os albicat, vt et cauda cum ani regione et perinaeo. Pedes cincti annulo albo ad vngulas. Cornua $2\frac{1}{2}$ ped. longa, teretia, ſummitatibus compreſſis palmatisque. Ramus vnus vel alter frontalis ex baſi fere cornu, longitudine capitis. Femina cornibus minoribus, tenuioribus, minus ramoſis. Nares oblique oblongae. Vngulae magnae crepitantes. Cauda breuis. Praeputium propendens, cylindricum. Mammae quatuor cum duabus ſpuriis.

Habitat in borealibus Europae, Aſiae vsque in Kamtſchatkam, Americae. In Lapponia per aeſtatem alpes incolit, per hiemem deſerta plana. Cultus in Lapponia, non in Kamtſchatka, pro lacte, carne, pelle, cet. et vt rhedam trahat.

Edit imprimis Lichenem rangiferinum, quem ſub niue ſepultum odore detegit. Parit in Lapponia medio Maii ſaepe gemellos; prurit circa finem Septembris menſis, grauida in 33 hebdomades. Mas cornua amittit mox a pruritu, fine Nouembris, femina ad initium. Haec retinet cornua vsque dum pariat; non foecundata amittit ea hieme. Caſtratus raro cornua amittit ante nouum annum. Aetas (domeſtici) 14-16 annorum. Vtiliſſimus Lapponi. Caro bona.

Dama. 5. C. cornibus ramoſis recuruatis compreſſis: ſummitate palmata.

Platyceros *Plin. hiſt. nat. XI c.* 37 (*c.* 45 *Hard.*).

Ελαφος ευρυκερως *Oppian. cyneg. II,* 293.

Ἴορκος *Oppian. cyneg. II, 296.*

Dama vulgaris siue recentiorum *Gesn. quadrup. p.* 335 *fig. p.* 1100 mediocr.

Platogni *Bellon. obs. p.* 57.

Dama vulgaris *Schwenckf. theriotr. p.* 87.

Dama vulgaris *Aldrov. bisulc. p.* 741 *cum fig.* mala.

Dama vulgaris *Ionst. quadrup. p.* 77.

Dama-Ceruus Damhirsch *Ionst. quadrup. tab.* 31 fig. mala.

Gemeiner Damhirsch *Gesn. Thierb. p.* 202 *fig. p.* 203 mala.

La Biche de Sardaigne *Perr. anim. II p.* 65 *tab.* 45?

Ceruus Platyceros *Rai. syn. quadr. p.* 85.

Dama *Rzacz. Polon. p.* 217 *auct. p.* 308.

Ceruus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 50.

A fallow Deer *Moor. trav. p.* 205?

Der Dannhirsch *Riding. jagdb. Th. tab.* 7 fig. bona.

Ceruus cornibus ramosis compressis: summitate palmata *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 14 *n.* 40.

Der Tannhirsch mit kleinen Flecken *Meyer Thiere II tab.* 71 fig. bona.

Das Thier vom Tannhirschen *Meyer Thiere II tab.* 72 fig. bona.

Ceruus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 5.

Ceruus Palmarus, Dama, Dama-Ceruus *Klein. quadrup. p.* 25.

Ceruus cornubus ramosis compressis, snmmitatibus palmatis. The Ceruus, with ramose, compressed horns, palmated at the top: the Fallow Deer *Hill anim. p.* 578.

Le Dain *Buff. hist. nat. VI p.* 167 *tab.* 27.

La Daine *Buff. hist. nat. VI tab.* 28.

Le Daim: Ceruus (Dama vulgaris) cornuum vnica et altiore summitate palmata *Briss. regn. an. p.* 91 *n.* 7.

Ceruus

Ceruus cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Kram. Austr. p.* 319.

Der Dammhirsch *Hall. vierf. p.* 342.

Ceruus (Dama) cornibus ramosis compressis: summitatibus palmatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p. 67 n.* 5.

Daim *Dictionn. anim. II p.* 4.

Damhert of Dein: Hert met platagtige takkige Hoornen, die aan 't end breed uitloopen *Houtt. nat. hist. III p.* 126 *tab.* 22 *fig.* 4.

Ceruus (Dama) cornibus ramosis compressis: summitate palmata *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 14 *n.* 42.

The Buck *Penn. brit. zool. p.* 15.

Daim *Bom. dictionn. II p.* 1.

Ceruus (Dama) cornibus ramosis recuruatis compressis: summitate palmata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 93 *n.* 5.

The Fallow Deer *Penn. syn. quadr. p.* 48 *n.* 37.

Daino *Aless. quadrup. I tab.* 43 fig. Buff.

Damma *Aless. quadrup. I tab.* 44 fig. Buff.

Der Damhirsch *Müll. Naturs. I p.* 399 *tab.* 22 *fig.* 4 Buff.

Der Damhirsch *Mart. Buff. vierf. III p.* 110 *tab.* 46.

Weibchen des Damhirsches *Mart. Buff. vierf. III tab.* 47.

Ceruus (Dama) cornibus ramosis recuruatis compressis: summitate palmata *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 37.

Daino (*mas*); Damma (*femina*) *Italis.*

Gamo (*mas*); Corza (*femina*); Venadito (*pullus*) *Hispanis.*

Corza (*femina*); Veado (*pullus*) *Lusitanis.*

Daim, Dain (*mas*); Daine (*femina*) *Gallis.*

Hydd (*mas*); Hyddes (*femina*); Elain (*pullus*) *Cambrensibus.*

Damhirsch, Tannhirsch, Tannbock (*mas*); Tannwildprett, Tanngeis (*femina*) *Germanis.*

Dendd *Austriacis.*

Dein, Damhert *Belgis.*
Buck (*mas*); Fallow-Deer, Doe (*femina*) *Anglis.*
Damhiort, Daa-Dyr *Danis.*
Dof, Dofhiort *Suecis.*
Daniel *Polonis.*
Серна (Serna) *Russis.*

Minor Elapho. Cornua fummitate palmata. Color rufus, fufcus, albo maculatus, totus albus. Femina ecornis.

Habitat in Europa, rarior Elapho. Abundat in vivariis Angliae. Forte quoque eft in Africa. In Hifpania magnitudine fere Elaphum aequat. Facile manfuefcit. Gregarius. Grauida 8 menf. parit vnicum, rarius duo, vix tres. Aetas viginti annorum. Caro proba.

Differtne vere *americanus* vti Pennanto videtur? Altior eft, cruribus longioribus, colore magis cinereo, cornibus parum palmatis, cauda longiore:
Dama virginiana *Rai. fyn. quadr. p.* 86.
Fallow-Deer *Lawfon Carol. p.* 123.
Ceruus platyceros *Sloan. Iam. II p.* 328.
The Fallow Deer *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*
The fallow-Deer *Brick. North-Carol. p.* 109.
Chevreuil *Du Pratz Louif. II p.* 69.
The virginian Deer *Penn. fyn. quadr. p.* 51 *n.* 39 *tab.* 9 *fig.* 2 corn.

Habitat in Virginia, Carolina. Gregarius, agilis.

Axis. 6. C. cornibus ramofis teretibus erectis: fummitate bifida, corpore albo maculato.
Axis *Plin. hift. nat. VIII c.* 21 (c. 31 *Hard.*)?
Cerui genus Platiceroti fimile, olim Axis nuncupatum *Bellon. obf. p.* 120.

La

La Biche de Sardaigne *Perr. anim. II p. 65 tab.* 45 ?
Axis Plinii Bellonio *Rai. ſyn. quadr. p.* 89.
Axis *Dictionn. anim. I p.* 193.
L'Axis *Buff. hiſt. nat. XI p.* 397 *tab.* 38 fig. maris, *tab.* 39 feminae.
The Axis *Penn. ſyn. quadr. p.* 51 *n.* 40.
Axis maſchio *Aleſſ. quadrup. I tab. 6* fig. Buff.
Axis femmina *Aleſſ. quadrup. I tab.* 8 fig. Buff.

Magnitudo Cerui Damae. Cornua gracilia, trifurca, ramo laterali primo ad baſin, altero ſupra: vtroque ſurſum verſo. Color corporis pallide rufus maculis albis. In lateribus abdominis linea vtrinque alba. Cauda ſupra rufa, ſubtus alba, longior ceruina.

Habitat ad ripas Gangis, vulgaris; in Iaua, Ceylona. Fert noſtrum clima, beneque manſueſcit. Olfactu ſubtiliſſimo gaudet.

Cornua multo maiora, ceteroquin ſimillima, ſunt in muſeo britannico, quae Pennantus refert ad aliam ſpeciem quam vocat the great Axis *ſyn. quadr. p.* 52 *n.* 41.

Capreolus. 7. C. cornibus ramoſis teretibus erectis: ſummitate biſida, corpore fuſco-rufo.
Caprea *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 53 (*c.* 79 *Hard.*). *c.* 58 (*c.* 83 *Hard.*). *X c.* 72 (*c.* 92 *Hard.*). *XI c.* 37 (*c.* 44, 74 *Hard.*).
Caprea ſiue Capreolus et Dorcas *Geſn. quadr. p.* 324 *cum fig.* mediocri, aliaque *p.* 1098.
Capreolus *Schwenckf. theriotr. p.* 78.
Caprea Plinii ſiue Capreolus *Aldrov. biſulc. p.* 738.
Caprea Plinii *Ionſt. quadrup. p.* 77 *tab.* 31 fig. feminae mediocr.

Capreolus. Rehe *Ionſt. quadrup. tab.* 33 fig. mediocr.
Capreolus, Dorcas *Muſ. worm. p.* 339.
Rehbock *Geſn. Thierb. p.* 144 *figg. p.* 144, 145 mediocr.
Dorcas *Charlet. exerc. p.* 12.
Capreolus, Dorcas ſeu Caprea *Wagn. Heluet. p.* 173.
Capreolus *Sibb. Scot. an. p.* 9.
Caprea Plinii, Capreolus vulgo *Rai. ſyn. quadr. p.* 89.
Dorcas *Rzacz. Polon. p.* 217 *auct. p.* 309.
Ceruus cornibus ramoſis teretibus erectis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 49.
Ein Rehbock *Riding. jagdb. Th. tab.* 9.
Ceruus cornibus ramoſis teretibus erectis *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 14 *n.* 41.
Der Rehebock *Meyer Thiere II tab.* 73.
Das Rehe *Meyer Thiere II tab.* 74.
Ceruus cornibus ramoſis teretibus erectis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 6.
Ceruus minimus, Capreolus *Klein. quadrup. p.* 24.
Ceruus cornubus ramoſis, teretibus, erectis. The Cervus, with ramoſe, cylindric, and erect horns: the Roe-deer *Hill anim. p.* 578.
Ceruus (Capreolus) cornibus ramoſis teretibus erectis *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 11.
Le Chevreuil *Buff. hiſt. nat. VI p.* 198 *tab.* 32.
La Chevrette *Buff. hiſt. nat. VI tab.* 33.
Le Chevreuil: Ceruus (Capreolus) cornibus teretibus erectis *Briſſ. regn. an. p.* 89 *n.* 5.
Ceruus cornibus ramoſis teretibus erectis *Kram. Auſtr. p.* 319.
Das Rehe *Hall. vierf. p.* 334.
Ceruus (Capreolus) cornibus ramoſis teretibus erectis: ſummitate bifida *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 68 *n.* 7.
Chevreuil *Dictionn. anim. I p.* 599.
Rhee: Hert met rolronde opſtaande Hoornen, die aan't end tweetakkig zyn *Houtt. nat. hiſt. III p.* 141 *tab.* 22 *fig.* 5.

Ceruus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 14 *n.* 43.
The Roebuck *Penn. brit. zool. p.* 18 *cum fig.*
Chevreuil *Bom. diction.* I *p.* 560.
Ceruus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis: summitate bifida *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 94 *n.* 6.
The Roe *Penn. syn. quadr. p.* 53 *n.* 43.
Capriuolo *Aless. quadrup. I tab.* 45 fig. Buff.
Capriuola *Aless. quadrup. I tab.* 46 fig. Buff.
Der Rehbock *Mart. Buff. vierf. III p.* 123 *tab.* 48.
Das Reh *Mart. Buff. vierf. III tab.* 49.
Das Reh *Müll. Natursf. I p.* 401 *tab.* 22 *fig.* 5 Houtt.
Ceruus (Capreolus) cornibus ramosis teretibus erectis; summitate bifida *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 38.
Capriuolo (*mas*); Capriuola (*femina*) *Italis.*
Zorlito, Cabronzillo montès *Hispanis.*
Cabra montès *Lusitanis.*
Chevreuil (*mas*); Chevrette (*femina*) *Gallis.*
Iwrch (*mas*); Iyrchell (*femina*) *Cambrensibus.*
Rehbock (*mas*); Reh, Rehziege, Rehgeiss, Ricke (*femina*) *Germanis.*
Rhee *Belgis.*
Roe *Anglis.*
Raa, Raa-Dyr, Raa-Buk *Danis et Noruegis.*
Rådjur *Suecis.*
Sarn, Sarna, Koza lesna *Polonis.*
Коза дикая (Koza dikaja) *Russis.*
Giftschan *Tungusis.*
Grichun *Burätis.*

Longitudo corporis fere 4 ped. altitudo $2\frac{1}{2}$ ped. Cauda breuissima, longitudine pollicis vnius. Cornua 6-8 poll. longa, trifurca, raro quadrifurca. Pili aestate breues, molles, rufi, apicibus griseis; hieme longiores, subgrisei, dorso nigricante. Facies

cies nigricans, praecipue circa os et oculos. Corpus fubtus album. Crura gracilia.

Habitat in Europa et Afia. Deeft in Britannia auftrali. Amat filuas minores montofas, gregibus paruis incedit.

Agilis. Caro optima. Prurit initio Nouembris. Vterum fert 20-22 hebdom. Parit gemellos menfe Aprili. Cornua deponit autumno, acquirit hieme.

Huc pertinere videntur:

Teuhtlamaçame *Hernand. Mex. p.* 325.
Temamaçame *Hernand. Mex. p.* 325 *cum fig.*
Cuguaca-apara *Marcgr. Braf. p.* 235.
Cuguacu-ete *Marcgr. Braf. p.* 235.
Capreolus Marinus *Ionft. quadrup. tab.* 33.
Cugaçu-apará et Cuguaçu-eté *Pif. Ind. p.* 97 *fig. p.* 98.
Cuguacu-ete et Cuguacu-apara Marcgr. *Rai. fyn. quadr. p.* 90.
Ceruus Macatlchichiltic fiue Temamacama dictus *Seb. thef. I p.* 69 *tab.* 42 *fig.* 4.
Le Chevreuil *Charlev. nouv. Fr. III p.* 132.
Der Hirfch Macatlchichiltis oder Tecamacama genannt *Meyer Thiere III tab.* 20 fig. Seb.
Ceruus maior corniculis breuiffimis. Biche des bois *Barr. Fr. équ. p.* 151.
Ceruus minor paluftris, corniculis breuiffimis. Biche des Paletuviers *Barr. Fr. équ. p.* 151.
Tragulus Temacama *Klein. quadrup. p.* 21.
La Gazelle de la nouvelle Efpagne: Hircus (Gazella nouae Hifpaniae) cornibus teretibus, circa medium inflexis, ab origine ad flexuram fpiraliter canaliculatis, a flexura ad apicem leuibus *Briff. regn. an. p.* 70 *n.* 11.
Das Temamacama *Hall. vierf. p.* 320.

Das

Das brasilische Rehe, Cagua-cuete *Hall. vierf. p.* 337.
Das brasilische Cagua-cuapara *Hall. vierf. p.* 337.
Ceruus (Bezoarticus) cornibus ramosis teretibus erectis: ramis tribus *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 67 *n.* 6.
Bezoar-Hert: Hert met rolronde opstaande Hoornen, die drietakkig zyn *Houtt. nat. hist. III p.* 134.
Ceruus cornibus ramosis teretibus erectis: ramis tribus *Gronov. zooph. I p.* 3 *n.* 9.
Les Mazames *Buff. hist. nat. XII p.* 317.
Le Cariacou *Buff. hist. nat. XII p.* 347 *tab.* 44. fig. feminae.
The Baieu *Bancr. Guian. p.* 122.
Die Waldhindinn, la biche des bois *Fermin Surin. II p.* 89.
The Mexican Deer *Penn. syn. quadr. p.* 54 *n.* 44 *tab.* 9 *fig.* 3 corn.
Cariacu *Alesf. quadrup. III tab.* 137 fig. Buff.

Habitat in Mexico, Guiania, Brasilia.

In quorum animalium, si vere differant, characteres inquirant autoptae. Vide quoque *Moschum americanum.*

Pygargus. 8. C. cornibus trifurcis, cauda nulla.
Rehe *Pallas Reis. I p.* 97.
Ceruus Pygargus *Pallas Reis. I p.* 453.
Der wilde Hirsch *Müll. Naturs. Suppl. p.* 51.
Дикая Коза (Dikaja Koza) *Russis.*
Saiga *Tataris.*

Magnitudo supra Damam. Color fere Capreoli. Cornua trifurca vt in Capreolo, basi tuberculis multiformibus muricata, gemma vernante pilis arrectis vndique hirsutissima, et barbata. Aures intus

intus albo villofiffimae. Oculi ciliis pilisque circa orbitam fparfis, longis, nigris. Cauda nulla, papilla tantum fupra anum cutacea, craffa. Clunes area magna niuea ad dorfum vfque adfcendente. Vellus altiffimum, fubtus artubusque lutefcens; ambitus nafi et latera labii inferioris nigra, ipfo tamen labii apice albo.

Habitat in campeftribus et montanis fruticofis vltra Wolgam.

Species obfcurae.

* The porcine Deer *Penn. fyn. quadr. p.* 52 *n.* 42 *tab.* 8 *fig.* 2.

Cornua gracilia trifurca, 13 poll. longa, apicibus 6 poll. ab inuicem diftantibus. Caput longitudine $10\frac{1}{2}$ poll. corpus ab apice nafi ad caudam 3 ped. 6 poll. longum. Altitudo antice 2 ped. 2 poll. poftice 2 ped. 4 poll. Cauda 8 poll. longa. Corpus craffiufculum. Pedes graciles. Color fupra fufcus, fubtus pallidus.

Habitat in India. The Hog-Deer, ob craffitiem corporis vocatum.

** Ceruus (guineenfis) grifeus fubtus nigricans *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 12.

Ceruus (guineenfis) grifeus fubtus nigricans *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 68 *n.* 8.

Guineefch Rheetje: Hert dat grys is van kleur, van onderen zwartagtig *Houtt. nat. hift. III p.* 153.

Ceruus (guineenfis) grifeus fubtus nigricans *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 94 *n.* 7.

The grey Deer *Penn. fyn. quadr. p.* 55 *n.* 45.

Das

Das Guineische Reh *Müll. Naturs. I p.* 403.

Est in museo regis Sueciae: num pullus? Huius corpus magnitudine cati, griseum, at linea atra inter aures. Macula magna atra supra oculos. Iugulum vtrinque longitudinaliter atrum. Sternum in medio atrum. Latera abdominis vsque ad poplites nigra. Ab ano ad genua vsque postica linea nigricans. Genua anteriora etiam antice nigra, et linea angusta nigra ad pedes ducta. Auriculae longiusculae. Cauda subtus nigra. Tibiae duplo crassiores quam in Moscho Pygmaeo. Cornua desunt.

Habitat in Guinea.

An Ceruus? Antilope? Moschus?

31. MOSCHVS.

Dentes Primores superiores nulli.
inferiores VIII.
Laniarii superiores solitarii exserti.
Cornua nulla.
Pedes vngulati.
Mammae inguinales.

moschiferus. 1. M. folliculo vmbilicali.

Moschi capreolus *Gesn. quadrup. p.* 786.

Certains animaux qui portent le musc *Della Valle voy. II p.* 387.

Animal moschiferum *Nieremb. hist. nat. p.* 184.

Capra Moschi *Aldrov. bisulc. p.* 743 *fig. p.* 744 mediocr.

Capra Moschi *Ionst. quadrup. p.* 78.

Gebaude der Petersburgl. Acad. der wissensch. Tab. X. fig. bona

Capreo-

Capreolus Moschi Bisemthier *Ionst. quadrup. tab.* 29 fig. mediocr.

Bisemthierlein Xe genannt *Neuh. Gesandsch. p.* 373 *cum fig.* bona.

Moschus *Schroeck monogr. cum figg.* mediocr.

Bisemthier, Moschi capreolus *Gesn. Thierb. p.* 50 *figg. p.* 50, 51 mediocr.

Animal qui produit le musc *Tavern. voy. II p.* 316 *cum fig.* mediocr.

Capra Moschi *Charlet. exerc. p.* 10.

The Musk Deer *Grew mus. reg. soc. p.* 21.

Animal moschiferum *Rai. syn. quadr. p.* 127.

Muskus-of Muskeljaat dier *Ysbr. Reis. p.* 45 *cum figg.* bonis.

Cabardyn *Strahlenb. As. p.* 335.

Hiang-tchang-tse *Du Halde Chin. I p.* 33.

L'animal qui porte le musc *Du Halde Chin. I p.* 129.

Moschus *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 13 *n.* 1.

Tragus moschiferus. Moschus *Klein. quadrup. p.* 18.

Animal moschiferum, Kabarga dictum *I. G. Gmelin: Nou. comm. petrop. IV p.* 393.

Moschus: The Musk Animal *Hill anim. p.* 575.

Le Musc: Tragulus (Moschus) ad vmbilicum folliculum moschiferum gerens *Briss. regn. an. p.* 97 *n.* 5.

Der Muskusbok *Hall. vierf. p.* 317.

Moschus (moschiferus) *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 66 *n.* 1.

Kabarga *Müll. Samml. III p.* 561.

Chevreuil de la Chine *Dictionn. anim. I p.* 601.

Musc *Dictionn. anim. III p.* 203.

Xé des Chinois *Dictionn. anim. IV p.* 575.

Muskus-Dier *Houtt. nat. hist. III p.* 29.

A creature called Kaberda *Bell trav. I p.* 233 *II p.* 79.

Le Musc *Buff. hist. nat. XII p.* 361.

Xé

Xé des Chinois *Bom. dictionn. IV p. 636.*

Moſchus (moſcihiferus) folliculo vmbilicali *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 91 *n.* 1.

The Tibet Muſk *Penn. ſyn. quadr. p.* 56 *n.* 46 *tab.* 10 *fig.* 1.

Das tartariſche Biſamthier *Müll. Naturſ. I p.* 375.

Кабаргá (Kabarga) *in Krasnojarsk Ruſſis.*

Саига (Saiga) *in Irkutsk, Ilimsk et ad Lenam fluvium Ruſſis.*

Honde *Tunguſis.*

Budek *Burätis.*

Xe, Hiang-tchang-tſe *Sinenſibus.*

Longitudo corporis $3\frac{1}{2}$ ped. altitudo $2\frac{1}{2}$ ped. Figura Cerui Capreoli. Roſtrum acutum. Maxilla ſuperior longior inferiore, cum laniario vtrinque gracili longitudine $2\frac{1}{2}$ poll. extra os prominente. Molares vtrinque ſex. Auriculae longae, erectae. Pili totius corporis longi, erecti, verſus apicem griſei, apicibus ipſis ferrugineis. Vngulae graciles, nigrae. Vngulae ſuccentuariatae in palmis longiſſimae. Cauda vix pollicem longa. Penis occultatus, vix viſibilis, ſcrotum ruberrimum. Cornutum animal dicit Bell, contrarium aſſerentibus reliquis autoptis. Femina minor mare, naſo obtuſiore absque laniariis elongatis, mammis duabus paruis.

Habitat in Tibetano regno, prouincia Mohang Meng Sinenſi, in Tonkin et Bontan, ad lacum Baikal, ad Ieniſeiam atque Argunum; in pinetis montoſis, ſolitarius, miſanthropus. Aſilum quaerit in ſummis rupibus. Manſueſcit tamen.

Moſchus eſt ſubſtantia vnctuoſa ambroſiaca odore fortiſſimo, praecipue oeſtri tempore, ex maris tumore magnitudinis oui gallinacei infra abdomen pone vmbi-

vmbilicum sito, ouificiisque duobus minoribus instructo, altero nudo, altero pilis longis obtecto. Moschus nullus ex femina obtinetur. Tibetanus optimus est atque carior reliquo. Maris caro moschi odore infecta ingrata.

Meminna. 2. M. supra cinereo-oliuaceus, subtus albus, lateribus albo maculatis.

Meminna *Knox Ceylon. p.* 21.

Le Chevrotain à peau marquetée de taches blanches *Buff. hist. nat. XII p.* 315.

The Indian Musk *Penn. syn. quadr. p.* 59 *n.* 48 *tab.* 10 *fig.* 2.

Longitudo corporis $1\frac{1}{2}$ ped. Corpus supra ex cinereo oliuaceum, subtus album gutture, pectore, ventre: latera albo maculata lineataque. Auriculae longae. Cauda breuissima.

Habitat in Ceylona.

Pygmaeus. 3. M. supra fusco-rufus, subtus albus, vngulis succenturiatis nullis.

Cerua paruula africana, ex Guinea, rubida sine cornibus *Seb. thes. I p.* 70 *tab.* 43 *fig.* 1.

Hinnulus seu Ceruus iuuencus pergracilis Africanus *Seb. thes. I p.* 70 *tab.* 43 *fig.* 2.

Ceruus africanus pilo rubro *Seb. thes. I p.* 73 *tab.* 45 *fig.* 1.

Tragulus; Ceruula paruula Africana ex Guinea, acornis *Klein. quadrup. p.* 22.

Tragulus siue Hinnulus aut Ceruus iuuencus, pergracilis, Africanus *Klein. quadrup. p.* 22.

Tragulus Guineensis pilo rubro longiore *Klein. quadrup. p.* 22.

Le Chevrotin des Indes: Tragulus (indicus) pilis breuibus supra fuluis, infra albicantibus *Briss. regn. an. p. 95 n. 1.*

Le Chevrotin de Guinée: Tragulus (Guineensis) pilis longissimis obscure fuluis *Briss. regn. an. p. 96 n. 2.*

Das schmächtige Afrikanische Hirschgen ohne Hörner *Hall. vierf. p. 320.*

Das ungehörnte Afrikanische Hirschgen mit gekräuseltem in die Höhe geschlagenen Hundsschwanze *Hall. vierf. p. 321.*

Das Afrikanische Hirschgen mit rothem Haar *Hall. vierf. p. 321.*

Chevrotin des Indes *Dictionn. anim. I p. 602.*

Chevrotin de Guinèe *Dictionn. anim. I p. 602.*

Die kleine braunrothe Hirschenähnliche Zwergziege aus Guinea *Muf. baruth. p. 5 tab. 3* fig. bon.

Le Chevrotin des Indes orientales *Buff. hist. nat. XII p. 315, 341 tab. 42 fig.* animalis; *tab. 43 fig. 1* capitis; *fig. 3-8* pedum.

Moschus (Pygmaeus) pedibus humano digito angustioribus *Linn. syst. nat. 12, I p. 92 n. 3.*

The Guinea Musk *Penn. syn. quadr. p. 59 n. 49.*

Tragolo *Aless. quadrup. III tab. 135* fig. Buff.

Das kleine Guineische Reh *Müll. Naturf. I p. 377.*

ANTILOPE *regia*;
CERVVS *Capreolus americanus*;
MOSCHVS *Meminna*;
Pygmaeus;
americanus;

extricatu difficillimae species apud auctores, neque vllum ex Mammalium classe animal plus molestiae mihi creauit hisce. Ego vero quinque haec animalia vere differre inter se fere credo; nisi forte Moschus Pygmaeus feminae sit Antilopis regiae ipseque conueniat cum Moscho Meminna; Moschus autem americanus cum Ceruo Capreolo americano. Synonymia imprimis obscura Sebae, Kleinii, Hallerii.

Longitudo corporis 9½ poll. caudae pollicis vnius. Corpus ſupra e fuſco rufum, ſubtus album. Vngulae ſuccenturiatae nullae. Dentes laniarii ſupra duo ex ore prominentes. Auriculae magnae.

Habitat in India orientali, Guinea.
Num forte plane idem animal ſit cum Antilope regia, dubius adhuc haereo.

americanus. 4. M. rufo-fuſcus, ore nigro, gula alba.
Biche de Guiane *Des March. voy. III p.* 281.
Ceruula ſurinamenſis ſubrubra, albis maculis notata *Seb. theſ. I p.* 71 *tab.* 44 *fig.* 2.
Tragulus Surinamenſis *Klein. quadrup. p.* 22.
Le Chrevrotain de Surinam: Tragulus (ſurinamenſis) ex rufo luteus, maculis albis variegatis *Briſſ. regn. an. p.* 96 *n.* 3.
Das Surinamiſche röthliche Hirſchgen mit weiſſen Flekken und langen Ohren *Hall. vierf. p.* 321.
Chevrotain de Surinam *Dictionn. anim. I p.* 602.
The Wirrebocerra *Bancr. Guian. p.* 123.
Die zwote Art von Hirſchen *Fermin. Surin. II p.* 89.
The Braſilian Muſk *Penn. ſyn. quadr. p.* 58 *n.* 47.

Magnitudo Capreoli (Bancroſtio tertia parte minor). Auriculae longitudine quatuor pollicum. Oculi magni, nigri. Nares magnae. Oris regio nigra. Crura poſtica longiora anticis. Cauda breuis. Pili breues mollesque, capitis colliquc ſupra fuſci, colli ſubtus albi, corporis crurumque rufofuſci. Vngulae nigrae.

Habitat in Guiania et Braſilia. Timidiſſimus, celerrimus, agilis. Natat per fluuios. Caro bona.

Species

Species obſcura.

* Stags withowt horns *Nieuh. Eaſt-Ind. p.* 209.

Habitat in inſula Formoſa, magnitudine fere cerui Elaphi.

32. LEPVS.

Dentes Primores vtrinque II: ſuperiores duplicati: interioribus ſ. palatinis minoribus.

Laniarii nulli.

Pedes digitati, digitis 5-4.

timidus. 1. L. cauda abbreuiata, pedibus poſticis longitudine corporis dimidii, auriculis apice nigris.

Lepus *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 55, 56 (*c.* 81, 82 *Hard.*). *c.* 58 (*c.* 83 *Hard.*). *X c.* 63 (*c.* 83 *Hard.*). *XI c.* 37 (*c.* 54 *Hard.*). *c.* 39 (*c.* 94 *Hard.*).

Λαγως *Aelian. anim. II c.* 12. *VI c.* 47. *XIII c.* 12-15.

Πτωξ *Oppian. cyneg. III,* 507.

Lepus *Geſn. quadrup. p.* 681 *c. fig.* mediocr.

Lepus *Schwenckf. theriotr. p.* 103.

Lepus *Waldung. monogr.*

Lepus *Aldrov. digit. p.* 347.

Lepus *Ionſt. quadrup. p.* 158.

Lepus Haſe *Ionſt. quadrup. tab.* 65 figg. mediocr.

Lepus *Muſ. Worm. p.* 321.

Has *Geſn. Thierb. p.* 167 c. fig. mediocr.

Lepus *Charlet. exerc. p.* 23.

Lepus *Sibb. Scot. an. p.* 11.

Lepus *Paullini monogr.*

Lepus *Rai. ſyn. quadr. p.* 204.

Lepus *Rzacz. Polon. p.* 219 *auct. p.* 311.

Lepus cauda abrupta, pupillis atris *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.

Haſe *Riding. jagdb. Th. tab.* 13.

Lepus cauda abrupta; pupillis atris *Linn. fn. suec.* I *p.* 8 *n.* 19.

Der Has *Meyer Thiere II tab.* 32 fig. bon.

Lepus cauda abrupta, pupillis atris *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 2.

Lepus vulgaris, cinereus *Klein. quadrup. p.* 51.

Lepus cauda abrupta, pupillis atris. The Lepus, with an abrupt tail, and black eyes: the common Hare *Hill anim. p.* 525 *tab.* 25 fig. mediocr.

Lepus (vulgaris) cauda abrupta, pupillis atris *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 9.

Le Liévre *Buff. hist. nat. VI p.* 246 *tab.* 38.

Le Liévre: Lepus (. . . . . .) caudatus ex cinereo rufus *Briss. regn. an. p.* 138 *n.* 1.

Lepus cauda abrupta, pupillis atris *Kram. Austr. p.* 315.

Der Hase *Hall. vierf. p.* 408.

Lepus (timidus) cauda abbreuiata, auribus apice nigris *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 57 *n.* 1.

Haasen *Müll. Samml. III p.* 525.

Liévre *Dictionn. anim. II p.* 649.

Haas met een kort Staartje, de Ooren aan de tippen zwart *Houtt. nat. hist. II p.* 371.

Lepus (timidus) cauda abbreuiata, auriculis apice nigris *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 9 *n.* 25.

The Hare *Penn. brit. zool. p.* 41.

De Danske Harer *Pontopp. Dan. I p.* 606.

Liévre *Bom. dictionn. II p.* 675.

Lepus (timidus) cauda abbreuiata, auriculis apice nigris *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 77 *n.* 1.

Lepus timidus *Forster: Philos. transact. LVII p.* 343.

The common Hare *Penn. syn. quadr p.* 248 *n.* 184.

Lepre *Aless. quadrup. I tab.* 42 fig. Buff.

Der Feldhase *Müll. Naturs. I p.* 318.

Haasen *Stell. Kamtsch. p.* 126.

Der Hase *Mart. Buff. vierf. III p.* 147 *tab.* 50.

Lepus *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Lepus

Lepus (timidus) cauda abbreuiata, auriculis apice nigris *Müll. Dan. prodr. p. 4. n. 23.*

Lepre, Lievora *Italis.*

Liebre *(adultus)*; Lebrecilla *(pullus) Hispanis.*

Lebre *(adultus)*; Lebrinho, Lebracho *(pullus) Lusitanis.*

Lievre *(mas)*; Hase *(femina)*; Levraut *(pullus) Gallis.*

Ysgyfarnog, Ceinach *Cambrensibus.*

Hase, Rammler *(mas)*; Setzhase, Häsinn *(femina) Germanis.*

Haas *Belgis.*

Hare *(adultus)*; Leveret *(pullus) Anglis.*

Hare *Danis.*

Iase *Noruegis.*

Hare *Suecis.*

Niaamel *Lapponibus.*

Záiac *Polonis.*

Заєцъ (Zaetz'), Заяцъ (Zajatz'), Русакъ (Rusak) *Russis.*

Ушнапъ (Uschnap'), Ушканъ (Uschkan) *in Sibiria.*

Touschak *Tungusis.*

Schandalgan *Burätis.*

Koiàn *Tataris.*

Merân *Tscheremissis.*

Molgâtsch *Tschuwaschis.*

Lûd ketsch *Wotiakis.*

Numola *Morduanis.*

Kütsch *permice.*

Kötsch *sirjänice.*

عرنب (Arnäh) *Arabibus.*

Longitudo corporis pedum 2. Auriculae elongatae, apice nigrae. Oculi magni, exstantes, membrana nictitante, somno aperti. Mentum album. Mystaces ad os setis numerosis longis: superioribus nigris, inferioribus albis. Nares humidae, mo-

 titantes.

titantes. Labium ſuperius fiſſum. Pili faciei, dorſi et laterum baſi albi, medio nigri, apice ruſi. Gula cum pectore rufa. Venter albus. Cauda ſupra nigra, ſubtus alba. Femora poſtica craſſa et longiora anticis. Pedes vsque ad apices lanati. Cauitas vtrinque e regione pubis. Clitoris magna, inde difficilis ſexus diſtinctio, fabulaeque de leporibus hermaphroditis.

Habitat vbique in Europa perque totam fere Aſiam, in Ceylona, Aegypto, Barbaria, America boreali vbi minor et ſola varietas alpina reperitur, niſi forte propria ſpecies ſit.

Victitat ruminans ramulis fruticum, cortice arborum, radicibus, herbis. Noctu paſcit. Inermis timidusque auditu et viſu excellit atque curſu valet, imprimis montem aſcenſurus, currit gyros ſenſim breuiores, retro deuiat exſiliendo. Capitur a canibus, felibus, accipitribus, ſtrigibus; proiecto ſub venatu in altum pileo ſeſe occultat ſub proximo frutice metu accipitris. Mordet truncum, transſcendendum. Dalectatur tympano. Ceruice fragili. Immenſus parturitione per totam aeſtatem. Coit primum februario et martio menſe. Parit tres ad quatuor. Vterum fert 30 - 31 diebus. Adoleſcit anno primo. Superfoetatio haud rara hoc in genere. Naſcitur oculis apertis. Mas crudelis in propriam ſaeuit prolem. Vrina foetida non in cubile mittenda. Pulicibus obnoxius. Aetas octo annorum.

alpinus. α. *Varietas* alpina alba, minor, auriculis breuioribus apice nigris, cruribus gracilioribus.

Lepores candidi *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 55 (*c.* 81 *Hard.*).

Lepores albi *Aldrov. digit. p.* 349.

Lepus

Lepus candidus *Ionst. quadrup. p.* 160.
Lepores *Scheff. Lappon. p.* 346.
Lepus albus *Wagn. Heluet. p.* 177.
An Hare almost all over white *Mort. Northampt. p.* 445.
Liévres *Egede Groenl. p.* 45.
Haase *Strahlenb. As. p.* 361.
Lepus albissimus *Klein. quadrup. p.* 51.
Le Liévre blanc; Lepus (albus) caudatus plane candidus *Briss. regn. an. p.* 139 *n.* 2.
Liévre blanc *Dictionn. anim. II p.* 651.
Hasen *Cranz Groenl. I p.* 95.
Hasen *Rytschk. Orenb. I p.* 230.
Lepus timidus *Forster: Philos. transact. LVII p.* 343.
The alpine Hare *Penn. syn. quadr. p.* 249 *n.* 185 *tab.* 23 *fig.* 1.
Die Schweitzerischen Berghasen *Mart. Buff. vierf. III p.* 166.
Alpine Hare *Forster: Philos. transact. LXII p.* 375.
Ukalek *Groenlandis.*

Habitat in alpinis, nec non frigidis regionibus.

Num forte propria species? Putat Pennantus, numquamque coire cum vulgari in Scotia certe affirmat. Minus celer. Latet in fissuris rupium. Facile mansuescit. In frigidissimis perpetuo albus est, in temperatioribus colorem mutat septembri mense atque aprili.

niger. β. *Varietas* nigra.
Lepus plane niger *Mus. Worm. p.* 321.
Lepus niger *Klein. quadrup. p.* 52.
Le Liévre noir: Lepus (niger) caudatus plane niger *Briss. regn. an. p.* 139 *n.* 3.

Liévre noir *Dictionn. anim. II p.* 651.
Schwarzer Hase *Mart. Buff. vierf. III p.* 167.

Rarissimus in Sibiria, alibique.

cornutus. γ *Lepus cornutus*, si non hybridus (sed ex quonam?) certe fabulosus.
Lepus cornutus *Ionst. quadrup. tab.* 65.
Lepores cornuti *Mus. Worm. p.* 321.
Ein frembde Art der Hasen mit Hörnern *Gesn. Thierb. p.* 173 *cum fig.*
Cornua leporina *Iacob. mus. reg. tab.* 3 *fig.* 6, 7, 8.
Zwey gehörnte Hasen *Meyer Thiere II tab.* 33.
Lepores cornuti *Klein. quadrup. p.* 52 *tab.* 3.
Liévre cornu *Dictionn. anim. p.* 652.
Gehörnte Hasen *Mart. Buff. vierf. III p.* 178 *tab.* 51.

Distinguunt porro venatores nostrates *die Berghaasen, Bruch*- vel *Sumpfhasen*, *Feld*- vel *Grundhasen, Holzhasen* etc. Has autem varietates non curamus, levissimis notis distinctas, praecipueque loco natali.

americanus. 2. L. cauda abbreuiata, pedibus posticis corpore dimidio longioribus, auricularum caudaeque apicibus griseis.
Die Hasen *Kalm. Amer. III p.* 349.
Hudson's Bay quadruped *Barrington: Philos. transact. LXII p.* 11.
American Hare *Forster: Philos. transact. LXII p.* 376.

Magnitudine medius inter L. Cuniculum et timidum alpinum. Auricularum et caudae apices perpetuo grisei. Pedes postici longiores quam in L. timido et

et Cuniculo. Color griseo fuscus, hieme in frigidioribus albus.

Habitat in America boreali, ad fretum Hudsonis copiosissimus. Nocturnus. Non fodit. Degit sub arborum radicibus inque cauis arboribus. Parit bis vel semel in anno pullos quinque ad septem. Caro bona, colore L. timidi.

Cuniculus. 3. L. cauda abbreuiata, pedibus posticis corpore dimidio breuioribus.

Δασυπους *Arist. hist. an. II c.* 9 *n.* 50. *V c.* 2 *n.* 12, 13. *VI c.* 33 *n.* 407 - 412.

Cuniculus *Plin. hist. nat. VIII c.* 29 (*c.* 43 *Hard.*). *c.* 55 (*c.* 81 *Hard.*) *c.* 58 (*c.* 83 *Hard.*).

Dasypus *Plin. hist. nat. VIII c.* 55 (*c.* 81 *Hard.*) *X c.* 63 (*c.* 83 *Hard.*) *XI c.* 39 (*c.* 94 *Hard.*).

Cuniculus *Agric. an. subt. p.* 16.

Cuniculus *Gesn. quadr. p.* 394 *cum fig.*

Cuniculus *Schwenckf. theriotr. p.* 86.

Cuniculus *Aldrov. digit. p.* 382.

Cuniculus cinereus *Aldrov. digit. p.* 385 *fig.* bona.

Cuniculus *Ionst. quadrup. p.* 161.

Kaninich: Kuniglein *Ionst. quadrup. tab.* 65 *fig.* bona.

Küniglein *Gesn. Thierb. p.* 174 *cum fig.* bona.

Cuniculus *Charlet. exerc. p.* 23.

Cuniculus *Sibb. Scot. an. p.* 11.

Cuniculus *Rai. syn. quadr. p.* 205.

Cuniculi *Rzacz. Polon. p.* 240.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 46.

Lepus cauda breuissima, pupillis rubris *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 8 *n.* 20.

Das Caninichen *Meyer Thiere I tab.* 83.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 3.

Lepu-

Lepusculus; Cuniculus; terram fodiens *Klein. quadrup.* *p.* 52.

Lepus cauda breuissima, pupillis rubris. The red-eyed Lepus, with a very short tail: the Rabbit *Hill anim. p.* 525 *tab.* 25 fig. bon.

Lepus (Cuniculus) cauda breuissima, pupillis rubris *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 9.

Le Lapin *Buff. hist. nat. VI p.* 303.

Le Lapin sauvage *Buff. hist. nat. VI tab.* 50.

Le Lapin domestique *Buff. hist. nat. VI tab.* 51.

Le Lapin de nôtre pays: Lepus (Cuniculus nostras) caudatus obscure cinereus *Briss. regn. an. p.* 140 *n.* 4.

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris: the Rabbit *Brown. Iam. p.* 484?

Lepus cauda abrupta, pupillis rubris *Kram. Austr. p.* 315.

Das Kaninchen *Hall. vierf. p.* 413.

Lepus (Cuniculus) cauda abbreuiata, auriculis nudatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 58 *n.* 2.

Lapin *Dictionn. anim. II p.* 599.

Konyn: Haas met een korte Staart, de Ooren kaal *Houtt. nat. hist. II p.* 391.

Lepus (Cuniculus) cauda abbreuiata, auriculis nudatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 10 *n.* 26.

The Rabbet *Penn. brit. zool. p.* 43.

Caniner *Pontopp. Dan. I p.* 606.

Lapin *Bom. dictionn. II p.* 642.

Lepus (Cuniculus) cauda abbreuiata, auriculis nudatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 77 *n.* 2.

The Rabbet *Penn. syn. quadr. p.* 251 *n.* 186.

Coniglio selvatico *Alesf. quadrup. I tab.* 47 fig. Buff.

Coniglio domestico *Alesf. quadrup. I tab.* 48 fig. Buff.

Das Kaninchen *Müll. Naturf. I p.* 322.

Das Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p.* 184.

Das wilde Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p.* 206 *tab.* 52.

Das

Das zahme Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p.* 207 *tab.* 53.

Lepus (Cuniculus) cauda abbreuiata, auriculis nudatis *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 24.

Conejo (*mas*); Coneja (*femina*); Conejuelo, Conejillo, Conejito (*pullus*) *Hiſpanis.*

Coelho *Luſitanis.*

Coniglio *Italis.*

Lapin (*mas*); Lapine (*femina*); Lapreau (*pullus*); Lapin de Garenne (*ferus*); Lapin de clapiers (*domeſticus*) *Gallis.*

Cwningen *Cambrenſibus.*

Kaninchen, Caninchen, Karnickel *Germanis*; *olim* Kunigle, Kunlein.

Küniglhaſe *Auſtriacis.*

Konyn *Belgis*; Lampreelen *pulli.*

Rabbet, Cony *Anglis.*

Kanin, Müne *Danis.*

Kanin *Suecis.*

Krolik *Polonis.*

Кроликъ (Krolik) *Ruſſis.*

Species facilius dignoſcitur quam differentia ſpecifica determinatur. Pupillae certe non ſemper rubrae, nec auriculae ſemper denudatae. Barringtonius recte attendit ad breuitatem crurum poſticorum vt et anticorum. *Philoſ. transact. LXII p.* 4.

Minor Lepore timido: longitudine corporis $1\frac{1}{2}$ ped. *Ferus* corpore ex fuſco cinereo, cauda ſupra nigra ſubtus alba. *Domeſticus* fero maior variat colore nigro, variegato, albo; huic autem oculi pulchre rubri.

Habitat in temperatis et calidioribus Europae, inque calidioribus Aſiae et Africae. Exoticus cultus in frigidis; in borealibus non niſi in domibus.

Cuni-

Cuniculos agit in arenosis locis; latet interdiu, nocte exit. Capitur a Falconibus, Mele, Putorio. Parit septies per annum quatuor ad octo, grauida 30-31 diebus. Adolescit mense sexto. Pellis bona. Caro passim esculenta, candida. Aetas octo vel nouem annorum.

angorensis. α. *Varietas* angorensis, pilis longioribus, vndulatis, sericeis.

Le Lapin d'Angora *Buff. hist. nat. VI tab.* 53.

Le Lapin d'Angora en muë *Buff. hist. nat. VI tab.* 54.

Le Lapin d'Angora: Lepus (Cuniculus Angorensis) caudatus pilis tenuissimis et longissimis toto corpore vestitus *Briss. regn. an. p.* 141 *n.* 6.

Lapin d'Angora *Dictionn. anim. II p.* 600.

The Angora Rabbet *Penn. syn. quadr. p.* 252 *n.* 186 *β.*

Coniglio d'Angora *Aless. quadrup. I tab.* 50 fig. Buff.

Das Angorische Kaninichen *Mart. Buff. vierf. III p.* 209 *tab.* 55.

Das angorische Kaninichen in der Mause *Mart. Buff. vierf. III tab.* 56.

Habitat circa Angoram.

argenteus. β. *Varietas* pilis ex argenteo griseis, pedibus fuscis.

Le Riche *Buff. hist. nat. VI tab.* 52.

Le Riche: Lepus caudatus, dilute cinereus *Briss. regn. an. p.* 191 *n.* 5.

The silver-haired Rabbet *Penn. syn. quadr. in indice.*

Coniglio grigio *Aless. quadrup. I tab.* 49 fig. Buff.

Das reiche Kaninchen *Mart. Buff. vierf. III p.* 208 *tab.* 54.

russus.

russus. γ. *Varietas* ſingularis, pelle duplici quaſi ſaccato in dorſo, intra quam retrahit caput, ſaccoque altero infra gulam pro pedibus anticis. Foramina parua in cute dorſali pro admittenda luce. Color corporis cinereus, capite auriculisque fuſcis.

The Ruſſian Rabbet *Penn. ſyn. quadr. p* 252 *tab.* 23 *fig.* 2 ab Edwardsio communicata.

capenſis. 4. L. cauda longitudine capitis, pedibus rubris.

Lepus (capenſis) cauda longitudine capitis, pedibus rubris *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 58 *n.* 3.

Haas, met de Staart zo lang als de Kop en roode Pooten *Houtt. nat. hiſt. II p.* 407.

Lepus (capenſis) cauda longitudine capitis, pedibus rubris *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 78 *n.* 3.

The Cape Hare *Penn. ſyn. quadr. p.* 253 *n.* 189.

Der Capſche Haſe *Müll. Naturſ. I p.* 324.

Der Kapiſche Haſe *Mart. Buff. vierſ. III p.* 215.

Habitat ad caput bonae ſpei. Fodiens.

dauricus. 5. L. cauda elongata, gula nigra.

Lepus cauda elongata *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46? forte Iaculus.

Lepus cauda elongata *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 4?

Lepus cauda elongata. The long-tailed Lepus: the Siberian Rabbit *Hill anim. p.* 525?

Cuniculus inſigniter caudatus coloris leporini *I. G. Gmelin: Nou. comment. petrop. V p.* 357 *tab.* 11 *fig.* 2.

Le Tolai *Buff. hiſt. nat. XV p.* 138.

The Baikal Hare *Penn. ſyn. quadr. p.* 253 *n.* 188.

Das langgeſchwänzte Kaninichen *Mart. Buff. vierſ. III p.* 219.

Толаи (Tolai), Талаи (Talai) *Ruſſis.*

Paullo

Paullo maior L. Cuniculo. Color timidi, at rufus circa collum et pedes; ſubtus albus, gula nigra. Cauda longa, ſupra nigra ſubtus alba. Mammae duae.

Habitat vulgaris trans lacum Baikal. Cuniculo ſimilis figura corporis, inceſſu, carne, moribus: fodit ſubterraneus.

Vtique ſpecie differre videtur a Cuniculo.

braſilienſis. 6. L. cauda nulla, auriculis elongatis, corpore ex rufo fuſco.

Citli ſeu lepus *Fernand. anim. p.* 2.

Tapeti Braſilienſibus *Marcgr. Braſil. p.* 223 *fig. p.* 224 bona, niſi quod caudata ſit.

Cauia Cobaya Cunic. Braſil. ſpec. *Ionſt. quadrup. tab.* 63 fig. Marcgr.

Tapetí *Piſ. Ind. p.* 102 *cum fig.* Marcgr.

Cavia Cobaya. Die zweyte Art auſs Braſilien *Geſn. Thierb. p.* 177 fig. Marcgr.

Cuniculus Braſilienſis Tapeti dictus *Rai. ſyn. quadr. p.* 205.

Lapin *Wafer voy. p.* 224.

Lepus cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.

Lepus cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 1.

Lepus cauda nulla. The Lepus, without any tail: the Tapeti *Hill anim. p.* 526.

Le Liévre du Bréſil: Lepus (Braſilianus) ecaudatus *Briſſ. regn. an. p.* 141 *n.* 7.

Lepus (braſilienſis) cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 58 *n.* 4.

Liévre du Breſil *Dictionn. anim. II p.* 651.

Haas zonder Staart *Houtt. nat. hiſt. II p.* 407.

Tapiti *Bom. dictionn. IV p.* 297.

Lepus (braſilienſis) cauda nulla *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 78 *n.* 4.

Le Tapeti *Buff. hiſt. nat. XV p.* 162.

The

The Braſilian Hare *Penn. ſyn. quadr. p.* 252 *n.* 187.
Das ungeſchwänzte Kaninchen *Müll. Naturſ. I p.* 325.
Das ungeſchwänzte Braſiliſche Kaninichen. Der Tapeti der Braſilianer *Mart. Buff. vierſ. III p.* 216.

Magnitudo Leporis timidi, facies Cuniculi. Auriculae elongatae. Oculi nigri. Color L. timidi obſcurior, ventre albicante, annulo vtplurimum albo circa collum, facie rufa, mento albo.

Habitat in Braſiliae et Mexici ſiluis. Mores Leporis timidi; non fodit. Valde prolifer. Caro proba.

The Rabbet *Catesb. Carol. app. p. XXVIII* an idem? an Lepus americanus?

Similis Cuniculo fero, colore, figura, ſapore et colore carnis.
Vulgaris in America boreali ſub Leporis nomine. Non fodit; fugit in cauas arbores.

alpinus. 7. L. cauda nulla, auriculis elongatis, corpore luteſcente.

~~Iebraſchken oder kleine Murmelthiere *Stell. Kamtſch. p.* 126.~~ v. Citellus p. 366.
Eine Art von Steinhaaſen *Pallas Reiſ. II p.* 569.
Lepus alpinus *Pallas Reiſ. II p.* 701 *tab. A.*
Der Berghaaſe *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 37.
Пищуха (Piſczucha), Сѣностаѣецъ (Sjenoſtawetz) *Ruſſis.*
Ochodona *Mungalis.*
Pika *Tunguſis.*

Magnitudo Cauiae Porcelli; facies totaque ſtructura Leporis puſilli. Caput oblongum, ore leporino. Dentes primores ſuperiores ſulco profundo exarati, acie

acie incisa, communi tridentata, denticuli palatini truncati. Auriculae magnae, suborbiculatae, intus bilamellatae, margine anteriore infundibuliformi-tubuloso. Corpus ventricosum, artusque breues vt in L. pusillo. Palmae pentadactylae, pollice breui; plantae tetradactylae: volae omnium lana densissima atra vestitae. Cauda nulla, sed tuberculum pinguedinosum mole nucis. Color lutescens, supra fusco mixtus. Areola parotica velleris vtrinque quasi detrita, pilis breuibus vestita. Pondus circiter vnciarum quindecim. Mammae duae inguinales, quatuor pectorales. Costarum paria octodecim. Structura intestinorum mira, vt in L. pusillo. Infestatur laruis Oestri subcutaneis.

Habitat in Alpinis rupestribus Sibiriae, Augusto mense foenisecans, herbasque siccas inter rupes congestans. Vox fistulata simplex.

pusillus. 8. L. cauda nulla, auriculis breuibus rotundatis.

Lepus (pusillus) cauda nulla, auriculis rotundatis *Linn. mant. II p.* 522.

Eine Art Zwerghaasen *Pallas Reis. I p.* 155.

Lepus pusillus *Pallas: Nou. comment. petrop. XIII p.* 531 *tab.* 14 *fig.* 1.

Der Zwerghaase *Müll. Naturs. Suppl. p.* 37.

Каменный Заяцъ (Kamennii Zajatz') *Russis.*

Sulgan, Kir-sickan *Tataris.*

Minutissimus Leporum, magnitudine Ratti. Caput longius quam in L. timido, vellere largiter vestitum. Mystaces longae, albae. Verruca supraocularis tripilis, parotica vnipilis. Oculi mediocres, obscuri. Auriculae breues, rotundatae, latae, vellere semilatentes, intus griseo-villosae, versus marginem fuscescentes, ipsoque limbo tenerrime

nerrime pilofae, albidae. Truncus gracilis, abdomine fubuentricofo. Cauda nulla. Artus poftici breues. Palmae pentadactylae pollice remoto breui. Plantae tetradactylae, digito extimo breuiore. Volae vt in Lepore timido pilofae. Vellus laxum prolixumque. Lanugo vbique denfa, tenerrima, fufca. Pili erecti, praelongi, praefertim in dorfo fubpollicares, extremitate grifeo nigroque varii. Ambitus oris, gula et pectus albent, reliquum corpus fubtus et pedes fupra e grifeo-lutefcente albicant. Clauiculae arcuatae, magnae. Coftae vtrinque feptendecim.

Habitat in campis apertis defertis circa Wolgam et vltra Iaicum, folitarius, cuniculis fubterraneis latens, noctu praefertim exiens. Edit aeftate herbas fucculentas, hieme excrementa animalium phytiphagorum maiorum, imprimis Equi et Ouis. Vox acuta. Parit fine Maii menfis pullos quinque vel fex coecos nudosque.

Species obfcura.

* Alia fpecies Cuniculorum, quam vocant Vizcacha *Laet Amer. p.* 407.
Vifcacha *Nieremb. hift. nat. p.* 161 *cum fig.* Ulloa noticias T. I. p. m. 125. 246
Vifcachas *Cieza Peru p.* 236.
Les Vifcachos *Feuill. obf. III p.* 32.
Vifcachos ou Vizchaca *Bom. dictionn. IV p.* 615.

Magnitudo et figura Leporis timidi, cauda longa vulpina. Pili molles, fericei, coloris murini.

Habitat in Peruani regni frigidioribus. Sub Yncarum imperio villos horum animalium ducebant in fila, quibus pannos nobiles intertexebant elegantiae gratia.

33. HYSTRIX.

Dentes Primores vtrinque II oblique ſciſſi.
Laniarii nulli.
Molares IV vtrinque ſupra et infra.
Corpus ſpinis tectum.

criſtata. 1. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato, cauda abbreuiata.

Ὕστριξ *Ariſt. hiſt. anim. I c. 7 n. 62. VIII c. 22 n.* 181.
Hyſtrices *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 35 (*c.* 53 *Hard.*).
Ὕστριξ *Aelian. anim. I c.* 31.
Ὕστριξ *Oppian. cyneg. III,* 391.
Hyſtrix *Geſn. quadrup. p.* 631 *fig. p.* 632 bon.
Hyſtrix *Aldrov. digit. p.* 471 *fig. p.* 474 mediocr.
Hyſtrix *Ionſt. quadrup. p.* 173.
Hyſtrix. Dornſchwein. Stachelſchwein *Ionſt. quadrup. tab.* 68 *fig.* mediocr.
Hyſtrix *Muſ. Wormian. p.* 335.
Dornſchwein *Geſn. Thierb. p.* 67 *cum fig.* mediocr.
Le Porc-Epic *Perr. anim. II p.* 31 *tab.* 41 fig. bon.
Porc-épys *Tavern. voy. I p.* 344.
Hyſtrix *Charlet. exerc. p.* 19.
Hyſtrix. The Porcupine *Rai. ſyn. quadr. p.* 206.
Queen-ja *Barbot Guin. p.* 114.
Stachelſchweine *Kolbe Vorgeb. p.* 166 *tab.* 6 *fig.* 6 mediocr.
Hyſtrix orientalis criſtata *Seb. theſ. I p.* 79 *tab.* 50 *fig.* 1 bona.
The Porcupine *Shaw trav. p.* 249.
Hyſtrix manibus tetradactylis, plantis tridactylis, capite criſtato *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.
Hyſtrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 1.

Hyſtrix

Hyſtrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato. The creſted Hyſtrix, with four toes on the fore-feet, and five on the hinder: the Porcupine *Hill anim. p.* 528 *tab* 25 fig. bona.

Le Porc-epic: Hyſtrix (. . . .) capite criſtato *Briſſ. regn. an. p.* 125 *n.* 1.

Hyſtrix manibus tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato *Kram. Auſtr. p.* 314.

Hyſtrix ſubcinereus nitens, aculeis longiſſimis: the Porcupine *Brown. Iam. p.* 487.

Das Stachelſchwein mit dem Buſche am Kopfe *Hall. vierf. p.* 465.

Hyſtrix (criſtata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato, cauda abbreuiata *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 57 *n.* 1.

Porc-épic *Dictionn. anim. III p.* 540 cum congener.

Gekuifd Stekelvarken: Stekelvarken met de Voorpooten vier-de Agterpooten vyf-Vingerig, een Kuif op den Kop, de Staart kort *Houtt. nat. hiſt. II p.* 354.

Le Porc-épic *Buff. hiſt. nat. XII p.* 402 *tab.* 51.

Autre Porc-épic *Buff. hiſt. nat. XII tab.* 52.

Porc-épic *Bom. dictionn. III p.* 627 cum congener.

Hyſtrix (criſtata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, capite criſtato, cauda abbreuiata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 76 *n.* 1.

Stachelſchwein mit dem Kopfbuſch aus Africa *Knorr delic. II tab. K,* 2 *fig.* 2 mala.

The creſted Porcupine *Penn. ſyn. quadr. p.* 262 *n.* 193.

Spinoſo *Aleſſ. quadrup. II tab.* 87. 88 figg. Buff.

Das gehaubte Stachelſchwein *S. G. Gmelin Reiſ. III p.* 107 *tab.* 21.

Das africaniſche Stachelſchwein *Müll. Naturſ. I p.* 312.

Spinoſo, Porco ſpinoſo, Iſtrice *Italis.*

Eſpin, Puerco-eſpino *Hiſpanis.*

Porco-eſpinho *Luſitanis.*
Porc-epic *Gallis.*
Stachelſchwein *Germanis.*
Stekelvarken *Belgis.*
Porcupine *Anglis.*
Дикобразъ (Dikobraz) *Ruſſis.*
Tzur-ban *Arabibus.*
Queen-ja *in Guinea auſtrali.*

Longitudo corporis 2 ped. caudae 4 poll. Caput myſtacibus longis. Labium ſuperius fiſſum. Auriculae rotundatae. Nucha aculeis ſetisue rigidis tenuiſſimis, flexilibus, longiſſimis. Spinae corporis poſtice ad 9 poll. longae, valde acutae, albo nigroque variegatae, intermixtis pilis rarioribus. Crura breuia. Pedes 4-5. Cauda breuis ſpinis obtecta. Teſticuli intra corpus latentes.

(intermediae pinnae caudales) albae, breves, muticae, cavae, crassitie pennae anserinae.

Habitat in omni Africa, India, Perſia, Palaeſtina; in Italia atque Hiſpania exoticae originis.

Mitis, edit fructus, radices, vegetabilia. Die dormit gregaria in cuniculis ſubterraneis, nocturna. Irata ſpinas erigit cum murmure, non vero eiaculat in hoſtes. In globum contracta ne Leonem quidem metuit. Vox Porci grunniens. Parit verno tempore gemellos ad quatuor.

prehenſilis. 2. H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehenſili ſeminuda.

Hoitzlacuatzin ſeu Tlacuatzin ſpinoſus. Hyſtrix novae Hiſpaniae *Hernand. Mex. p.* 322 *cum fig.* mediocr.

Hoitzlaquatzin *Nieremb. hiſt. nat. p.* 154 *cum fig.* Hernand.

The Iron Pig *Nieuh. Braſ. p.* 17 *fig. p.* 18 mediocr.

Cuandu

Cuandu Braſilienſibus, Luſitanis Ourico cachiero *Marcgr. Braſil. p.* 233 *cum fig.*

Cuandu ſ. Ourico cachiero. Eyſern Verken *Ionſt. quadrup. tab.* 60.

Cuandú *Piſ. Ind. p.* 99 *cum fig.* Marcgr.

Cuandú maior *Piſ. Ind. p.* 325 *cum fig.*

Hyſtrix *Bont. Ind. or. p.* 54? *cum fig.* Piſon.

Indianiſches Dornſchwein *Geſn. Thierb. p.* 70 *cum figg.* Hernand. et Marcgr.

Hyſtrix Americanus, Cuanda Braſilienſibus Marcgr. *Rai. ſyn. quadr. p.* 208.

Cuandu, Chat epineux *Des March. voy. III p.* 288.

Hyſtrix pedibus tetradactylis, cauda exſerta prehenſili ſeminuda *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 2.

Hyſtrix longius caudatus, breuioribus aculeis Porc-épic *Barr. Fr. équ. p.* 153.

Hyſtrix minor leucophaeus, Gouandu *Barr. Fr. équ. p.* 153.

Hyſtrix pedibus tetradactylis, cauda exerta ſeminuda, The Hyſtrix, with four toes on the hinder feet, and an exerted, almoſt naked tail *Hill anim. p.* 529.

Le Porc-epic de la nouvelle Eſpagne: Hyſtrix (nouae Hiſpaniae) aculeis apparentibus, cauda breui et craſſa *Briſſ. regn. an. p.* 127 *n.* 2.

Le Porc-epic d'Amerique: Hyſtrix (americanus) cauda longiſſima, tenui, medietate extrema aculeorum experte *Briſſ. regn. an. p.* 129 *n.* 4.

Le grand Porc-epic d'Amerique: Hyſtrix (americanus maior) cauda longiſſima, tenui, medietate extrema aculeorum experte *Briſſ. regn. an. p.* 130 *n.* 5.

Hyſtrix (prehenſilis) pedibus tetradactylis, cauda elongata prehenſili ſeminuda *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 57 *n.* 2.

Stekelvarken van Nieuw-Spanje: Stekelvarken met vier-Vingerige Pooten, de Staart lang en aan-

vatbaar, ten halve kaal *Houtt. nat. hiſt. II p.* 359.

Le Coendou *Buff. hiſt. nat. XII p.* 418 *tab.* 54.

Coendou *Bom. dictionn. I p.* 619.

Hyſtrix (prehenſilis) pedibus tetradactylis, cauda elongata prehenſili ſeminuda *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 76 *n.* 2.

Hyſtrix longus caudatus, breuioribus aculeis *Fermin Surin. II p.* 81.

The Braſilian Porcupine *Penn. ſyn. quadr. p.* 264 *n.* 195 *tab.* 24 *fig.* 1.

Cuandu *Aleſſ. quadrup. III tab.* 139 fig. Buff.

Das geſchwänzte Stachelſchwein *Müll. Naturſ. I p.* 314.

Cuandu *Braſilienſibus.*

Longitudo corporis 18 poll. Naſus breuis, obtuſus. Labium ſuperius non fiſſum. Myſtaces longae, albae. Infra naſum ſpinae breues. Auriculae paruae. Oculi fulgidi. Caput ſupra, dorſum, latera corporis atque baſis caudae ſpinis tecta, in dorſo poſtico atque cauda longiſſimis ad 3 poll. acutiſſimis, albis, prope apicem nigro annulatis. Pili nulli inter has ſpinas. Verſus ventrem breuiores mollioresque ſunt ſpinae, in pectore autem, ventre atque crurum interiore latere ſetae ex nigricante fuſcae. Pedes 4-4 vnguibus longis: pollicis loco protuberantia. Cauda 18 poll. longa, apice attenuato, longitudine decem pollicum nuda cum pilis rarioribus, prehenſilis, fortis.

Habitat in Mexico, Braſilia; non in India orientali. Degit in ſiluis, fructibus victitans atque auiculis, nocturna. Arbores lente adſcendit, deſcenſura cauda ramos circumuoluit, ne labatur. Vox Suis. Manſueſcit. Caro alba bona.

dorſa-

dorſata. 3. H. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda mediocri, dorſo ſolo ſpinoſo.

Hyſtrix piloſus americanus. The Porcupine of North-America *Catesb. Carol. app. p. XXX.*

The Porcupine from Hudſon's bay *Edw. birds I tab.* 52.

Das Stachelſchwein welches man by Hudſons Meerbuſen antrifft *Ellis Hudſ. p.* 39 *tab.* 4 fig. mala.

Cauia Hudſonis *Klein. quadrup. p.* 51.

Le Porc-epic de la Baye de Hudſon: Hyſtrix (Hudſonis), aculeis ſub pilis occultis, cauda breui et craſſa *Briſſ. regn. an. p.* 128 *n.* 3.

Mus maximus pullus, cauda oblonga piloſa, dorſo ſubſetoſo: the large brown Indian Coney *Brown. Iam. p.* 484?

Das verlarvte Stachelſchwein von der Hudſonsbucht *Hall. vierf. p.* 406.

Hyſtrix (dorſata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda elongata, dorſo ſolo ſpinoſo *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 57 *n.* 3.

Cavia de la baye d'Hudſon *Dictionn. anim. I p.* 450.

Stekelvarken van de Hudſons-Baay: Stekelvarken met vier-Vingerige Voor-en vyf-Vingerige Agterpooten, de Staart lang en de Rug alleen Stekelig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 360 *tab.* 19 *fig.* 1.

L'Urſon *Buff. hiſt. nat. XII p.* 426 *tab.* 55.

Urſon *Bom. dictionn. IV p.* 631.

Hyſtrix (dorſata) palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda mediocri, dorſo ſolo ſpinoſo *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 76 *n.* 3.

The Canada Porcupine *Penn. ſyn. quadr. p.* 266 *n.* 196.

Urſone *Aleſſ. quadrup. III tab.* 140 fig. Buff.

Canada Porcupine *Forſter: Philoſ. transact. LXII p.* 374.

Der Stachelrücken *Müll. Naturſ. I p.* 315 *tab* 19 *fig.* 1 Houtt.

obr G. Cartwright on the coast of Labrador. vol. II pag. 58 by

Magnitudine Caſtoris, cui ſimilis figura. Auriculae breues, pilis occultatae. Caput totumque corpus, vt et crura et cauda ſupra pilis mollibus, longis, obſcure fuſcis tecta. Aculei inter pilos in capite ſupra, dorſo et cauda ſupra, fortes, acuti, longiſſimi ad tres pollices in dorſo. Setae intermixtae, tres pollices longae, apice ſordide albae. Cauda ſubtus alba. Pedes 4-5 vnguibus longis, ſubtus excauatis.

Habitat in omni America boreali vsque ad fretum Hudſonis, vbi copioſiſſima. Edit fructus corticesque arborum, imprimis Iuniperi et Pini, aeſtate gemmas ramuſculosque Salicis. Arbores adſcendit. Nidum parat ſub radicibus arborum maiorum. Coit Septembri menſe, parit initio Aprilis pullum vnicum. Caro bona ſapore porcellinae. Aquam horret, bibit tamen; hieme niuem deglutit. Oſſa hieme ex viridi flaueſcunt.

macroura. 4 H. pedibus pentadactylis, cauda longiſſima: aculeis clauatis.

Hyſtrix *Bont. Ind. or. p.* 54 (Figura autem ad H. prehenſilem pertinet).

Porcus aculeatus ſilueſtris ſeu hyſtrix orientalis ſingularis *Seb. theſ. I p.* 84 *tab.* 52 *fig.* 1.

Hyſtix pedibus pentadactylis, cauda exſerta *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.

Hyſtrix pedibus pentadactylis, cauda exſerta *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 3.

Acanthion cauda praelonga, acutis pilis horrida, in exitu quaſi paniculata *Klein. quadr. p.* 67.

Hyſtrix pedibus pentadactylis, cauda exerta. The fivetoed Hyſtrix, with an exerted tail: the Eaſt Indian Porcupine *Hill anim. p.* 529.

Le

Le Porc-epic des Indes orientales: Hyſtrix (orientalis) cauda longiſſima, aculeis vndique obſita, in extremo paniculata *Briſſ. regn. an. p.* 131 *n.* 6.

Das langſchwänzige Stachelſchwein *Hall. vierf. p.* 469.

Hyſtrix (macroura) pedibus pentadactylis, cauda elongata: aculeis clauatis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 57 *n.* 4.

Orientaalſch Stekelvarcken: Stekelvarcken met vyf-Vingerige Pooten, een lange Staart, de Stekels knodswyze *Houtt. nat. hiſt. II p.* 365.

Hyſtrix (macroura) pedibus pentadactylis, cauda longiſſima: aculeis clauatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 77 *n.* 4.

The long-tailed Porcupine *Penn. ſyn. quadr. p.* 263 *n.* 194.

Langſchwanz *Müll. Naturſ. I p.* 316.

Myſtaces longae. Labium ſuperius fiſſum. Auriculae breues nudae. Oculi magni, fulgidi. Corpus craſſum, pilis acutiſſimis luce variabilibus colore. Digiti 5-5, pollice retrorſum verſo? Cauda longitudine corporis, apice gracillimo, penicillo quaſi inſtructo. Aculei clauati, medio craſſiores, coloris argentei.

Habitat in Indiae orientalis ſiluis.

Mirum, quod antecedentis ſpeciei eſſe putet Buffonius.

34. CAVIA.

Dentes Primores ſupra et infra II.
Laniarii nulli.
Pedes digitati: digitis 4-3. (*At Pacae* 5-5.)
Cauda nulla, aut breuis.

Aperea. 1. C. ecaudata, corpore ex cinereo rufo.

Cuniculus Indicus foemina *Aldrov. digit. p.* 393 *fig.* mala.

Aperea Braſilienſibus, Belgis veldratte vel Boſchratte *Marcgr. Braſil. p.* 223 *cum fig.* mediocr.

Aperea Cuniculi ſpecies Veldratte *Ionſt. quadrup. tab.* 63 *fig.* Marcgr.

Apereá *Piſ. Ind. p.* 103 *cum fig.* Marcgr.

Aperca, Cuniculi ſpecies, ein Feldratte *Geſn. Thierb. p.* 177 *fig.* Marcgr.

Cuniculus Braſilienſis Aperea dictus Marcgr. *Rai. ſyn. quadr. p.* 206.

Cauia, Aperea *Klein. quadrup. p.* 50.

Lepus auribus breuioribus obtuſis. The Lepus, with ſhort and obtuſe ears: the Aperea *Hill anim. p.* 526.

Le Lapin du Bréſil: Cuniculus (braſilienſis) ecaudatus, auritus, ex cinereo rufus *Briſſ. regn. an. p.* 149 *n.* 8.

Die braſilianiſche Buſchratte *Hall. vierf. p.* 404.

Aparea *Dictionn. anim. I p.* 144.

Cavia

CAVIAE (rectius ÇAVIAE) barbaro nomine primo vſus Kleinius, poſt hunc Pallasius. Affines hae Hyſtrici. Clauiculae nullae, quae adſunt in cognatis reliquis. Capite craſſo, breui, retuſo. Crebro pariunt, prole numeroſa, maxima, perfecta. Victu vegetabili vtuntur. Omnes fere in America degunt.

Cavia Aparea *Dictionn. anim. I p.* 450.
Lapin du Bresil *Dictionn. anim. II p.* 603.
L'Aperea *Buff. hist. nat. XV p.* 160.
The indian Coney, Puccarara *Bancr. Guian. p.* 141.
The rock Cavy *Penn. syn. quadr. p.* 244 *n.* 177.
Aperea, die brasilianische Buschratte, das brasilianische Kaninchen *Mart. Naturlex. III p.* 4 *cum fig.*
Die brasilianische Maus: Mus Aperea *Müll. Naturs. Suppl. p.* 40.

Longitudo corporis pedis vnius. Caput paullo acutius leporino. Auriculae breues, rotundatae. Labium superius diuisum. Color corporis supra leporinus, in ventre albus. Cauda nulla.

Habitat in Brasiliae speluncis fissurisque rupium. Incessus Leporis; mores Cuniculi, nec tamen fodit terram. Caro proba ob quam capitur caniculis. Facile mansuescit.

Porcellus. 2. C. ecaudata, corpore variegato.
Porcellus Indicus *Schwenckf. theriotr. p.* 119.
Cuniculus indicus, fortasse Cuitlatepolli *Nieremb. hist. nat. p.* 160 *fig.* mala.
Expressior effigies Cuniculi Indici *Nieremb. hist. nat. p.* 160 *fig.* mala.
Cuniculus indicus *Aldrov. digit. p.* 390.
Porcellus indicus *Aldrov. digit. p.* 391 *fig.* mala.
Cuniculus indicus *Aldrov. digit. p.* 392 *fig.* mala.
Cavia Cobaya Brasiliensibus *Marcgr. Bras. p.* 224 *cum fig.* mala.
Porcellus indicus *Ionst. quadrup. p.* 162.
Cuniculi Indus Gesneri *Ionst. quadrup. tab.* 63 fig. mala.
Cuniculus porcellus Indicus *Ionst. quadrup. tab.* 65 fig. mala.
Çavia Çobáya *Pis. Ind. p.* 102 *cum fig.* Marcgr.

India-

Indianiſch Küniglein *Geſn. Thierb. p.* 176 *cum fig.* mediocr.

Porcellus Indicus ſiue Guinenſis *Charlet. exerc. p.* 24.

Mus ſeu Cuniculus Americanus et Guineenſis, Porcelli pilis et voce, Cavia Cobaya Braſilienſibus dictus Marcgr. *Rai. ſyn. quadr. p.* 223.

Porcellus indicus *Rzacz. auct. p.* 333.

Meerſchweinchen *Linn. Weſtgoth. p.* 244.

Das Meerſchweinlein *Meyer Thiere I tab.* 82.

Mus cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 1.

Cavia Cobaya Braſil. quibusdam Mus Pharaonis. Tatu piloſus, Porcellus, Mus indicus *Klein. quadrup. p.* 49.

Mus corpore variegato, cauda nulla. The Mus, with a variegated body, and without a tail: the Guinea-Pig *Hill anim. p.* 520 *tab.* 25 *fig.* mediocr.

Mus Porcellus *Linn. amoen. acad. IV p.* 190 *tab.* 2.

Mus (braſilienſis) cauda abrupta, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 9.

Le Lapin des Indes: Cuniculus (Indicus) ecaudatus, auritus, albus aut rufus, aut ex vtroque variegatus *Briſſ. regn. an. p.* 147 *n.* 7.

Lepus cauda nulla *Kram. auſtr. p.* 315.

Mus maior albo fuluoque varia, cauda nulla: the Guinea Pig *Brown. Iam. p.* 484.

Das Meerſchweinchen *Hall. vierſ. p.* 402 *tab.* 19.

Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 59 *n.* 1.

Cavia Cobaya *Dictionn. anim. I p.* 449.

Lapin des Indes *Dictionn. anim. II p.* 602.

Le Cochon d'Inde *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 1 *tab.* 1.

Guineeſch Biggetje: Muis zonder Staart, de Voorpooten vier-de Agterpooten drie-Vingerig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 439.

The Guiney-Pig *Edw. glean. II tab.* 294.

Cuni-

Cuniculus ecaudatus, auritus, albus aut rufus aut ex vtroque variegatus *Gronov. zooph. I p. 4 n. 16.*
Cochon d'Inde *Bom. diction. I p. 615.*
Mus (Porcellus) cauda nulla, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. syst. nat. 12, I p. 79 n. 1.*
The restless Cavy *Penn. syn. quadr. p. 243 n. 176.*
Porcellino d'India *Aless. quadrup. II tab. 84 fig.* Buff.
Das Meerschweinchen *Müll. Naturs. I p. 334.*
Porcellino d'India *Italis.*
Cochino de India, Cochino de Guinea *Hispanis.*
Cochon d'Inde, Cochon de Guinée *Gallis.*
Meerschweinchen *Germanis.*
Guineesch Biggetje *Belgis.*
Guiny pig *Anglis.*
Swinka Zamorska *Polonis.*

Cuniculo minor: longitudine corporis 10-11 poll. Caput ouatum, crassiusculum: rostro obtuso, rotundato. Labium superius semifissum, inferius breuius. Vibrissae plurimae, capite breuiores, ad rostrum Setae circiter tres supra canthum oculi anteriorem, et totidem pone aut fere infra canthum oculi posteriorem. Nares minimae, caruatae, transuersae. Oculi fusci, prominentes. Palpebrae margine nudo. Auriculae breues, latae, rotundatae, tenues, glabrae. Collum breue. Pili corporis erecti, molles. Color albus aut aurantio nigroque variegatus. Pedes breues. Cauda plane nulla. Femina mammis duabus inguinalibus. Genitalia externe vix distinguunt sexum.

Habitat in Brasilia, non vero in Guinea; domestica colitur in Europa.

Animal irrequietum, cursitans, loquax, grunniens, sequax, calcitrans; edit panem, frumentum, olera; vix bibit, Parit 4-12 quouis bimestri, pullos

per-

perfectiſſimos, grauida 3 hebdom. Adoleſcit menſe ſecundo. Mox coit a partu. Mas pullis infeſtus. Frigoris impatiens. Pellit Rattos. Caro mediocris, eſculenta tamen nonnullis.

capenſis. 3. C. ecaudata, dentibus primoribus infra quatuor.

Dachs *Kolbe Vorgeb. p.* 145?
Murmelthier *Kolbe Vorgeb. p.* 159?
Cauia capenſis *Pallas miſcell. p.* 34 *tab.* 3.
Cauia capenſis *Pallas ſpicil. II p.* 16 *tab.* 2.
Cauia (capenſis) *Linn. ſyſt. nat.* 12, *III p.* 223.
The Cape Cavy *Penn. ſyn. quadr. p.* 247 *n.* 182.
Die caapſche Savia *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 48 *tab.* 3 *fig.* 1 Pallas.

Longitudo corporis 10 policum. Caput breue: roſtro ſubconico, compreſſiuſculo, breuiſſimo, obtuſo. Buccae inflatae. Labium ſuperius ſetis tribus maioribus nigris, totidemque minoribus; labium inferius vtrinque pilis albidis, parallelis, deorſum verſis ſubciliatum. Gula faſciculo ſetarum craſſarum, breuium, nigricantium. Dentes primores ſupra duo diſtantes, infra quatuor contigui, bis crenati. Molares vtrinque quatuor. Auriculae ouales, patulae, vellere ſemiabſconditae. Pedes 4-3: digitis connatis plantarumque duobus exterioribus muticis. Abdomen ventricoſiſſimum. Cauda nulla. Vellus rariuſculum, tenue lanugineum, intus caneſcens, extus griſeum, in dorſo longitudinaliter fuſceſcens. Setae longiores interſperſae, maxime in dorſo et ceruice. Cyſtis fellea nulla. Coſtae vtrinque 21.

Habitat ad caput bonae ſpei, vulgaris in locis rupeſtribus, fodiens. Inceſſus congenerum. Vox acuta. Caro ſapida.

Aguti.

Aguti. 4. C. caudata, corpore ex rufo fusco, abdomine flauescente.

Acuti siue Agouti *Laet. Amer. p.* 551.

Aguti vel Acuti Brasiliensibus *Marcgr. Brasil. p.* 224 *cum fig.*

Aguti vel Acuti Cunic. Br. spec. *Ionst. qradrup. tab.* 63 fig. Marcgr.

Agúti *Pis. Ind. p.* 102 *cum fig.* Marcgr.

L'Agouty *Rochef. Ant. p.* 139.

Aguti vel Acuti. Eine Art Küniglein aus Brasilien *Gesn. Thierb. p.* 177 *fig.* Marcgr.

Mus Siluestris Americanus Cuniculi magnitudine, Porcelli pilis et voce *Rai. syn. quadr. p.* 226.

Cuniculus americanus *Seb. thes. I p.* 67 *tab.* 41 *fig.* 2.

Cuniculus omnium vulgatissimus Aguti vulgo *Barr. Fr. équ. p.* 153.

Cauia, Aguti vel Acuti *Klein. quadrup. p.* 50.

Cauia Surinamensis *Klein. quadrup. p.* 50.

Mus pilis rigidis, cauda breui. The Mus, with rigid hairs, and a short tail: the Aguti *Hill anim. p.* 521 *tab.* 25 fig. Marcgr.

L'Agouty: Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo et fusco mixtus, rigidis vestitus *Briss. regn. an. p.* 143 *n.* 2.

Le Lapin d'Amerique: Cuniculus (americanus) caudatus auritus, pilis rufis rigidis vestitus *Briss. regn. an. p.* 144 *n.* 3.

Mus maior fusco-cinerescens cauda truncata: the small Indian Coney *Brown. Iam. p.* 484.

Das braune brasilianische Ferkelkaninchen mit kurzem Schwanze *Hall. vierf. p.* 403.

Das surinamische Kaninchen *Hall. vierf. p.* 405.

Agouti *Dictionn. anim. I p.* 56.

Cavia Aguti *Dictionn. anim. I p.* 449.

Lapin d'Amerique *Dictionn. anim. II p.* 601.

L'Agouti *Buff. hist. nat. VIII p.* 375 *tab.* 50.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis ex rufo et fusco mixtis, rigidis vestitus *Gronov. zooph. I p. 4. n. 14.*

Agouty *Bom. dictionn. I p. 68.*

Mus (Aguti) cauda abbreuiata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine flauescente *Linn. syst. nat. 12, I p. 80 n. 2.*

Ein brasilisches Thier Aguti *Linné: Act. holmiens. 1768 p. 27.*

Aguti *Fermin Surin. II p. 93.*

The longnosed Cavy *Penn. syn. quadr. p. 145 n. 179.*

Aguti *Aless. quadrup. III tab.* 113 fig. Buff.

Das Ferkelkaninchen *Müll. Natursf. I p. 337.*

Aguti *Mart. Naturlex. I p. 653.*

Aguti, Acuti, Cotia *Brasiliensibus.*

Magnitudo Cuniculi. Nasus elongatior quam in C. Porcello. Labium superius diuisum. Auriculae breves, rotundatae. Oculi nigri. Corpus pilis rigidis, rufo-fuscescentibus, abdomine flauescente. Crura fere nuda, gracilia, nigra. Cauda breuis, nuda.

Habitat in Brasilia et Guiania.

Erecta sedet cibumque palmis ori admouet; quae non edit abscondit. Vorax. Vox Porcelli. Incessus saliens. Latet in cauis arboribus. Parit duo bis vel ter in anno. Irata iubam erigit, pedibusque calcitrat. Mordax, mansuescit tamen. Caro esculenta.

Acouchy. 5. C. caudata, corpore oliuaceo.

Agouchi *Des March. voy. III p. 287.*

Cuniculus minor caudatus oliuaceus, Akouchy *Barr. Fr. équ. p. 153.*

L'Akouchi *Buff. hist. nat. XV p. 158.*

The olive Cavy *Penn. syn. quadr. p. 246 n. 180.*

Paullo

Paullo minor antecedente, colore oliuaceo.

Habitat vulgaris in Guiania reliquaque America australi. Caro melior praecedentis carne.

leporina. 6. C. caudata, corpore fupra rufo, fubtus albo.

The Iava hare *Catesb. Carol. app. tab.* 18.

Cauia Iauenfis *Klein. quadrup. p.* 50.

Le Lapin de Iava: Cuniculus (Iauenfis) caudatus, auritus, rufefcens, fufco admixto *Briff. regn. an. p.* 142 *n.* 1.

Der Iavanifche Halbhafe *Hall. vierf. p.* 405.

Mus (leporinus) cauda abbreuiata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 59 *n.* 2.

Cavia de Iava *Dictionn. anim. I p.* 450.

Lapin de Iava *Dictionn. anim. II p.* 601.

Ronyn van Iava: Muis met een kort Staartje, de Voorpooten vier-de Agterpooten drie-Vingerig *Houtt. nat. hift. II p.* 446.

Mus (leporinus) cauda abbreuiata, palmis tetradactylis, plantis tridactylis, abdomine albo *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 80 *n.* 3.

The Iavan Cavy *Penn. fyn. quadr. p.* 246 *n.* 181.

Die Hafenmaus *Müll. Naturf. I p.* 338.

Magnitudo Leporis timidi. Caput paruum, tenue. Oculi magni, prominentes. Auriculae nudae, rotundatae. Corpus fupra rufum, pectore et ventre albis. Cauda abbreuiata.

Habitat in Iaua et Sumatra. Mitis. Edit vegetabilia more congenerum.

Forte haud differre a C. Aguti *Linné act. holmienf.*

Paca. 7. C. caudata, pedibus pentadactylis, lateribus flauescenti-lineatis.

Pacae, Pag aut Pague *Laet Amer. p.* 551.

Pac *Laet Amer. p.* 618.

Paca *Marcgr. Brasil. p.* 224 *cum fig.* mediocr.

Paca. Cunic. Bras. sp. *Ionst. quadrup. tab.* 63 fig. Marcgr.

Paca *Pis. Ind. p.* 101 *cum fig.* Marcgr.

Paca. Die dritte Art aufs Brasilien *Gesn. Thierb. p.* 177 *fig.* Marcgr.

Mus Brasiliensis magnus, Porcelli pilis et voce, Paca dictus *Rai. syn. quadr. p.* 226.

Cuniculus maior palustris fasciis albis notatus Pak *Barr. Fr. équ. p.* 152.

Cauia, Paca *Klein. quadrup. p.* 50.

Mus fuscus cinereo maculatus ventre albente. The brown Mus, spotted with grey, and with a white belly: the Pica *Hill anim. p.* 521 *tab.* 25 fig. Marcgr.

Le Pak: Cuniculus (Paca) caudatus, auritus, pilis obscure fuluis rigidis, lineis ex albo flauescentibus ad latera distinctis *Briss. regn. an. p.* 144 *n.* 4.

Die grosse brasilianische Maus *Hall. vierf. p.* 404.

Cavia Paca *Dictionn. anim. I p.* 449.

Paca *Dictionn. anim. III p.* 313.

Cuniculus caudatus, auritus, pilis obscure fuluis, rigidis, lineis ex albo flauescentibus ad latera distinctis *Gronov. zooph. I p.* 4 *n.* 15.

Le Paca *Buff. hist. nat. X p.* 269 *tab.* 43.

Paca *Bom. dictionn. III p.* 331.

Mus (Paca) cauda abbreuiata, pedibus pentadactylis, lateribus flauescenti-lineatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 81 *n.* 6.

Der Paka *Fermin Surin. II p.* 108.

The spotted Cavy *Penn. syn. quadr. p.* 244 *n.* 178.

Paca *Alessi. quadrup. III tab.* 126 fig. Buff.

Die brasilianische Kaninchenmaus *Müll. Naturs. I p.* 341.
Pak, Paka *Brasiliensibus.*
Pakiri, Ourana *Guianiensibus.*

Corpus longitudine pedis vnius. Maxilla superior longior inferiore. Nares magnae. Mystaces longae. Auriculae breues, ouatae, nudae. Verruca superciliorum, temporum, gulae. Collum crassum. Corpus pilis breuibus, rudibus, supra fuscum, maculis alboflauescentibus in tres lineas longitudinales dispositis. Venter albus. Cauda abbreuiata. Pedes 5 - 5. Mammae duae inguinales duaeque minores pectorales.

Habitat in Brasilia et Guiania in locis vliginosis. Fodit subterranea. Non sedet erecta, vti saepe congeneres. Vox Porcelli. Mordax. Capitur caniculis ob carnem delicatulam, valde pinguem.

Varietas niuea iuxta ripas fluminis S. Francisci.

Species obscura.

* Rat musqué *Rochef. Ant. p.* 140 *cum fig.*
Le Pilori ou rat musqué des Antilles *Buff. hist. nat. X p.* 2.
Pilori *Bom. dictionn. III p.* 488.
The musk Cavy *Penn. syn. quadr. p.* 247 *n.* 183.

Cauda breuis cylindrica. Magnitudo dupla vel tripla Ratti. Corpus supra nigricans, subtus album.

Habitat in Antillis, fodiens intra terram. Moschum spirat. Differre vtique videtur a Castore zibethico.

35. GLIS.

Dentes Primores vtrinque II.
Laniarii nulli.
Auriculae abbreuiatae.
Pedes digitati: digitis 4-5.
Cauda breuis vel mediocris, pilosa.

Marmota. 1. G. corpore supra fusco-cinereo, subtus cinereo-flauescente.

Mures alpini *Plin. hist. nat. X c. 65 (c. 85 Hard.).*
Mures alpini *Agric. an. subt. p. 28.*
Mus alpinus *Gesn. quadr. p. 840 fig. p. 841* bon.
Mus alpinus siue Marmota *Aldrov. digit. p. 445 cum fig.* mediocri.
Mus alpinus *Ionst. quadrup. p. 168.*
Mus alpinus. Marmota. Murmelthier *Ionst. quadrup. tab. 67.* fig. mediocr.
Murmelthier, Murmentle. Mistbellerle *Gesn. Thierb. p. 267 fig. p. 268* mediocr.
La Marmotte *Perr. anim. III p. 31 tab. 7* fig. bon.
Mus alpinus, Marmota *Charlet. exerc. p. 19.*
Mus Alpinus, Mus montanus, Marmota *Wagn. Helvet. p. 179.*
Mus Alpinus Plin. Marmota Italis *Rai. syn. quadr. p. 221.*
Mus alpinus *Rzacz. Polon. p. 233 auct. p. 327.*
Mus alpinus plinii *Linn. syst. nat. 2 p. 47.*
Das Murmelthier *Meyer Thiere I tab. 81.*
Mus cauda elongata nuda, corpore rufo *Linn. syst. nat. 6 p. 10 n. 11.*
Mus alpinus *Klein. prodr. av. p. 230.*
Glis Marmota, Italis *Klein. quadr. p. 56.*
Eigentliche Murmelthiere *I. G. Gmel. Sibir. II p. 445.*

Mus

Joh. Stumpfens Schweizer Chronik. Zürich 1548. fol. T. II. p. 28[illegible]

J. G. Altmanns Beschr. der helvetischen Eisberge. Zürich 1751. 8. p. 198 [illegible]

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo. The Mus, with a long naked tail, and tawny body: the Marmotte *Hill anim. p.* 520 *tab.* 25 fig. bona.

La Marmotte de Pologne: Glis (Marmota polonica) flauicans, capite rufefcente *Briff. regn. an. p.* 165 *n.* 6.

La Marmotte des Alpes: Glis (Marmota alpina) pilis e fufco et flauicante mixtis veftitus *Briff. regn. an. p.* 165 *n.* 7.

Mus cauda elongata nuda, corpore rufo *Kram. Auftr. p.* 317.

Das Murmelthier *Hall. vierf. p.* 421.

Mus (Marmota) cauda abbreuiata fubnuda, auriculis rotundatis, buccis gibbis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 60 *n.* 4.

Bobaque *Dictionn. anim. I p.* 302.

Boubak *Dictionn. anim. I p.* 322.

Marmotte de Pologne *Dictionn. anim. III p.* 28.

Marmotte des Alpes *Dictionn. anim. III p.* 29.

La Marmotte *Buff. hift. nat. VIII p.* 219 *tab.* 28.

Marmeldier: Muis, met een korte byna kaale Staart, rondagtige Ooren en dikke Wangen *Houtt. nat. hift. II p.* 455.

Animals called marmots *Bell trav. I p.* 311.

Bobaque *Bom. dictionn. I p.* 307.

Boubach *Bom. dictionn. I p.* 331.

Marmotte *Bom. dictionn. III p.* 33.

Le Bobak *Buff. hift. nat. XIII p.* 136 *tab.* 18.

Mus (Marmota) cauda abbreuiata fubpilofa, auriculis rotundatis, buccis gibbis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 81 *n.* 7.

Mus Marmotta *Forfter: Philof. transact. LVII p.* 343.

Murmelthiere *S. G. Gmelin Reif. I p.* 30.

The alpine Marmot *Penn. fyn. quadr. p.* 268 *n.* 597.

Marmotta *Aleff. quadrup. II tab.* 80 fig. Buff.

...mstein in der bündner wochenschr. der Sammler. IVter Jahrg. 1782. pag. 217—38.
...raus Girtanner in Journal de phys. Mars 1786.

Schinz Beytr. zur nähern Kenntn. des Schweizerlandes 1787. p. 65 ...

Marmotta di Polonia *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 157 fig. Buff.

Die Murmelthiere *Pallas Reiſ. I p.* 96.

Die ruſſiſchen Murmelthiere *Pallas Reiſ. I p.* 129.

Das Murmelthier *Müll. Naturſ. I p.* 341.

Die polniſche Maus: Mus Bobak *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 40.

Das Murmelthier *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 297 *tab.* 80.

Marmota, Marmontana, Varoza *Italis.*

Marmota *Hiſpanis.*

Marmotte *Gallis.*

Murmelthier *Germanis.*

Marmeldier *Belgis.*

Marmot *Anglis.*

Bobak, Swiſzcz *Polonis.*

Сурокъ (Surok), Бабакъ (Babak) *Ruſſis.*

Urika *Tunguſis.*

Longitudo corporis 16 - 18 poll. caudae 6 poll. Dentes primores inferiores apice diuergentes. Myſtaces vtrinque ſerie ſextuplici. Auriculae paruae, rotundatae, veſtitae, pilis occultatae. Bucca vtrinque admodum gibba. Verruca ſupra oculis ſetis ſex, ſub oculis ſetis ſeptem. Corpus craſſum. Pedes 4 - 5. Cauda valde piloſa. Caput et dorſum ex fuſco cinereum; corpus ſubtus et pedes cinereo - flaueſcentia. Sutura a gula ad anum. Cauda nigra. Variat autem colore, et in Ruſſia atque Polonia magis rufeſcit, pedibus 4½ - 5.

Habitat in alpibus Helueticis, Tridentinis, in Polonia, Ukrania, et Tataria ſinenſi.

Victitat inſectis, radicibus, vegetabilibus. Vigilias agit vna, dum reliquae edunt; hisque ſono acuto periculum inſtans annunciat. Valde pingueſcit. Pre-

Profunde et celerrime fodit; cuniculis camera triplici forma Y cum duplici introitu. Quiefcit fuper mufcis. Hibernant 5 - 12 fimul portis denfiffime claufis ab Octobri menfe vsque in Aprilem, alto fomno, vt vix excitentur vel in frufta diffectae. Palmis cibum ori admouet. Saepe erecta incedit. Vox acutiffima; laeta murmurat. Manfuefcit, ludibunda, at mordax. Rebus cibariis, domefticis, veftimentis nocet. Delectatur valde lacte. Parit tres vel quatuor femel in anno. Aetas nouem aut decem annorum. Caro nonnullis efculenta. Canem odit. In Tataria Rhei propagatrix.

Non vere differre videtur Bobak. de quo v. Anderson in mineralogischen Briefen an J. Fr. Henkel T. II. p. 61 &c

Monax. 2. G. corpore fufco, lateribus ventreque pallidioribus.

The Bahama Coney *Catesb. Carol. II p.* 79 *tab.* 79.

The Monax *Catesb. Carol. app. p. XXVIII.*

The Monax or Marmotte of America *Edw. birds II tab.* 104.

Cauia Bahamenfis *Klein. quadr. p.* 50.

Glis Marmota, Americanus *Klein. quadr. p.* 56.

La Marmote de Bahama: Glis (Marmota Bahamenfis) fufcus *Briff. regn. an. p.* 163 *n.* 4.

La Marmote d' Amerique: Glis (Marmota Americana) fufcus, roftro e cinereo caerulefcente *Briff. regn. an. p.* 164 *n.* 5.

Das langfchwänzige amerikanifche Ferkelkaninchen *Hall. vierf. p.* 405.

Das amerik. Murmelthier *Hall. vierf. p.* 426.

Mus (Monax) cauda mediocri pilofa, corpore grifeo, auriculis fubrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 60 *n.* 5.

Cavia de Baham *Dictionn. anim. I p.* 450.

Lapin de Bahama *Dictionn. anim. II p.* 603.

Marmotte de Bahama *Dictionn. anim. III p.* 28.
Marmotte de l'Amerique *Dictionn. anim. III p.* 28.
Muis met de Staart middelmaatig van langte, Hairig, het Lighaam vaal, de Ooren rondagtig, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig *Houtt. nat. hist. II p.* 463.
Le Monax ou Marmotte de Canada *Buff. hist. nat. XIII p.* 136.
Mus (Monax) cauda mediocri pilosa, corpore cinereo, auriculis subrotundis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 81 *n.* 8.
The Maryland Marmot *Penn. syn. quadr. p.* 270 *n.* 198.
Das amerikanische Murmelthier *Müll. Naturs. I p.* 343.

Magnitudo Cuniculi, vel paullo maior. Rostrum acutius quam in G. Marmota. Nasus cum buccis e caeruleo cinereus. Oculi prominentes, nigri. Auriculae breues, rotundatae. Dorsum profunde fuscum; latera atque venter pallidiora. Cauda longitudine dimidia corporis, pilis longis nigricantibus, subtus nuda. Palmae tetradactylae cum rudimento digiti quinti mutici. Plantae pentadactylae, digito postico breuiore. Pedes nigri.

Habitat in Virginia, Marilandia, Pensiluania, inque insulis bahamensibus.

Victitat fructibus aliisque vegetabilibus. Hibernat sub cauarum arborum radicibus. Caro sapida, fere Porcelli.

cana-

canadensis. 3. G. corpore griseo, ventre cruribusque aurantiis.

The Quebec Marmot *Penn. syn. quadr. p.* 270 *n.* 199 *tab.* 24 *fig.* 2.

Quebec Marmot *Forster: Philos. transact. LXII p.* 378.

Cuniculo maior (minor Forstero, sed forsan iuniorem habuit). Rostrum obtusum. Auriculae breves, rotundatae. Facies nigricans: naso nigro, genis griseis. Pili in dorso basi grisei, medio nigri, apice albicantes. Venter et crura aurantia. Palmae subpentadactylae, plantae pentadactylae. Digiti nigri, nudi. Cauda breuis, nigricans (apice Forstero).

Habitat in Canada et ad fretum Hudsonis. Mansuescit.

Cricetus. 4. G. corpore subtus nigro, lateribus rufescentibus maculis vtrinque tribus albis.

Hamester, quem quidam Cricetum nominant *Agric. an. subt. p.* 40.

Vormela *Agric. an. subt. p.* 42?

Cricetus *Gesn. quadrup. p.* 836 *cum fig.* mala.

Porcellus frumentarius *Schwenckf. theriotr. p.* 118.

Hamester. Kornfärklein *Gesn. Thierb. p.* 267 *cum fig.* mala.

Cricetus der Hamster *Clauder: Ephem. nat. curios. dec. II ann.* 5 *p.* 376 *cum fig.* mediocr.

Cricetus Gesn. *Rai. syn. quadr. p.* 221.

Cricetus *Rzacz. Polon. p.* 232 *auct. p.* 326.

Mus Cricetus gesneri *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 47.

Der Hamster *Meyer Thiere II tab.* 81, 82.

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 10.

Glis

Glis Cricetus *Klein. quadrup. p.* 56.

Mus dorſo rutilo, ventre nigricante. The Mus, with a reddiſh brown back, and black belly: the Cricetus *Hill anim. p.* 519.

La Marmotte de Strasbourg: Glis (Marmota Argentoratenſis) ex cinereo rufus in dorſo, in ventre niger, maculis tribus ad latera albis *Briſſ. regn. an. p.* 166 *n.* 8.

Mus cauda elongata, corpore cinereo rutilo nigroque longitudinaliter vario *Kram. Auſtr. p.* 317.

Der Hamſter *Hall. vierf. p.* 424 *tab.* 23.

Mus (Cricetus) cauda ſubabbreuiata, auriculis rotundatis, corpore ſubtus nigro, lateribus rufeſcentibus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 60 *n.* 6.

Hameſter *Dictionn. anim. II p.* 385.

Marmotte de Strasbourg *Dictionn. anim. III p.* 30.

Hamſter: Muis met een kortagtige Staart, de Ooren gerond, het Lighaam van onderen zwart, aan de Zyden rosagtig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 464.

Hamſter *Bom. dictionn. II p.* 416.

Le Hamſter *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 117 *tab.* 14.

Mus (Cricetus) cauda mediocri, auriculis rotundatis, corpore ſubtus nigro, lateribus rufeſcentibus maculis tribus albis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 82 *n.* 9. *et addend. Tom. II.*

Der Hamſter *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 33 *tab.* 6 fig mediocr.

Hamſter *Pallas Reiſ. I p.* 128.

The German Marmot *Penn. ſyn. quadr. p.* 271 *n.* 200.

Criceto *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 156 fig. Buff.

Der Hamſter *Müll. Naturſ. I p.* 344.

Der Hamſter *Sulzer monogr. cum fig.* bon.

Hamſter *Germanis.*

Krietſch *Auſtriacis.*

Skrzéczek, Chomik, Myſz wielka ziemna *Polonis.*

Хомякъ (Chomäk) *Ruſſis.*

Karbusch *circa Simbirsk.*

Longitudo corporis 9-10 pollicum, caudae 2 poll. Bucca vtrinque ſaccata. Myſtaces nigrae. Auriculae magnae, rotundatae. Oculi nigri. Color capitis et dorſi ex rufo fuſcus. Genae albae. Infra vtramque aurem macula alba, aliaque in quouis humero, et tertia prope crura poſteriora. Ad latera dorſi vtrinque macula depilis ſetoſa. Pectus cum cruribus anterioribus ſupra, et ventre nigrum. Cauda breuis, ſubnuda. Pedes breves. Palmae digitis quatuor cum vngue pollicari, plantae digitis quinque. Cyſtis fellea nulla.

Varietas nigra, pedibus, ore et auricularum margine albis, ſig. in titulo monographiae Sulzerianae. Eſt quoque vulgaris in deſertis auſtralioribus regni Ruſſici.

Habitat in Germania, Polonia, Vkrania, in locis arenoſis.

Cauernas fodit, ſenior profundiores, ſub terra, plurimis concamerationibus, duplici foramine, altero obliquo aditu, altero perpendiculari. Colligit frumentum, piſa, fabas, fructus, in diſtinctis cameris ſeruanda diſtincta atque ſingula; adportat ea nocturno tempore in bucca. Raro potat. Parit bis vel ter in anno ſuper ſtramine ſex ad duodecim pullos coecos, itidem in propria camera nutriendos, vti etiam ſterquilinium in diſtincta. Iracundus et mordax. Latrat. Hibernat ſubterraneus ſomno profundo.

Capitur ob carnes, pelles, frumentum collectum; occiditur puluere Veratri farina et melle in panes cocti.

tſcherkeſ-

tſcherkeſ- ſicus. 5. G. corpore caſtaneo.
Thierchen die die Einwohner zu den Feldmäuſen rechnen *Schober: Müll. Samml. VII p.* 124.
The Circaſſian Marmot *Penn. ſyn. quadr. p.* 278 *n.* 205.

Magnitudo Criceti. Auriculae murinae. Oculi rubri ſplendentes. Dentes acuti. Corpus longum, craſſitici aequalis, pilis caſtaneis, longis, praecipue in dorſo, veſtitum. Vngues acuti. Cauda ſat longa, piloſa. Pedes antici breuiores poſticis.

Habitat ad fluuium Terek. Fodit ſubterraneus. Celerrime aſcendit montem, tarde deſcendit.

Citellus. 6. G. auriculis nullis.
Mus Noricus quem Citellum appellant *Agric. an. ſubt. p.* 33.
Mus noricus vel Citellus *Geſn. quadrup. p.* 835.
Citellus *Schwenckf. theriotr. p.* 86.
Citellus *Aldrov. digit. p.* 436.
Bilchmauſz *Geſn. Thierb. p.* 266 *cum fig.* mala.
Mus Noricus vel Citillus Geſn. *Rai. ſyn. quadr. p.* 220.
Mus noricus *Rzacz. Polon. p.* 235 *auct. p.* 327.
Mus noricus vel Citrellus *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.
Mus cauda breui, capite inauri *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 3.
Mus Noricus vel Citillus Geſneri *Klein. quadrup. p.* 56.
Ievraſchka *I. G. Gmelin Sibir. II p.* 443.
Mus corpore longiore, cauda breui. The Mus, with a long body, and ſhort tail: the Citille *Hill anim. p.* 519 *tab.* 25 fig. mala.
Le Lapin d'Allemagne: Cuniculus (germanicus) caudatus, auriculis nullis, cinereus *Briſſ. regn. an. p.* 147 *n.* 6.

Kleine Murmelthiere. Steller kamtsch. p.

Die

Die langgeſtrekte, ſchmächtige Zieſelratte *Hall. vierf. p.* 424.
Lapin d'Allemagne *Dictionn. anim. II p.* 602.
L'animal de Sibérie, que les Ruſſes appellent Ievraſchka *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 137.
Mus (Citellus) cauda abbreuiata, corpore cinereo, auriculis nullis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 80 *n.* 4.
Le Ziſel *Buff. hiſt. nat. XV p.* 139.
Le Souslik *Buff. hiſt. nat. XV p.* 144, 195, 205.
Mus Suslica *Güldenſtädt*: *Nov. comm. petrop. XIV p.* 389 *tab.* 7.?
Mus Citillus *Pallas*: *Nov. comm. petrop. XIV p.* 549 *tab.* 21 *fig.* 1, 2.
Orientaliſcher Hamſter *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 30 *tab.* 5?
The Caſan Marmot *Penn. ſyn. quadr. p.* 273 *n.* 201 *tab.* 25 *fig.* 1.
The earleſs Marmot *Penn. ſyn. quadr. p.* 276 *n.* 203.
Mus (Citellus?) cauda mediocri piloſa, pedibus pentadactylis, auriculis obſoletis *Linn. mant. II p.* 523?
Zieſelmauſs *Pallas Reiſ. I p.* 51, 129.
Polniſche Maus *Müll. Naturſ. I p.* 339.
Die Zieſelratze *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 39.
Siſel *Bohemis.*
Suſel *Polonis.*
Cусликъ (Suslik) *Ruſſis.*
Степныя кошки (Stepnija koſchki) *in prouincia Iſetenſi.*
Iemuranka, Avraſchka, Ievraſchka *in Sibiria.*
Szymron *Tataris.*
Simral, Imral *Morduanis.*
Zurrma *Calmyccis.*
Sumura *Burätis.*

Corpus magnitudine Sciuri, longitudine decem pollicum, caudae circiter trium pollicum. Femina paullo

paullo minor. Caput minus depreſſum quam in Marmota; roſtrum magis conicum, parotides minus gibbae et collum tenuius. Naſus nigricans, conuexus, pubeſcens; nudus tantum circa nares lunulatas, ſepto canaliculato diremtas. Labium ſuperius vsque ad naſum bipartitum. Buccae ſubſinuatae, auellanae maxime in femina capaces. Dentes primores ſuperiores conuexi, parum luteſcentes (vix in feminis), truncati; inferiores albi, apice attenuato-rotundati. Molares ſupra vtrinque quinque, infra quatuor (Güldenſt. et S. G. Gmelin). Myſtaces nigrae, capite breuiores, minus ordinatae, quinque fere ordinibus, per latera roſtri conuexa ſparſae. Supra oculum anterius ſetae nigrae quatuor, ſerie transuerſa; ſetae paroticae itidem transuerſo ordine quatuor, vt in Marmota. Sub gula verrucula ſetis tribus tenellis albis. Seta longa ſolitaria in medio antibrachii exterius. Oculi magni, prominuli: irides brunneo-fuſcae; pupilla maiuſcula, etiam ad lucem longitudinaliter oualis. Periophthalmii loco caruncula canthi vnguiformis, fuſca. Auriculae nullae: meatus auditorii nudi, anfractuoſi, poſterius margine craſſo, piloſo cincti, quale refectae auriculae cicatrice obductum veſtigium in canibus fricatoribus eſſe ſolet. Corpus reptabundum, depreſſum, minus ventricoſum quam Marmotae, flexile et per anguſta ſpatia facile penetrans. Pellis tenuis, laxa, praeſertim ad armos atque femora. Artus tenuiores quam in Marmota. Palmae tetradactylae cum vnguiculo pollicari conico, inſigniter prominulo, magis quam in Marmota ruthena. Plantae pentadactylae, digitis tribus mediis ſubaequalibus. Vngues nigri, compreſſi, acuti, in palmis longiores. Cauda artubus poſticis breuior, linearis ſubannulata (vti Muribus), ſed piloſiſſima villisque longis in latum ſparſis ſciureae aemula,

maxime

maxime cum expandat illam iracundum animal. Vellus breue, laxum, ſatis molle: vertex pilis fuſcis, extus albicantibus caneſcit; ſed naſus, latera roſtri, tractus ſupraciliares et oculorum cum genis, auriumque ambitus ex luteo ferruginei; intenſiusque naſus, ſupercilia et macula ſub oculo vtroque. Corpus ſupra totum pilis extremo albidis, annulo fuſco notatis, imo griſeis mixtipile caneſcens aliqua flauedine. Corpus ſubtus e flaueſcente album, vellere rudiori veſtitum, ſed collum ante armos, et pedes quatuor latea. Caudae villi corpori concolores, vnde ex luteo extus albicat, fuſco immixto. Feminae dorſum paullo magis luteſcens, cauda villoſior. Papillae a ſinu axillari ad inguina vtrinque octo aequidiſtantes, praeter inguinales viciniores. Glandulae diſtinctae lactiferae ad ſingulam papillam. Scrotum maſculis nudiuſculum, fuſcum. Anus vt in Marmota compreſſo ventre papillis tribus conicis extrorſum riget, quae in ſtatu contractionis totidem ſinus ſebaceos intra ipſum marginem orificii conſtituunt. Cyſtis fellea maiuſcula. Penis oſſiculo incuruo fultus. Teſtes maximi. Clitoris feminis papillaris, terminata oſſiculo vnguiformi denticulato minutiſſimo.

Habitat in campeſtribus elatis, apricis, aridiuſculis Ruſſiae et Sibiriae auſtralioris copioſus; copioſiſſimus in deſertis trans Wolgam. Eſt quoque in Bohemia, Auſtria, Hungaria, Polonia,

Victitat tenerioribus plantulis et ſucculentioribus vegetabilibus inſipidis. Caro Calmyccis in deliciis eſt. Autumno pingueſcit. Putorii et Ermineae praeda. Antra fodit vnico introitu cum camera oblonga, ſubpedalis diametri, culmis graminis ſiccis comminutis molliter ſtrata. Erectus circum

ſpicit, viſo hoſte ſono fiſtulante intra cuniculum ruit. Facillime manſueſcit. Currit ſaltabundus. Caput lauat palmis linguâ humefactis. Iracundus grunnit. Parit 25 - 30 a coitu die initio Maii menſis nudos pullos coecosque informes tres, quatuor, ſex, celerrime adoleſcentes. Bibit lambendo et parciſſime vt Felis aquam, vrinamque propriam. Lacticinia perdite amat. Hibernat clauſo antro, ab initio Septembris menſis pinguiſſimus pigerrimusque in initium Aprilis, vbi macilentiſſimus.

Varietas duplex: *altera* a gradu 56 vel 57 latitudinis borealis in deſertis ad Wolgam vsque ad Tanain ad gradum 53, minor, longitudine corporis 9 poll. caudae lin. 14; vellere magis griſeo, pulcherrime maculoſo ſiue guttato; ambitu oculorum albeſcente, naſo pallide luteo, litura infra oculum lunata intenſe ferruginea; cauda breuiore tereti piloſiſſima, pilis breuibus ſtrictis: *altera* ſupra deſcripta, trans Wolgam ad auſtrum degens, maior vellere ſticlico e cano fuſcoque mixto ſubflaueſcens, cauda paullo longiore villisque longioribus criſtata.

The Caſan Marmot Pennanti non videtur differre.

Zemni. 7. G. corpore profunde griſeo.

Diertje Zits-Ian *Bruin. Reiz. p.* 430 *fig. p.* 431.
Caniculus ſubterraneus *Rzacz. auct. p.* 325.
Le Zemni *Buff. hiſt. nat. XV p.* 142.
The Podolian Marmot *Penn. ſyn. quadr. p.* 277 *n.* 204.
Pieſek ziemny *Polonis.*
Sczeniuk zemny *Ruſſis.*

Magni-

Magnitudo Sciuri. Caput magnum, roſtro breuiore. Dentes primores inferiores dimidio breuiores ſuperioribus. Oculi minuti, pilis occultati. Auriculae breues, rotundatae. Corpus gracile. Pili corporis molles, coloris murini. Pedes breues. Palmae digitis quatuor cum vngue pollicari, plantae digitis quinque. Cauda breuis.

Habitat in Podolia, Vkrania, Volhinia, Perſia. Granaria colligit pro hieme; victitat frumento, fructibus, oleribus. Hieme ſubterraneus latet. Mordax.

Lemmus. 8. G. corpore fuluo nigroque vario.

Leem vel Lemmer *Geſn. quadrup. p.* 828.

Lemmar vel Lemmus *Ol. Magn. ſept. p.* 617.

Murium multitudo de nubibus demiſſa *Ol. Magn. ſept. p.* 726.

Beſtiola Leem dicta *Aldrov. digit. p.* 436.

Beſtiola Olao Leem dicta *Ionſt. quadrup. p.* 168.

Mus Noruagicus *Muſ. Worm. p.* 321 *fig. p.* 325 bona.

Wormii monogr.

Norwegiſche Maus *Geſn. Thierb. p.* 275.

Beſtiae minutae Lemmus dictae *Scheff. Lapp. p.* 344.

Ein ſonderlich rauch Thierlein *Olear. Gott. Kunſtk. p.* 20 *tab.* 12 *fig.* 6 bona.

Mus Norwegicus *Charlet. exerc. p.* 25.

Mus Norwagicus vulgo Leming *Rai. ſyn. quadr. p.* 227.

Mus noruagicus Leming vel Lemend dictus *Iacob. muſ. reg. p.* 6.

Thiere von denen in Norwegen geſagt wird, daſs ſie aus den Wolken kommen *Linné: Act. holmienſ.* 1740 *p.* 75 *tab.* 6 *fig.* 4, 5 Worm.

Mus noruegicus vulgo Lemming *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.

Mus cauda breui, corpore fuluo nigroque variegato *Linn. fn. fuec.* I *p.* 10 *n.* 26.

Mus cauda abrupta, corpore fuluo nigroque vario *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 2.

Mus Lemingus, Noruagicus *Klein. quadrup. p.* 58.

Mus cauda breui, corpore fuluo nigroque variegato. The fhort-tailed Mus, with a body variegated with black and tawny: the Leming *Hill anim. p.* 515.

Le Lapin de Norwege: Cuniculus (Noruegicus) caudatus, auritus, ex flauo, rufo et nigro variegatus *Briff. regn. an. p.* 145 *n.* 5.

Die Norwegifche Maus Leming *Hall. vierf. p.* 436.

Norwegifche Bergmaus. Leming *Hall. vierf. p.* 603.

Mus (Lemmus) cauda abbreuiata, pedibus pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 59 *n.* 3.

Lemmar ou Leming *Dictionn. anim. II p.* 609.

Lapin de Norwege *Diction. anim. II p.* 601.

Lemming: Muis met een kort Staartje, de Pooten vyf-Vingerig *Houtt. nat. hift. II p.* 446 *tab.* 20 *fig.* 1. Wormii.

Mus (Lemmus) cauda abbreuiata, pedibus pentadactylis, corpore fuluo nigroque variegato *Linn. fn. fuec.* 2 *p.* 11 *n.* 29.

Leming ou Lemmar *Bom. dictionn. II p.* 657.

Le Leming *Buff. hift. nat. XIII p.* 314.

Mus (Lemmus) cauda abbreuiata, pedibus pentadactylis, corpore fuluo nigro-vario *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 80 *n.* 5.

The Lapland Marmot *Penn fyn. quadr. p.* 274 *n.* 202 *tab.* 25 *fig.* 2.

Der Lemming *Müll. Naturf. I p.* 339 *tab.* 20 *fig.* 1 Worm.

Mus (Lemnus) cauda abbreuiata, pedibus pentadactylis, corpore fuluo nigro-vario *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 26.

Lemœn, Leming *Noruegis.*

Godde

Goddé Sapan *Lapponibus danicis.*
Fiällmus, Sabelmus *Succis.*
Lummick *Lapponibus ſuecicis.*

Longitudo corporis quinque pollicum, caudae pollicis dimidii. Caput antice acuminatum. Dentes primores vtrinque duo valde longi. Myſtaces longae, pilis ſex longioribus et fortioribus reliquis vtrinque. Oculi minuti, nigri. Os paruum. Labium ſuperius diuiſum. Auriculae paruae, obtuſae, retrorſum verſae. Crura antica breuiſſima. Palmae digitis quatuor gracilibus piloſis cum vngue pollicari; plantae digitis quinque. Cutis tenuiſſima. Pili molles. Caput et corpus nigro fuluoque irregulariter maculatum. Venter ſubflaueſcens albus. Mammae octo.

Habitat in Lapponiae et Noruegiae alpibus, ſub tuberibus terrae.

Gregatim fugiunt innumeri periodis incertis ex alpibus, recta via per ipſa flumina lacusque iter inſtituentes omnesque obuias herbas deuoraturi. Edunt Lichenem rangiferinum, amenta Betulae nanae; non carnes. Dicunt mori pecora, quae gramen edunt tactum a Lemmo. Mordax animal, latrans, curſu celer; Voratur a Canibus Lagopodibus, Lynce, Erminea, nunquam in patriam rediturum, olim ex nubibus depluere creditum. Parit quinque vel ſex.

migratorius. 9. G. corpore ſupra cinereo, ſubtus candido.
Mus migratorius *Pallas Reiſ. II p.* 703.
Die Zugmaus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 43.

Magnitudo ſupra Murem terreſtrem, habitus diuerſiſſimus. Roſtrum craſſum, carnoſum, obtuſum;

facci buccarum vsque ad humeros protenfi vt in Criceto. Dentes primores minufculi, lutefcentes. Myftaces exiles. Auriculae reclinatae, nudiufculae, ouatae, apice rotundato pofteriusque finu obfoletiffimo excifo. Corpus breue, craffum. Palmae tetradactylae cum veftigio pollicis obfoletiffimo, inermi. Cauda breuiffima, cylindrica, fubpilofa. Color fupra grifeo - cinereus, vniformis, fubtus candidus; roftri quoque extremum circa nares, pedesque extremi albi. Longitudo animalculi fere quatuor pollicum, caudae vix octo linearum.

Habitat in graminofis ad Iaicum, diciturque certis annis copiofiffime e defertis aduentare, infequente infigni Vulpium copia, quorum iis annis felicior venatio.

barabenfis. 10. G. corpore grifeo - lutefcente fubtus albido, ftria dorfali nigra.

Mus barabenfis *Pallas Reif. II p.* 704.

Die Obymaus *Müll. Naturf. Suppl. p.* 44.

G. arenario toto habitu maxime fimilis, vixque maior. Roftrum fubacutum. Dentes primores fulvefcentes, Sacci buccarum ampliffimi. Auriculae maiufculae, fufcae, limbo albido. Palmae tetradactylae, pollicis rudimento vix vllo. Cauda paullo longior quam in G. arenario, tenuis, fubattenuata, fupra fufca, fubtus albida. Color corporis fupra lateribus grifeo - lutefcens, pilis murinis mixtus; taeniola nigra fpinali a vertice fere vsque ad caudam. Subtus fordide albet. Annuli lati fufci circa tarfos pedum. Longitudo corporis 3 poll. 10 lin. cauda pollicis vnius.

Habitat in arenofis ad Ob fluuium. Interdiu vagatur.

arena-

arenarius. 11. G. corpore ſupra cano, ſubtus podibusque caudaque albis.

Mus arenarius *Pallas Reiſ. II p.* 704 *tab. B fig. ſuperior.*

Die Sandmaus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 44.

G. oeconomico paullo maior, agilior, elegantior; roſtro argutiore, cauda longiore magisque attenuata. Auriculae maiores, ouales, pubeſcentes. Dentes primores luteſcentes. Naſus acutus. Buccae ſaccis ampliſſimis, per colli latera dilatatis, Palmae ſubpentadactylae, rudimento pollicis minutiſſime vnguiculato. Cauda tenuis, recta, nudiuſcula, attenuata. Color ſupra et in lateribus vniformis canus, pilis fuſcis immixtis; ſubtus candidiſſimus. Cauda tota et pedes alba. Longitudo animalculi 3 poll. 8 lin. caudae 10 lin.

Habitat ad Irtim in auſtralibus; in collibus arena fluctuante congeſtis, vbi profundo cuniculo biforique nidulatur. Victum quaerit ex Aſtragalis variis, praeſertim Aſtragali phyſodis ſeminibus, quae leguminibus arroſis dexterrime haurit, ſacculisque buccarum in nidum congerit. Parit G. oeconomico maturius, paucioresque pullos. Nocte tantum vagatur. Vox irato Criceti.

Lagurus. 12. G. auriculis vellere breuioribus, corpore ſupra cinereo ſubtus albo, ſtria dorſali nigra.

Mus Lagurus *Pallas Reiſ. II p.* 704.

Der Rauhſchwanz *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 45.

Magnitudo fere Muris terreſtris, quo breuior omnibus partibus. Roſtrum obtuſiſſimum, hirſutie tumidulis labiis. Myſtaces exiles. Auriculae multo minores quam in Mure terreſtri, vellere plane non exſer-

exſertae, rotundatae nudiuſculae. Corpus ventricoſum. Artus exiles, tenues. Palmae ſubpentadactylae, verruca cornea loco pollicis. Cauda breuiſſima omnium congenerum, vix vellere exſerta, hirſuta, truncata. Color ſupra dilutus murinocinereus, ſtriga nigra inter oculos incipiens, per dorſum ad caudam vsque ducta. Subtus corpus, itemque artus ſordide et e cineraſcente albent. Longitudo animalculi 3 poll. 8 lin. caudae 2½ lin.

Habitat rarius ad Iaicum auſtraliorem, copioſiſſimus in campis arenoſis herbidis ad Irtim, inque deſerto tatarico, cuniculis ſimplicibus aut biforibus latitans. Imbelle animalculum, attamen mordaciſſimum. Pluries anno parit, primo iam vere pullificans. Herbas varias depaſcitur, ſeminaque.

oeconomicus. 13. G. corpore cinereo lateribus variegatis, ſtria dorſali nigra.

Mus ſungorus *Pallas Reiſ. II p.* 703 *tab. B fig.* 2.
Die Hamſtermaus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 43.
Kutuguna *Tunguſis*
Kutgun *Burätis.*

Forma tota Criceto ſimillimus, ſed magnitudine infra Murem terreſtrem. Caput breuiculum, buccatum. Myſtaces copioſiſſimae. Dentes primores luteſcentes. Buccae ſacco vtrinque maximo, ad humeros vsque dilatato. Auriculae ouales, nudiuſculae. Palmae tetradactylae, rudimento pollicis mutico. Corpus et artus breuicula. Cauda breuiſſima, teretiuſcula. Color in dorſo et vertice cinereus, ſtriga nigra a nucha ad caudam fere ducta, ſpinali. Latera verſicoloria, areis ſubintrantibus albis, liturisque fuſcis interiectos angulos ad dorſum occupantibus, quarum prior ab auribus ad ſcapulas flexuoſa,

ſa, altera triangularis ante femora, vltima per clunes deſcendens, inter quam et angulum cinereum verſus caudam excurrentem itidem areolae intercedunt albae. Subtus omnia, pedes quoque et apex caudae albent. Longitudo animaculi trium pollicum, caudae 4½ lin.

Habitat in campis elatis, aridis, auſtralioribus ad Irtim. Cuniculi multiloculares, canali longo, prope ſuperficiem terrae decurrente: Maſculis ſimplicior. Parit Iunio ſenos vel ſeptenos pullos cito adoleſcentes. Vagatur interdiu.

36. SPALAX.

Dentes Primores vtrinque II, cuneiformes, plani.
Laniarii nulli.
Oculi minuti.
Auriculae nullae.
Pedes pentadactyli.
Cauda nulla ſ. breuiſſima.

maior. 1. S. roſtro elongato attenuato.

Spalax microphthalmus *Güldenſtädt: Nou. comment. petrop. XIV p.* 411 *tab.* 9.

Mus oculis minutiſſimis, auriculis caudaque nullis, corpore rufo cinereo *Lepechin: Nou. comment. petrop. XIV p.* 504 *tab.* 15 *fig.* 1.

Eine beſondere Mausart *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 131 *tab.* 22 fig. mala.

Слепецъ (Slepetz), Слепышокъ (Slepyſchok.) *Ruſſis.*

Longitudo corporis 8 - 8½ pollicum. Caput productum, quaſi pyramidale, antice attenuatum in roſtrum cartilagineum. A naribus vsque ad meatum auditorium lateribus vtrinque linea prominens, durior, pilis rigidis ſetaceis obſita, quae muſculus roſtrum expandens. Myſtaces ſparſae ſupra et infra hanc lineam plurimae, inferius longiores. Apex naſi ſat latus, durior, nudus. Nares rotundae, anguſtae. Rictus oris paruus, quaſi perpendicularis. Labium ſuperius oblique verſus inferiora atque poſteriora deſcendens. Labium inferius multo breuius, dentes non tegens. Lingua carnoſa, craſſa, plana, obtuſa, laeuis. Dentes primores vtrinque duo, cuneiformes, inferioribus longioribus. Laniarii nulli. Molares remoti, vtrinque tres, truncati, ſubcylindrici, minimi, vix e gingiuis prominentes. Oculi minutiſſimi vix granum papaueris aequantes, nigri, non niſi cute detracta detegendi. Auriculae nullae, meatu auditorio pilis tecto, anguſto. Frons decliuis. Collum breve, vix diſtinctum. Truncus ſat craſſus, elongatus, cylindricus. Dorſum ſubgibbum. Cauda nulla, eiusque loco tuberculum paruum. Pedes breves pentadactyli: palmae digitis fiſſis, plantae ſemipalmatis. Vngues rectiuſculi, obtuſi, in plantis longiores. Pili totius corporis molles, baſi ex nigro cinerei, apice rufeſcentes. Naſus cute nigra tectus, apice albicante. Taenia ſupra naſum per frontem ad 6 lin. excurrens. Macula magna alba in iugulo atque ante pedes poſteriores in abdomine cruciformis alba, trabe transuerſa vsque ad lumbos excurrente. Vibriſſae albae. Mammae duae inguinales, in mare non apparentes ſecundum Güldenſtädtium.

Talpam

Talpam sibiricam versicolorem Sebae (Talpam asiaticam, *vid. pag.* 120) esse putat dodiss. Güldenstädtius: vix tamen videtur.

Habitat ad Wolgam a Sysran vsque ad Zaryzyn: in campis apricis vastissimis desertis Tanaicensibus ac in vicis hortisque vicinis frequentissimus. Proxime sub terrae superficie fodit canales rostri ope Talpae instar, in medio nidum relinquens, in quo lectum ex graminibus conficit. Hieme profundius latet intra terram. Incessus tradissimus. Victitat gramine, radicibus, praesertim aromaticis vmbelliferarum. Vox pipiens. Coit aestate. Parit pullos duo ad quatuor. Pulicibus obnoxius, non pediculis.

minor. 2. S. rostro abbreuiato.

Mus talpinus *Pallas*: *Nou. comment. petrop. XIV p.* 568 *tab.* 21 *fig.* 3.

Slepuschtschonka (id est: coecus), Semljaroika (id est: fossor terrae) *Russis*.

Magnitudine Muris amphibii: longitudine corporis $3\frac{3}{4}$ poll. caudae 4 linearum; ponderis drachmarum decem. Similis nonnihil Muris amphibii. Caput grande, subrotundum. Rostrum breuissimum, crassum, retusum, lateribus hirsutissimum. Nasus planus, non productus, truncatus, didymus, fuscus, nudus. Nares conniuentes, distantes. Labium superius vsque ad nares late bipartitum, hians, dentesque superiores vsque ad basin detegens, ab vtroque latere tumidulum, pubescens, intraque os conniuens et coiens, palato pone dentes primores deficiente. Labium inferius crassum, dentes vaginans. Dentes primores superiores denudati, quasi extra os porrecti, magni, interius

terius plani, lataque acie terminali rotundata. Myſtaces nigrae, breues, deorſum vergentes, per hirſuta latera roſtri ſparſae quinque fere ordinum. Punctum ſupraoculare tripile, paroticum et gulare vnipilia; pili ſparſi per inferioris labii ambitum. Oculi vertici et naſo propiores, minutiſſimi, vellere ferme latentes, nigri. Aurium apertura mediocris, vellere obumbrata, poſterius margine prominulo cincta. Corpus breue, ventricoſum. Artus breues, robuſtiſſimi. Pedes nudiuſculi, albidi, omnes pentadactyli, digitis ſubſquamatis. Palmae maiores, latae, foſſoriae, digitis interioribus ſenſim longioribus praeter pollicem breuiorem. Palmae plantaeque exterius ad digitum vsque pilis rigidis, deflexis, crebris, ciliatae. Cauda breuiſſima, teres, truncata, vix alto vellere clunium eminens. Vellus murinum, tenerum, molle, circa clunes et caput denſiſſimum ſub armis et in ventre rariuſculum aeſtate, hieme vero vbique largum. Color capitis, praeſertim circa roſtrum, ſubater, mento albido; reliqui corporis ſupra fuſco griſeoque mixtus murinus; verſus latera, magisque ſubtus et in artubus caneſcens. Interdum totum animal atrum. Genitalia exilia.

Habitat in regionibus auſtralioribus Ruſſiae ad occidentem Wolgae ſitis, ſub terra continuis cuniculis incedens et magnos cumulos agens. Etiam Germaniae nonnullis regionibus inquilinum (ſub nomine *Reitmaus*), teſte doctiſſimo Pallas.

Delectatur Phlomidis tuberoſae et Lathyri tuberoſi radicibus, aliisque victitans radicibus. Noctu praeſertim fodit. Parat nidum ſubterraneum e gramine molli verno tempore pro pullis. Hieme latet ſub foeni aceruis vel in profundioribus cuniculis intra terram. Vox nulla.

37. MVS.

37. MVS.

Dentes Primores vtrinque II; inferiores subulati.
Laniarii nulli.
Pedes digitati: digitis 4-5.
Cauda gracilis, subnuda.

noruegicus. 1. M. cauda elongata, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, corpore rufo.

manus. Pouch Russorum *Rzacz. auct. p.* 329?
Mus ex Norwegia cinereo fuscus *Seb. thes. II p.* 64 *tab.* 63 *fig.* 5.
Glis Noruagicus *Klein. quadrup. p.* 56.
Le Rat de bois: Mus (silaestris) cauda longissima, supra dilute fuluus, infra albicans *Briss. regn. an. p.* 170 *n.* 3.
Le Rat de Norvége: Mus (noruegicus) cauda longa, ex dilute cinereo fuscus *Briss. regn. an. p.* 173 *n.* 8.
Die grauschwärzliche Norwegische Ratte *Hall. vierf. p.* 424.
Rat de bois *Dictionn. anim. III p.* 661.
Rat de Norwege *Dictionn. anim. III p.* 662 (confundit hunc cum Glire Lemmo).
Le Surmulot *Buff. hist. nat. VIII p.* 206 *t.* 27.
The Norway Rat *Penn. brit. zool. p.* 47 *cum fig.* bona.
Rat des bois *Bom. dictionn. III p.* 716.
Surmulot *Bom. dictionn. IV p.* 279.
Le Pouc *Buff. hist. nat. XV p.* 143?
The brown Rat *Penn. syn. quadr. p.* 300 *n.* 227.

Die

Caudam elongatam in hoc genere dico, quae est longitudine corporis vel vltra; *mediocrem*, quae breuior est.

Die groſſe Waldratte. Sürmülot *Mart. Buff. verſ. IV p. 291 tab. 79.*

Paullo maior Ratto, cui ſimilis; longitudine corporis 9 pollicum, cauda longitudinis eiusdem. Caput, dorſum et latera pallide ex rufo-fuſca, pectus et venter ſordide alba. Pedes nudi, coloris ſordide carnei. Palmae digitis quatuor cum vngue pollicari, plantae digitis quinque. Auriculae Ratti. Oculi magni, nigri. Naſi apex ſordide albus. Caudae baſis dorſo concolor, reliqua cauda ſquamoſa intermixtis pilis rarioribus. Mammae ſex ventrales totidemque pectorales.

Habitat hodie fere in omni Europa, a ſeculo noſtro inde, borealis originis. In Anglia ignotus ante annum 1730, in Gallia ante 1750. Degit praecipue ad aquas, beneque natat et vrinatur. Fodit ſubterraneus, et reperitur quoque in domibus. Victitat frumento, fructibus, cuniculis, gallinulis, vtenſilibus variis. Maxime pingueſcit. Audaciſſimum animal inter congeneres atque Ratto ferocius, morſu periculoſo: deleuit fere paſſim Rattum. Parit ter in anno 12-18. Mas feminam magnitudine antecellit.

Rattus. 2. M. cauda elongata, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, corpore griſeo.

Mus domeſticus maior, quem vulgo Rattum vocant *Geſn. quadrup. p.* 829 *cum fig.* bona.
Mus domeſticus maior *Schwenckf. theriotr. p.* 115.
Rattus *Aldrov. digit. p.* 415.
Glires Ratten *Ionſt. quadrup. tab.* 66 fig. mediocr.
Die Ratte *Geſn. Thierb. p.* 263 *cum fig.* bon.
Sorex domeſticus *Charlet. exerc. p.* 25.
Mus domeſticus maior ſeu Sorex *Sibb. Scot. an. p.* 12.

Mus

Mus domeſticus maior, ſiue Rattus *Rai. ſyn. quadr. p.* 217.

Mus domeſticus maior, ſiue Rattus *Sloan. Iam. II p.* 330.

The Houſe Rat *Brick. North-Car. p.* 130.

Mus domeſticus maior *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.

Mus cauda longa ſubnuda, corpore fuſco-cineraſcente *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 10 *n.* 28.

Die Ratte *Meyer Thiere II tab.* 83.

Mus cauda longa ſubnuda, corpore fuſco-cineraſcente *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 6.

Mus, Rattus; Mus criſtinarius *Klein. quadrup. p.* 57.

Mus cauda longa ſubnuda, corpore fuſco cinereſcente. The browniſh-grey Mus, with a long and almoſt naked tail: the Ratt *Hill anim. p.* 517 *tab.* 25 fig. mediocr.

Ratzen *Kalm. Amer. III p.* 14.

Le Rat: Mus (Rattus) cauda longiſſima, obſcure cinereus *Briſſ. regn. an. p.* 168 *n.* 1.

Mus cauda longa ſubnuda, corpore fuſco-cineraſcente *Kram. Auſtr. p.* 316.

Die groſſe Hausmaus (Ratte) *Hall. vierf. p.* 427.

Mus (Rattus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 61 *n.* 9.

Rat domeſtique *Dictionn. anim. III p.* 661.

Le Rat *Buff. hiſt. nat. VII p.* 278 *tab.* 36.

Huis-Rot: Muis met een lange byna kaale Staart, de Voorpooten vier-Vingerig met een Nageltje in plaats van Duim, de Agterpooten vyf-Vingerig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 471.

Mus (Rattus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, plantis pentadactylis *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 12 *n.* 33.

Mus cauda longiſſima, obſcure cinereus *Gronov. zooph. I p.* 4 *n.* 18.

The common Rat *Penn. brit. zool. p.* 46 *cum fig.* bon.

Rotter

Rotter *Pontopp. Dan. I p.* 611.

Rat domeſtique *Bom. dictionn. III p.* 714.

Mus (Rattus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 83 *n.* 12.

Mus Rattus *Forſter: Philoſ. Tansact. LVII p.* 343.

The black Rat *Penn. ſyn. quadr. p.* 299 *n.* 226.

Sorcio *Aleſſ. quadrup. II tab.* 78 fig. Buff.

Hausratze *Müll. Naturſ. I p.* 347.

Mus (Rattus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, plantis pentadactylis *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 31.

Die Ratte *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 221 *tab.* 69.

Sorcio, Ratto *Italis.*

Raton, Rata *Hiſpanis.*

Rato *Luſitanis.*

Rat *Gallis.*

Llygoden ffrengig *Cambrenſibus.*

Ratze, Ratte *Germanis.*

Rot, Rotte *Belgis.*

Rat *Anglis.*

Rotte *Danis.*

Rotta *Suecis.*

Крыса (Kryſa) *Ruſſis.*

Ulu Tſkan *Tataris.*

Schönkſcha *Tſcheremiſſis.*

As i-ſchüſchi *Tſchuwaſchis.*

Budſchim-ſchir *Wotiakis.*

Kriſſa *Morduanis.*

Wurdis, Burdüſch *Sirjänice.*

Corpus ſeptem pollices longum, e nigro griſeum, ſubtus album vel cinereum. Roſtrum acuminatum. Auriculae ſubouatae, pilis breuibus tectae. Verruca ſupraocularis pilis duobus longioribus. Myſtaces albae, longitudine capitis. Pedes 4-5, cum vnguiculo pollicari in palmis, fiſſi, ſupra pilis albis

albis breuiſſimis tecti, ſubtús papilloſo-verrucoſi. Digiti compreſſi. Vngues laterales breuiores. Cauda longitudine circiter corporis ad 8 poll., ſubnuda, ſquamoſa, pilis breuiſſimis ſcabra. Calculo vrinario maxime obnoxium animal.

Variat colore fuſco, griſeo, albo.

Habitat fere vbique in Europa et in calidioribus, paſſim fere deletus a M. noruegico. Exul Lapponiae. Americanus europaeae originis; allatus eſt in nouum orbem circa annum 1544.

Edit frumenta, vtenſilia varia, gallinulas, columbas, cuniculos: animal domibus peſſimum cautumque. Nidum parat in loco calidiore ex lana, pannis, ſtramine. Laſciuus valde. Parit pluries in anno ad ſex vel ſeptem. Saeuit in propriam ſpeciem. Retro coit, facileque ſub coitu caudae permiſcentur; inde fabula de rege Rattorum. Muſtela Ratto maxime infeſta.

Eiusdem forte ſpeciei eſt:

Mus americanus *Seb. theſ. II p. 30 tab. 29 fig. 2.*

Le Rat d'Amerique: Mus (Rattus Americanus) cauda longiſſima, ſupra ex rufo flaueſcens, infra albicans, auriculis retrorſum ſitis *Briſſ. regn. an. p.* 172 *n. 6.*

Rat d'Amerique *Dictionn. anim. III p. 662.*

Rat d'Amerique *Bom. dictionn. III p. 717.*

Dorſum ex rufo flaueſcens. Venter albeſcit. Auriculae longae, albicantes. Cauda albida, corpore longior, hiſpida.

amphibius. 3. M. cauda mediocri, palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, corpore nigricante.

Mus aquatilis *Agric. an. subt. p.* 58.
Mus aquaticus *Gesn. quadrup. p.* 830.
Mus aquaticus *Bellon. aquat. p.* 35 *fig. p.* 36 mala.
Mus aquaticus *Schwenckf. theriotr. p.* 115.
Mus aquatilis *Aldrov. digit. p.* 447.
Mus aquaticus *Ionst. quadrup. p.* 169.
Mus aquaticus *Charlet. exerc. p.* 25.
Sorex aquaticus *Charlet. exerc. p.* 25.
Mus aquaticus *Sibb. Scot. an. p.* 12.
Mus maior aquaticus, siue Rattus aquaticus *Rai. syn quadr. p.* 217.
The Water-Rat *Lawf. Carol. p.* 122.
Mus agrestis virginianus albus *Seb. thes. I p.* 76 *tab.* 47 *fig.* 4?
The Water-Rat *Brick. North-Car. p.* 120.
Castor cauda lineari tereti *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 47.
Castor cauda lineari tereti *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 10 *n.* 25.
Die Wasserratte *Meyer Thiere II tab.* 84.
Castor cauda lineari tereti *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 3.
Mus aquatilis *Klein. quadrup. p.* 57.
Mus agrestis Virginianus albus *Klein. quadrup. p.* 57?
Mus cauda abrupta, digitis connexis. The abrupt-tailed Mus, with connected toes: the Water-Rat *Hill anim. p.* 518.
Le Rat d'eau: Mus (aquaticus) cauda longa, pilis supra ex nigro et flauescente mixtis, infra cinereis vestitus *Briss. regn. an. p.* 175 *n.* 11.
Le Rat blanc de Virginie: Mus (albus virginianus) cauda longa, albus, mystace nigricante *Briss. regn. an. p.* 173 *n.* 7?
Die Wasserratte *Hall. vierf. p.* 430.
Mus (amphibius) cauda elongata pilosa, plantis palmatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 61 *n.* 8.

Le

Le Rat d'eau *Buff. hiſt. nat. VII p.* 348 *tab.* 43.
Rat d'eau *Dictionn. anim. III p.* 665.
Rat blanc *Dictionn. anim. III p.* 662?
Water-Rot: Muis met een lange Hairige Staart, de Agterpooten tuſſchen de Vingeren gevliesd *Houtt. nat. hiſt. II p.* 470.
Mus (amphibius) cauda elongata piloſa, plantis palmatis *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 12 *n.* 32.
The Water Rat *Penn. brit. zool. p.* 48 *cum fig.* bon.
Vand-Rotte *Pontopp. Dan. I p.* 612.
Rat d'eau *Bom. dictionn. III p.* 717.
Rat blanc *Bom. dictionn. III p.* 717?
Mus (amphibius) cauda elongata piloſa, plantis palmatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 82 *n.* 11.
Le Rat d'eau blanc *Buff. hiſt. nat. XV p.* 146?
The Water Rat *Penn. ſyn. quadr. p.* 301 *n.* 228.
Sorçio morgange *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 165 *fig.* 1 Buff.
Die Waſſerratze *Müll. Naturſ. I p.* 346.
Mus (amphibius) cauda elongata piloſa, plantis palmatis *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 30.
Die Waſſermaus. Waſſerratte *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 251 *tab.* 72.
Sorcio morgange *Italis.*
Raton de agua *Hiſpanis.*
Rato de agoa *Luſitanis.*
Rat d'eau *Gallis.*
Llygoden y dwfr *Cambrenſibus.*
Waſſerratze *Germanis.*
Water-Rot *Belgis.*
Water Rat *Anglis.*
Vand-Rotte *Danis.*
Vasmuus, Vandſkiœr *Noruegis.*
Wattn Rotta *Suecis.*
Водяной Кротъ (Wodjanoi Krot) *Ruſſis.*
Mataga *Tunguſis.*

Longitudo corporis 7 pollicum, caudae 4½ poll. Corpus craſſius quam in Ratto. Naſus craſſus, obtuſus. Auriculae paruae, pilis occultatae. Oculi minuti. Dentes aurantii. Palmae digitis 4½, plantae 5 non palmatis, vti Raio et Linneo, aliisque auctoribus. Caput et corpus pilis longis nigris, admixtis paucioribus ferrugineis. Venter ex ferrugineo griſeus. Cauda pilis breuibus, nigris, apice albicantibus. Mammae quatuor pectorales totidemque ventrales.

Variat colore albo.

Habitat in Europa et America boreli, ad aquas, fodiens.

Victitat piſciculis eorumque ouis, ranis, inſectis, radicibus. Bene natat atque vrinatur. Coit fine hiemis, parit Aprili menſe ſex vel ſeptem. Sapor carnis piſcinus.

ſiluaticus. 4. M. cauda mediocri, corpore cano pilis nigris, pectore flaueſcente, abdomine albido.

Mus agreſtis maior *Geſn. quadrup. p.* 830 *fig. p.* 1104.
Mus ſiluaticus *Geſn. quadrup. p.* 833?
Mus ſiluaticus *Schwenckf. theriotr. p.* 116.
Mus agreſtis maior *Aldrov. digit. p.* 436.
Mus ſiluaticus *Sibb. Scot. an. p.* 12.
Mus domeſticus medius *Rai. ſyn. quadr. p.* 218.
Mus agreſtis maior macrouros Geſn. *Rai. ſyn. quadr. p.* 219.
Sorices *Rzacz. Polon. p.* 261 *auct. p.* 328?
Mus domeſticus medius *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.
Mus cauda longa, corpore nigro-flaueſcente, abdomine albo *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 11 *n.* 30.

Die

Die Feldmaus *Meyer Thiere 1 tab.* 1?

Mus cauda longa, corpore nigro-flauefcente, abdomine albo *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 7.

Mus cauda longa corpore nigro flauefcente. The yellowifh-black Mus, with a long tail *Hill anim. p.* 517.

Le grand Rat des champs: Mus (campeftris maior) cauda longiffima, fufcus, ad latera rufus *Briff. regn. an. p.* 171 *n.* 4.

Le Mulot: Mus cauda longa, fupra e fufco flauefcens, infra ex albo cinerafcens *Briff. regn. an. p.* 174 *n.* 9.

Mus cauda longa corpore nigro-flauefcente, abdomine albo *Kram. Auftr. p.* 316.

Mus (filuaticus) cauda longa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore grifeo pilis nigris, abdomine albido *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 62 *n.* 12.

Le Mulot *Buff. hift. nat. VII p.* 325 *tab.* 41.

Mulot *Dictionn. anim. III p.* 195.

Grand Rat des champs *Dictionn. anim. III p.* 662.

Bofch-Muis: Muis met een lange Staart, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig, het Lyf grys met zwarte Hairtjes, de Buik witagtig *Houtt. nat. hift. II p.* 486.

Mus (filuaticus) cauda elongata, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore grifeo pilis nigris, abdomine albido *Linn. fn. fuec.* 2 *p.* 12 *n.* 36.

The long-tailed Field-Moufe *Penn. brit. zool. p.* 49 *cum. fig.* bona.

Skov-Muus *Pontopp. Dan. I p.* 612.

Mulot *Bom. dictionn. III p.* 164.

Mus (filuaticus) cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore grifeo pilis nigris, abdomine albido *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 84 *n.* 17.

The field Rat *Penn. ſyn. quadr. p.* 302 *n.* 230.
Topo di Campagna *Aleſſ. quadrup. II tab.* 79 fig. Buff.
Field Mouſe *Forſter: Philoſ. tranſact. LXII p.* 380.
Die Waldmaus *Müll. Naturſ. I p.* 352.
Mus (ſiluaticus) cauda mediocri, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore griſeo pilis nigris, abdomine albido *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 29.
Die groſſe Feldmaus *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 243 *tab.* 71.
Topo di campagna *Italis.*
Rat ſauterelle, Souris de terre, Mulot *Gallis.*
Ratte à la grande queue *in Burgundia.*
Llygoden ganolig, Llygoden y maes *Cambrenſibus.*
Feldmaus *Germanis.*
Boſch-Muis *Belgis.*
Field-mouſe *Anglis.*
Beanmouſe *paſſim in Anglia.*
Skov-muus *Danis.*
Myſzy polne *Polonis?*

Longitudo corporis 4½ poll. caudae 4 poll. Oculi magni, prominentes, nigri. Auriculae e vellere prominentes. Caput, dorſum et latera flauicanti-fuſca, intermixtis pilis nigricantibus; pectus ochraceum; venter albus. Cauda leuiter piloſa. Mammae quatuor ventrales, duae pectorales.

Habitat in Europae campis, ſiluis et hortis ſiccioribus. Eſt quoque ad fretum Hudſonis. Edit nuces varias atque frumentum. Nidus prope terrae ſuperficiem; parit ſeptem ad decem pullos. Cibum in hiemem colligit.

Varietatem Noueboracenſem Pennantus habet, myſtacibus valde longis, aliis albis, aliis nigris; auriculis

culis magnis, nudis, apertis; ſtria per medium dorſum a capite ad caudam lata ferruginea; buccis ſpatioque inter auriculas, nec non lateribus vsque ad caudam aurantiis; corpore ſubtus a naſo ad caudam vsque albiſſimo; pedibus albis. Crura poſtica huic longiora ac europaeo. Cauda ſupra nigricans, infra albicans.

Muſculus. 5. M. cauda elongata, palmis tetradactylis absque vnguiculo pollicari, corpore griſeo.

Μυς *Ariſt. hiſt. anim.* I c. 2 n. 15.

Mus *Plin. hiſt. nat.* VIII c. 56 (c. 82 *Hard.*). X c. 65 (c. 85 *Hard.*) c. 73 (c. 94 *Hard.*).

Mus *Geſn. quadrup.* p. 808 *fig.* bona.

Mus domeſticus minor *Schwenckf. theriotr.* p. 113.

Mus albus *Schwenckf. theriotr.* p. 114.

Mus rubeus *Schwenckf. theriotr.* p. 114.

Mus muſcatus *Schwenckf. theriotr.* p. 114?

Mus domeſticus minor *Aldrov. digit.* p. 417 *cum fig.* mediocr.

Mus domeſticus minor albus Suidae *Aldrov. digit.* p. 417.

Mus domeſticus *Ionſt. quadrup.* p. 165.

Mures Meuſe *Ionſt. quadrup. tab.* 66 fig. mediocr.

Eine Maus *Geſn. Thierb.* p. 260 *cum fig.* mala.

Mus domeſticus minor *Sibb. Scot. anim.* p. 12.

Mus domeſticus vulgaris ſeu minor *Rai. ſyn. quadr.* p. 218.

Mus albus domeſticus *Rzacz. auct.* p. 328.

Mus domeſticus vulgaris ſeu minor *Sloan. Iam.* II p. 330.

The Houſe-mouſe *Brick. North-Car.* p. 131.

Mus domeſticus vulgaris *Linn. ſyſt. nat.* 2 p. 47.

Mus cauda longiuſcula, corpore cinereo-fuſco, abdomine ſubalbeſcente *Linn. fn. ſuec.* 1 p. 11. n. 31.

Eine Maus *Meyer Thiere* I *tab.* 1.

Mus cauda nudiuſcula, corpore cinereo-fuſco, abdomine ſubalbeſcente *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 8.

Mus minor, Muſculus vulgaris, domeſticus *Klein. quadrup. p.* 57.

Mus cauda longa nudiuſcula, ventre ſubalbido. The Mus, with a long and almoſt naked tail, and a white belly: the Mouſe *Hill anim. p.* 517.

Mus cauda longa nudiuſcula, corpore cinereo-fuſco, abdomine ſubalbeſcente *Linn. muſ. Ad. Frid.* I *p.* 9.

La Souris: Mus (Sorex) cauda longiſſima, obſcure cinereus, ventre ſubalbeſcente *Briſſ. regn. an. p.* 169 *n.* 2.

Mus cauda nudiuſcula, corpore cinereo-fuſco, abdomine ſubalbeſcente *Kram. Auſtr. p.* 316.

Mus domeſticus minor, cauda longa ſubnuda, corpore fuſco-cinereſcente, abdomine albicante: the Mouſe *Brown. Iam. p.* 484.

Die kleine Hausmaus *Hall. vierſ. p.* 431.

Mus (Muſculus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 10, I *p.* 62 *n.* 10.

La Souris *Buff. hiſt. nat. VII p.* 309 *tab.* 39.

Souris *Dictionn. anim. IV p.* 226.

Huis-Muis: Muis met een lange byna kaale Staart; de Voorpooten vier-de Agterpooten vyf-Vingerig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 478.

Mus (Muſculus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, pollice mutico *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 12 *n.* 34.

Mus cauda longiſſima, obſcure cinereus, ventre albeſcente *Gronov. zooph.* I *p.* 4 *n.* 19.

The common Mouſe *Penn. brit. zool. p.* 302 *n.* 229.

Lille-Muus *Pontopp. Dan.* I *p.* 612.

Souris *Bom. Dictionn. IV p.* 253.

Mus (Musculus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 83 *n.* 13.
Mus Musculus *Forster: Philos. transact. LVII p.* 343.
The Mouse *Penn. syn. quadrup. p.* 302 *n.* 229.
Topo *Aless. quadrup. II tab.* 77 fig. Buff.
Die Hausmaus *Müll. Natursf. I p.* 349.
Mus domesticus *Forsk. fn. orient. p. IV.*
Mus (Musculus) cauda elongata subnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis: pollice mutico *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 28.
Die Maus *Mart. Buff. vierf. IV p.* 239 *tab.* 70.
Topo, Sorice *Italis.*
Raton (*mas*); Rata (*femina*) *Hispanis.*
Ratinho *Lusitanis.*
Souris *Gallis.*
Llygoden *Cambrensibus.*
Maus, Hausmaus *Germanis.*
Muis, Huis-muis *Belgis.*
Mouse *Anglis.*
Lille-Muus *Danis.*
Huus-Muus *Noruegis.*
Mus *Suecis.*
Мышь (Mysch'), Домашная Мышь (Domaschnaja Mysch') *Russis.*
Tskan *Tataris.*
Koljä *Tscheremissis.*
Schüschì *Tschuwaschis.*
Schir *Wotiakis.*
Tschar *Morduanis.*
Schir *Permice.*
Schür *Sirjänice.*
Far *Aegyptiis.*

Minor Ratto, longitudine corporis trium pollicum, in reliquis isti similis figura et colore, nisi quod hic pallidior sit, et quod vnguis palmarum polli-

 caris

caris desit. Cauda longitudine corporis pilosiuscula.

Varietas alba, oculis aurantiis.

Habitat vbique in domibus et siluis glandiferis, polyphagus: noxium animalculum rebus esculentis, cautumque et timidum, agileque. Parit sex vel septem pleries in anno. Delectatur musica. Praeda Felis, Mustelae, Erinacei, Strigis; in horreis pellitur Ebulo.

Eiusdem speciei videtur:

Mus americanus masculus, pilis dilute spadiceis vestitus *Seb. thes. I p.* 177 *tab.* 111 *fig.* 6.

La Souris d'Amerique: Mus (Sorex Americanus) cauda longissima, dilute spadiceus *Briss. regn. an. p.* 172 *n.* 5.

La Souris de l'Amerique *Diction. anim. IV p.* 227.

Die Orakelmaus *Hall. vierf. p.* 432 quid?

paludosus. 6. M. cauda elongata, auriculis vellere breuioribus, corpore nigro.

Mus (paludosus) cauda mediocri pilosa, palmis subtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus; ater *Linn. mant. II p.* 522.

Die Sumpfmaus *Müll. Naturs. Suppl. p.* 39.

Corpus magnitudine, statura, facie Muris terrestris, sed totum atrum. Auriculae vellere breuiores, pilosae (nec vt in M. terrestri nudiusculae). Pedes toti (digitis M. terrestri conformibus, etiam pollicis palmarum vngue minuto obsoletiore) pilis albis tecti, omnes fissi. Cauda tota pilis tecta (qua

(qua differt a M. terreſtri) longitudine corporis absque capite.

Habitat ad Sueciae foſſas, introitu ſub ipſa aqua. Num forte *M. amphibius.*

terreſtris. 7. M. cauda mediocri, auriculis vellere breuioribus, corpore ſupra ferrugineo, ſubtus cinereo.

Mus agreſtis *Schwenckf. theriotr. p.* 116.

Mus agreſtis minor *Aldrov. digit. p.* 436.

Nül oder Wühlmaus *Geſn. Thierb. p.* 264 *cum fig.* mala.

Mus agreſtis capite grandi, brachyuros *Rai. ſyn. quadr. p.* 218.

Mus agreſtis, capite grandi, brachyurus *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.

Mus cauda breui, corpore nigro-fuſco, abdomine cinerafcente *Linn. fn. ſuec.* I *p.* 10 *n.* 27.

Mus cauda longa piloſa; auribus ſubrotundis vellere breuioribus *Linn. fn. ſuec.* I *p.* 10 *n.* 29.

Mus cauda breui, corpore nigro-fuſco, abdomine cineraſcente *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 4.

Mus cauda longa piloſa, auribus ſubrotundis vellere breuioribus *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 5.

Mus agreſtis capite grandi *Klein. quadrup. p.* 57.

Mus cauda breui, dorſo nigro-fuſco, ventre albo. The ſhort-tailed Mus, with a browniſh-black back, and white belly *Hill anim. p.* 516.

Mus cauda longa villoſa, auribus breuibus. The ſhort-eared Mus, with a ſhort hairy tail: the Ground-rat *Hill anim. p.* 517 *tab.* 25 fig. mala.

Le petit Rat des champs: Mus (campeſtris minor) cauda breui, pilis e nigricante et ſordide luteo mixtis in dorſo, et ſaturate cinereis in ventre veſtitus *Briſſ. regn. an. p.* 176 *n.* 12.

Mus

Mus cauda breui, corpore nigro-fuſco, abdomine cinerafcente *Kram. Auſtr. p.* 316.

Mus cauda longa piloſa, auribus ſubrotundis vellere breuioribus *Kram. Auſtr. p.* 316.

Die Feldmaus *Hall. vierf. p.* 431?

Die Scharrmaus *Hall. vierf. p.* 431.

Mus (terreſtris) cauda mediocri ſubpiloſa, palmis ſubtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 61 *n.* 7.

Le Campagnol *Buff. hiſt. nat. VII p.* 369 *tab.* 47.

Petit rat des champs *Dictionn. anim. III p.* 666.

Veldmuis: Muis met een Staart van middelbare langte, dun gehaird; de Voorpooten omtrent vierde Agterpooten vyf-Vingerig; de Ooren korter dan het Hair van de Vagt *Houtt. nat. hiſt. II p.* 469.

Mus (agreſtis) cauda abbreuiata, corpore nigro-fuſco, abdomine cinerafcente *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 11 *n.* 30.

Mus (tereſtris) cauda mediocri ſubpiloſa, palmis ſubtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 11 *n.* 31.

The ſhort-tailed Fieldmouſe *Penn. brit. zool. p.* 50 *cum fig.* bona.

Mark-Muus *Pontopp. Dan. I p.* 612.

Campagnol *Bom. dictionn. I p.* 389.

Mus (terreſtris) cauda mediocri ſubpiloſa, palmis ſubtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 82 *n.* 10.

Die eine Mauſeart *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 151 *tab.* 29 *fig.* 1. (num [illegible] paludoſus?)

The ſhort-tailed Rat *Penn. ſyn. quadr. p.* 305 *n* 233.

Campagnolo *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 165 *fig.* 2 Buff.

Short-tailed Mouſe *Forſter: Philoſ. transact. LXII p.* 380.

Die

Die Feldmaus *Müll. Naturf. I p.* 345.
Mus (terreftris) cauda mediocri fubpilofa, palmis fubtetradactylis, plantis pentadactylis, auriculis vellere breuioribus *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 27.
Die kleine Feldmaus. Der Kampagnol *Mart. Buff. vierf. IV p.* 256 *tab.* 73.
Campagnolo *Italis.*
Petit rat des champs, Campagnol *Gallis.*
Ratte couette *in Burgundia.*
Llygoden gwtta'r maes *Cambrenfibus.*
Kleine Feldmaus *Germanis.*
Erdzeift *Auftriacis.*
Veldmuis *Belgis.*
Short-tailed Fieldmoufe *Anglis.*
Mark-Muus *Danis.*
Molle *Suecis.*
Песцовая Мышь (Peftzowaja Myfch') *Ruffis.*

Corpus longitudine trium pollicum, cauda vnius. Caput magnum. Nafus obtufus. Auriculae breues, pilis occultatae. Oculi prominentes. Cauda fubpilofa, apice leuiter floccofa. Color capitis et corporis fupra e fufco ferrugineus admixto nigro; venter profunde cinereus.

Habitat aeftate in Europae campis et hortis, hieme in filuis: reperitur quoque in America boreali. Subterraneum animal. Nidum parat in pratis humidis. Parit ad octo pullos. Edit nuces arborum et frumenta.

Idem videtur:

Mus (gregarius) cauda corpore triplo breuiore fubpilofa, corpore grifeo fubtus pedibusque albis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 84 *n.* 16.

The

The gregarious Rat *Penn. ſyn. quadr. p.* 305 *n.* 234.
Mus ſocialis *Pallas Reiſ. II p.* 705 qui vtique idem videtur.
Die Erdmaus *Müll. Naturſ. I p.* 351.
Die geſellige Maus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 45.
Niri Katſchan *Tunguſis.*

Corpus M. Muſculo paullo maius, ſupra griſeum: pilis baſi atris, medio ferrugineis, apice nigris. Gula, abdomen et pectus albicantia. Caput ouatum, roſtro obtuſo, rictu paruo. Myſtaces nigrae. Auriculae nudae, ſubrotundae, ex vellere prominentes. Cauda albido-piloſa, apice nigro-cinerea. Pedes 4-5, digitis omnibus vnguiculatis.

Habitat in Germania, Suecia, nec non ad Iaicum. Fodit et ſub terra degit; ſedens edit.

agrarius. 8. M. cauda mediocri, corpore ſupra luteo, ſubtus caneſcenti albo, linea dorſali nigra.
Mus agrarius *Pallas Reiſ. I p.* 454.
Die Ackermaus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 41.

Paullo minor et tenerior M. Muſculo, roſtroque acutiore. Myſtaces parciores. Caput oblongius. Auriculae minores, intus villoſae. Corpus luteum, ſubtus artubusque caneſcenti-album. Linea ab occipite ad caudam fere vsque ſpinalis atra, conſtantiſſima. Artus gracillimi: palmae vnguiculo pollicari minutiſſimo, obtuſo. Cauda longitudine corporis dimidia circiter, tenuior quam in M. Muſculo et piloſior paullo, filiformis, annulis circiter 90 notata, ſupra nigricans, ſubtus albeſcens. Pondus drachm. 3-4.

Habitat

Habitat ad Wolgam et in vicinis locis copiofiffime fub frumenti aceruis.

Idem videtur:
The harveft Rat *Penn. fyn. quadr. p.* 303 *n.* 231.

Corpus longitudine 2 ½ poll. caudae 2 poll. Oculi minus prominentes quam in M. filuatico. Auriculae e vellere prominulae. Color corporis fupra ferrugineus, fubtus albus, linea recta in lateribus vtrumque colorem diftinguente. Cauda fubpilofa.

Habitat in Hampfhire Angliae, copiofiffimus apparens durante meffe, numquam domus intrans. Hieme fubterraneus. Fodit valde profunde. Lectam parat e gramine ficco. Parit ad octo.

Porro huc referendus videtur:
Die zwote Gattung *S. G. Gmelin Reif. I p.* 151.
Eine andere Art Mäufe *S. G. Gmelin Reif. I tab.* 29 *fig.* 2 mediocr.

Corpus fupra ex rufo flauum. Stria dorfalis nigra longitudinalis, medio latiffima. Corpus fubtus cinereum. Auriculae mediocres, intus et extus pilofae, capiti concolores. Corpus ad tres pollices longum, cauda 2½ poll. cinerea, fubpilofa. Pedes 4-5.

Habitat in defertis ad Tanain, fodiens fubterraneus.

barbarus. 9. M. cauda elongata, corpore fufco ftriis decem pallidis.
Rats d'Inde *Boullaye voy. p.* 256?
Sweet mice *Barbot Guin. p.* 214?

Mus

Mus (barbarus) cauda mediocri, corpore fuſco ſtriis decem pallidis, palmis tridactylis, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *II addend.*
Die wilde Maus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 47.

Corpus M. Muſculo minus, ſupra fuſcum. Abdomen pallidum. Dorſum ſtriis decem pallidis, et ſaepe lineola vix manifeſta inter ſtrias laterales. Pedes antici digitis tribus vnguiculatis; praeterea pollice obſoleto; ſub planta ipſa rudimentum quinti digiti. Cauda nudiuſcula, ſubuerticillata, longitudine corporis.

Habitat in Barbaria.

ſtriatus. 10. M. cauda elongata, corpore griſeo ſtriis punctatis albis.
Mus orientalis *Seb. theſ. II p.* 22 *tab.* 21 *fig.* 2.
Mus Orientalis *Klein. quadrup. p.* 57.
Mus (ſtriatus) cauda longa, ſtriis corporis longitudinalibus ex punctis albis *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 10.
Le Rat oriental: Mus (orientalis) cauda longa, rufus, lineis in dorſo albicantibus, margaritarum aemulis *Briſſ. regn. an. p.* 175 *n.* 10.
Die rothe orientaliſche Maus *Hall. vierf. p.* 432.
Mus (ſtriatus) cauda elongata ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corpore ſtriis punctatis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 62 *n.* 13.
Rat oriental *Dictionn. anim. III p.* 665.
Muis met een lange byna kaale Staart, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig, geſtippelde Streepen over 't Lyf *Houtt. nat. hiſt. II p.* 487.
Rat oriental *Bom. dictionn. III p.* 717.

Mus

Mus (ſtriatus) cauda mediocri ſubnuda, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, corporis ſtriis punctatis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 84 *n.* 18.
The oriental Rat *Penn. ſyn. quadr. p.* 304 *n.* 232.
Die oſtindiſche geſtreifte Ratze *Müll. Naturſ. I p.* 352.

Dimidio minor M. Muſculo. Color griſeus ſtriis duodecim a capite ad poſtrema diductis, albis, ex punctis in ſeries digeſtis; ſubtus pallidus. Auriculae rotundatae, nec elongatae, nudae. Pedes flaueſcentes. Palmae tetradactylae, plantae pentadactylae. Cauda ſubnuda, longitudine corporis.

Habitat in India.

minutus. 11. M. cauda elongata, corpore griſeo-luteſcente ſubtus ſordide albo.
Mus minutus *Pallas Reiſ. I. p.* 454.
Die Zwergmaus *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 41.

Totius generis minimus, vix dimidia mole M. Muſculi. Caput et praeſertim naſus hirſutior quam in agrario. Myſtaces teneriores. Auriculae minores et vellere ſemilatentes, orbiculatae, intus ſubuilloſae. Corpus griſeo-luteſcens, in dorſo fuſceſcente mixtum, ſubtus cano-album. Pedum palmae vtrinque cano-ciliatae, palmarum vnguiculus pollicaris obtuſiſſimus. Cauda maior quam in M. agrario, tenuior tamen et breuior quam M. Muſculi, ſubfiliformis, piloſa tota, circuliſque fere 130 annulata. Pondus plerumque ſeſquidrachmale, raro duarum drachmarum. Interaneis aeque ac M. agrarius cum M. amphibio et ſiluatico conuenit. Cyſtis fellea in vtroque pariter nulla.

Habitat ad Wolgam et in vicinis locis copiosissime sub frumenti aceruis.

subtilis. 12. M. cauda elongata, corpore cinereo-canescente, fasciola dorsali nigra.

Eine Art kleiner grauer Schlafmäuse *Pallas Reis. II p.* 408.

Mus subtilis *Pallas Reis. II p.* 705.

Der Zärtling *Müll. Naturf. Suppl. p.* 46.

Minutissima (praeter M. minutum) species. Habitus M. minuti, sed auriculae maiores et cauda multo longior, minusque pilosa. Dentes primores lutei. Auriculae magnae, ouales, nudae, plicatiles. Palmae subpentadactylae, verruca insigni callosa loco pollicis. Cauda corpore multo longior, attenuata, subuolubilis, nudiuscula, minus tamen quam in M. Musculo, circulis circiter 170 euidentissime annulata. Color supra cinereo-canescens fusco mixtus; fasciola latiuscula a scapulis vel ima ceruice incipiens, vsque ad caudam, nigra. Pondus paullo vltra drachmam. Longitudo animalculi 2 poll. 1 lin. caudae 2 poll. 10 lin.

Varietas colore fuluescenti-luteo, fasciola spinali simili, cauda longiore. Pondus granorum 80, longitudo 2 poll. $2\frac{1}{2}$ lin. caudae 3 poll. $2\frac{1}{2}$ lin.

Habitat rariuscule ad Iaicum, abundat vero in orientali parte deserti tatarici inter Iaicum, Irtin et Ob fluuios, apricis pariter atque Betula obsitis in campis, cuniculis exiguis vel cauis arborum in truncis nidificans. Victitat seminibus variis, plantasque per caules adscendit victum quaerens. Frigore torpescit conglobatus, imo aere ad 60 grad. Fahrenh. calente vix animatur; adeoque breuissima vita huic in rigidissimo Sibiriae climate.

astra-

aſtrachanenſis. 13. M. cauda mediocri, corpore ſupra flauo ſubtus cinereo.

Eine Mäuſe-Gattung *S. G. Gmelin Reiſ. II p.* 173 *tab.* 11 fig. mediocr.

Figura M. Muſculi et color, at cauda abbreuiata magisque piloſa. Corpus ſupra pilis nigris apice flavis, vt fere totum flauum videatur, ſubtus cinereum. Auriculae fere nudae. Pedes et cauda cinerea. Longitudo corporis 4 pollicum, caudae pollicis vnius cum aliquot lineis. Pedes 4-5.

Habitat circa Aſtrachan intra terram, perpendiculariter fodiens ſatis profunde.

micruros. 14. M. cauda abbreuiata, corpore ſupra cinereo-caneſcente ſubtus ſordide albido.

Mus micruros *S. G. Gmelin Reiſ. III p.* 500 *tab.* 57 *fig.* 2 mala.

Longitudo corporis 3 poll. 3 lin. caudae 6 lin. Corpus ſupra ex cinereo caneſcens, ſubtus ex griſeo albidum. Caput breue, roſtro obtuſo. Nares minimae, rotundae. Myſtaces griſeo-albae. Irides nigrae. Auriculae magnae, oblongae, rotundatae, piloſae. Pedes 4-5 vnguibus acutis.

Habitat in prouincia Maſanderan Perſiae.

38. IACVLVS.

Dentes Primores vtrinque II.
Laniarii nulli.
Pedes antici breuissimi; *postici* elongati.
Cauda elongata, apice floccosa.

orientalis. 1. I. palmis tetradactylis cum vnguiculo pollicari, plantis tridactylis.

Aegyptii mures *Plin. hist. nat.* X c. 65 (c. 85 *Hard.*).
Aegyptii mures alii *Gesn. quadrup. p.* 837.
Agnus filiorum Israel *Alpin. Aeg. p.* 232.
Cuniculus seu Lepus indicus Vtias dictus *Aldrov. digit. p.* 395 *fig.* bona.
Seltzame Art Feldmäuse Ierbuab *Olear. Reis. p.* 740.
Des rats de montagne *Moncon. voy. I p.* 285.
Fliegende Hasen *Strahlenb. As. p.* 361.
The Ierbôa or Yerbôa *Shaw trav. p.* 248.
The Daman Israel *Shaw trav. p.* 376.
Mus (aegyptius) pedibus posticis longissimis, cauda corpore longiore, extremo villosa *Hasselquist: Act. upsal.* 1750 *p.* 17.
Die aegyptische Bergratte *Hasselquist: Act. holmiens.* 1752 *p.* 129 *tab.* 4 *fig.* 1.
Mus (Iaculus) pedibus posticis longissimis, cauda extremo villosa *Hasselqu. Palaest. p.* 277.
Egiptische Bergratte *Hall. vierf. p.* 595.
Mus (Iaculus) cauda elongata floccosa, palmis pentadactylis, plantis tridactylis, femoribus longissimis, brachiis breuissimis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 63 *n.* 15.

The

IACVLI bipedes incedunt super pedum plantis, vel potius saliunt, opitulante cauda elongata rigida.

The Gerbua *Edw. Glean. I tab.* 219.

Springer: Muis met een lange Staart, die aan 't end een Kwaſt heeft, de Voorpooten vyf-, de Agterpooten drie-Vingerig, de agterſte Beenen zeer lang, de voorſte Beenen zeer kort *Houtt. nat. hiſt. II p.* 488 *tab.* 20 *fig.* 2 Haſſelqu.

Zits-jam *Schober*: *Müll. Samml. VII p.* 124.

Cuniculus pumilio ſaliens, cauda longiſſima *S. G. Gmelin*: *Nov. comment. petrop. V p.* 351 *tab.* 11 *fig.* 1.

Mus (Iaculus) cauda elongata floccoſa, palmis ſubpentadactylis, plantis tridactylis, femoribus longiſſimis, brachiis breuiſſimis *Linn. muſ. Ad. Frid. II p.* 9.

Gerboiſe *Bom. dictionn. II p.* 307.

Le Gerbo ou Gerboiſe *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 141.

L'Alagtaga *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 141.

Mus (Iaculus) cauda elongata floccoſa, palmis ſubpentadactylis, femoribus longiſſimis, brachiis breviſſimis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 85 *n.* 20.

Der Erdhaaſe *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 26 *tab.* 2.

The Aegyptian Ierboa *Penn. ſyn. quadr. p.* 295 *n.* 222 *tab.* 25 *fig.* 3.

The Siberian Ierboa *Penn. ſyn. quadr. p.* 296 *n.* 223.

Die egyptiſche Bergratte *Berl. Samml. IV p.* 542 *cum fig.*

Der Springer *Müll. Naturſ. I p.* 352 *tab.* 20 *fig.* 2 Haſſelqu.

Mus Iaculus *Forsk. fn. orient. p. IV.*

Iaculus aſiaticus *Pallas.*

Земляной заецъ (Zemljanoi Zaetz), Бабукъ (Babuk) *Ruſſis.*

Alagtaga *Mungalis.*

يربوع (Ierboa) *Arabibus.*

Djarbua *Aegyptiis.*

Magnitudo Musculi maioris: longitudine corporis $7\frac{1}{4}$ pollicum, caudae 10 poll Caput oblongum, vertice subconuexum, lateribus parum protuberans. Corpus obouatum, versus caudam augustius, decliue. Rostrum breuiusculum, apice truncatum, crassum, cylindricum. Apertura oris subtus rostro tecta, minima. Maxilla superior maxima, totum rostrum constituens; inferior tenuis, breuissima, obtusa, sub superiore abscondita, nec nisi sub gula visibilis. Dentes primores duo vtrinque, hinc conuexi, apice acuminati. Nares in apice rostri, margini eius superiori quam inferiori propiores, ampliusculae, rotundae, approximatae. Tuberculum paruum, subrotundum, parum elevatum supra nares, terminatum inferius processibus duobus lineari-longitudinalibus. Sinus longitudinalis linearis in medio horum tuberculorum, parum profundus, inferius amplior. Mystaces copiosissimae, seriebus tribus, quarum prima circa marginem rostri ad latera eius inferiora constat radiis numerosissimis, breuiusculis, mollibus, albidis; secunda proxime supra nares ad latera superiora rostri, constructa radiis rigidis, longioribus, parcioribus, nigris; tertia inter has media, inferius versus basin capitis, composita radiis paucis (decem circiter vtrinque) longissimis, rigidissimis, quorum vnus omnium longissimus corpus longitudine superat, ex albis et nigris mixta. Oculi ad latera capitis, vertici quam gulae, basi capitis quam apici rostri propiores: respectu corporis magni, protuberantes, toti atri. Auriculae ad basin capitis, iuxta verticem erectae, oblongo-ouatae, apice obtusae, margine anteriore inflexo perpendiculari, posteriore conuexo, plano; amplae, ratione capitis magnae, nudae pellucidae, arteriis, distinctissimis perreptatae. Pedes anteriores proxime infra collum, breuissimi, subtere-

tes,

tes, subnudi, terram non attingentes, sub collo reconditi, vix conspiciendi. Digiti quatuor cum pollice oblitterato mutico, fissi, tenues, fere aequales: vngues arcuati, infra medium attenuati. Pedes posteriores anterioribus triplo longiores, corpore vero femoribus simul sumtis duplo longiores, compressi, nudi. Femora nuda, pedibus continua, iisque similia vt in Grallis. Planta longiuscula, crassa, pone lanuginosa, digitis tribus fissis, compressis, mediis parum longioribus. Vngues recti, breues, compressi, acuti. Cauda obsolete quadrangularis, aequalis, corpore triplo? longior, pilis breuissimis rigidiusculis tecta, extremitate spatio trium digitorum pilis longis molliusculis distinctis instructa. Pili longiusculi, molles, densi, in capite et corpore vsque ad media latera pallide fusci; interum reliqua parte et abdomine candidi. Pili candidi in circulum paruum dispositi corpus proxime supra caudam terminant. Cauda pallide fusca, corpore paullo lucidior. Pars lanuginosa caudae anterius nigra, extremo apice candida. Auriculae et pedes coloris carnei. Mammae octo remotissimae.

Habitat in Aegypto, in monticulis Aegyptum ab Arabia diuidentibus; in Circassia, Sibiriae campis Tschikoiensibus, Argunensibus et Ononensibus: hic enim Iaculus quibus differat ab Aegyptio non video. An pollice retro verso plantarum? (sed num certe sic?) S. G. Gmelinus autem sibirico quinque digitos tribuit. Distinguit Buffonius atque Pennantus.

Solis plantis pedum incedit saliendo ad trium vel quatuor pedum distantiam. Quiescens pedes posteriores abdomini adplicat et supra genua inflexa sedet, anteriores vero gulae admouet, qui tunc

 minime

minime conſpiciuntur. Veſcitur radicibus, gramine, Tritico, Seſamo. Terram fodit ſubterraneus. Cibum palmis ori admouet. Aquam palmis digitis incuruatis haurit. Die integro dormit, nocte ſemper vigil. Hominem non valde metuit, neque tamen perfecte cicur euadit. In Sibiria foenum ante hiemem ſecat ſiccatumque in aceruos rotundiuſculos coactum cuniculis importat. Caro Arabibus et Calmyccis eſculenta.

Ab hoc rurſus diſtinguit doctiſſimus Pallas aliam ſpeciem:

Mus Sagitta *Pallas Reiſ. II p. 706.*
Die Pfeilmaus *Müll. Naturſ. Suppl. p. 46.*
Тарбаганчикъ (Tarbaganczik) *Ruſſis in Sibiria.*
Ierboah *Arabibus* (ſecundum Pallas.)

deque ea haec addit:

„ Mure Iaculo maiore longe inferior, ſed maior eiusdem varietate pygmea, et conſtantioris ſtaturae. Mole circiter Rattum domeſticum aequat. Colore, ſtructura interna, pedibus poſticis cum cauda maximis Iaculo perquam ſimilis. Diuerſus capite globoſiore, auriculis capite multo breuioribus oualibus, dentibus primoribus ſupra luteis, ſtriga profunde exaratis (quod non in Iaculo); artubus poſticis caudaque proportione breuioribus, minori quoque flocco caudam terminante. Maxime diſtinguitur plantis tridactylis et digitorum lateralium defectu plenario; digiti tres ſubtus longis pilis hirſutiſſimi, vngue medii digiti minore. Poſtica pars corporis, femoraque minus craſſa et carnoſa, vropygium quoque haud adeo longe productum quam in Iaculo. Longitudo animalculi 5 poll. 11 lin. caudae 6 poll. 5 lin. Longitudo artuum poſteriorum

circiter

circiter 6 lin. At in Iaculo maiore corpus 7 poll. cauda 9 poll. artus postici 7 poll. 6 lin. aequant."

„Minor haec species, vt in Arabia, ita et ad Irtin cuniculatur in arena mobili, campisque arenosis aridissimis, quum contra Iaculus solum firmum et campos quaerat herbidos. Cuniculi caeterum simillimi, oblique descendentes ad nidum, vnde denuo canalis adscendit, in superficiem terrae non omnino peruius, per quem adpropinquante periculo, pertusa arena ausugit animal."

Ego quidem plures vna specie hic subesse bene intelligo, quotnam autem sint, quibusque notis differant, determinare nescio.

giganteus. 2. I. cauda attenuata longitudine corporis.
Känguruh *Hawkesw. Secreis. III p.* 174 *cum fig.*
Das Känguruh: Mus Canguru *Müll. Natursf. Suppl. p.* 62 *tab.* 3 *fig.* 3 Hawkesw.

Magnitudine Ouis. Cauda fere longitudine corporis versus apicem attenuata; in reliquis similis I. orientali. Pedes . . . . . Color profunde murinus, at in capite et auriculis leporinus.

Habitat in noua Hollandia. Salit plantis insistens. Caro bona, esculenta.

torridarum. 3. I. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis.
Mus (longipes) cauda longa vestita, pedibus posticis longitudine corporis flaui *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 9.
Mus (longipes) cauda longa vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 62 *n.* 14.

Muis met een lange ruige Staart, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig en zeer lang *Houtt. nat. hist. II p.* 488.

Mus (longipes) cauda longa vestita, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 84 *n.* 19.

The torrid Ierboa *Penn. syn. quadr. p.* 297 *n.* 224.

Der Langfuſs *Müll. Naturſ. I p.* 352.

Magnitudine M. Musculi, vel paullo minor. Color flauus, subtus albicans. Caput quasi absque collo vllo. Mystaces longae. Auriculae nudae, ouatae. Cauda longitudine corporis, flaua, subpilosa. Pedes antici breues vt in Musculo, vnguibus quatuor. Pedes postici longitudine totius corporis, crassi, robusti, subnudi, vnguibus siue digitis quinque.

Habitat in torridis regionibus. Animal obscurum.

Eiusdem forte speciei est:

Mus meridianus *Pallas Reiſ. II p.* 702.

Der Langfuſs *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 42.

Magnitudo paullo supra Murem siluaticum; caput oblongius, rostro productiore. Nasus gibbus, fossorius, pubescens. Mystaces longissimae. Dentes primores lutei; superiores sulco exarati crenaque incisi. Auriculae insignes, ouales, pubescentes. Corpus postice incrassatum, femoribus crassissimis saltatoriis. Pedes posteriores elongati, magni, pentadactyli. Palmae subpentadactylae, pollice vix vnguiculato. Volae omnium pedum villosissimae. Cauda longitudine fere corporis, crassa, teres, largiter pilosa, apice floccosa, tota corpori concolor. Vropygium sub cauda cum scroto prominentissimum.

tissimum. Color supra pallide fuluus, interdum subgriseus, subtus lacteus. Sutura longitudinalis abdominis fusca. Os pedesque alba. Longitudo corporis $4\frac{3}{4}$ poll. caudae paullulum supra 3 pollices.

Habitat in deserto arenoso versus mare Caspium, Iaicum et Wolgam interiacente, vbi vix quicquam crescit praeter Pterococcum aphyllum Pallasii, cuius forte nucleis vescitur; et Astragali aliqui. Cuniculi in arena vlnari circiter profunditate, trifores.

39. SCIVRVS.

Dentes Primores vtrinque II; *superiores* cuneati; *inferiores* compressi.

Laniarii nulli.

Pedes digitati, digitis 4-5: palmis saepe vnguiculus pollicaris.

Cauda longa, pilis longioribus.

vulgaris. 1. S. auriculis apice barbatis, cauda dorso concolori.

Sciurus *Plin. hist. nat. VIII c.* 38 (*c.* 58 *Hard.*) *XI c.* 43 (*c.* 99 *Hard.*).

Σκιουρος *Oppian. cyneg. II,* 586.

Sciurus *Gesn. quadrup. p.* 955 *fig. p.* 956 mediocr.

Sciurus *Schwenckf. theriotr. p.* 121.

Sciurus *Aldrov. digit. p.* 396 *fig. p.* 398 mediocr.

Sciurus *Ionst. quadrup. p.* 163.

Sciurus Eichhorn *Ionst. quadrup. tab.* 66 fig. modiocr.

Aychhorn *Gesn. Thierb. p.* 22 *fig.* mediocr.

Sciurus *Charlet. exerc. p.* 24.

Sciurus *Sibb. Scot. an. p.* 11.

Sciurus vulgaris *Rai. syn. quadr. p.* 214.

Sciurus *Rzacz. Polon. p.* 224 *auct. p.* 320.
Sciurus ſolis palmis ſaliens *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.
Eichhörnlein *Riding. jagdb. Th. tab.* 20.
Die Eichhörner *Linn. Gothl. p.* 222.
Sciurus palmis ſolis ſaliens *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 8 *n.* 21.
Das Eichhorn *Meyer Thiere I tab.* 97.
Sciurus palmis ſolis ſaliens *Linn. ſyſt nat.* 6 *p.* 9 *n.* 1.
Sciurus vulgaris, rubicundus *Klein. quadrup. p.* 53.
Sciurus fuſco-ſubrubens ventre albido. The reddiſh-brown Sciurus, with a white belly: the common Squirrel *Hill anim. p.* 523.
Sciurus (vulgaris) palmis ſolis ſaliens *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 8.
L'Ecureuil: Sciurus (vulgaris) rufus, quandoque griſeo admixto *Briſſ. regn. an. p.* 150 *n.* 1.
Sciurus palmis ſolis ſaliens *Kram. Auſtr. p.* 314.
Das Eichhörnchen *Hall. vierf. p.* 415.
Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 63 *n.* 1.
L'Ecureuil *Buff. hiſt. nat. VII p.* 253 *tab.* 32.
Ecureuil *Dictionn. anim. II p.* 73 cum congener.
Inkhoorn, met de Ooren aan de tippen gebaard, de Voorpooten vier-, de Agterpooten vyf-Vingerig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 494.
Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 13 *n.* 37.
Sciurus auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Gronov. zooph. I p.* 4 *n.* 17.
The Squirrel *Penn. brit. zool. p.* 44 *cum fig.* bona.
Egerne *Pontopp. Dan. I p.* 611.
Ecureuil vulgaire *Bom. dictionn. II p.* 80.
Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 86 *n.* 1.

Das

Das gemeine Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 591.
Das Eichhörnichen *S. G. Gmelin Reiſ. I p.* 35 *tab.* 7.
Das Eichhörnchen von weiſſlicher Farbe *S. G. Gmelin Reiſ. I tab.* 8.
The common Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 279 *n.* 206.
Scoiattolo *Alcſſ. quadr. II tab.* 75.
Common Squirrel *Forſter: Philoſ. transact. LXII p.* 378.
Das gemeine Eichhorn *Müll. Naturſ. 1 p.* 355.
Sciurus (vulgaris) auriculis apice barbatis, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 32.
Das Eichhörnchen *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 208 *tab.* 68.
Scoiattolo, Schiarro, Schiratto, Schiriuolo, Chiriuolo, Schiratolo *Italis.*
Harda, Arda, Hardilla, Ardilla, Eſquilo *Hiſpanis.*
Ciuro *Luſitanis.*
Ecureuil *Gallis.*
Gwiwair *Cambrenſibus.*
Eichhorn, Eichhörnchen *Germanis.*
Eichkatzl *Auſtriacis.*
Inkhoorn, Eekhoorn, Eikhoorn *Belgis.*
Squirrel *Anglis.*
Egern *Danis.*
Ikorn *Noruegis.*
Ikorn *Suecis.*
Gråſkin *Oſtrobothnienſibus.*
Orre *Lapponibus.*
Wiéwiorka *Polonis.*
Бѣлка (Bjelka), Вѣкша (Wjekſcha) *Ruſſis.*
Uluk *Tunguſis.*
Kermang *Burätis.*
Tíen *Tataris.*
Ur *Tſcheremiſſis.*
Bakſcha *Tſchuwaſchis.*

Koni

Koni *Wotiakis.*
Uru *Morduanis.*
Ur *permice.*

Oculi magni, ſplendentes, nigri. Auriculae longius barbatae. Caput, corpus, crura atque cauda ex ſplendenti rufo fuſca. Pectus et venter alba. Pedes 4-5 cum vngue pollicari in palmis. Cauda pilis longioribus diſticha, in dorſum reflexa pro vmbraculo. Mammae ſex ventrales, duae pectorales. Penis ingens, glande oſſiculo paruo fulta. Longitudo corporis $8\frac{1}{2}$ poll. cauda longitudine corporis vel paullo longior.

Habitat in Europa, America boreali Aſiaque boreali et temperata, vsque adeo in Ceylonam.

Degit in ſiluis. Victitat aeſtate gemmis ramulisque arborum, praecipueque amat abietem eiusque ſtrobilos iuniores; pro hieme colligit nuces varias intra terram defodiendas. Edit erectus ſedens, palmis vtens quaſi manibus. Agiliimus ſalit ex arbore in arborem. Nidus globoſus e muſcis foliisque ſiccis in arborum ramis, obturatis qua ſpiraturus eſt ventus cauernis ex alia parte aperit fores. Coit verno tempore, Martio et Aprili menſe, poſt quatuor hebdom. parit 3-5 coecos. Cortice interdum nauigat. Docilis facileque manſueſcens.

Varietates haud paucae; praecipuae hae quidem videntur cum ſuis ſynonymis:

α. Sciurus hieme caeruleſcenti-cinereus, aeſtate ruber abdomine albo.
Ponticus ſeu venetus mus, quem vulgo varium vocant *Geſn. quadr. p.* 839 *cum fig.* mediocr.

Sciurus

Sciurus varius, Varus vulgo dictus *Aldrov. digit. p.* 403.

Mus ponticus Varus vulgo dictus Popieliza, siue Sciurus cinereus *Aldrov. digit. p.* 405 *fig.* mediocr.

Sciuri, qui Mures Pontici et a colore varii dicuntur *Ionst. quadrup. p.* 163.

Veeh, Mus Ponticus siue Venetus *Gesn. Thierb. p.* 24.

Sciuri *Scheff. Lappon. p.* 342.

Sciurus, siue Mus Ponticus *Charlet. exerc. p.* 24.

Mus ponticus seu venetus *Rzacz. auct. p.* 318.

L'Ecureuil varié: Sciurus (varius) ex candido cinereus *Briss. regn. an. p.* 152. *n.* 4.

Eichhörner oder Grauwerk *Müll. Samml. III p.* 517.

Das weisgraue Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 603.

Popielica *Polonis.*

Primo colorem mutat in dorso, tunc in ventre, porro in pedibus, dein in capite.

Habitat in borealibus Europae et Asiae.

Optimi circa Kasim fluuium in districtu Beresowiensi; nec non circa Ob fluuium, magnitudine dupla, colore argenteo, Teleuzkaja belka dicti. Circa Ieniseiam et Angaram obscuriores colore, sed pilis minus densis. Nigriores circa Baikal lacum, nigerrimi circa Baryusinskoi Ostrog, ad Werchnajam Angaram, ad fontes Witim fluuii inque districtu Nertschinskiensi, qui omnium optimi.

ε. Sciurus niger, rarius visus in borealibus, distinguendus ab Americano.

7. Sciu-

γ. Sciurus totus albus, oculis rubris.
Sciurus albus *Wagn. Heluet. p.* 185.
Das weiſſe Eichhorn *Linn. Weſtgoth. p.* 8.
L'Ecureuil blanc de Siberie: Sciurus albus ſibericus *Briſſ. regn. an. p.* 151 *n.* 2.
Das weiſſe ſehne ſiberiſche Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 600.

Habitat in borealibus et alpinis, rariſſimus.

δ. Sciurus cauda lacteo-alba; interdum et hypochondriis pedibusque albis.

Reperitur paſſim in Anglia et Weſtrobothnia.

ε. Sciurus hudſonicus.
The Hudſon's bay Squirrel *Penn. ſyn. quadr. n.* 206 *α tab.* 26 *fig.* 1.

Minor europaeo. In medio dorſo linea ferruginea a capite ad caudam vsque. Latera pallidiora. Venter pallide cinereus nigro variegatus. Cauda breuior, minus piloſa, ferruginea nigro annulata, verſusque apicem faſcia latiore nigra.

Habitat ad fretum Hudſonis.

ζ. Sciurus ceylonicus.
The white-legged Squirrel *Penn. ſyn. quadr. n.* 206 β.

Caput, corpus ſupra, latera et digiti rufo-fuſca. Facies, naſus, collum ſubtus, venter, crura anteriora, auriculae intus et femora intus alba. Auriculae leuiter nigro-barbatae. Cauda longa nigri-

nigricans, pilis multo breuioribus quam in vulgari.

Habitat in Ceylona.

η. Sciurus perſicus.
Eine Abänderung der Eichhörner in Perſien *S. G. Gmelin Reiſ.* III *p.* 379 *tab.* 43.

Corpore ſupra obſcure cinereo; orbitis nigris; auriculis intus denudatis, extus nigricantibus; gula, pectore, abdomine flauis, lateribus albis; cauda ex nigricante griſea, ſubtus faſcia alba; pedibus totis extus dorſo, intus abdomini concoloribus; palmis plantisque profunde rubris.

Habitat in Perſiae prouincia Gilan.

Non in omnes varietates haſce quadrat character ſpecificus, quem dedi: meliorem tamen ignoro.

niger. 2. S. niger auriculis imberbibus.
Quauhtechalotl thliltic. Sciurus mexicanus *Hernand. Mex. p.* 582 *cum fig.*
Quauhtechallotl *Fernand. anim. p.* 8.
Prior Quauhtechallotl Species *Ionſt. quadrup. p.* 163.
The black Squirrel *Catesb. Carol.* II *p.* 73.
Sciurus niger *Klein. quadrup. p.* 53.
Das ſchwarze indianiſche Eichhörnchen *Hall. vierf. p.* 417.
L'Ecureuil noir: Sciurus niger *Briſſ. regn. an. p.* 151 *n.* 3.
Sciurus (niger) niger *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 64 *n.* 2.
Zwarte Inkhoorn *Houtt. nat. hiſt.* II *p.* 497.

Sciurus (niger) niger *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 86 *n.* 2.

Das schwarze Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 598.

The black Squirrel *Penn. syn. quadr. p.* 284 *n.* 210 *tab.* 26 *fig.* 2.

Das schwarze Eichhorn *Müll. Natursf. I p.* 356.

Paullo maior vulgari. Auriculae imberbes. Totus niger, interdum autem nasus albus collumque torque albo notatum, nec non caudae apex albus. cauda breuior ac in cinereo.

Habitat in America boreali, nec non in mexicano regno.

Distinguendus probe a Sciuri vulgaris varietate nigra, cui auriculae barbatae.

cinereus. 3. S. cinereus ventre albo, auriculis imberbibus.

Sciurus Virginianus cinereus maior *Rai. syn. quadr. p.* 215.

The Fox-Squirrel *Lawson Carol. p.* 124.

The Gray Fox Squirrel *Catesb. Carol. II p.* 74 *tab.* 74.

The Fox-Squirrel *Brick. North-Carol. p.* 127.

Sciurus Virginianus cinereus maior *Klein. quadrup. p.* 53.

Sciurus griseus cauda minore. The grey Sciurus, with a smaller tail: the American grey Squirrel *Hill anim. p.* 523.

Die grauen Eichhörner *Kalm Amer. II p.* 352, 450.

L'Ecureuil de Virginie: Sciurus (Virginianus) cinereus, auriculis ex albo flauicantibus *Briss. regn. an. p.* 153 *n.* 6.

Sciurus maior griseus, cauda extrema comosa, pilis diffusis: the grey Squirrel *Brown. Iam. p.* 483.

Sciurus

Sciurus (cinereus) virginianus cinereus maior *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 64 *n.* 3.

Groote Aschgraauwe Virginische Inkhoorn *Houtt. nat. hist. II p.* 498.

Le Petit-Gris *Buff. hist. nat. X p.* 116 *tab.* 25.

Petit gris *Bom. hist. nat. III p.* 430.

Sciurus (cinereus) virginianus cinereus maior *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 86 *n.* 3.

Das grosse graue virginianische Eichhorn *Berl. Samml. II p.* 600.

The grey Squirrel *Penn. syn. quadr. p.* 282 *n.* 209 *tab.* 26 *fig.* 3.

Scoiattolo del Canada *Alesf. quadrup. III tab.* 117 fig. Buff.

Das aschgraue Eichhorn *Müll. Naturs. I p.* 356.

Magnitudo tripla Sciuri vulgaris. Auriculae imberbes, intus nudae, extus pilis ex albo flauicantibus vestitae. Pili obscure grisei, nigro mixti, saepe admixto sordide flauo. Venter cum interiore crurum latere albus. Cauda reflexa, longa, pilosissima, grisea, nigro striata. Pedes 4-5 (Kleinio male 5-4).

Habitat in America septentrionali, vbi Zeam imprimis destruit, ideoque cum praemio (3 pence) occidendus. Mores Sciuri vulgaris. Facile mansuescit. Caro valde delicata.

Sciurus cinereus asiaticus, ex quo pelles *Grauwerk, petit gris* dictae, omnino differt atque ad Sciurum vulgarem pertinet.

Huc refero:

The Squirrel with plain ears *Penn. syn. quadr. n.* 210 *β.*

Pili corporis fordide albo et nigro mixti. Gula et crura cum femoribus intus nigra. Cauda breuior quam in reliquis Sciuris, obfcure flaua admixto nigro.

Habitat in Virginia.

macrourus. 4. S. cauda corpore duplo longiore grifea.
Sciurus zeylanicus pilis in dorfo nigricantibus, Rukkaia dictus *Rai. fyn. quadr. p.* 215.
Sciurus cauda maxima grifeo nigrefcens. The blackifh Sciurus, with a very large tail: the Ceylon Squirrel *Hill anim. p.* 523.
Das gelbbauchige Indian. Eichhörnchen *Hall. vierf p.* 417.
Sciurus macrourus: the longtailed Squirrel *Penn. Ind zool. p.* 1 *tab.* 1.
Das gelbbäuchige indianifche Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 612.
The Ceylon Squirrel *Penn. fyn. quadr. p.* 281 *n.* 207.
Dandulana *Ceylonenfibus.*

Magnitudo tripla Sciuri vulgaris. Auriculae nigro barbatae. Nafus coloris carnei. Buccae, crura et venter pallide flaua. Macula flaua auriculis interiecta. Frons, dorfum, latera femoraque nigra. Buccae linea bifurca nigra. Corpus fubtus rubrum. Cauda corpore duplo longior, pallide grifea, valde pilofa, difticha, nifi quod prope bafin pili totam caudam circumdent.

Habitat in Ceylona et Malabarico regno.

indicus. 5. S. cauda longitudine corporis, apice aurantio.
The Bombay Squirrel *Penn. fyn. quadr. p.* 281 *n.* 208.

Longi-

Longitudo corporis 16 pollicum, caudae 17 poll. Auriculae apice barbatae. Caput, dorſum, latera, crura ſuperius, femora et cauda obſcure purpurea. Crura et femora inferius cum ventre flaua. Cauda apice aurantia.

Habitat in India orientali.

variegatus. 6. S. corpore ſupra nigro, albo et fuſco variegato.

Quauhtecallotlquapachtli aut Coztiocotequallin *Fernand. anim. p.* 8.

Coquallin *Bom. dictionn. I p.* 653.

Le Coquallin *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 109 *tab.* 13.

The varied Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 285 *n.* 211.

Coquallin *Alesſ. quadrup. III tab.* 147.

Magnitudine dupla S. vulgaris. Auriculae imberbes. Corpus ſupra nigro, albo et fuſco variegatum, ventre flaueſcente. Cauda ſupra corpus reflexa.

Habitat in Mexico. Subterraneus parit, cibumque colligit pro hieme. Edit Zeam. Non manſueſcit.

aeſtuans. 7. S. griſeus, ſubtus flaueſcens.

Sciurus braſilienſis *Marcgr. Braſil. p.* 230.

L'Ecureuil du Breſil: Sciurus (braſilienſis) coloris ex flauo et fuſco mixti, taeniis in lateribus albis *Briſſ. regn. an. p.* 154 *n.* 7.

Sciurus (aeſtuans) griſeus, ſubtus flaueſcens *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 88 *n.* 9.

The Squirrel of Guiana *Bancr. Guian. p.* 143?

Das gelb- und braunbunte Eichhörnchen aus Braſilien, mit weiſſen Streifen an den Seiten *Berl. Samml. II p.* 610.

Das ſurinamiſche Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 612.

The Braſilian Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 286 *n.* 213.

Das ſurinamiſche Eichhorn *Müll. Naturſ. I p.* 359.

Longitudo corporis $8\frac{1}{4}$ poll. caudae 10 poll. Auriculae ſubrotundae, imberbes. Caput, dorſum et latera pilis mollibus griſeis, apicibus flauis. Cauda rotundata, pilis nigro et flauo annulatis. Gula cinerea. Crura intus et venter flaua. Venter longitudinaliter linea alba diuiſus a pectore inde vsque in ipſam caudam, medio tamen interrupta. Pedes 4-5 cum vngue in palmis pollicari.

Habitat in Braſilia, Guiania, Surinamo.

Num eiusdem ſpeciei:

Sciurus americanus *Seb. theſ. I p.* 78 *tab.* 48 *fig.* 5.
Sciurus genitalibus maximis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.
Sciurus Americanus Sebae *Klein. quadrup. p.* 54.
Sciurus cauda teretiuſcula, auribus latis nudis. The round-tailed Sciurus, with ſhort, broad ears: the brown American Squirrel *Hill anim. p.* 524.
L'Ecureuil d'Amerique: Sciurus (americanus) obſcure cinereus *Briſſ. regn. an. p.* 152 *n.* 5.
Das ungeſtreifte Amer. Eichhörnchen *Hall. vierſ. p.* 417.
Das dunkelgraue americaniſche Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 599.

flauus. 8. S. auriculis ſubrotundis, corpore luteo.
Sciurus cauda teretiuſcula, auribus ſubrotundis nudis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 3.

Sciu-

Sciurus cauda tereti: pilis breuibus, auribus fubrotundis *Linn. amoen. acad. I p. 561.*

Sciurus (flauus) auriculis fubrotundis, pedibus pentadactylis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 64 *n.* 4.

Les quatriémes Ecureuils *Du Pratz Louif. II p.* 99.

Inkhoorn met rondagtige Ooren, de Pooten vyf-Vingerig *Houtt. nat. hift. II p.* 499.

Sciurus (flauus) auriculis fubrotundis, pedibus pentadactylis, corpore luteo *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 86 *n.* 4.

Das gelbe Eichhörnchen von Karthagena *Berl. Samml. II p.* 611.

The fair Squirrel *Penn. fyn. quadr. p.* 285 *n.* 212.

Das gelbe Eichhorn *Müll. Naturf. p.* 357.

Facies S. vulgaris, fed dimidio minor. Auriculae nudiufculae, fubrotundae, humanis quodammodo fimiles, nec pilis longis terminatae. Setae plures ad latera roftri in labio fuperiore, et nonnullae etiam in genis. Cauda pilofa, teres, nec pilis longiufculis bifariam pectinata, vt in noftratibus. Palmae digitis quatuor cum pollice breviffimo et fere nullo, vngue etiam breuiore armato. Plantae pentadactylae, pollice et longiore et vngue magis acuto, quam in palmis. Color luteus, apicibus pilorum albicantibus.

Habitat in America auftrali, Pennanto in India orientali.

palmarum. 9. S. fubgrifeus, ftriis tribus flauicantibus, cauda albo nigroque lineata.

Γαλῆ Λιβυκή, Muftela africana *Cluf. exot. p.* 112 *cum fig.* mala.

Muftela libyca *Nieremb. hift. nat. p.* 172.

Muftela africana *Nieremb. hift. nat. p.* 172 *fig.* Cluf.

Africana muſtela *Ionſt. quadrup. p.* 153.
Muſtela Africana Cluſii *Rai. ſyn. quadr. p.* 216.
Mus indicus arboreus ſtriatus in Palmis cocciferis degens *Rai. ſyn. quadr. p.* 230?
Mus corpore breui, lateribus ſtriatis. The ſhort-bodied Mus, with ſtriated ſides *Hill anim. p.* 522.
L'Ecureuil palmiſte, vulgairement Rat palmiſte: Sciurus (palmarum, Mus palmarum vulgo) coloris ex rufo et nigro mixti, taeniis in dorſo flauicantibus *Briſſ. regn. an. p.* 156 *n.* 10.
Nierembergs Zwergeichhörnchen *Hall. vierf. p.* 418.
Le Palmiſte *Buff. hiſt. nat. X p.* 126 *tab.* 26.
Rat palmiſte *Bom. dictionn. III p.* 721.
Sciurus (palmarum) ſubgriſeus ſtriis tribus flauicantibus, caudaque albo nigroque lineata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 86 *n.* 5.
Der Palmiſt, die Palmenratze, das Palmeichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 603.
Ein ſogenanntes Zwergeichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 614.
The Palm Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 287 *n.* 215.
Scoiattollo delle Palme *Aleſſ. quadrup. III tab.* 118 fig. Buff.
Das Wieſeleichhörnchen *Müll. Naturſ. I p.* 357.

Magnitudo Ratti vel Sciuri parui: corpus longitudine 5 poll. cauda 6 poll. Auriculae rotundatae. Color capitis, dorſi et laterum ex rufo et griſeo mixtus cum ſtriis tribus (interdum 5 vti Pennanto) pallide flauis in dorſo et lateribus. Venter pallide flauus eſt. Cauda diſticha, erecta, non obumbrans, albo nigroque lineata. Pedes 4-5.

Habitat in Aſia et Africa, num et in America? ſic certe Linné putat. In arboribus, praecipue Palmis degit.

getulus.

getulus. 10. S. fuſcus, ſtriis quatuor albidis longitudinalibus.

Sciurus getulus *Aldrov. digit. p.* 405 *fig. p.* 406.

Sciurus getulus *Ionſt. quadrup. p.* 163 *tab.* 67 fig. mala.

Africaniſches Aychhorn Scyurus Getulus genannt *Geſn. Thierb. p.* 24 *cum fig.* mala.

Sciurus, ſiue Mus Getulus *Charlet. exerc. p.* 24.

Sciurus Getulus Caii apud Geſnerum *Rai. ſyn. quadr. p.* 216.

Sciurus getulus ex noua Hiſpania foemina *Seb. theſ. I p.* 76 *tab.* 47 *fig.* 3.

Sciurus genitalibus maximis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.

Sciurus Getulus Caii apud Geſnerum *Klein. quadrup. p.* 54.

Sciurus ex cinere rubicundus, lateribus ſtriatis, auribus breuioribus *Klein. quadrup. p.* 55.

The Barbarian Squirrel *Edw. birds IV tab.* 198.

Sciurus rufo-nigreſcens lateribus variegatis. The darkercoloured Sciurus, with variegated ſides: the Barbary-Squirrel *Hill anim. p.* 524.

L'Ecureuil de Barbarie: Sciurus (Getulus) coloris ex rufo et nigro mixti, taeniis in lateribus alternatim albis et fuſcis aut nigris *Briſſ. regn. an. p.* 157 *n.* 11.

Das africaniſche Lievereieichhörnchen *Hall. vierf. p.* 418.

Das Amer. geſtreifte flieg. Eichhorn *Hall. vierf. p.* 421 (Non eſt americanus, non volat).

Sciurus (getulus) fuſcus, ſtriis quatuor albidis longitudinalibus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 64 *n.* 5.

Bruine Inkhoorn, met vier witagtige Streepen, langs heen, over 't Lyf *Houtt. nat. hiſt. II p.* 500 *tab.* 21 *fig.* 1.

Le Barbareſque *Buff. hiſt. nat. X p.* 126.

L'Ecureuil Barbareſque *Buff. hiſt. nat. X tab.* 27.

Sciurus (getulus) fuscus, striis quatuor albidis longitudinalibus *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 87 *n.* 6.
Das Eichhörnchen von der Küste der Barbarey *Berl. Samml. II p.* 605.
Das africanische Lievereyeichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 610.
The Barbary Squirrel *Penn. syn. quadr. p.* 287 *n.* 215 β varietatem putat Sc. palmarum.
Scoiattolo di Barbaria *Aless. quadrup. III tab.* 119 *fig.* 1 Buff.
Das africanische Eichhorn *Müll. Natursf. I p.* 357 *tab.* 21 *fig.* 1 Houtt.

Magnitudo Sciuri vulgaris minoris. Oculi nigri. Auriculae maiores quam praecedentis, minores quamvis ac vulgaris. Orbitae albae. Caput, corpus, pedes et cauda cinereo-rufescentia, crura pallidiora. Latera corporis striis vtrinque duabus longitudinalibus albis. Venter albus. Cauda nigro variegata, pilosior quam in antecedente, corpus obumbrans.

Habitat cum praecedente, cuius varietatem putat Pennantus, non ego. Mores Sciuri vulgaris.

striatus. 11. S. flauus striis quinque fuscis longitudinalibus.
Techallotl *Fernand. anim. p.* 9?
Sciurus a Cla. D. Lyster obseruatus *Rai. syn. quadr. p.* 216.
The Ground Squirrel *Laws. Carol. p.* 124.
Born-doeskie *Bruin. Reiz. p.* 467 *tab.* 254 fig. bon.
The Ground Squirrel *Catesb. Carol. II p.* 75 *tab.* 75.
The Ground Squirrel *Brick. North. Carol. p.* 129.
L'Ecureuil suisse *Charlev nouv. Fr. III p.* 134.
Sciurus striatus *Klein. quadrup. p.* 53.
The ground Squirrel *Edw. birds IV tab.* 181.
Die Erdeichhörner *Kalm Amer. II p.* 462.

Sciurus

Sciurus (ſtriatus) pallidus ſtriis quatuor fuſcis longitudinalibus *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 8.

Sciurus minor virgatus. Furunculus Sciuroides Meſſerſchm. *I. G. Gmelin: Nov. comm. petrop. V p.* 344 *tab.* 9 fig. bon.

L'Ecureuil de la Caroline: Sciurus (Carolinenſis) rufus, taeniis in dorſo nigris, taeniis ex albo flavicantibus intermixtis *Briſſ. regn. an. p.* 155 *n.* 9.

Das geſtreifte Virgin. Eichhörnchen *Hall. vierf. p.* 416.

Sciurus (ſtriatus) flavus ſtriis quatuor fuſcis longitudinalibus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 65 *n.* 6.

Les Ecureuils Suiſſes *Du Pratz Louiſ. II p.* 98.

Geele Inkhoorn, met vier bruine Streepen, langs heen, over 't Lyf *Houtt. nat. hiſt. II p.* 501 *tab.* 21 *fig.* 2.

Le Suiſſe *Buff. hiſt. nat. X p.* 126.

L'Ecureuil ſuiſſe *Buff. hiſt. nat. X tab.* 28.

Sciurus (ſtriatus) flavus ſtriis quinque fuſcis longitudinalibus *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 87 *n.* 7.

Der Schweitzer, das ſchweitzeriſche Eichhörnchen *Berl. Samml. II p.* 605.

Das gelbe ſiberiſche Erdeichhörnchen mit 5 braunen Streifen *Berl. Samml. II p.* 608.

The ground Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 288 *n.* 216.

Scoiattolo Urone *Aleſſ. quadrup. III tab.* 119 *fig.* 2 Buff.

Das geſtreifte Eichhorn *Müll. Naturſ. I p.* 358 *tab.* 21 *fig.* 2 Houtt.

Die geſtreiften Eichhörnchen *Pallas Reiſ. II p.* 665.

Бурундукъ (Burunduk) *Ruſſis.*

Marawki *Tunguſis.*

Girchi *Burätis.*

Ohihoin *Huronibus.*

Röſſelwiſſlar *Suecis in Philadelphia.*

Magni-

Magnitudo circiter dimidia Sc. vulgaris: longitudine corporis 5 ½ poll. caudae 5 poll. Oculi prominentes nigri. Auriculae rotundatae. Dorſum ſtria longitudinali nigra vel fuſca. Latera corporis pallide flaua cum lineis duabus nigris longitudinalibus vtrinque. Caput et reliquum corpus ſupra cum cauda rufo-fuſca, haec autem profundior. Frons luteſcens, pilis raris obſcure fuſcis intermixtis. Linea fuſca ſupra et infra oculos. Palpebrae albentes. Malae luteſcentes. Pectus cum ventre album. Naſus et pedes pallide rubri. Pedes 4½-5. Cauda pilis nigris et flaueſcentibus breuioribus quam in praecedentibus tecta, apice albo.

Habitat in America ſeptentrionali, nec non in Aſia boreali copioſus, ſub terra, canali longo bifori cum concamerationibus lateralibus pluribus diſtinctis pro ſingula meſſe (*Kalm Amer. II tab.* 2 *fig.* 8). Edit ſemina, nuces, ſimiliaque. Ferus et vix domandus, vehementer mordet. Rariſſime arbores aſcendit.

mexicanus. 12. S. cinereo-fuſcus ſtriis quinque ad ſeptem albidis longitudinalibus.

Tlamototli *Fernand. anim. p.* 9.

Sciurus rariſſimus ex noua Hiſpania, taeniis albis, mas *Seb. theſ. I p.* 76 *tab.* 47 *fig.* 2.

Sciurus rariſſimus, ex noua Hiſpania, taeniis albis *Klein. quadrup. p.* 53.

L'Ecureuil de la nouvelle Eſpagne: Sciurus (nouae Hiſpaniae) obſcure cinereus, taeniis in dorſo albicantibus *Briſſ. regn. an. p.* 154 *n.* 8.

Das ſchönſte Am. Levereichhörnchen *Hall. vierf. p.* 416. *tab.* 21.

Das

Das schönste americanische Lievereyeichhörnchen, das weissgestreiste Eichhörnchen aus Neuspanien *Berl. Samml. II p.* 609.

The Mexican Squirrel *Penn. syn. quadr. p.* 286 *n.* 214.

Longitudo corporis $5\frac{1}{2}$ poll. cauda paullo longiore. Auricularum margo depilis. Color murinus. Dorsum striis septem albis in mare, quinque in femina, per caudam decurrentibus.

Habitat in noua Hispania? nisi forte ad getulum pertineat.

Glis. 13. S. canus, subtus albidus.

Ἐλειός *Arist. hist anim. VIII c.* 22 *n.* 183.

Glires *Plin. hist. nat. VIII c.* 58 *(c.* 83 *Hard.) XVI c.* 6 *(c.* 7 *Hard.) XXXVI c.* 1 *(c.* 2 *Hard.).*

Μυοξὸς *Oppian. cyneg. II,* 574.

Glis *Gesn. quadrup. p.* 619 *cum fig.* mediocri.

Glis *Aldrov. digit. p.* 407 *fig. p.* 409 medior.

Glis *Ionst. quadrup. p.* 164.

Glis Aldr. *Ionst. quadrup tab.* 67 fig. mala.

Rellmaufs. Greul. Rell. Rell-oder Schrotmaus *Gesn. Thierb. p.* 272 *cum fig.* mal.

Le Loir *Perr. anim. III p.* 31 *tab.* 3 fig. mediocr.

Glis *Charlet. exerc. p.* 25.

Glis Gesneri et aliorum *Rai. syn. quadr. p.* 229.

Sciurus Epilepticus; cinereus Prussicus *Klein. quadrup. p.* 54.

Glis vulgaris Aldrov. *Klein. quadrup. p.* 56.

Mus cauda longa pilosa, ventre albo. The white-bellied Mus, with a long hairy tail: the Italian Dormouse *Hill anim. p.* 518?

Mus dorso fusco-nigricante, ventre albo, corpore oblongo. The white-bellied Mus, with a blackish back,

back, and long body: the Rell-moufe *Hill anim. p.* 521.

Le Loir: Glis (. . . , .) fupra obfcure cinereus, infra ex albo cinerafcens *Briff. regn. an. p.* 160 *n.* 1.

Der preuffifche graue Tagfchläfer *Hall. vierf. p.* 418.

Die Schlafratte *Hall. vierf. p.* 422.

Loir *Dictionn. anim. II p.* 700.

Le Loir *Buff. hift. nat. VIII p.* 158 *tab.* 24.

Loir *Bom. dictionn. II p.* 711.

Sciurus (Glis) canus, fubtus albidus *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 87 *n.* 8.

Der preuffifche graue Tagfchläfer *Berl. Samml. II p.* 612.

The fat Squirrel *Penn. fyn. quadr. p.* 289 *n.* 217.

Ghiro *Aleff. quadrup. III tab.* 105 *fig.* 2.

Die Schlafratte *Pallas Reif. I p.* 154.

Das Maufeeichhörnchen *Müll. Naturf. I p.* 358.

Der Siebenfchläfer *Mart. Buff. vierf. IV p.* 271 *tab.* 76.

Ghiro, Gliero, Galero *Italis.*

Liron *Hifpanis.*

Arganaz *Lufitanis.*

Loir *Gallis.*

Ratz *paffim Germanis.*

Rell, Rellmufs *Helvetis.*

Dormoufe, Rellmoufe *Anglis.*

Семлаиая Бѣлка (Semlanaja Bjelka) *circa Samaram.*

Longitudo corporis 6 poll. caudae 5. Corpus craffius quam in Sciuro vulgari. Auriculae tenues, nudae. Genae albae. Myftaces ipfo capite longiores. Pili corporis molles fupra cani, ventris albidi. Cauda valde hirfuta, cana. Pedes 4-5. Mammae fex ventrales, quatuor pectorales.

Habi-

Habitat in Europa auſtrali in ſiluis. Victitat glandibus, nucibus, ſeminibus pomorum. Nidificat in cauis arborum, pullis 9-12. Interdiu latet. Autumno pingueſcit. Octobri menſe gregatim migrat in latebras ſubterraneas, ibique hibernat in finem Maii vſque. Caro Romanis olim maxime expetita, qui in Glirariis nutriebant animal. Mordax.

Tota mihi dormitur hiems, et pinguior illo
Tempore ſum, quo me nil niſi ſomnus alit.
(*falſo.*) *Martial.*

tamariſcinus. 14. S. griſeo-luteſcens, ſubtus albus, cauda fuſco obſolete variegata.

Mus tamariſcinus *Pallas Reiſ. II p.* 702.
Die Tamariſkenmaus *Müll. Naturſ. Suppl.* p. 42.

Magnitudo vltra Murem Rattum; habitus fere Sciuri quercini. Dentes primores fului, ſuperi ſulco exarati. Myſtaces longiſſimae. Oculi maiuſculi. Auriculae magnae, ouales, nudiuſculae. Palmae ſubpentadactylae, verruca pollicari inſigni, incruſtata; plantae pentadactylae. Cauda longitudine circiter corporis, pilis veſtita, apice ſubfloccoſa, annulis latis fuſceſcentibus obſolete variegata. Color ſupra griſeo-luteſcens, ſubtus albus; ſupercilia areaque oculorum albent; plantae ſubtus longitudinaliter fuſcae, areaque fuſca triangula ſupra metacarpum. Animal elegantiſſimum, longitudine $6\frac{1}{2}$ pollicum, cauda 5 poll. 1 lin.

Habitat in ſalſis verſus mare caſpium, Tamarice praeſertim et Nitraria fruticoſis, quorum ſub radicibus cuniculos fodit profundiſſimos, bifores. Paſcitur forte fructibus Tamaricis vel Nitrariae, plantisque ſalſis ſucculentis.

quer-

quercinus. 15. S. canus, ſubtus albidus: macula nigra ſub oculis.

Mus auellanarum, Sorex Plinii *Geſn. quadrup. p.* 833 *cum fig.* bona.

Mus auellanarum maior *Aldrov. digit. p.* 439.

Mus auellanarum maior *Ionſt. quadrup. p.* 168.

Mus auellanarius Haſelmaus *Ionſt. quadrup. tab.* 66 *fig.* mediocris.

Mus auellanarius *Charlet. exerc. p.* 25.

Mus Auellanarum maior *Rai. ſyn. quadr. p.* 219.

Mus auellanarum *Rzacz Polon. auct. p.* 315.

Mus auellanarum maior *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.

Mus auellanarum maior Raii *Klein. quadrup. p.* 56.

Mus cauda hirſuta, pedibus rubentibus. The hairy-tailed Mus, with red feet: the great Sleeper *Hill anim. p.* 519.

Le Lérot: Glis ſupra obſcure cinereus, infra ex albo cinerafcens, macula ad oculos nigra *Briſſ. regn. an. p.* 161 *n.* 2.

Lérot *Dictionn. anim. II p.* 619.

Le Lérot *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 181 *tab.* 25.

Mus (quercinus) cauda elongata piloſa, macula nigra ſub oculis *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 84 *n.* 15.

The garden Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 290 *n.* 218.

Ghiro piccolo *Aleſſ. quadrup. III tab.* 106 *fig.* 1.

Die Eichelmaus *Müll. Naturſ. I p.* 351.

Die groſſe Haſelmaus *Mart. Buff. vierſ. IV p.* 283 *tab.* 77.

Loir, Lérot, Rat blanc *Gallis.*

Voiſieu, Vonſieu *in Burgundia.*

Myscz orzechowa, Koſzalka *Polonis.*

Longitudo corporis $4\frac{1}{2}$ - 5 poll. caudae 4 poll. Oculi maiuſculi nigri. Auriculae ſubrotundae. Corpus ſupra obſcure, ſubtus pallide cinereum. Macula nigra circa oculos vtrinque, et alia infra auriculas.

las. Pedes 4-5. Cauda praecipue versus apicem longius pilosa.

Habitat in Europa australi, in hortis destruens fructus omnis generis: praecipue autem amat persicas drupas. Nidificat in rimis murorum et cauis arboribus. Coit vere; parit aestate 5-6. Hibernat. Odorem Ratti fortem spirat.

auellanarius. 16. S. corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis.

Mus auellanarum minor *Aldrov. digit. p.* 439.

Mus auellanarum vulgo Moscardino *Aldrov. digit. fig. p.* 440 bona.

Mus auellanarum minor *Ionst. quadrup. p.* 168.

Haselmaus *Gesn. Thierb. p.* 265 *cum fig.* mala.

Mus Auellanarum Minor *Rai. syn. quadr. p.* 220.

Mus auellanarum minor *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 47.

Mus cauda longa pilosa; corpore rufo, gula albicante. *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 11 *n.* 32.

Mus cauda pilosa elongata, corpore rufo, gula albicante *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 10 *n.* 9.

Mus cauda longa pilosa, gula albicante. The Mus, with a long hairy tail, and a white throat: the Dormouse *Hill anim. p.* 518.

Le Croque-noix: Glis supra rufus, infra albicans *Briss. regn. an. p.* 162 *n.* 3.

Mus cauda pilosa elongata, corpore rufo, gula albicante *Kram. Austr. p.* 316.

Kleine Haselmaus *Hall. vierf. p.* 443.

Mus (auellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 62 *n.* 11.

Le Muscardin *Buff. hist. nat. VIII p.* 193 *tab.* 26.

Hazelmuis: Muis met een lange Hairige Staart, het Lighaam ros, de Keel witagtig *Houtt. nat. hist. II p.* 485.

Georg. Hoefnagelii Archetypa Pars. II. tab. 7.

Mus (auellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 12 *n.*35.

The Dormouse *Edw. Glean. II tab.* 266.

The lesser Dormouse *Penn. brit. zool. p.* 45 *cum fig.*

Mus (auellanarius) cauda elongata pilosa, corpore rufo, gula albicante, pollicibus posticis muticis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 83 *n.* 14.

The Dormouse *Penn. syn. quadr. p.* 291 *n.* 219.

Muscardino *Aless. quadrup. III tab.* 106 *fig.* 2.

Die Haselmaus *Müll. Naturs. I p.* 350.

Die kleine Häselmaus *Berl. Samml. VI p.* 318 *cum fig.* Edw.

Die kleine Haselmaus *Mart. Buff. vierf. IV p.* 287 *tab.* 78.

Moscardino *Italis.*

Rat d'or, Muscardin, Croque-noix *Gallis.*

Ratdort *in Burgundia.*

Pathew *Cambrensibus.*

Haselmaus *Germanis.*

Hazelmuis *Belgis.*

Dormouse, Sleeper *Anglis.*

Skogsmus *Suecis.*

Magnitudo Muris Musculi, corpore $2\frac{2}{3}$ poll. longo; at minus gracilis, rostroque obtusiore. Oculi magni, prominentes, nigri. Auriculae breues, rotundatae, nudae, tenues. Corpus supra rufum, gula et ventre ex flauo albicante. Cauda longitudine corporis vel paullo longior, imprimis versus apicem longius pilosa. Pedes 4-5; pollice plantarum mutico.

Habitat in Europae sepibus densis et siluis, vix in hortis. Nidum parat in caua arbore minus alta, vel in frutice prope terram e gramine, muscis, foliis. Parit 3-4. Edit erectus nuces fructusque. Hibernat; diebus serenioribus hiemis expergiscitur.

volans.

volans. 17. S. hypochondriis prolixis volitans, cauda rotundata.

Quimichpatlan ſeu Mus volans *Fernand. anim. p.* 9.
Aſſapanick *Laet Amer. p.* 82.
Quimichpatlan ſeu mus volans *Ionſt. quadrup. p.* 164.
Mus Ponticus aut Scythicus volans, das fliegende Vech *Geſn. Thierb. p.* 24 *fig. p.* 25 mediocr.
The flying Squirrel *Grew muſ reg. ſoc. p.* 20.
Sciurus Americanus volans *Rai. ſyn. quadr. p.* 215.
Flying-Squirrel *Lawſon Carolin. p.* 124.
Mus ponticus, ſcythicus, volans *Rzacz. Polon. auct. p.* 315.
Sciurus volans *Rzacz. Polon. auct. p.* 316.
The flying Squirrel *Catesb. Carol. II p.* 76 *tab.* 76; in volatu *tab.* 77.
Quadrupes volatile Ruſſiae *Duvernoi: Comment. petrop. V p.* 218.
Sciurus volans ſiue Mus ponticus aut Scythicus Geſneri *Klein: Philoſ. transact. num.* 427 *p.* 32 *cum fig.* vol. 38.
Sciurus volans, mas *Seb. theſ. I p.* 67 *tab.* 41 *fig.* 3.
The flying Squirrel *Brick. North-Carol. p.* 129.
Sciurus hypochondriis prolixis volitans *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 46.
Sciurus hypochondriis prolixis volitans *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 9 *n.* 22.
Das fliegende Eichhorn das Männlein *Meyer Thiere III tab.* 14 fig. Sebae.
Sciurus hypochondriis prolixis volitans *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 9 *n.* 2.
Sciurus petauriſta, volans *Klein. quadrup. p.* 54.
The flying Squirrel *Edw. birds IV tab.* 191.
Sciurus hypochondriis prolixis volitans. The Sciurus, with the ſides extended: the flying Squirrel *Hill anim. p.* 524.
Fliegende Eichhörner *Kalm Amer. II p.* 460.
Sciurus (volans) hypochondriis prolixis volitans *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 8.

L'Ecureuil volant: Sciurus (volans) obſcure cinereus aut rufeſcens, cute ab anticis cruribus ad poſtica membranae in modum extenſa, volans *Briſſ. regn. an. p.* 157 *n.* 12.

L'Ecureuil volant de Siberie: Sciurus (ſibericus volans) diluto cinereus, cute ab anticis cruribus ad poſtica membranae in modum extenſa, volans *Briſſ. regn. an. p.* 159 *n.* 13.

Sciurus hypochondriis prolixis volitans *Kram. Auſtr. p.* 315.

Sciurus minimus, hypochondriis prolixis volans, ventre albido: the Flying-Squirrel *Brown. Iam. p.* 483.

Das graue fliegende Eichhörnchen aus Rusland *Hall. vierf. p.* 418.

Sciurus (volans) hypochondriis prolixis volitans *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 64 *n.* 7.

Ecureuils volans *Du Pratz Louiſ. II p.* 98 *cum fig.* mediocr.

Fliegende Eichhörner *Müll. Samml. III p.* 524.

Inkhoorn met uitgebreide Buikzyden vliegende *Houtt. nat. hiſt. II p.* 503 *tab.* 21 *fig.* 3.

Sciurus (volans) hypochondriis prolixis volitans *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 13 *n.* 38.

Das europäiſche fliegende Eichhorn *Muſ. baruth. p.* 6, 14 *tab.* 4 *fig.* bona.

Le Polatouche *Buff. hiſt. nat. X p.* 95 *tab.* 21; fig. volantis *tab.* 22, 23.

Ecureuil volant *Bom. dictionn. II p.* 79.

Sciurus (volans) hypochondriis prolixis volitans, cauda rotundata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 88 *n.* 10.

The flying Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 293 *n.* 221.

Polatucha *Aleſſ. quadrup. III tab.* 116 fig. Buff.

Der Polatuche oder das fliegende Eichhorn *Berl. Samml. III p.* 432 *cum fig.*

Greater flying Squirrel *Forſter*; *Philoſ. transact. LXII p.* 379.

Das

J. B. Fischer Versuch einer Naturgeschichte von Livland. ed. 2. König[illegible] 1791. 8. p. 158. tab. 3. bona

Das fliegende Eichhorn *Pallas Reiſ. II p.* 439.
Das fliegende Eichhörnchen *Müll. Naturſ. I p.* 359 *tab.* 21 *fig.* 3 Houtt.
Sciurus (volans) hypochondriis prolixis volitans, cauda rotundata *Müll. Dan. prodr. p.* 5 *n.* 33.
Grauwerkskönige *in Boruſſia.*
Flyve-Ekorn *Noruegis.*
Wiewiorka lataiaca *Polonis.*
Лѣтяга (Ljetaga), Лѣтягъ (Ljetag'), Лѣтягь (Ljetäg) *Ruſſis.*
Umuk *Tunguſis.*
Chilob *Burätis.*
Aſſapanick *Virginianis.*
Sahouesquanta *Canadenſibus.*

Magnitudo Sciuri ſtriati, corpore et capite breuiore: corpore 5 poll. longo (magnitudo Sc. vulgaris *Forſter*). Auriculae rotundatae, nudae. Oculi magni, nigri, prominentes. Palpebra ſuperior alba. Naſus breuis albicans. Corpus pilis molliſſimis, colore ſupra fuſco-cinereo, ſubtus flauo-albo. Membrana lateralis a pedibus anticis expanſa ad poſticos, margine nigro. Pedes 4½-5. Cauda longitudine corporis, pilis longis; diſticha, medio longioribus.

Habitat in borealibus Americae, Aſiae, Europae; rarior in Finlandia, Lapponia, Polonia. Degit in arboribus, amatque praecipue Alnum, cuius amenta edit et fructus cum amentis Pini. Gregarius latet interdiu in arboribus cauis et dormit, noctu egreditur. Extenſa cute inter brachia et femora volitat, non ſurſum nec horizontaliter, ſed oblique deorſum. Manſueſcit. Parit 2, 3, 4 nudos coecosque pullos. Pellis minus bona, pilis nimis raris.

Petaurista. 18. S. membrana a capite ad caudam per pedes expansa volitans.

Sciurus virginianus volans *Seb. thes. I p. 72 tab. 44 fig. 3.*

Sciurus cute a capite ad caudam relaxata volans *Linn. syst. nat. 2 p. 46.*

Das virginische fliegende Eichhorn *Meyer Thiere III tab. 15* fig. Sebae.

Sciurus Virginianus, petaurista *Klein. quadrup. p. 55.*

L'Ecureuil volant de Virginie: Sciurus (virginianus volans) cute a capite ad anum membranae in modum lateraliter extensa, volans *Briss. regn. an. p. 159 n. 14.*

Das Virginische fliegende Eichhörnchen *Hall. vierf. p. 420 tab. 22.*

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, lateribus extensis volitans *Linn. syst. nat. 10, I p. 63 n. 16.*

Vliegende Muis: Muis met een lange Donshairige Staart, de Voorpooten vier, de Agterpooten vyf-Vingerig, vliegende met uitge spannen Zyden *Houtt. nat. hist. II p. 492 tab. 20 fig. 3.*

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, hypochondriis volitans *Linn. muf. Ad. Frid. II p. 10.*

Mus (volans) cauda elongata villosa, palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, hypochondriis extensis volitans *Linn. syst. nat. 12, I p. 85. n. 21.*

The hooded flying-Squirrel *Penn. syn. quadr. p. 294 n. 221 β.* Varietatem antecedentis putat cum Buffonio.

Der Flieger *Müll. Naturf. I p. 354 tab. 20 fig. 3* Houtt.

Os rotundatum labio superiore bifido, albido. Vibrissae quinque ordinum, longae. Verruca setis tribus supra canthum oculi anteriorem. Dentes primo-

primores ſuperiores duo conuergentes, inferiores duo paralleli. Auriculae ouatae, paruae, pilis breuibus tectae. Pedes anteriores digitis quatuor, calcaneis incedentes, vnguibus compreſſis, arcuatis, acutis. Pedes poſteriores digitis quinque, talis incedentes. Corpus griſeo-fuſcum; Sciuro vulgari minus. Cutis a latere vtroque extenſa ab aure ad palmas, a palmis ad genua femorum, a genu poſtico femorum ad caudae baſin, margine vndique plicato-rugoſo, obtuſo. Cauda longitudine corporis, teres, tecta vti corpus pilis, non vero longioribus.

Habitat in Virginia, Mexico. Sub dio quieſcit mordaciſſimus.

Sagitta. 19. S. hypochondriis prolixis volitans, cauda plano-pinnata lanceolata.

Flying Cat *Nieuh. Eaſtind. p.* 354 *cum fig.* mala, aliaque *in titulo libri.*

Sciurus (Sagitta) hypochondriis prolixis volitans, cauda plano-pinnata lanceolata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 88 *n.* 11.

Sciurus petauriſta *Pallas miſcell. p.* 54 *tab.* 6.

The ſailing Squirrel *Penn. ſyn. quadr. p.* 292. *n.* 270 *tab.* 27.

Der Pfeilſchwanz *Müll. Naturſ. I p.* 360.

es edifiantes Rec. XVI. p. 29. ex Pulo-Condor [illegible] aurelianens. prope cambogiam

Tota ſtatura Sciuri vulgaris; 18 poll. longus praeter caudam longitudine 15 pollicum. Supra ferrugineo-fuſcus, ſubtus ferrugineo-pallidus. Caput paruum ouatum. Auriculae minutae, ouatae, obtuſae, veſtitae (nudiuſculae, acutae *Pallas.*). Myſtaces longitudine capitis. Seta vna in mala. Labium ſuperius fiſſum; inferius breue. Dentes fuſci, obtuſiuſculi. Collum breue. Pedes 4-5. Palmarum calcar ſetaceum, cartilagineum, longitu-

gitudine ipsius vlnae intra cutem. Cutis extensa a capite ad carpum; a carpo ad genu in membranam tectam, concolorem, ciliatam. Femora postice ciliata pilis. Pedes subtestacei: digiti omnes vltimo geniculo supra prominuli. Vngues compressi. Scrotum ouatum, magnum, vestitum. Praeputium elongatum, vestitum. Cauda fere longitudine corporis (corpore longior *Pall.*), valde depressa et pilis lanceolata, obtusa. Mammae sex.

Habitat in Iaua, aliisque insulis indicis, rarus.

40. CASTOR.

Dentes Primores vtrinque II: *Superiores* truncati, angulo transuerso excauati; *inferiores* apice transuersi.
Laniarii nulli.
Pedes digitati: digitis 5-5.
Cauda plana, nec teres, squamosa.

Fiber. 1. C. cauda depressa ouata.
Fiber *Plin. hist. nat. VIII c.* 30 *(c.* 47 *Hard.)*.
Fibri quos castores vocant *Plin. hist. nat. XXXII c.* 3 *(c.* 13 *Hard.)*.
Καστωρ *Aelian. anim. VI c.* 34.
Fiber *Agric. an. subt. p.* 20.
Castor *Gesn. quadrup. p.* 336 *cum fig.* bona.
Castor *Rondel. aquat. p.* 236 *cum fig.* pessima.
Fiber *Bellon. aquat. p.* 28 *fig. p.* 30 mediocr.
Castor *Ol. Magn. Sept. p.* 604.
Castor *Gesn. aquat. p.* 219 *fig. p.* 220 Rondel.
Fiber *Schwenckf. theriotr. p.* 94.
Fiber siue castor *Schonev. ichth. p.* 34.

Castor

Caſtor *Aldrov. digit. p.* 276 *fig. p.* 279 mediocr.
Caſtor *Ionſt. quadrup. p.* 147.
Caſtor. Fiber. Biber *Ionſt. quadrup. tab.* 68 fig. Aldrov.
Caſtor *Muſ. Worm. p.* 320.
Fiber *Geſn. Thierb. p.* 39 *cum fig.* mediocri.
Le Caſtor *Perr. anim. I p.* 136 *tab.* 19 fig. bon.
Caſtores *Scheff. Lappon. p.* 339.
Caſtor *Charlet. exerc. p.* 18.
Caſtor, Fiber *Wagn. Heluet. p.* 172.
Caſtor *Mar. monogr.*
Caſtor ſiue Fiber *Rai. ſyn. quadr. p.* 209.
Beveren *Ysbr. Reiſ. p.* 21.
Le Caſtor *Sarraſin: Mém. de l'acad.* 1704 *p.* 48.
Bevers *Lawſon Carolin. p.* 120.
Caſtor, Fiber *Rzacz. Polon. p.* 215 *auct. p.* 306.
The Beaver *Catesb. Carol. App. p.* XXIX.
The Beaver *Brick. North-Carol. p.* 121.
Caſtor cauda ouata plana *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 47.
Biber *Riding. jagdb. Th. tab.* 15.
Le Caſtor *Charlev. nouv. Fr. III p.* 94.
Beavers *Dobbs Hudſ. p.* 36.
Caſtor cauda ouata plana *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 9 *n.* 23.
Caſtor cauda ouata plana *Linn. ſyſt. nat.* 6. *p.* 10 *n.* 1.
Caſtor. Biber *Klein. quadrup. p.* 91.
Caſtor cauda ouata plana. The Caſtor, with a flat oval tail: the Beaver *Hill anim. p.* 526 *tab.* 25 fig. mediocr.
Bieber *Kalm Amer. III p.* 28, 606.
Caſtor (communis) cauda ouata plana *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 9.
Le Caſtor, ou le Biévre: Caſtor (ſ. Fiber) caſtanei coloris, cauda horizontaliter plana *Briſſ. regn. an. p.* 133 *n.* 1.
Mortimer. in Philoſ. Transact. vol. 38. N. 430.

Le Caſtor blanc: Caſtor (albus) albus cauda horizontaliter plana *Briſſ. regn. an. p.* 135 *n.* 2.
Bieber *Gisler: Act. holmienſ.* 1756 *p.* 196.
Caſtor cauda ouata plana *Kram. Auſtr. p.* 315.
Biber *Hall. vierf. p.* 573.
Caſtor (Fiber) cauda ouata plana *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 58 *n.* 1.
Caſtor *Dictionn. anim. I p.* 444.
Le Caſtor *Buff. hiſt. nat. VIII p.* 282 *tab.* 36.
Bever met een Ovale platte Staart *Houtt. nat. hiſt. II p.* 410.
Caſtor (Fiber) cauda ouata plana *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 10 *n.* 27.
Bever *Pontopp. Dan. I p.* 610.
Caſtor *Bom. dictionn. I p.* 438.
Caſtor (Fiber) cauda ouata plana *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 78 *n.* 1.
The Caſtor *Penn. ſyn. quadr. p.* 255 *n.* 190.
Caſtore *Aleſſ. quadrup. II tab.* 62 fig. Buff.
Beaver *Forſter: Philoſ. transact. LXII p.* 375.
Der Caſtor *Müll. Naturſ. I p.* 326 *tab.* 30 *fig.* 2.
Caſtor (Fiber) cauda ouata plana *Müll. Dan. prodr. p.* 4 *n.* 25.
Bivaro, Bevero, Caſtore *Italis.*
Bívaro, Bíbaro, Caſtor *Hiſpanis.*
Caſtôr *Luſitanis.*
Caſtor, Biévre *Gallis.*
Biber, Bieber *Germanis.*
Bever *Belgis.*
Beaver, Caſtor *Anglis.*
Bever *Danis.*
Bæver *Noruegis.*
Bäſwer *Suecis.*
Biur *Smolandis.*
Majeg *Lapponibus.*

Bobr *Polonis.*
Бобръ (Bobr') (*adultus*); Кошлоки (Koſchloki) (*pulli*); Ярцы (Iartzy) (*annui*) *Ruſſis.*
Chaly *Burätis.*

Longitudo corporis trium pedum, caudae longitudo 11 poll. latitudo 5 poll. Caput breue, compreſſum, roſtro rotundato. Dentes primores fortes. Auriculae minutae, breues, rotundatae, pilis fere latentes. Oculi parui, ſubnigri. Collum breue, craſſum. Color profunde caſtaneus. Crura breuia. Pedes antici minores, fiſſi, vnguibus obtuſis; poſtici maiores, palmati, vnguibus latis; 5 - 5. Cauda lata, depreſſa, fere oualis, ſquamoſa. Mammae quatuor pectorales.

Habitat in Europa frigida et temperata, hodie Angliae exul, non olim; praecipue autem viuit in borealibus imprimis Aſiae, maxime Americae, ad ripas fluuiorum lacuumque, victitans corticibus Sorbi, Salicis, potiſſimum Populi, vnde Caſtoreum praeſtantius. Vix Piſces edit. Ventriculo ſuperius innatum eſt corpus craſſum cauernoſum humore foetido turgens. Grauida 4 menſ. parit Martio menſe 2 - 3. Manſueſcit. Aetas 15 - 20 annorum?

Caſtoreum e folliculis putoriis vtriusque ſexus, celluloſis, praeſtantius europaeum quam canadenſe; in ſuperiore cauitate liquidum vt axungia.

Architectura in conſtruendo domos ad ripas ante hiemem ſuperat omnium animalium. Non autem aedificat varietas terreſtris ſolitaria (*Terrier* Gallis), quae praecipue in Europa occurrit.

Pellis

Pellis proba; aestimatur maxime nigra; alba autem rarissima est. Optimae russicae circa Petschoram et ad Tas fluuios, pulchrae etiam ad Ob et ad Ieniseiam.

zibethicus. 2. C. cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis.

Musk Rat *Lawson Carol. p.* 120.

Le Rat musqué *Sarrazin: Mém. de l'acad.* 1725 *p.* 323 *tab.* 11 *fig.* 1, 2 mediocr.

The Musk-rat *Brick. North-Car. p.* 129.

Rat Musqué *Charlev. nouv. Fr. III p.* 107.

Castor cauda longa, lanceolata plana. The Castor, with a long, flat, lanceolated tail: the flat-tailed small Beaver *Hill anim. p.* 527 nisi forte Sorex moschatus sit.

Die Biesemratzen *Kalm Amer. III p.* 25.

Le Rat musqué du Canada: Castor (Mus moschiferus Canadensis) cauda verticaliter plana, digitis omnibus a se inuicem separatis *Briss. regn. an. p.* 136 *n.* 4.

Rat musqué du Canada *Dictionn. anim. III p.* 668.

L'Ondatra *Buff. hist. nat. X p.* 1 *tab.* 1.

Rat musqué *Bom. dictionn. III p.* 718.

Castor (zibethicus) cauda longa compresso-lanceolata, pedibus fissis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 79 *n.* 3.

The Musk Beaver *Penn. syn. quadr. p.* 259 *n.* 191.

Ondatra *Aless. quadrup. III tab.* 114 *fig.* 1 Buff.

Musk Beaver *Forster: Philos. transact. LXII p.* 375.

Die Zibethratze *Müll. Naturs. I p.* 333.

Ondatra *Canadensibus.*

Longitudo corporis pedis vnius, caudae 9 pollicum. Figura Fibri. Nasus crassus, obtusus. Auriculae breues pilis fere latentes. Oculi magni. Pedes digitis 5-5 fissis; posticis setis ciliatis. Cauda com-

compreſſa marginibus acutis, ſquamis minutis tecta, admixtis pilis paucioribus. Color ſupra ruſo-fuſcus, ſubtus ex cano cinereus. Pili molles. Meit ex foramine infra vuluam.

Habitat in America boreali ad aquas. Edit lignum, radices, caules, folia, fructus Vegetabilium. Maxime amat Acorum.

Per aeſtatem mas et femina cohabitant; hieme autem plures familiae coeunt in vnum habitaculum rotundum ex herbis iuncisque conſtructum ope argillae cum pluribus portis, quotannis denuo ſtruendum. Hibernant alii ſolitarii in cauis arboribus. Cibum non colligit in hiemen vt Fiber. Parit ter vel quater in anno (ſemel *Edwards.*) 4-7. Pellis bona, mollis. Caro eſculenta. Manſueſcit. Moſchi odorem aeſtate ſpirat, non hieme.

41. LVTRA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, diſtincti.
Inferiores VI, obtuſiores, conferti: duo interiores.
Pedes pentadactyli palmati.

marina. 1. L. plantis piloſis, cauda corpore quadruplo breuiore.

Iiya quae et Carigueibeiu appellatur a Braſilienſibus *Marcgr. Braſil. p.* 234 *cum fig.* mala.
Carygueibeiu alias Iiya, *Ionſt. quadrup. p.* 150.
Iiya ſiue Carigueibeiu Lutra Indica *Ionſt. quadrup. tab.* 66 *fig.* Marcgr.
Saricovieme et Carygueibeju *Charlet. exerc. p.* 19.

Lutra

Lutra brasiliensis *Rai. syn. quadr. p.* 189.

Loutre que les Indiens appellent Carigurbeju *Des March. voy. III p.* 290.

Lutra pollice digitis breuiore *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 44.

Lutra pollice digitis breuiore *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 2.

Lutra nigricans cauda depressa et glabra *Barr. Fr. équ. p.* 155.

Lutra marina *Steller: Nov. comment. petrop. II p.* 367 *tab.* 26 fig. bona.

Lutra Brasiliensis *Klein. quadrup. p.* 91.

Lutra pollice digitis breuiore. The Lutra, with the inner toe shorter than the other: the Brasilian Otter *Hill anim. p.* 551.

Meerotter *Steller: Hamb. Mag. XI p.* 460 *cum fig.* bon.

La Loutre du Bresil: Lutra (Brasiliensis) atri coloris, macula sub gutture flaua *Briss. regn. an. p.* 278 *n.* 2.

Die Seeotter *Hall. vierf. p.* 567.

Seebiber *Müll. Samml. III p.* 244.

Kamtschatkische Bieber *Müll. Samml. III p.* 529.

Mustela (Lutris) plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo breuiore *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 45 *n.* 1.

Carigueibeju *Dictionn. anim. I p.* 434.

Brasiliaansche Otter: Wezel met de Voetzoolen, die gevliesd zyn, Hairig, de Staart viermaal korter dan het Lighaam *Houtt. nat. hist. II p.* 168.

La Saricovienne *Buff. hist. nat. XIII p.* 319.

Mustela (Lutris) plantis palmatis pilosis, cauda corpore quadruplo breuiore *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 66 *n.* 1.

The Sea Otter *Penn. syn. quadr. p.* 241 *n.* 175.

Die Meerotter *Müll. Naturs. I p.* 259.

Der Seebiber oder vielmehr der Seeotter *Stell. Kamtsch. p.* 97.

Mustela

Cpt. Cook: voyage to the northern hemisphere vol. II. p. 295.

p. 465,

Mustela Lutris *Schreb. Säugth. III tab.* 128 fig. Stell.

Камчатской бобръ (Kamczatskoi bobr') *Russis.*
Каланъ (Kalan) *Kamtschadalis.*
Kaiko *Itelmanis.*
Carigueibeju *Brasiliensibus.*

Longitudo corporis 4 ped. 2 poll. caudae 13 poll. Caput depressum. Auriculae minimae, erectae, villosae, subrotundae. Nasus niger. Os obtusissimum. Maxilla superior longior latiorque inferiore. Mystaces copiosae, rigidulae: supra supercilia; pone oculos; pone sinum oris; ad latera labii inferioris; sub gula. Dentes primores superiores sex aequales, inferiores sex: duobus alternis interioribus et duobus bilobis lateralibus. Pedes 5-5, palmati omnes, postici maiores, fere Phocae. Crura crassa et breuia. Cauda depressa. Mammae duae abdominales. Cutis crassa, pilis densis longisque fuscis aut atris splendentibus cum lanugine molliore.

Variat colore argenteo.

Habitat in Asia septentrionali atque America, in litoribus marinis maioribusque fluuiis. Americana maculam flauam habet infra mentum; num specie diuersa ab asiatica?

Animal mite timidumque, prolem mire amans, vt moerore adeo extinguatur pullo spoliatum. Natat in dorsum proiectum, pullum palmis tenens. Cursu celer. Ludibundum. Victitat Piscibus, Sepiis, Cancris, Testaceis. Parit monogama vnicum semel in anno post grauiditatem octo vel nouem mensium. Coit omni tempore, femina resupinata. Visus debilis, at olfactus fortis. Pellis proba, Sinensibus

imprimis

imprimis aestimata. Iuniorum caro delicata, agninae fere sapore. Occiditur facile ictu capitis. Eiulatus infantis similis.

vulgaris. 2. L. plantis nudis, cauda corpore dimidio breviore.

Ενυδρις *Arist. hist. anim. I c. 2 n. 8. VIII c. 9 n. 105.*
Λαταξ *Arist. hist. anim VIII c. 9 n. 105?*
Lutra *Agric. an. subt. p. 18.*
Latra *Gesn. quadrup. p. 775 fig. p. 776* mediocr.
Latax *Gesn. quadrup. p. 777.*
Lutra *Bellon. aquat. p. 31 fig. p. 32* mediocr.
Lutra *Gesn. aquat. p. 608 cum fig.* mediocr.
Lutra *Schwenckf. theriotr. p. 107.*
Lutra *Schonev. ichthyol. p. 46.*
Lutra *Aldrov. digit. p. 292 fig. p. 295* mala.
Lutra *Ionst. quadrup. p. 150 tab. 68* fig. mediocr.
Der Otter *Gesn. Thierb. p. 302 fig. p. 303* mala.
La Loutre *Perr. anim. I p. 150 tab. 21* fig. bona.
Lutra *Charlet. exerc. p. 18.*
Lutra, Enydris *Wagn. Heluet. p. 178.*
Lutra *Sibb. Scot. an. p. 10.*
Lutra *Rai. syn. quadr. p. 187.*
Lutra *Rzacz. Polon. p. 221 auct. p. 313.*
The Otter *Brick. North-Carol. p. 122.*
Lutra digitis aequalibus *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*
Fischotter *Riding. jagdb. Th. tab. 16.*
Lutra digitis omnibus aequalibus *Linn. fn. suec. 1 p. 4 n. 10.*
Lutra digitis aequalibus *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 1.*
Lutra *Klein. quadrup. p. 91.*
Lutra digitis omnibus aequalibus. The Lutra, with all the toes of equal length: the Otter *Hill anim. p. 550 tab. 27* fig. mediocr.
La Loutre: Lutra (. . . .) castanei coloris *Briss. regn. an. p. 277 n. 1.*
Lutra digitis aequalibus *Kram. Austr. p. 312.*

Die

Die Flusotter *Hall. vierf. p.* 564.
Fischotter *Hall. vierf. p.* 599.
Mustela (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 45 *n.* 2.
Otter, Flussotter oder Fischotter *Müll. Samml. III p.* 531.
La Loutre *Buff. hist. nat. VII p.* 134 *tab.* 11.
Loutre *Dictionn. anim. II p.* 717.
Otter: Wezel met de Voetzoolen, die gevliesd zyn, kaal, de Staart half zo lang als 't Lighaam *Houtt. nat. hist. II p.* 179. *tab.* 14 *fig.* 1.
Viuerra (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 5 *n.* 12.
Lutra digitis omnibus aequalibus *Gronov. zooph. I p.* 8 *n.* 31.
The Otter *Penn. brit. zool. p.* 32 *cum fig.* bona.
Odder *Pontopp. Dan. I p.* 610.
Loutre *Bom. dictionn. II p.* 725.
Mustela (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 66 *n.* 2.
Mustela Lutra *Forster: Philos. transact. LVII p.* 342.
Lutra *Fermin Surin. II p.* 82.
The greater Otter *Penn. syn. quadr. p.* 238 *n.* 173.
Lontra *Alesf. quadrup. tab.* 63 fig. Buff.
Lontra del Canada *Alesf. quadrup. tab.* 64.
Flussotter *Müll. Naturs. I p.* 262 *tab.* 14 *fig.* 1 Houtt.
Fischotter *Stell. Kamtsch. p.* 128.
Die Fischotter *S. G. Gmel. Reis. III p.* 285, 373.
Mustela Lutra *Schreb. Säugth. III tab.* 126 *A* fig. propr.
Mustela Lutra canadensis *Schreb. Säugth. III tab.* 126 *B* fig. propr.
Mustela (Lutra) plantis palmatis nudis, cauda corpore dimidio breuiore *Müll. Dan. prodr. p.* 2 *n.* 10.
Der Fischotter *Mart. Buff. vierf. IV p.* 137 *tab.* 60.

Nutria *Hiſpanis.*
Lodra, Lodria, Lontra *Italis.*
Loutre *Gallis.*
Dyfrgi *Cambrenſibus.*
Otter, Fiſchotter *Germanis.*
Otter *Belgis.*
Otter *Anglis.*
Odder *Danis.*
Otter, Slenter *Noruegis.*
Zhievres *Lapponibus.*
Utter *Suecis.*
Wydra *Polonis.*
Выдра (Wydra) *Ruſſis.*
Irgendir *Tunguſis.*
Chaleu *Burätis.*
Schank *Perſis.*
Sagif *Turcis et Armeniis.*
Tovus *Surinamenſibus.*

Longitudo corporis 23-26 poll. caudae 16-18 poll. Caput latum planumque, naſo obtuſo, craſſo, naribus lunatis. Oculi parui, naſo approximati. Auriculae breuiſſimae rotundatae. Labia craſſa. Myſtaces magnae. Dentes primores ſuperiores ſex, conſerti, acuti: exterioribus duobus maioribus; inferiores minores, obtuſiores: interioribus et exterioribus lobatis. Laniarii ſolitarii magni, arcuati. Molares ſupra vtrinque quinque: poſterioribus duobus lobatis; infra vtrinque ſex. Collum abbreuiatum, craſſitie capitis. Corpus elongatum. Crura breuia atque craſſa. Digiti quinque palmati in omnibus. Cauda baſi lata, depreſſa vsque ad apicem. Mammae quatuor minutae, ventrales. Color corporis profunde fuſcus. Maculae duae paruae albae ad naſum vtrinque, aliaque infra mentum. Guttur, pectus et venter ex cinereo albicantia. Foramen ouale clauſum.

Habitat

Habitat in Europae atque Asiae Americaeque borealis aquis dulcibus, fluuiis, stagnis, piscinis, non in mari. Est quoque in Persia. Victitat Piscibus, Ranis, Cancris, hisque deficientibus herbis corticibusque arborum. Piscinas deuastat. Celerrime natat atque vrinatur. Nidus sub terra supra aquae superficiem, aditu sub aqua, atque spiraculo paruo in terrae superficie. Coit februario mense, aduocata femina sono lento susurrando. Parit martio et aprili pullos tres vel quinque. Ferox, mordet vehementer, sed mansuescit. Caro saporis piscini.

minor. 3. L. plantis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo.

Noerza *Agric. an. subt. p.* 39.

Nörtz - Wieselein, Noertz, Nertz oder Nörtz *Gesn. Thierb. p.* 347.

The Minx *Lawson Carol. p.* 121.

Latax; Germ. Nurtz; nobis Nurek *Rzacz. Polon. p.* 218.

The Minx *Brick. North - Carol. p.* 118.

Viuerra (Lutreola) ore albo, plantis palmatis hirsutis, digitis subaequalibus *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 5 *n.* 13.

Mustela (Lutreola) plantis palmatis hirsutis, digitis aequalibus, ore albo *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 66 *n.* 3.

Norka *Rytschk. Orenb. I p.* 237.

The lesser Otter *Penn. syn. quadr. p.* 239 *n.* 174 *tab.* 21 *fig.* 2 bona.

Eine kleine Art von Ottern *Pallas Reis. I p.* 96.

Lesser Otter *Forster: Philos. transact. LXII p.* 371.

Die Sumpfotter *Müll. Natursf. I p.* 264.

Mustela Lutreola *Schreb. Säugth. III tab.* 127 fig. Pennanti.

Steinhund *circa Goettingam.*

Mænk *Suecis.*

 Tichuri

Tichuri *Fennis.*
Nurek *Polonis.*
Норка (Norka) *Russis.*
Iackash *ad fretum Hudsonis.*

Statura Lutrae vulgaris, sed triplo minor. Corpus fulvo-fuscum: pilis breuioribus flauescentibus; longioribus nigris. Auriculae subrotundae. Os album. Lingua tecta papillis mollibus. Dentes laniarii supra duo approximati vtrinque, postico graciliore. Molares supra tres, postico transuerso. Vertex canescens pilis albis immixtis. Pedes palmati pentadactyli. Vngues non retractiles. Cauda in acumen attenuata, vestita pilis paullo longioribus.

Habitat in Europa passim, in Sibiria Americaque boreali; amat praecipue loca aquosa. Victitat piscibus, ranis, insectis aquaticis, carne. Foetet. Mores Lutrae vulgaris. Pellis bona.

42. MVSTELA.

Dentes Primores Superiores VI, erecti, acutiores, distincti.
Inferiores VI, obtusiores, conferti: duo interiores.
Lingua laeuis.
Pedes fissi, pentadactyli.

barbara. 1. M. atra, collo subtus macula alba triloba.
Mustela maxima atra moschum redolens. Tayra. grosse Belette *Barr. Fr. équ. p.* 155.
Mustela (Barbara) pedibus fissis, atra, collo subtus macula alba triloba *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 46 *n.* 4.

Zwarte

Zwarte Wezel, onder aan den Hals met eene witte drielobbige Vlak *Houtt. nat. hift. II p.* 193.
Muftela (Barbara) pedibus fiffis, atra, collo fubtus macula alba triloba *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 67 *n.* 4.
The Guiana Weefel *Penn. fyn. quadr. p.* 225 *n.* 161.
Der fchwarze Wiefel *Müll. Naturf. I p.* 265.

Corpus ftatura Martis, nigrum, pilis rigidioribus. Auriculae rotundae, villofae. Area cinerafcens ante oculos. Macula fub medio collo, non fub gula, albida. Mammae quatuor pone vmbilicum.

Habitat in Brafilia et Guiania. Adfricat arboribus materiam vnctuofam odore Mofchi.

Galera. 2. M. tota fufca.
Vondfira *Flacourt Madag. p.* 154.
Koekeboe *Boffm. Guin. p.* 299.
Galera fubfufca, cauda elongata, oculis nigris, auribus fubnudis appreffis *Brown. Iam. p.* 485 *tab.* 29 *fig.* 1 bona.
Vond-fira *Bom. dictionn. IV p.* 629.
Le Vanfire *Buff. hift. nat. XIII p.* 167 *tab.* 21.
Le Tayra ou le Galera *Buff. hift. nat. XV p.* 155.
The Madagafcar Weefel *Penn. fyn. quadr. p.* 224 *n.* 158.
The Guinea Weefel *Penn. fyn. quadr. p.* 225 *n.* 160.
Vanfiro *Aleff. quadrup. IV tab.* 159 *fig.* 2 Buff.
Muftela Galera *Schreb. Säugth. III tab.* 135 fig. Buff.
Voang-Shira *in Madagafcar.*

 Lon-

MVSTELAE genus corpore elongato pedibusque breuibus eft, currit trunco incuruato, fcandit arbores, falit ex arbore in arborem. Inteftina habet maxime breuia et fimplicia.

Longitudo corporis 13 poll. caudae fere 10 poll. Rostrum productum, subacutum, barbatum, maxilla inferiore longe breuiore. Dentes primores superiores sex, subcompressi, acuti, exteriores paullo maiores. Inferiores totidem consimiles subcompressi et subobtusi, laniariis approximati. Laniarii superiores conici. Lingua retrorsum aculeis scabra. Caput oblongum. Oculi oblongo-rotundati, medio inter aures et apicem rostri locati. Auriculae breues, compressae, semiellipticae, reniformes, humanis fere similes. Pedes lacertosi, validi, fossorii, antici breuiores, metatarsis oblongis, digitis 5-5. Cauda conico-cylindracea producta, attenuata, recta, declinata. Mammae duae inguinales. Pili totius corporis basi fusci, supra nigro et ferrugineo annulati. Cauda corpori concolor.

Habitat in Guinea et Madagascar; fodit subterranea.

Idem animal putat Buffonius:

De Iavaansche Wezel *Valent. Amb. III p.* 279.
Mustela Iauanica *Seb. thes. I p.* 77 *tab.* 48 *fig.* 4.
Mustela Iauanica, Koger Angan dicta *Klein. quadrup. p.* 64.
Le Furet de Iava: Mustela (Viuerra Iauanica) supra rufa, infra dilute flaua, caudae apice nigricante *Briss. regn. an. p.* 245 *n.* 5.
Die Iavanische Wiesel *Hall. vierf. p.* 460.
Furet de Iava *Dictionn. anim. II p.* 230.
Kager Angan *Iauanensibus.*

Magnitudo Furonis. Caput obscure spadiceum. Dorsum rufum. Venter pallide flauus. Caudae apex niger.

Habitat

Habitat in Iaua. Fodit terram talparum more. Praedatur Mures, Columbas.

canadensis. 3. M. corpore fuluo-nigricante, pectore macula alba.

Le Pitoi *Charlev. nouv. Fr. III p.* 134?
Les Pekans *Charlev. nouv. Fr. III p.* 134.
Le Vison: Mustela (Vison) pilis coloris saturate castanei in toto corpore vestita *Briss. regn. an. p.* 246 *n.* 6.
Vison *Dictionn. anim. IV p.* 557.
Pekan *Bom. dictionn. III p.* 401.
Vison *Bom. dictionn. IV p.* 615.
Le Pekan *Buff. hist. nat. XIII p.* 304 *tab.* 42.
Le Vison *Buff. hist. nat. XIII p.* 304 *tab.* 43.
The Pekan *Penn. syn. quadr. p.* 234 *n.* 159.
Pekano *Aleff. quadrup. IV tab.* 155 *fig.* 1 Buff.
Visone *Aleff. quadrup. IV tab.* 155 *fig.* 2 Buff.
Mustela canadensis *Schreb. Säugth. III tab.* 134 fig. propr.

Paullo minor Marte, cui similis, longitudine corporis 17 poll. caudae 7 poll. Caput mystacibus longis. Auriculae subacutae. Totum corpus pilis splendentibus saturate castaneis, basi cinereis. Macula alba inter crura antica. Digiti tecti pilis densis supra et infra. Vngues acuti. Cauda colore profundiore ac corpus.

Habitat in America boreali. Forte varietas est Martis et Foinae in vnicam speciem contrahendae cum M. barbara.

Martes. 4. M. corpore fuluo-nigricante, gula flaua.
Martes in arboribus *Agric. an. subt. p.* 38.

Martes ſilueſtres *Geſn. quadrup. p.* 865 *cum fig.* mediocr.
Martes arborea *Schwenckf. theriotr. p.* 110.
Martes *Aldrov. digit. p.* 331.
Martes ſilueſtris *Ionſt. quadrup. p.* 156.
Martes *Ionſt. quadrup. tab.* 64 fig. mal.
Martes. Marter *Ionſt. quadrup. tab.* 64 fig. mediocr.
Ein Marder *Geſn. Thierb. p.* 345 *cum fig.* mala.
Mardures *Scheff. Lappon. p.* 341.
Martes *Charlet. exerc. p.* 20.
Martes *Wagn. Heluet. p.* 181.
Martes *Sibb. Scot. an. p.* 11.
Martes abietum *Rai. ſyn. quadr. p.* 200.
Martes *Rzacz Polon. p.* 222 *auct. p.* 314.
Martes *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.
Marder *Riding. jagdb. Th. tab.* 19.
Les Martres *Charlev. nouv. Fr. III p.* 134.
Muſtela fuluo-nigricans, gula pallida *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 3 *n.* 7.
Der Feldmarder oder Baummarder *Meyer Thiere II tab.* 5.
Muſtela fuluo-nigricans, gula pallida *Linn. ſyſt nat.* 6 *p.* 5 *n.* 2.
Muſtela Martes abietum, Baum-Marter *Klein. quadrup. p.* 64.
Muſtela fuluo-nigricans gula pallida. The blackiſh brown Muſtela, with a pale throat: the Martin *Hill anim. p.* 546 *tab.* 27 fig. mediocr.
La Marte: Muſtela (Martes) pilis in exortu e cinereo albidis, caſtaneo colore terminatis, veſtita, gutture flauo *Briſſ. regn. an. p.* 247 *n.* 8.
Muſtela fuluo-nigricans, gula pallida *Kram. Auſtr. p.* 311.
Baummarder *Hall. vierf. p.* 457.
Muſtela (Martes) plantis fiſſis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 46 *n.* 5.

v. Wildungen Taschenbuch a. 1800. c. fig.

Marder

Marder *Müll. Samml. III p.* 515.

La Marte *Buff. hist. nat. VII p.* 186 *tab.* 22.

Marte *Dictionn. anim. III p.* 37.

Marter: Weezel met gespleeten Voetzoolen, geelagtig bruin over 't Lyf, aan de Keel bleek *Houtt. nat. hist. II p.* 193.

Mustela (Martes) pedibus fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 6 *n.* 15.

The yellow breasted Martin *Penn. brit. zool. p.* 39.

Maar *Pontopp. Dan. I p.* 610.

Marte *Bom. Dictionn. III p.* 40.

Mustela (Martes) pedibus fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 67 *n.* 6.

Mustela Martes *Forster: Philos. transact. LVII p.* 342.

The pine Martin *Penn. syn. quadr. p.* 216 *n.* 155.

Martora *Aless. quadrup. II tab.* 69 fig. Buff.

Pine Martin *Forster: Philos. transact. LXII p.* 372.

Der Marder *Müll. Naturs. I p.* 267.

Mustela Martes *Schreb. Säugth. III tab.* 130 fig. propr.

Mustela (Martes) pedibus fissis, corpore fuluo-nigricante, gula pallida *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 12.

Der Feldmarder *Mart. Buff. vierf. IV p.* 156.

Das Mart. Hausmarder *Mart. Buff. vierf. IV tab.* 61.

Marta *Hispanis.*

Marta *Lusitanis.*

Marta, Martura, Martora, Martorello *Italis.*

Marte *Gallis.*

Belagoed *Cambrensibus.*

Feldmarder, Wildmarder, Baummarder *Germanis.*

Edlmarder *Austriacis.*

Marter *Belgis.*

Martin, Martlet *Anglis.*

Maar *Danis.*

Mård *Suecis.*

Nætte *Lapponibus.*

Kuna *Polonis.*
Куница (Kunitza) *Russis.*
Susar *Tataris.*
Lui *Tscheremissis.*
Suwsär *Tschuwaschis.*
Tschinäma *Morduanis.*
Tulàn *Sirjänice.*

Longitudo corporis 18-19 poll. caudae 10 poll. Auriculae breues, rotundatae. Oculi fulgidi. Nasus prominens. Maxilla superior obtusa. Dentes superiores primores sex paralleli, parui, obtuso-acuti; laniarii solitarii, maximi, spatio remoti; molares quinque: tribus anterioribus simplicibus minoribus, reliquis duobus spatio remotis. Inferiores primores sex: duobus mediis retusis, minimis, obtusis; laniarii solitarii, maximi, cum primoribus paralleli; molares vti superiores. Lingua longa, laeuis, tecta papillis acutis, mollibus, retro spectantibus. Pedes pentadactyli digitis subaequalibus, vndique villosi, semipalmati, pollice paullo breviore. Cauda pilosa. Totum corpus pilis profunde castaneis, pulchris, splendentibus, gula pectoreque flauis.

Habitat in borealibus Europae, Asiae, Americaeque, rarior in Anglia atque Gallia. Degit in siluis antiquis, praecipue pinetis, nunquam ad domos. Edit auiculas, sciuros, mures, talpas. Nidum parat in summis abietibus, occupat quoque nidum Sciuri. Parit duo vel tres. Excrementa odore moschi.

Foina. 5. M. corpore fuluo-nigricante, gula alba.
Martes in saxis *Agric. an. subt. p.* 38.
Martes domesticae *Gesn. quadrup. p.* 865 *cum fig.* mediocr.

Martes

Martes ſaxatilis *Schwenckf. theriotr. p.* 110.
Martes domeſtica *Aldrov. digit. p.* 332.
Martes domeſtica *Ionſt. quadrup. p.* 156.
Martes Fagorum, Gallis Foynae *Rai. ſyn. quadr. p.* 200.
Martes *Rzacz. Polon. p.* 222 *auct. p.* 314.
Der Steinmarder oder Buchmarder *Meyer Thiere II tab.* 4.
Martes ſaxorum non fagorum ſeu domeſticus, Steinmarter *Klein. quadrup. p.* 64.
La Fouine: Muſtela (Foyna) pilis in exortu albidis, caſtaneo colore terminatis, veſtita, gutture albo *Briſſ. regn. an. p.* 246 *n.* 7.
Der Steinmarder *Hall. vierf. p.* 459.
La Fouine *Buff. hiſt. nat. VII p.* 161 *tab.* 18.
Fouine *Dictionn. anim. II p.* 200.
The Martin *Penn. brit. zool. p.* 38 *cum fig.* bon.
Fouine *Bom. dictionn. II p.* 232.
The Martin *Penn. ſyn. quadr. p.* 215 *n.* 154.
Foina *Aleſſ. quadrup. II tab.* 68 fig. Buff.
Der Marter *S. G. Gmelin Reiſ. III p.* 370.
Muſtela Foina *Schreb. Säugth. III tab.* 129 fig. propr.
Der Hausmarder *Mart. Buff. vierf. p.* 147 *tab.* 61 *a.*
Fuina *Hiſpanis.*
Foina, Fouina *Italis.*
Fouine *Gallis.*
Bela graig *Cambrenſibus.*
Hausmarder, Steinmarder, Marder *Germanis.*
Marter *Belgis.*
Martin *Anglis.*

Paullo minor praecedente longitudine corporis 16½ poll. caudae 8-9 poll. Valde ſimilis Martis, vt adeo eius varietatem credant plerique auctores. Differt capite paullo longiore, pedibus breuioribus; gula pectoreque albis, pelle minus pulchra.

Habitat

Habitat in Europa inque Persia, in siluis et circa domos. Vulgaris in Gallia et Anglia, Scotiae exul rariorque in borealibus. Edit gallinas aliaque animalia minora. Parit in cauis arboribus inque rudetis pullos quatuor vel sex. Mansuescit.

sarmatica. 6. M. fusco luteoque varia.

Animal idiomate russico Perewiąska *Rzacz. Polon.* p. 222.

Mustela praecincta *Rzacz. Polon.* p. 328.

Peregusna, noua Mustelae species *Güldenstädt: Nou. comm. petrop. XIV* p. 441 *tab.* 10.

Mustela sarmatica *Pallas Reis. I* p. 453.

Tiger-Iltis *Pallas Reis. I* p. 175.

Mustela Sarmatica *Schreb. Säugth. III tab.* 132 fig. Güldenst.

Der Sarmatier *Müll. Naturs. Suppl.* p. 33.

Przewiaska *Polonis.*

Перегузна (Pereguznă) *Russis.*

M. Putorio aliquantum minor, cui similis. Longitudo corporis 13½ poll. caudae 6½ poll. Caput triangulare, depressum. Rostrum vltra labium prominens, acuminatum, nudum, nigrum, medio carinatum. Nares amplae, recuruae. Oris apertura sat ampla, triangularis, infra oculos vsque extensa. Labium superius integrum, laxum, crassum, pilosum, pendulum, dentes non tegens. Lingua lata, vix ex ore producenda, carnosa, apice rotundato, submembranaceo, superne papillis retrorsum acuminatis confertissime obsita et albicans; inferne rubra, glabra, frenulo laxissimo musculoso. Dentes primores superiores sex paralleli, teretes, acuminati, approximati, extimo vtrinque crassiore et tantillo longiore; inferiores sex breuissimi, quatuor maioribus obtusis, subtuberculosis, intermediis duobus tantillum interius sitis; duoque minimi granula referentes

rentes ante interſtitium dentium duorum maiorum intermediorum ſiti. Laniarii ſuperiores ſolitarii, a primoribus parum remoti molaribusque approximati; primoribus quadruplo maiores, conici, leuiſſime incurui, exterius obſolete ſtriati. Laniarii inferiores ſolitarii, vix a primoribus remoti, figura et magnitudine ſuperiorum. Molares ſupra vtrinque quatuor: primo minimo vix extra gingiuas prominente, obtuſo; ſecundo paullulum maiore, exterius acuminato; tertio omnium maximo, longitudinaliter extenſo, bicuſpidato; quarto transuerſaliter extenſo, breui, rugoſo. Molares infra vtrinque quinque, laniariis approximati: primo obtuſo; ſecundo et tertio maiore acuminato; quarto omnium maximo tricuſpidato, denticulo intermedio productiore; quinto primo ſimili. Myſtaces quinque ordinum in labio ſuperiore: ordinis ſuperioris ſetis a reliquis remotioribus in eadem cum oculis linea, ſurſum ſpectantibus, breuibus; reliquis deorſum flexis, inaequalibus, longiſſimis aures attingentibus. Setae ſupra oculum ad canthum anteriorem fere decem: duabus longioribus. Infra oculum pone canthum poſteriorem ſetae duae: ſuperiore longiore. Pone ſinum oris ſetae duae, longae, deorſum declinatae; in mento plures detritae. Oculi in medio lineae a naribus ad aures ductae poſiti, laterales, parui, profundi, elliptici; cantho anteriore acutiſſimo. Palpebrarum margo nudus. Membrana nictitans ad canthum anteriorem obſoleta, albicans. Irides et pupillae nigrae. Auriculae laterales, erectae, rotundae, amplae, breues, piloſae. Collum breue, vix capite anguſtius. Truncus elongatus, cylindricus, vix collo craſſior. Pedes trunco fere triplo breuiores, ſubaequales, poſterioribus aliquantum longioribus, omnes calcaneis incedentes. Palmae plantaeque pentadactylae piloſae, ſubtus verrucis quatuor nudis.

dis. Digiti fiſſi, palmarum longiores, pollice reliquis inter ſe fere aequalibus dimidio breuiore, digito quinto itidem breuiore. Vngues compreſſi, vncinati, acuminati, flauicantes, in palmis longiores; ſed vnguis primi plantarum latior, obtuſior, breuior reliquis. Cauda teres, attenuato-acuminata, piloſa, pilis baſin verſus longioribus. Pili corporis confertiſſimi, decumbentes, absque ſuturis et lanugine, rigidiuſculi, vix ſemipollice longiores; in capite breuiores, in cauda longiores. Caput nigrum: omni oris circumferentia, faſcia frontali infra aures extenſa, auricularumque ambitu et vertice medio albis. Truncus ſupra et ad latera brunneo luteoque varius, regione interſcapulari fere tota brunnea. Maculae luteſcentes hieme pallidiores euadunt et albeſcunt. Truncus ſubtus et pedes toti aterrimi. Caudae pili elongati baſi cineraſcentes, medio nigri, apice albidi; pili breuiores apicis caudae baſi cinerei, apice nigri. Pili omnes nitentes. Vmbilicus nullus. Mammae duodecim abdominales et inguinales, papillis minimis vix conſpicuis. Teſticuli extus non apparentes. Glans penis oſſiculo fulta. Odor empyreumaticus. Veſica fellea magna. Clauiculae nullae. Coſtae vtrinque ſeptemdecim.

Habitat in campis Tanaicenſibus, paſſim et in Polonia et Volhynia, victitans imprimis gliribus et muribus voraciſſima. Noctu praeſertim vagatur, interdiu latitans in cauernis ab aliis animalibus effoſſis, quamuis et ipſa fodiat. Arbores vix ſcandit. Agiliſſima, iracunda, irata acute fremitans, alias vix ſonum edens, caudam ſurſum et dorſum verſus pilis erectis flectens, magis ac antea foetens, caputque erigens. Vix manſueſcit. Coit verno tempore,

pore, parit poſt menſes duo catulos quatuor ad octo, validos et oculatos.

Putorius. 7. M. flauo-nigricans, ore auricularumque apicibus albis.

Silueſtris muſtela ἴκτις *Agric. an. ſubt. p.* 37.

Putorius *Geſn. quadrup. p.* 868 *cum fig.* mala.

Putorius *Schwenckf. theriotr. p.* 120.

Putorius *Aldrov. digit. p.* 329 *fig. p.* 330 mala.

Putorius *Ionſt. quadrup. p.* 154.

Putorius Iltis *Ionſt. quadrup. tab.* 64 fig. mala.

Ein Iltis *Geſn. Thierb. p.* 346 *cum fig.* mala.

Putorius *Charlet. exerc. p.* 20.

Putorius, Viuerra *Wagn. Heluet. p.* 182.

Putorius *Sibb. Scot. an. p.* 11.

Putorius *Rai. ſyn. quadr. p.* 199.

Putorius *Rzacz. Polon. p.* 236 *auct. p.* 329.

Putorius *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.

Der Iltnis *Riding. jagdb. Th. tab.* 20.

Muſtela flaueſcente nigricans, ore albo, collari flaveſcente *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 3 *n.* 8.

Der Iltis *Meyer Thiere II tab.* 6 fig. bona.

Muſtela flaueſcente nigricans, ore albo, collari flaueſcente *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 3.

Muſtela foetida. Putorius. Iltis. Teufelskind *Klein. quadrup. p.* 63.

Muſtela flaueſcente-nigricans ore albo, collari flavo. The yellowiſh-black Muſtela, with a white mouth, and a yellow collar: the Pole-cat *Hill anim. p.* 347.

Le Putois: Muſtela (Putorius) pilis in exortu ex cinereo albidis, colore nigricante terminatis, veſtita, oris circumferentia alba *Briſſ. regn. an. p.* 249 *n.* 10.

Muſtela flaueſcente nigricans, ore albo collari flaueſcente *Kram. Auſtr. p.* 312.

Der

Der Iltis, Stinkthier *Hall. vierf. p.* 456.
Mustela (Putorius) plantis fissis; corpore flauo nigricante, ore auriculisque albis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 46 *n.* 6.
Le Putois *Buff. hist. nat. VII p.* 199 *tab.* 23.
Putois *Dictionn. anim. III p.* 626.
Bontsem: Wezel met gespleeten Voetzoolen, het Lyf zwartagtig geel, de Bek en Oorlapjes wit *Houtt. nat. hist. II p.* 200.
Mustela (Putorius) pedibus fissis, corpore flauo-nigricante, ore auriculisque albis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 6 *n.* 16.
The Polecat *Penn. brit. zool. p.* 37 *cum fig.* bona.
Ilder *Pontopp. Dan. I p.* 611.
Putois *Bom. dictionn. III p.* 674.
Mustela (Putorius) pedibus fissis, corpore flauo nigricante, ore auriculisque albis *Linn. syst nat.* 12, *I p.* 67 *n.* 7.
Mustela Putorius *Forster: Philos. transact. LVII p.* 342.
The Polecat *Penn. syn. quadr. p.* 213 *n.* 152.
Puzzolente *Aless. quadrup. II tab.* 72 fig. Buff.
Der Iltis *Müll. Naturs. I p.* 269.
Mustela Putorius *Schreb. Säugth. III tab.* 131 fig. propr.
Mustela (Putorius) pedibus fissis, corpore flauo nigricante, ore auriculisque albis *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 13.
Der Iltis *Mart. Buff. vierf. IV p.* 169 *tab.* 63.
Putoro *Hispanis.*
Foetta, Puzolo, Puzzolente *Italis.*
Putois *Gallis.*
Ffwlbard *Cambrensibus.*
Iltis, Ulk, Bentfing *Germanis.*
Bontsem *Belgis.*
Polecat, Fitchet, Fummer *Anglis.*
Ilder *Danis.*

Iller

Iller *Scanis*.
Boaaid, Boitta; Goa-aige (*mas*) Gaa-fe (*femina*) *Lapponibus*.
Tchorz *Polonis*.
Λасица (Laſitza), Λасочка (Laſoczka) *Ruſſis*.

Longitudo corporis 17 pollicum, caudae 6 poll. Auriculae breues, latae, ſubrotundae. Naſus acutus. Crura breuia. Totum corpus ex flauo nigricans, circumferentia oris et apice aurium albis. Cauda nigra, valde piloſa.

Habitat inter Europae temperatae, non frigidae, rupes et lapidum aceruos circa domos. Noctu praedatur Cuniculos, Gallinas, Auiculas, Oua. Ano halitu foetidiſſima. Curſu celer. Coit vere paritque quinque ad ſex.

Furo. 8. M. corpore pallide flauo.
Ικτις *Ariſt. hiſt. anim. IX c.* 9 *n.* 108.
Viuerra *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 55 (*c.* 81 *Hard.*).
Muſtela ſilueſtris *Plin. hiſt. nat. XXIX c.* 4 (*c.* 16 *Hard.*).
Viuerra *Agric. an. ſubt. p.* 40.
Muſtela ſilueſtris *Geſn. quadrup. p.* 862.
Viuerra vel muſtela ruſtica, Ictis *Geſn. quadrup. p.* 862.
Furo *Geſn. quadrup. p.* 863 *fig. p.* 862.
Ictis *Geſn. quadrup. p.* 864.
Muſtela ſilueſtris *Aldrov. digit. p.* 325 *fig. p.* 327 mediocr.
Muſtela ſilueſtris *Ionſt. quadrup. p.* 154.
Frett, Frettel oder Furettel *Geſn. Thierb. p.* 344 *cum fig.* mediocr.
Viuerra *Charlet. exerc. p.* 20.
Viuerra *Sibb. Scot. an. p.* 11.
Muſtela ſilueſtris Viuerra dicta *Rai. ſyn. quadr. p.* 198.

Muftela filueftris *Rzacz. Polon. p.* 235.
The Ferret *Shaw trav. p.* 249.
Viuerra *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 44.
Das Frettel *Meyer Thiere II tab.* 22.
Muftela filueftris Viuerra dicta *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 4.
Muftela Viuerra dicta *Klein. quadrup. p.* 63.
Muftela albido-flauefcens capite depreffo: The yellowifh-white Muftela, with a flatted head: the Ferret *Hill anim. p.* 548.
Le Furet: Muftela (Viuerra mas) pilis fubflauis, longioribus caftaneo colore terminatis veftita. (Viuerra foemina) pilis ex albo fubflauis *Briff. regn. an. p.* 244 *n.* 3.
Das Fret oder der Kaninchenjäger, Kaninchenwiefel *Hall. vierf. p.* 456.
Muftela (Furo) plantis fiffis, oculis rubicundis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 46 *n.* 7.
Le Furet *Buff. hift. nat. VII p.* 209 *tab.* 26.
Le Furet Putois *Buff. hift. nat. VII tab.* 25.
Furet *Dictionn. anim. II p.* 229.
Fret: Wezel met gefpleeten Voetzoolen, de Oogen roodagtig *Houtt. nat. hift. II p.* 203.
Fritter *Pontopp. Dan. I p.* 612.
Muftela (Furo) pedibus fiffis, oculis rubicundis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 68 *n.* 8.
The Ferret *Penn. fyn. quadr. p.* 214 *n.* 153.
Furetto *Aleff. quadrup. II tab.* 71 fig. Buff.
Furetto puzzolente *Aleff. quadrup. II tab.* 73 fig. Buff.
Der Kaninchenwiefel *Müll. Naturf. I p.* 271.
Muftela Furo *Schreb. Säugth. III tab.* 133 fig. propr.
Das wilde Wiefel *Mart. Buff. vierf. IV p.* 177 *tab.* 64.
Das gelbe Wiefel *Mart. Buff. vierf. IV tab.* 65.
Huron *Hifpanis.*
Forão, Foram *Lufitanis.*
Furetto, Donnola *Italis.*

Furet

Furet *Gallis.*
Frett, Frettel *Germanis.*
Fret *Belgis.*
Ferret *Anglis.*
Fritt *Danis.*
Laská, Lasica lésna *Polonis.*
Nimse *in Barbaria.*

Putorio minor, corpore 14 poll. longo, cauda $5\frac{1}{2}$ poll. Nasus acutissimus. Auriculae rotundatae, arrectae, patulae, breues. Oculi rubicundi. Color corporis pallidissime flauus, in mare obscurior. Femina minor est.

Habitat in Africa, olim in Hispaniam translata ad destruendos Cuniculos, nunc et in reliqua Europa, passimque domestica pro cuniculi venatione. Victitat cuniculis, quorum sanguinem potat, raro carnem dilacerat. Agilis. Vterum fert 6 hebdom. paritque 5-9. Mansuescit. Foetet vt Putorius.

Coit cum Putorio, negante id quidem Buffonio; atque ex hoc parit pullos obscurioris coloris; num forte huius varietas?

Zibellina. 9. M: corpore obscure fuluo, fronte exalbida, gutture cinereo.

Zobela *Agric. an. subt. p.* 39.
Mustela Sobella *Gesn. quadrup. p.* 869.
Mustela Zibellina dicta *Aldrov. digit. p.* 335.
Mustela Zibellina *Ionst. quadrup p* 156.
Mustela Zobela, Zobelwieselein, Zobel *Gesn. Thierb. p.* 347.
Sebellinae *Scheff. Lappon. p.* 343.
Mustela Zibellina, Aristoteli Satherius, Nipho Cebalus, Alciato Mus Sarmaticus et Scythicus *Charlet. exerc. p.* 20.

Muſtela Zibellina *Rai. ſyn. quadr. p.* 201.
Muſtela Sobella *Rzacz. Polon. auct. p.* 317.
Zobeln oder Sobeln *Strahlenb. Aſ. p.* 430.
Muſtela Zibellina *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.
Muſtela Zibellina *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 7.
Muſtela Zibellina *Klein. quadrup. p.* 64.
Kankaragaiſche Zobel *I. G. Gmelin Sibir. I p.* 253?
Zobel *I. G. Gmelin Sibir. I p.* 391.
Muſtela fulua auribus cineraſcentibus. The brown Muſtela, with grey ears: the Sable *Hill anim. p.* 548.
Muſtela Zibellina *I. G. Gmelin: Nov. comment. petrop. V p.* 338 *tab.* 6.
La Marte Zibelline: Muſtela (Martes Zibellina) obſcure fulua, gutture cinereo *Briſſ. regn. an. p.* 248 *n.* 9.
Der Zobel *Hall. vierſ. p.* 459.
Muſtela (Zibellina) plantis fiſſis, corpore obſcure fuluo, fronte exalbida, gutture cinereo *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 46 *n.* 8.
Der Zobel *Müll. Samml. III p.* 495.
Zibeline *Dictionn. anim. IV p.* 589.
Sabeldier: Wezel met de Voetzoolen geſpleeten, het Lyf donker vaal, voor op den Kop witagtig, aan de Keel Aſchgraauw *Houtt. nat. hiſt. II p.* 204.
Zibeline *Bom. dictionn. IV p.* 650.
La Zibeline *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 309.
Muſtela (Zibellina) pedibus fiſſis, corpore obſcure fuluo, fronte exalbida, gutture cinereo *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 68 *n.* 9.
The Sable *Penn. ſyn. quadr. p.* 217 *n.* 156.
Der Zobel *Müll. Naturſ. I p.* 272.
Zobel *Stell. Kamtſch. p.* 119.
Marta Cebellina, Marta Cevellina *Hiſpanis.*
Forão de Scythia *Luſitanis.*
Zibellino *Italis.*
Marte Zibelline *Gallis.*

Zobel,

Zobel, Zobelthier *Germanis.*
Sabeldier *Belgis.*
Sable *Anglis.*
Sabbel *Suecis.*
Sobol *Polonis.*
Соболь (Sobol') *Ruſſis.*
Недособоль (Nedoſobol') animal aeſtate vel autumno captum pelle viliore *Ruſſis.*
Kaltan *in Krasnojarsk.*
Kyſch *Bulgaris.*
Bulgan *Calmyccis.*
Bula *Burätis.*
Kymich Chym, Chymchymka *Kamtſchadalis.*
Kuiſch *Tataris.*
Lumuſch *Tſcheremiſſis.*
Stör *Wotiakis.*
Sobol *Morduanis.*
Nîſch *Sirjänice.*

Longitudo corporis 18 poll. caudae 12 poll. femina paulo minore. Color fuluo - obſcurus gutture cinereo, anteriore capitis parte et auriculis rotundatis ex albido cinereis. Vibriſſae ad ſupercilia, nares, os, longiſſimae: Cauda longius piloſa. Vngues albi.

Variat rariſſime colore albo aut flauicante.

Habitat in Aſia ſeptentrionali, Tataria, Sibiria vsque in Kamtſchatkam, vbi hodie rarior. Raro quoque in Lapponia occurrit. Degit in ſiluis antiquis deſertis. Latet in terrae caueis aut ſub arborum radicibus; interdum nidum parat in arboribus vti Martes. Salit egregie ex arbore in arborem. Agillima, praecipue noctu, die dormit. Pugnat cum ipſo Cato. Victitat aeſtate Ermineis, Sciuris,

 Lepo-

Leporibus; autumno baccis; hieme auiculis. Excrementa pessime olent. Parit fine Martii et initio Aprilis mensis catulos tres ad quinque, quos lactat per quatuor aut quinque hebdomades.

Ob pellem pretiosissimam capitur a Nouembri mense in Februarium vsque. Maxime aestimatur nigra, pilosissima. Optimae capiuntur circa Nertschinsk et Iakuzk. Laqueum quo capitur animal describit depingitque *Pallas Reis. II p.* 227 *tab.* 7.

Pennanti. 10. M. corpore nigro, lateribus fuscis.
The Fischer Weesel *Penn. syn. quadr. p.* 223 *n.* 157.

Longitudo corporis 28 pollicum, caudae 17 poll. Auriculae latae, rotundatae, nigricantes, albo marginatae. Nasus niger. Vibrissae magnae, setosae. Facies collique latera pallide fusca siue cinerea nigro admixto. Dorsum, venter, crura et cauda nigra, basi fuscescente. Latera fusca. Pedes lati, vsque ad volas pilosi. Digiti postice saepe quatuor. Vngues acuti, fortes, curuati, albi. Crura anteriora posticis breuiora. Cauda pilis longis.

Habitat in America boreali, vulgaris, victitans quadrupedibus minoribus. Pennanto eiusdem cum Zibellina speciei esse videtur.

sibirica. 11. M. fulua palmis plantisque hirsutissimis.
Eine noch nicht beschriebene Wieselart *Pallas Reis. II p.* 570.
Mustela sibiria *Pallas Reis. II p.* 701.
Die sibirische Wiesel *Müll. Naturs. Suppl. p.* 34.
Кулоннокъ (Kulonnok), Хорокъ (Chorok) *Russis.*
Kulon *Tataris.*

Nonno

Nonno *Tungusis.*
Scholongo *Burätis.*

Magnitudo fere Putorii, sed forma potius Ermineae; longiores tamen pedes sunt et cauda. Rostrum ad oculos vsque nigrum, sed circa nares album, guttatum versus oculos. In reliquo toto corpore color intense fuluus, subuniformis, tamen subtus et versus caput paullo dilutior. Gula saepe guttis albis adspersa. Palmae plantaeque subtus hirsutissimae, cano-argentatae. Cauda dimidia animalis longitudine, villosissima, intensiore quam dorsum colore. Vellus vbique laxius longiusque quam in Putorio vel Furone. Longitudo corporis 12 pollicum, caudae 6 poll. sed dantur minores.

Habitat in Sibiriae montanis silvis densissimis, omnivora, ad pagos hieme non raro accedens.

vulgaris. 12. M. corpore ex rufo fusco subtus albo.

Mustela quae in domibus nostris oberrat *Plin. hist. nat.* XXIX *c.* 4 (*c.* 16 *Hard.*).
γαλῆ *Aelian. anim. IV c.* 14. *XII c.* 5.
Mustela domestica, visela *Agric. an. subt. p.* 36.
Mustela proprie sic dicta *Gesn. quadrup. p.* 851 *cum fig.* mediocr.
Mustela *Schwenckf. theriotr. p.* 116.
Mustela vulgaris *Aldrov. digit. p.* 307.
Mustela vulgaris *Ionst. quadrup. p.* 152.
Mustela. Wiesel *Ionst. quadrup. tab.* 64 fig. bona.
Ein Wieselein oder Wiesel: etliche nennen es Hermelein, andere Häermlein *Gesn. Thierb. p.* 342 *cum fig.* mal.
Mustela *Charlet. exerc. p.* 20.
Mustela vulgaris *Sibb. Scot. an. p.* 11.

Lavellan Animal in Cathaneſia frequens *Sibb. Scot. an. p.* 11?
Muſtela vulgaris *Rai. ſyn. quadr. p.* 195.
Muſtela *Rzacz. Polon. p.* 235.
Muſtela alba vulgaris *Rzacz. Polon. p.* 235.
The Weeſel *Brick. North-Carol. p.* 129.
The Weeſel *Shaw trav. p.* 249.
Muſtela vulgaris *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.
Wieſel *Riding. jagdb. Th. tab.* 19.
L'Hermine *Charlev. nouv. Fr. III p.* 134.
Muſtela caudae apice atro *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 3 *n.* 9.
Das weiſſe Wieſel *Meyer Thiere II tab.* 23.
Das rothbraune Wieſel *Meyer Thiere II tab.* 24.
Muſtela caudae apice atro *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 5.
Muſtela vulgaris *Klein. quadrup. p.* 62.
Muſtela caudae apice atro. The Muſtela, with the tip of the tail black: the Weaſel *Hill anim. p.* 547.
Muſtela (erminea) caudae apice atro *Linn. muſ. Ad. Frid. I p.* 5.
La Belette: Muſtela (vulgaris) ſupra rutila, infra alba *Briſſ. regn. an. p.* 242 *n.* 1.
Muſtela caudae apice atro *Kram. Auſtr. p.* 312.
Die gemeine Speicherwieſel *Hall. vierſ. p.* 454.
Muſtela (Erminea) plantis fiſſis, caudae apice atro *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 46 *n.* 9.
Ein beſonderes Geſchlecht von Hermelinen *Müll. Samml. III p.* 517.
La Belette *Buff. hiſt. nat. VII p.* 225 *tab.* 7 *fig.* 1.
Belette *Dictionn. anim. I p.* 269.
Hermyn-Wezel: Wezel met geſpleeten Voetzoolen, de Staart aan 't end zwart *Houtt. nat. hiſt. II p.* 206 *tab.* 14 *fig.* 5.
Muſtela (Erminea) pedibus fiſſis, caudae apice atro *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 6 *n.* 17.
The Weeſel *Penn. brit. zool. p.* 39 *cum fig.* bon.
Lækatten eller Væſelen *Pontopp. Dan. I p.* 611.
Belette *Bom. dictionn. I p.* 262.

Muſtela

Muftela (Erminea) pedibus fiffis; caudae apice atro *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 68 *n.* 10.
The common Weefel *Penn. fyn. quadr. p.* 212 *n.* 151.
Donnola *Aleff. quadrup. II tab.* 70 fig. Buff.
Die gemeine Wiefel *Pallas Reif. I p.* 129.
Common Weefel *Forfter: Philof. transact. LXII p.* 373.
Der Hermelin *Müll. Naturf. I p.* 274 *tab.* 14 *fig.* 5 Houtt.
Muftela Erminea *Schreb. Säugth. III tab.* 137 *A* fig. propr.
Muftela (Erminea) pedibus fiffis, caudae apice atro *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 14.
Das gemeine Wiefel *Mart. Buff. vierf. IV p.* 186 *tab.* 66.
Comadreia *Hifpanis.*
Doninha *Lufitanis.*
Donnola, Ballottula, Benula *Italis.*
Belette *Gallis.*
Bronwen *Cambrenfibus.*
Wiefel *Germanis.*
Wezel *Belgis.*
Weefel, Weafel *Anglis.*
Foumart, Fitchet *Eboracenfibus.*
Whitred *Scotis.*
Læ-kat, Væfel *Danis.*
Rös-kat *Noruegis.*
Wefla *Smolandis.*
Lafká, Laficzká *Polonis.*
Ласмицки (Lasmitzki) *Ruffis.*
Fert el Heile *in Barbaria.*

Longitudo corporis 6-7 pollicum, caudae $2\frac{1}{2}$ poll. Oculi parui, nigri. Auriculae paruae, rotundatae. Caput et corpus fupra ex rufo fufca, fubtus alba. Macula fufca infra angulos oris.

 Habitat

Habitat in temperatis Europae et in Africa boreali, rarior in Europa boreali, corpore toto albo. Eft quoque in America boreali, nifi forte haec vera Erminea fit. Degit in filuis et ad domos. Edit gallinulas, oua, cuniculos iuniores, pifces, carnes, mures, fungos, non plantas. Auariffima portat praedam in fuas latebras, neque edit animalcula, ybi ea occidit. Foetida, immunda, fiticulofa, noctu praedatur, muribus peffima, quos totos relictis folis dentibus confumit; eorum adeo foramina intrat. A Fele non facile occiditur. Recurrens accurrensque continuo profpicit; terrefacta epilepfia conuellitur. Parit quatuor ad fex coecos. Pellis et excrementa valde foetent.

Erminea. 13. M. auricularum marginibus albis, caudae apice nigro.

Mus Ponticus, quem hodie vocant Hermelam *Agric. an. fubt. p.* 33.

Armelini *Gefn. quadrup. p.* 852.

Muftela candida *Schwenckf. theriotr. p.* 118.

Muftela candida in extrema cauda nigricans *Aldrov. digit. p.* 310 fig. mediocr.

Hermellani *Ionft. quadrup. p.* 153.

Hermelini *Scheff. Lappon. p.* 343.

Hermellanus *Charlet. exerc. p.* 20.

Muftela alpina candida *Wagn. Heluet. p.* 180.

Muftela candida f. animal Ermineum recentiorum *Rai. fyn. quadr. p.* 198.

Muftela alba, Turnebio Hermelinus *Rzacz. Polon. p.* 235 *auct. p.* 328.

Muftela candida f. Ermineum *Linn. fyft. nat. 6 p.* 5 *n.* 6.

Muftela Armellina *Klein. quadrup. p.* 63.

Muftela niuea auribus anguftis, caudae apice nigro. The white Muftela, with narrow ears, and the tip of the tail black: the Ermin *Hill anim. p.* 548.

L'Her-

L'Hermine: Muftela hieme alba, aeftate fupra rutila infra alba; caudae apice nigro *Briff. regn. an. p.* 243 *n.* 2.

Das Hermelin *Hall. vierf. p.* 455.

Hermelinen *Müll. Samml. III p.* 516.

L'Hermine ou le Rofelet *Buff. hift. nat. VII p.* 240 *tab.* 7 *fig.* 2.

Hermine *Dictionn. anim. II p.* 430.

When brown, the Stoat; when white, the Ermine *Penn. brit. zool. p.* 40 *cum fig.* bon.

Ermellino *Aleff. quadrup. II tab.* 74 fig. Buff.

Hermeline *Pallas Reif. I p.* 129.

Der Hermelin *S. G. Gmelin Reif. II p.* 192, *III p.* 370.

Muftela ermineum maius *S. G. Gmelin Reif. II tab.* 23.

Stoat and Ermine *Forfter: Philof. transact. LXII p.* 373.

Hermelins *Stell. Kamtfch. p.* 125.

Muftela Erminea β *Schreb. Säugth. III tab.* 137 *B* fig. propr.

Das Hermelin *Mart. Buff. vierf. IV p.* 196 *tab.* 67.

Armiño, Armelina *Hifpanis.*

Arminho *Lufitanis.*

Armellino, Ermellino *Italis.*

Rofelet *(fufca)*, Hermine *(alba) Gallis.*

Carlwm *Cambrenfibus.*

Hermelin *Germanis.*

Hermyn *Belgis.*

Stoat *(fufca)*, Ermine *(alba) Anglis.*

Hermelin *Noruegis.*

Hermelin, Lekatt *Suecis.*

Gronoftay *Polonis.*

Горносmай (Gornoftai) *Ruffis.*

Ielek *Tungufis.*

Ujing *Burätis.*

Sic-cufe-fue *in America boreali.*

Differre

Differre omnino videtur a praecedente, quacum eam confundit perill. Linneus aliique.

Maior M. vulgari, longitudine corporis 10 poll. caudae $5\frac{1}{2}$ poll. Corpus ſupra pallide fuſcum, marginibus auricularum apicibusque digitorum ex flauicante albis. Gula, pectus, venter, alba. Caudae apex perpetuo niger.

Habitat in Europa Aſiaque boreali in ſiluis rarioribus betulinis et locis vliginoſis. Hieme tota alba excepto caudae apice; redeunte verno tempore colore ruſo-fuſco. Pellis pretioſa. Optimae ſunt ex prouincia Iſetenſi; peſſimae circa Irkuzk capiuntur.

Das verkehrte Hermelin *Hall. vierf. p.* 462 corpore nigro, cauda alba, quid?

niualis. 14. M. corpore albo, caudae apice vix pilis vllis nigris.

Muſtela (niualis) caudae apice vix pilis vllis nigris *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 7 *n.* 18.

Muſtela (niualis) pedibus fiſſis, corpore albo, caudae apice vix pilis vllis nigris *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 69 *n.* 11.

Der Schneewieſel *Müll. Naturf. I p.* 276.

Muſtela niualis *Schreb. Säugth. III tab.* 138.

Muſtela (niualis) pedibus fiſſis corpore albo, caudae apice vix pilis nigris *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 15.

Snee-Muus *Danis.*

Snömus *Suecis.*

Seibbſh *Lapponibus.*

Ласка (Laſka) *Ruſſis.*

Unagin *Burätis.*

Simil-

Simillima Ermineo, ſed dimidio minor; niuea caudae apice pilo vix vno alteroue nigro.

Habitat in Weſtrobothnia.

Videant autoptae, num forte ſit varietas alba Muſtelae vulgaris, vti putat Pennantus forteque doctiſſ. Schreberus; quam Linneus quidem confundit cum M. Erminea, quae maior.

Gulo. 15. M. corpore rufo-fuſco, medio dorſi nigro.

Gulo *Geſn. quadrup. p.* 623 *cum fig.* mala.
Gulo *Ol. Magn. ſept. p.* 605.
Roſſomaka *Nieremb. hiſt. nat. p.* 188.
Gulo *Aldrov. digit. p.* 178.
Gulo *Ionſt. quadrup. p.* 131.
Gulo. Vielfraes *Ionſt. quadrup. tab.* 57 fig. mala.
Ein ander Vielfraſz *Geſn. Thierb. p.* 358.
Gulones *Scheff. Lappon. p.* 339.
Gulo *Charlet. exerc. p.* 15.
Veelvraaten *Ysbr. Reiſ. p.* 21.
Gulo *Rzacz. Polon. p.* 218 *auct. p.* 311.
Gulo *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.
Muſtela rufo-fuſca; medio dorſi nigro *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 2 *n.* 6.
Muſtela rufo-fuſca: medio dorſi nigro *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 1.
Gulo. Vielfraſs *Klein. quadrup. p.* 83 *tab.* 5 fig. mala. Confundit praeterea animal noſtrum cum Cane Hyaena.
Vielfraſs *I. G. Gmelin. Sibir. III p.* 492.
Muſtela rufo-fuſca medio dorſi nigro. The reddiſh-brown Muſtela, with the middle of the back black: the Gulo *Hill anim. p.* 546 *tab.* 27 fig. mala.
L'Hyene: Hyaena *Briſſ. regn. an. p.* 233 *n.* 1. confuſa cum Cane Hyaena.

Muſtela

Mustela ruso-fusca: medio dorsi nigro *Kram. Austr. p.* 311.

Der Vielfras *Hall. vierf. p.* 548.

Mustela (Gulo) plantis fissis, corpore ruso-fusco medio dorsi nigro *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 45 *n.* 3.

Vielfrasse *Müll. Samml. III p.* 549.

Goulu *Dictionn. anim. II p.* 283.

Veelvraat: Weezel met de Voetzoolen gespleeten, het Lyf bruin ros, op 't midden van de Rug Zwart *Houtt. nat. hist. II p.* 189. *tab.* 14 *fig.* 4 mala.

Mustela (Gulo) pedibus fissis, corpore ruso-fusco: medio dorsi nigro *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 5 *n.* 14.

Rossomack *Bell trav. I p.* 221.

Glouton *Bom. dictionn. II p.* 333.

Goulu *Bom. dictionn. II p.* 343.

Le Glouton *Buff. hist. nat. XIII p.* 278 confundit cum Vrso lusco.

Mustela (Gulo) pedibus fissis, corpore ruso-fusco, medio dorsi nigro *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 67 *n.* 5.

Rosomach, Vielfrass *Rytschk. Orenb. I p.* 237.

Mustela Gulo Linnaei oder Iaerven *Gunnerus: Act. nidros. III p.* 121 *tab.* 3 *fig.* 5.

The Glutton *Penn. syn. quadr. p.* 196 confundit cum Vrso lusco.

Der Vielfrass *Müll. Naturs. I p.* 265 *tab.* 14 *fig.* 4 Houtt.

Rosomaken oder Vielfrässe, Timuch genannt *Stell. Kamtsch. p.* 118.

Vrsus Gulo *Schreb. Säugth. III tab.* 144 fig. act. holmiens. 1773.

Mustela (Gulo) pedibus fissis, corpore ruso-fusco medio dorsi nigro *Müll. Dan. prodr. p.* 3 *n.* 11.

Vielfrass *Germanis.*

Ierf, Iärv, Filfras *Noruegis.*

Iärf, Filfrass *Suecis.*

Gieddk *Lapponibus.*

Roſomak *Polonis.*
Роcамака (Roſamaka) *Ruſſis.*
Tſchatak *Tungùſis.*

Dentes Primores ſuperiores ſex: intermediis quatuor aequalibus vtroque latere quaſi lobatis; extimis longioribus altero latere lobatis. Inferiores ſex, obtuſiſſimi: horum duo alterni interiores. Laniarii ſuperiores ſolitarii, antice remoti, extus rugoſi; inferiores ſolitarii vtrinque approximati. Molares ſuperiores quinque; inferiores ſex: omnes lobati primo vltimoque minuto.

Mihi obſcurum adhucdum animal, nondum enim legi, quae habent de eo acta holmienſia anni 1773. Ex Vrſi genere eſſe audio. Confuſum a variis auctoribus tam cum Cane Hyaena, quam cum Vrſo luſco, animalibus diuerſiſſimis.

Habitat in Lapponiae, Ruſſiae, Sibiriae ſiluis vaſtiſſimis. Victitat Leporibus, Auibus, Rangiferis, Ceruis, cadaueribus. Voraciſſima beſtia deiicit ſe ex arboribus in animalia praetereuntia. Lenta inceſſu. Ludibundam dicit Stellerus.

Coit Ianuario menſe, parit Maio pullos duo vel tres. Admittit vulpem (*Linn.*). Pellis praeſtantiſſima, olim pretioſiſſima, non hodie. Foetor horrendus, ob quem vix excoriandum animal.

43. VIVER-

43. VIVERRA.

Dentes Primores vtrinque VI: intermediis breuioribus.

Molares plures quam tres.

Lingua retrorſum ſaepe aculeata.

Vngues exſerti.

Ichneumon. 1. V. cauda e baſi incraſſata ſenſim attenuata, pollicibus remotiuſculis.

Ἰχνεύμων *Ariſt. hiſt. anim.* VI c. 35 n. 422.

Ichneumon *Plin. hiſt. nat.* VIII c. 24, 25 (c. 35 - 37 *Hard.*) X c. 63 (c. 83 *Hard.*).

Ἰχνεύμων *Aelian. anim.* III c. 22. X c. 47.

Ἰχνεύμων *Oppian. cyneg.* III, 407.

Quil vel Quirpele *Garc. arom.* p. 214.

Ichneumon *Geſn. quadrup.* p. 635 *cum fig.* mala.

Ichneumon *Bellon. aquat.* p. 44 *fig.* p. 45 mediocr.

Ichneumon *Bellon. obſ.* p. 96 *cum fig.* mediocr.

Muris genus ſiluestre, quod indigenae Murem Pharaonis appellant *Alp. Aeg.* I p. 234 *tab.* 14 *fig.* 3 Bellon.

Ichneumon *Aldrov. digit.* p. 298 *fig.* p. 301 mediocr.

Ichneumon *Ionſt. quadrup.* p. 151.

Ichneumon ſ. lutra Aegypti *Ionſt. quadrup. tab.* 67 fig. Bellon.

Mus Indicus *Ionſt. quadrup. tab.* 67 fig. mala.

Indianiſche Mauſz. Ichneumon *Geſn. Thierb.* p. 273 *cum fig.* Bellon.

Ichneumon *Charlet. exerc.* p. 19.

Viuerra Indica Quil el Quirpele dicta *Rai. ſyn. quadr.* p. 197.

Viuerra Indica ex griſeo rufeſcens *Rai. ſyn. quadr.* p. 198.

Ichneumon *Rai. ſyn. quadr.* p. 202.

Der Maushund *Kolbe Vorgeb.* p. 159.

Viuerra

Viuerra Mungo *Kämpf. amoen. exot. p.* 574 *fig. p.* 567 mediocr.

De Mongkos *Valent. Amboin. III p.* 293 *cum fig.* bona.

Ichneumon seu vulpecula ceylonica *Seb. thes. I p.* 66 *tab.* 41 *fig.* 1.

L'Ichneumon, ou Rat de Pharaon *Maillet Aeg. II p.* 33.

The Ichneumon *Shaw trav p.* 249 *cum fig.* mediocr.

Der kleine ceylanische Fuchs *Meyer Thiere III tab.* 16 *fig.* 16.

Mustela glauca *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 9.

Meles vnguibus vniformibus, leucophaea *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 2.

Mustela quaedam Mungo dicta *Linn. amoen. acad. II p.* 97.

Mustela aegyptiaca *Klein. quadrup. p.* 64.

Mustela ceylonica *Klein. quadrup. p.* 65.

The Indian Ichneumon *Edw. birds IV tab.* 199.

Mustela griseo et albido variegata. The grey and white variegated Mustela: the tabbied Mungo *Hill anim. p.* 549.

Mustela ferruginea cruribus longioribus. The ferrugineous Mustela, with longer legs: the brown Mungo *Hill anim. p.* 550.

Meles vnguibus vniformibus leucophaea. The bluish Meles, with uniform claws: the Ichneumon *Hill anim. p.* 557.

Serpenticida seu Moncus *Rumph. herb. amb. auct. p.* 69 *tab.* 28 *fig.* 2, 3.

Le Furet des Indes: Mustela (Viuerra indica) ex griseo rufescens *Briss. regn. an. p.* 245 *n.* 4.

L'Ichneumon ou la Mangouste, vulgairement le Rat de Pharao: Mustela (Ichneumon, mus Pharaonis vulgo) pilis ex albido et nigricante variegatis vestita *Briss. regn. an. p.* 250 *n.* 12.

Meles (Ichneumon) digitis mediis longioribus, lateralibus aequalibus, vnguibus fubuniformibus *Hasselqu. Palaest. p.* 271.
Die Pharaonsmaus. Ichnevmon *Hall. vierf. p.* 460.
Das Ceilonifche Füchsgen *Hall. vierf. p.* 461 *tab.* 29.
Viuerra (Ichneumon) cauda e bafi incraffata fenfim attenuata *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 43 *n.* 1.
Furet des Indes *Dictionn. anim. II p.* 230.
Ichneumon *Dictionn. anim. II p.* 528.
Rat d'Aegypte *Dictionn. anim. III p.* 669.
Fret, welker Staart van den Wortel af verdient Zynde, allengs weder dun wordt *Houtt. nat. hist. II p.* 248 *tab.* 13 *fig.* 1 Sebae.
Ichneumon ou Mangoufte *Bom. dictionn. II p.* 571.
La Mangoufte *Buff. hist. nat. XIII p.* 150 *tab.* 19.
Viuerra (Ichneumon) cauda e bafi incraffata fenfim attenuata, pollicibus remotiufculis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 63 *n.* 1.
The Ichneumon *Penn. fyn. quadr. p.* 226 *n.* 162.
Mangufta *Aleff. quadrup. IV tab.* 158 fig. Buff.
Die indianifche Maus oder der Ichnevmon *Berl. Samml. IV p.* 370 *cum fig.*
Pharaoratze *Müll. Naturf. I p.* 244 *tab.* 13 *fig.* 1 Sebae.
Viuerra Ichneumon *Forsk. fn. orient. p. III.*
Viuerra Ichneumon *Schreb. Säugth. III tab.* 116 fig. Buff.
Viuerra Ichneumon β *Schreb. Säugth. III tab.* 116 *B* fig. Vosmaerii.
Tezer-dea *in Africa boreali.*
Nems *Aegyptiis.*

Magnitudo Cati, vel paullo maior, longitudine corporis 20 pollicum, caudae 18 poll. Caput prominens, oblongum. Latera capitis iuxta aures compreffa, infra oculos longitudinaliter parum protuberantia. Vertex fubconuexus. Frons valde decliuis, feu

ſeu perpendiculariter fere a vertice pergens, fere plana, ſenſim verſus oculos vsque ad roſtrum anguſtata. Roſtrum longiuſculum, dorſo conuexum, deorſum valde anguſtatum, inde ad latera verſus marginem maxillae ſuperioris decliue, planiuſculum, verſus oculos valde depreſſum et quaſi excauatum, nudiuſculum, apice nudum, obtuſiuſculum, ſubcalloſum, integerrimum. Maxilla ſuperior, quae totum roſtrum conſtituit, inferiore multo longior; ſubtus integra ſulco paruo in medio notata. Inferior triangularis, apice obtuſa. Nares ſemilunares, ad apicem roſtri iuxta latera eius. Margo ſuperior narium valde conuexus vel gibboſus, gibbere ex dorſo apicis roſtri prodeunte. Oculorum orbita ablonga, ad vtrumque canthum anguſtata, anterius et ad latera excauata. Oculi proxime ſupra roſtrum, ad latera capitis, perpendiculariter ſub auriculis, parui, extra orbitam non exſtantes. Pupilla elliptica, atra. Iris griſea. Auriculae iuxta baſin capitis, ad latera eius, rotundatae, breues, erectae, lanuginoſae, ambitu amplae ratione corporis. Apertura aurium ampla. Lobi duo erecti, lanuginoſi, lati, paralleli, apice ciliati, lineares in anthelice. Pili rigidiuſculi, copioſi, erecti ad tempora, qui aurium aperturam tegunt. Labia latiuſcula, reflexilia, dentes vtrinque tegunt, quorum inferius antice immobile. Myſtaces breues, ſparſi, parum rigidi, ſimplici ſerie longitudinali in vtriusque labii margine diſponuntur in vtraque maxilla. Dentes primores ſupra et infra ſex, breviuſculi, apice obtuſi, exterius conuexi, interius planiuſculi, ſulco paruo longitudinali in medio interioris ſuperficiei notati, aequales. Laniarii ſolitarii: ſuperiores longiuſculi, compreſſi, extus conuexi, intus parum incuruati; inferiores erecti, craſſiuſculi, recti, extus plani, ſulcati, obtuſi. Molares ſupra vtrinque duo lobati: lobis tribus. Rictus

 oris

oris mediocris. Apertura oris ſubtus. Lingua plana, apice obtuſa, ſuperficie ſuperiore ſcabra, aculeis breuibus retrorſum ſpectantibus. Collum breviſſimum, cylindricum, capiti et corpori parallelum, hoc paullo anguſtius. Corpus cylindricum, ſupra caudam paruum decliue. Abdomen planiuſculum. Lumbi compreſſi, anteriores poſterioribus breuiores. Poſtici anterius craſſiores. Crura anterius conuexa, piloſa, pone planiuſcula nuda; anteriora poſticis breuiora. Digiti vtrinque quinque: pollice breuiſſimo, a reliquis remotiſſimo; ex reliquis digitis medii lateralibus longiores, aequales. Omnes ſubtus lobati, baſi membrana connexi. Vngues antici compreſſi, acuminati, parum arcuati, ſubtus longitudinaliter excauati, terminales, aequales. Poſtici fere recti, compreſſi, dorſo conuexi, apice obtuſi, ſubtus longitudinaliter excauati; terminales, aequales, anticis paullo breuiores et craſſiores. Cauda conica, baſi craſſior vsque ad apicem attenuata, piloſa, longitudine fere corporis. Folliculus ante anum circularis, amplus, ex marginibus ani reflexibilibus conſtructus. Mammae inguinales approximatae. Pili totius corporis ſtricti, breues, ſubrigidi, ſupra longiuſculi, albido et griſeo nigreſcentes annulati; roſtro et pedibus griſeo-nigreſcentibus.

Habitat in India atque in Aegypto in campis et ad ripas Nili, inundationis tempore in hortis et iuxta pagos. Calcaneis incedit inſidioſe et cum ſilentio, ſaepeque rependo. Veſcitur herbis, amphibiis, ſerpentibus, lacertis, muribus, ouis atque gallinis nocturna. Effodit editque oua Crocodili. Facile manſueſcit. Vox murmurans, iratae eiulans.

Serpentum hoſtis, morſa a Serpente Ophiorrhizam aſſumere creditur.

Varietas

Varietas indica minor glauca, an specie diuersa?

Nasua. 2. V. rufa, cauda albido annulata.

Taxus suillus *Aldrov. digit. p.* 267? *cum fig.* mediocri. *Vix.*

Le Coati Mondi *Perr. anim. II p.* 15 *tab.* 37 fig. bona.

Coati Mondi Marcgrav. *Rai. syn. quadr. p.* 180.

Vulpes minor, rostro superiore longiusculo, cauda annulatim ex nigro et rufo variegata. Quachy *Barr. Fr. équ. p.* 167.

Coati Mondi, Marcgr. *Klein. quadrup. p.* 72.

Le Coati-Mondi à queue annelée: Vrsus naso producto et mobili, cauda annulatim variegata *Briss. regn. an. p.* 263 *n.* 6.

Das Koatimondi *Hall. vierf. p.* 505.

Vrsus naso producto et mobili, cauda annulatim variegata *Dictionn. anim. I p.* 660.

Le Coati *Buff. hist. nat. VIII p.* 358.

Le Coati *Buff. hist. nat. VIII tab.* 48.

De Coati-monde *Houtt. nat. hist. II p.* 238 *tab.* 15 *fig.* 2 Perr.

Coati *Bom. dictionn. I p.* 608.

Viuerra (Nasua) rufa, cauda albo annulata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 64 *n.* 2.

The Badger of Guiana *Bancr. Guian. p.* 141.

The Brasilian Weesel *Penn. syn. quadr. p.* 229 *n.* 164 *tab.* 22 *fig.* 1.

Coati grigio *Aless. quadrup. III tab.* 112 *fig.* 2 Buff.

Das Nasenfrett *Müll. Naturf. I p.* 247 *tab.* 15 *fig.* 2 Perr.

Viuerra Nasua *Schreb. Säugth. III tab.* 118 fig. Buff.

Corpus magnitudine Cati, longitudine 18 pollicum, cauda 13 poll. longa, statura Vrsi Lotoris, rufum vt Vulpis, pilis in dorso rigidulis. Macula albida supra, infra, poneque oculum. Auriculae rotundatae, paruae, supra nigrae. Oculi minuti. Verruca

ruca ſupra palpebram ſuperiorem, ſub oculo, in bucca, ſub gula. Gula flaueſcens. Naſus eductus in proboſcidem nigram, longiſſimam, vndique mobilem, apice introrſum truncatam, absque lacuna ſubtus. Dentes primores ſuperiores ſex diſtincti: lateralibus maioribus. Inferiores ſex: mediis conuergentibus. Laniarii ſolitarii. Molares plures. Lingua fiſſuris lobata vt querci folium (non vidit hoc Daubentonius). Cauda erecta, corpore longior, fuſca, annulis decem pallidis, pilis patulis depreſſa, apice compreſſa. Pedes calcaneis incedentes tardo greſſu, etiam ſcandentes. Digiti ſingulis quinque, pollice non remoto. Vngues acuti, compreſſi. Calcanea criſtata perill. Linneus non vidit, neque oculatiſſimus Daubentonius. Mammae ventrales ſex.

Habitat in America: in Braſilia et Guiania. Egregie fodit quaeſitura Lumbricos; victitat etiam ouis, auiculis, muribus, pomis, pane; dum iraſcitur peſſime foetet. Mitis facileque manſueſcit. Vox debilis.

Narica. 3. V. ſubfuſca cauda concolore.

Coati-Mondi *Marcgr. Braſil. p.* 228.

Le Coati-Mondi: Vrſus (Coatimondi) naſo producto et mobili, cauda vnicolore *Briſſ. regn. an. p.* 262 *n.* 5.

Vrſus naſo producto et mobili cauda vnicolore *Dictionn. anim. I p.* 660.

Le Coati noiratre *Buff. hiſt. nat. VIII tab.* 47.

Viuerra (Narica) ſubfuſca cauda concolore *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 64 *n.* 3.

Das Thier Narica *Linné*: *Act. holmienſ.* 1768 *p.* 152 *cum fig.*

The duſky Braſilian Weeſel *Penn. ſyn. quadr. p.* 230 *n.* 164.

Coati

Jo. Dan. Majoris de nummis Rehdigerianis desiderium (Kil. 1681) 4. pag 60. icon mediocr.

J. J. Walbaum im 1ᵗᵉⁿ B. der neuen Schr. der Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin 1795.

Coati nero *Aleff. quadrup. III tab.* 112 *fig.* 1 Buff.
Ein feltenes Thier Narica genannt *Linné: Berl. Samml. III p.* 199 *cum fig.* Linn.
Der Frettbär *Müll. Naturf. I p.* 250.
Viuerra Narica *Schreb. Säugth. III tab.* 119 fig. Buff.

Cato paullo maior, maiorque antecedente. Corpus fupra grifeum, fubtus album, inter crura poftica flauicans. Pili fupra bafi fufci, medio nigri, apice ferruginei. Collum breue. Roftrum et auriculae vt in praecedente. Labium vtrumque album. Macula alba fupra et infra oculum vtrumque. Stria alba a fuperciliis vsque ad labium fuperius vtrinque. Nares lunatae. Vibriffae longae, nigrae, in nafo labioque vtroque. Verruca fupra palpebram fuperiorem, fub oculo, in bucca, pone angulum oris, fub gula, pone palmas. Dentes Primores fuperiores fex, parui, fubobtufi, paullulum diftantes, recti. Inferiores fex, paralleli, approximati. Laniarii folitarii reliquis longiores; fuperioribus rectis a primoribus, inferioribus curuatis a molaribus remotis. Molares fupra et infra vtrinque fex. Sutura pone angulos oris, aliaque in pedibus anticis extus. Pedes calcaneis incedentes, pilis nigris. Volae nudae. Digiti 5-5: pollice breviore. Vngues incuruati, nigri, compreffi, longitudine digitorum, in pofticis paullo breuiores. Cauda corpore fere longior, teres, craffa, villofa, corpori concolor, recta. Scrotum mari nullum.

Hanc meram praecedentis varietatem putant Buffonius atque Pennantus.

Habitat in America auftrali. Fodit nafo terram profunde, vt fola cauda promineat. Edit lumbricos, panem, fructus, radices. Aquam quoque intrat, afcenditque arbores.

 Suri-

Suricatta. 4. V. pedibus tetradactylis.

Die Ratelmaus *Kolbe Vorgeb. p.* 158?

Le Surikate *Buff. hist. nat. XIII p.* 72 *tab.* 8.

Surikate *Bom. dictionn. IV p.* 278.

The fourtoed Weesel *Penn. syn. quadr. p.* 228 *n.* 163.

Surikate *Alesf. quadrup. III tab.* 144 fig. Buff.

Viuerra Suricatta *Schreb. Säugth. III tab.* 117 fig. Buff.

Longitudo corporis pedis vnius, caudae sex pollicum. Rostrum elongatum: maxilla superiore longiore maxime mobili. Auriculae rotundatae. Pili corporis longi, rudes, erecti, nigro alboque variegati, apicibus nigris. Pedes 4-4. Cauda gracilis, attenuata.

Habitat in India orientali, num etiam ad caput bonae spei? Agilis, ludibunda, mitis; erecta sedet, cruribus anticis pectori admotis. Victitat animalibus minoribus. Bibit vrinam suam.

Buffonius Surinamo indigenum dicit animal.

Putorius. 5. V. nigricans lineis quinque dorsalibus parallelis albis.

Conepatl seu vulpecula puerilis *Hernand. Mex. p.* 332.

Conepatl seu vulpecula puerilis *Ionst. quadrup. p.* 134.

Polcats or Skunks *Lawson Carol. p.* 119.

The Pol-cat *Catesb. Carol. II p.* 62 *tab.* 62.

The Pol-cat *Brick. North-Carol. p.* 118.

Mustela Americana foetida *Klein. quadrup. p.* 64.

Ein gewisses vierfüssiges Thier *Kalm. Amer. II p.* 412.

Le Putois rayé: Mustela (Putorius striatus) nigra, taeniis in dorso albis *Briss. regn an. p.* 250 *n.* 11.
Der Amerikanische Livreiltis *Hall. vierf. p.* 460.
Viuerra (Putorius) fusca lineis quatuor albidis dorsalibus parallelis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 44 *n.* 3.
Bête puante *Dictionn. anim. I p.* 280.
Putois rayé *Dictionn. anim. III p.* 626.
Amerikaansche Bontsem: Fret met vier witagtige Streepen, die evenwydig loopen, op de Rug *Houtt. nat. hist. II p.* 156.
Le Conepate *Buff. hist. nat. XIII p.* 288 *tab.* 40.
Putois rayé *Bom. dictionn. III p.* 675.
Viuerra (Putorius) fusca lineis quatuor dorsalibus parallelis albidis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 64 *n.* 4.
The striated Weesel *Penn. syn. quadr. p.* 232 *n.* 166.
Conepato *Aless. quadrup. IV tab.* 154 *fig.* 2 Buff.
Das Stinkthier *Müll. Naturf. I p.* 251 *Suppl. p.* 31.
Viuerra Putorius *Schreb. Säugth. III tab.* 122 fig. Catesb.
Pol-cat *Anglis in America.*
Fiskatte *Suecis in Pensiluania.*
Skunk *Noueboracensibus.*
Pekan *nonnullis in America boreali.*

Magnitudo Mustelae Putorii, sed dorsum magis arcuatum. Auriculae rotundatae. Caput, collum, venter, crura et cauda nigricantia. Striae quinque parallelae albae in dorso et lateribus longitudinales, secunda vtrinque in caudam prolongata. Cauda longa, pilis longioribus versus apicem.

Habitat in America septentrionali. Irritata haec et sequentes 6, 7, 8, 9, halitum suffocantem fere Geranii robertiani fortissimum explodit, quo nihil foetidius; simulque corpus in globum componit, vrinamque eiaculat ad 18 pedum distantiam, foetidissimam, oculos excoecantem. Incessu tarda, nec

nec hominem nec feras metuens. Veſtes foetore huius animalis inquinatae purgantur ſepeliendo eas per diem intra terram. Victitat animalibus, inſectis et fructibus. Canes non niſi aſſueti haec animalia adoriuntur, ſaepeque interim naſum terrae immittunt. Caro bona, modo mox cutis detrahatur animali, veſicaque vrinaria remoueatur. Parit in cauis arboribus vel ſub terra inque rupium fiſſuris. Bene aſcendit arbores.

Vulpecula. 6. V. caſtanea ſubtus flaueſcens.

Yzquiepatl ſeu Vulpecula, quae Maitzium torrefactum aemulatur colore *Hernand. Mex. p.* 332 *cum fig.* mediocr.

Vulpes Indica Izquiepatl *Ionſt. quadrup. p.* 134?

Izquiepotl *Ionſt. quadrup. p.* 134.

Yzquiepatl. Ein Indianiſcher Fuchs *Geſn. Thierb. p.* 126 *cum fig.* malá.

Yzquiepatl, ſeu Vulpecula quae Maizium torrefactum colore aemulatur Hernandez *Rai. ſyn. quadr. p.* 181.

Tamandua, mexicana, Yzquiepatl, ſeu Vulpecula dicta *Seb. theſ. I p.* 66 *tab.* 40 *fig.* 2.

Ichneumon de Yzquiepatl ſeu Vulpecula americana, quae colore Maizium torrefactum aemulatur *Seb. theſ. I p.* 68 *tab.* 42 *fig.* 1.

Der mexicaniſche Ameiſenfreſſer *Meyer Thiere III tab.* 11 fig. Sebae.

Coati, Hernandeſii *Klein quadrup. p.* 72.

Le Blaireau de Surinam: Meles (ſurinamenſis) ex ſaturate ſpadiceo nigricans, cauda fuſca, annulis flauicantibus quaſi cincta *Briſſ. regn. an. p.* 255 *n.* 3.

Das Izquiepotl. Stinkthier *Hall. vierf. p.* 509.

Viuerra (Memphitis) cauda fuſca luteo-annulata, corpore ſpadiceo ſubtus flaueſcente *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 44 *n.* 2.

Blaireau

Blaireau de Surinam *Dictionn. anim. I p.* 298.
Izquepolt *Dictionn. anim. II p.* 258.
Stinkdier: Fret met een bruine Staart, die geel geringd is, het Lyf Kaſtanje-bruin, van onderen geelagtig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 154 *tab.* 13 *fig.* 2 Sebae.
Usquiepatli *Bom. dictionn. IV p.* 633.
Le Coaſe *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 288, 299 *tab.* 38.
The ſtifling Weeſel *Penn. ſyn. quadr. p.* 230 *n.* 165.
Coaſo *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 154 *fig.* 1 Buff.
Müll. Naturſ. I tab. 13 *fig.* 2 Sebae.
Viuerra Vulpecula *Schreb. Säugth. III tab.* 120 fig. Buff.
Das Braunfrett: Viuerra fuſca *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 32.

Longitudo corporis 18 pollicum. Naſus breuis, gracilis. Auriculae paruae. Crura breuia. Vngues nigri. Corpus caſtaneum, valde piloſum. Cauda longa nigra et alba. Palmas tetradactylas dicit Buffonius.

Habitat in Mexico. Mores praecedentis.

Mephitis. 7. V. dorſo albo linea longitudinali nigra.
Un animal appellé Chinche *Feuill. Iourn. I p.* 272.
Une ſorte de Fouine, qu'on a nommée Enfant du Diable, ou Bête Puante *Charlev. nouv. Fr. III p.* 133.
Le Chinche *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 288, 300 *tab.* 39.
The Skunk *Penn. ſyn. quadr. p.* 233 *n.* 167.
Viuerra Putorius *Linn. mant. II p.* 522.
Chinco *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 153 *fig.* 2.
Der Chinchi *Berl. Samml. IV p.* 298.
Skunk *Forſter: Philoſ. tranſact. LXII p.* 374.

Viuerra Mephitis *Schreb. Säugth. III tab.* 121 fig. Buff.

Der Chunk: Viuerra Cinche *Müll. Naturf. Suppl. p.* 32.

Chinche *in America Auſtrali.*

Viuerra Putorio minor. Auriculae breues, rotundatae. Caput nigrum: linea alba a naſo inter aures ad verticem ducta. Collum ſupra cum dorſo toto album cum linea nigra a cauda per dorſi partem extenſa. Venter et crura nigra. Cauda pilis denſis, longis, rudibus, vtplurimum nigris, interdum apicibus albis: Buffonio tota alba. Vngues valde longi, vt in Melis palmis.

Habitat in Peruano regno et America boreali vsque ad Canadam. Mores et foetor affinium. Manſueſcit.

Zorilla. 8. V. albo nigroque variegata.

Stinking fox *Cieza Peru p.* 235.

Mapurito, Maſutiliquì *Gum. Orin. II p.* 312.

Bête Puante *Du Pratz Louiſ. II p.* 97 ? *cum fig.* mala.

Le Zorille *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 289, 302 *tab.* 41.

The Zorilla *Penn. ſyn. quadr. p.* 233 *n.* 168.

Zorilla *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 153 *fig.* 1.

Viuerra Zorilla *Schreb. Säugth. III tab.* 123 fig. propr.

Der Mapurit: Viuerra Mapurita *Müll. Naturf. Suppl. p.* 32.

Minor praecedente. Dorſum et latera ſtriis breuibus nigris et albis ſubflauis. Cauda longa piloſa albo nigroque mixta. Crura et venter nigra.

Habitat in America auſtrali. Peſſime foetet.

capen-

capenſis. 9. V. nigra dorſo griſeo albo marginato.

Stinckbinckſem *Kolbe Vorgeb. p.* 167.

Bléreau puant *De la Caille voy. p.* 182.

Muſtela ſubfuſca, linea longitudinali alba per vtrumque latus ducta: the Guinea Weaſel *Brown. Iam. p.* 486.

Blaireau puant *Dictionn. anim. I p.* 298.

Blaireau puant du cap de bonne eſperance *Bom. dictionn. I p.* 292.

The Fizzler Weeſel *Penn. ſyn. quadr. p.* 234 *n.* 169.

Viuerra capenſis *Schreb. Säugth. III tab.* 125 fig. propr.

Longitudo corporis 2 ped. caudae 8 poll. Roſtrum breue, ſubacuminatum. Auriculae nullae, foramina tamen auditoria. Dorſum medio fuſco-griſeum. Ab oculis ad mediam caudam vsque in vtroque latere ſtria alba. Venter, crura atque apex caudae nigra. Vngues palmarum pollicem longi, plantarum vngues breues.

Habitat ad caput bonae ſpei. Foetidiſſimum animal.

Zibetha. 10. V. cauda annulata, dorſo cinereo nigroque vndatim ſtriato.

Zibethicum animal americanum *Hernand. Mex. p.* 538 *cum fig.* mediocr.

Animalis Zibethici Maris Icon D. Fabii Columnae Lync. *Hernand. Mex. p.* 580 *fig.* mediocr.

Animalis Zibethici Foeminae Icon D. Fabii Columnae Lync. *Hernand. Mex. p.* 580 *fig.* mediocr.

Felis zibethi *Geſn. quadrup. p.* 948 *cum fig.* mediocr.

Hyaena veteribus nuncupata, nunc autem Ciuetta *Bellon. obſ. p.* 94 *cum fig.* mediocri.

Thierlein ſo den Zibeth tragen *Rauwolf Reiſ. II p.* 133.

Chats muſquez *Della Valle voy. I p.* 275.

Hyaena

Clusii curae posteriores. p. 109. icon accurata

Hyaena odorifera *Castelli monogr. cum figg.* recusa quoque in *Ionst. quadrup.*

Animal Zibethi *Aldrov. digit. p.* 340.

Felis zibethi *Aldrov. digit. p.* 342 *fig.* mediocr.

Animal zibethi, vel hyena veterum Bellonii *Aldrov. digit. p.* 343 *fig.* mediocr.

Animal zibethi *Ionst. quadrup. p.* 157.

Felis zibetti Zibet Katz *Ionst. quadrup. tab.* 72 fig. mediocr.

Falanouc *Flacourt Madag. p.* 154.

Felis Zibethi. Zibeth-Katz *Gesn. Thierb. p.* 244 *cum fig.* mediocr.

La Civette *Perr. anim.* 1 *p.* 157 *tab.* 23 fig. bona.

Zibethkatze *Olear. Gott. Kunstk. p.* 7 *tab.* 6 *fig.* 3 mediocr.

Animal Zibethi *Charlet. exerc. p.* 20.

Animal zibethicum *Rai. syn. quadr. p.* 178.

The civet-cat *Barbot Guin. p.* 114, 210.

Zibethkatzen *Bossm. Guin. p.* 298.

De Civet-Kat *Valent. Amb. III p.* 270.

Un animal connu sous le nom de Musc: *De la Peyronnie Mém. de l'acad.* 1731 *p.* 443 *tab.* 1 fig mediocr.

Meles vnguibus vniformibus *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 45.

Die Zibethkatze *Meyer Thiere III tab.* 32 fig. Perr.

Meles vnguibus vniformibus, cinerea *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 2.

Coati Civetta vulgo *Klein. quadrup. p.* 73.

Meles cinerea vnguibus vniformibus. The grey Meles, with uniform claws: the Civet-Cat *Hill anim. p.* 556 *tab.* 27 fig. mediocr.

La Civette: Meles (Civetta) fasciis et maculis albis, nigris et rufescentibus variegata *Briss. regn. an. p.* 256 *n.* 4.

Die Zibetkatze. Zibetthier *Hall. vierf. p.* 510.

Viuerra (Zibetha) cauda annulata, dorso cinereo nigroque vndatim striato *Linn syst. nat.* 10, *I p.* 44 *n.* 4.

Chat

Chat civette *Dictionn. anim. I p.* 504.

Civette *Dictionn. anim. p.* 602.

Sivet-Kat: Fret met een gebaendeerde Staart; de Rug zwart en wit, golfswyze gestreept *Houtt. nat. hist. II p.* 159 *tab.* 13 *fig.* 3.

Le Zibet *Buff. hist. nat. IX p.* 299 *tab.* 31.

La Civette *Buff. hist. nat. IX p.* 299 *tab.* 34.

Civette *Bom. dictionn. I p.* 602.

Viuerra (Zibetha) cauda annulata, dorso cinereo nigroque vndatim striato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 65 *n.* 5.

The Civet *Penn. syn. quadr. p.* 234 *n.* 170.

Zibetto *Alesf. quadrup. I tab.* 31 fig. Buff.

Zibetto della Guinea *Alesf. quadrup. I tab.* 33 fig. Buff.

Das Zibetthier *Müll. Naturf. I p.* 253 *tab.* 13 *fig.* 3.

Viuerra Zibetha *Forsk. fn. orient. p.* III.

Viuerra Ciuetta *Schreb. Säugth. III tab.* 111 fig. Buff.

Viuerra Zibetha *Schreb. Säugth. III tab.* 112 fig. Buff.

قط البر (Qott el barr) *Aegyptiis.*

Can-Can *Aethiopibus.*

Falanouc *in Madagascar.*

Longitudo corporis 2 ped. 3 poll. caudae 14 poll. Corpus oblongum. Rostrum subobtusum, apice nigrum. Oculi caerulei. Orbitae nigrae. Dentes primores superiores sex paralleli: intermedii paullo minores; inferiores sex paralleli medii paulo breuiores, alternis interioribus. Laniarii solitarii, vtrinque distantes. Molares acuti, denticulati. Auriculae breues, rotundatae, tectae. Corporis pili secundum dorsum longiores cinereo nigroque vndati, rigidiusculi. Pedes subtus nudi. Vngues 5-5 canini. Cauda Felis annulata. Guttur, Pedes,

des, Venter, nigra. Latera nigro maculata. Folliculus zibethi inter anum et genitalia in vtroque sexu, vnicus, propria apertura donatus distincta ab ano et vulua, prominente, ambrosiaca.

Habitat in India, Sinensi regno, Philippinis insulis, Guinea, Aethiopia, Madagascar. Zibethi (s. rectius Zabad) circiter drachmam vnam dat omni triduo, spatula ferrea extrahendam. Ex mare plus obtinetur. Victitat auiculis; nutritur in Belgio ob Zibethum carne, iunior pulte miliacea. Animal ferum, indomitum; iratum pilos dorsi erigit.

Varietates duas distinxit primus perill. Buffonius: la Civette (the Civet Penn.) et le Zibet (the Zibet Penn.). Haec in India orientali, Arabia, dentibus molaribus vtrinque quinque, mammis quatuor pectoralibus et duabus abdominalibus, auriculis magis eleuatis et latis, cauda annulata distinctiusque annulata, pilis breuioribus ac mollioribus, iuba nulla: ista in Africa dentibus molaribus vtrinque sex, mammis duabus pectoralibus totidemque abdominalibus, rostro crassiore, breuiore, subconuexo.

Genetta. 11. V. cauda annulata, corpore fuluo-nigricante maculato.

Genetha *Gesn. quadrup. p.* 619 *fig.* pellis *p.* 1102.
Genette *Bellon. obs. p.* 76 *cum fig.* medioer.
Genetta *Aldrov. digit. p.* 337.
Ginetta Bellonii, Felis species *Aldrov. digit. p.* 339 *fig.* Bellon.
Genetta *Ionst. quadrup. p.* 157.
Genetta Geneth Katz *Ionst. quadrup. tab.* 72 fig. Bellon.
Genetha. Eine Geneth-Katz *Gesn. Thierb. p.* 243 *cum fig.* pellis.

Genetta *Charlet. exerc. p.* 20.

Genetta vel Ginetta *Rai. ſyn. quadr. p.* 201.

The Shibeardou or ſpaniſh Ginetta *Shaw trav. p.* 246.

Muſtela cauda annulis nigris albidisque cincta *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 8.

Coati Ginetta *Klein. quadrup. p.* 73.

Muſtela cauda annulis nigris albidisque cincta. The Muſtela, with the tail annulated with white and black: the Genet *Hill anim. p.* 549.

La Genette: Muſtela (Genetta) cauda ex annulis alternatim albidis et nigris variegata *Briſſ. regn. an. p.* 252 *n.* 13.

Die Genettkatze *Hall. vierf. p.* 509.

Viuerra (Genetta) cauda annulata, corpore fuluonigricante maculato *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 45 *n.* 5.

Genette *Dictionn. anim. II p.* 259.

Genet-Kat: Fret met een gebandeerde Staart, het Lyf Goudgeelagtig zwart, gevlakt *Houtt. nat. hiſt. II p.* 165.

La Genette *Buff. hiſt. nat. IX p.* 343 *tab.* 36.

Genette *Bom. dictionn. I p.* 665.

Viuerra (Genetta) cauda annulata, corpore fuluonigricante maculato *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 65 *n.* 6.

The Genet *Penn. ſyn. quadr. p.* 236 *n.* 171.

Fuina di Conſtantinopoli *Aleſſ. quadrup. I tab.* 32.

Die Genettkatze *Müll. Naturſ. I p.* 256 *tab.* 31 *fig.* 4.

Viuerra Genetta *Schreb. Säugth. III tab.* 113 fig. Buff.

Magnitudo Felis. Corpus croceo-nigricans, linea dorſali nigra maculisque nigris in lineas longitudinales diſpoſitis, excepto capite et pedibus. Roſtrum acutiſſimum. Auriculae ſubacuminatae. Cauda

annulis octo nigris, totidemque albicantibus. Mammae ventrales quatuor.

Habitat in Oriente iuxta riuos, atque in Hiſpania. Manſueſcit vt Felis. Odorem debilem moſchi ſpirat ex orificio inter anum et genitalia.

Foſſa. 12. V. cauda annulata, corpore cinereo nigro maculato.

Foſſa *Flacourt Madag. p.* 152.
Bieſamkatze *Kolbe Vorgeb. p.* 154?
Ziebet *Kolbe Vorgeb. tab.* 6 *fig.* 3?
Foſſane *Bom. dictionn. II p.* 226.
La Foſſane *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 163 *tab.* 20.
The Foſſane *Penn. ſyn. quadr. p.* 237 *n.* 172 *tab.* 22 *fig.* 2.
Foſſana *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 159 *fig.* 1.
Das melirte Frett: Viuerra Foſſana *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 32.
Die Bieſamkatze *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 30?
Viuerra Foſſa *Schreb. Säugth. III tab.* 114 fig. Buff.
Berbe *Guineenſibus.*
Foſſa *in Madagaſcar.*

Habitus V. Genettae; at minor. Auriculae rotundatae. Oculi nigri. Corpus et crura cinerea admixto rufo. Faciei latera nigra. Ab occipite ad dorſum et humeros lineae quatuor nigrae. Humeri, latera et crura poſtica nigra. Cauda nigro annulata.

Habitat in Madagaſcar, Guinea, Cochinchina, Philippinis inſulis. Fera vixque domanda. Victitat gallinulis et fructibus. Iuniorum caro eſculenta. Odor

Odor nullus, niſi mari oeſtri tempore. Folliculus nullus.

* * *

Duas huius generis ſpecies praeterea depictas habet celeb. Schreberus ex Voſmaerii et Allamandii figuris, quarum deſcriptionem adhuc exſpectamus in pulcherrimo opere:

Viuerra tigrina *Schreb. Säugth. III tab.* 115 fig. Voſmaerii.

Viuerra vittata *Schreb. Säugth. III tab.* 124 fig. Allamandii.

* * *

Felis capite acuminato ex noua Hiſpania *Seb. theſ. I p.76 tab.* 48 *fig.* 1 videtur huius generis.

Naſus ſimus. Auriculae planae, rotundatae. Cauda longa, acuminata. Ex ruſo flaueſcit, ventre dilutiore.

Habitat in deſertis nouae Hiſpaniae; altiſſimis inſidens arboribus, capit auiculas. Manſueſcit.

44. FELIS.

Dentes Primores VI acutiusculi: exterioribus maioribus.
Laniarii solitarii, supra a primoribus, infra a molaribus remoti.
Molares terni.
Lingua retrorsum aculeata.
Pedes digitati: digitis 5-4: vnguibus retractilibus.

Leo. 1. F. cauda elongata, corpore heluolo.

Λεων, Λεαινα *Arist. hist. anim. II c.* 1 *n.* 2. *c.* 5 *n.* 23. *c.* 7 *n.* 29. *c.* 8 *n.* 41. *c.* 9 *n.* 50. *III c.* 7 *n.* 102. *c.* 15 *n.* 233. *VI c.* 31 *n.* 393-400. *VIII c.* 9 *n.* 104. *IX c.* 69 *n.* 460-472.

Leo, Leaena *Plin. hist. nat. VII c.* 1 (*c.* 1 *Hard.*). *VIII c.* 15, 16 (*c.* 17-21 *Hard.*). *X c.* 45 (*c.* 62 *Hard.*). *c.* 63 (*c.* 73 *Hard.*). *XI c.* 37 (*c.* 65, 67, 86 *Hard.*). *c.* 39, 40 (*c.* 94, 95 *Hard.*). *c.* 43 (*c.* 99 *Hard.*). *c.* 45 (*c.* 105 *Hard.*). *c.* 53 (*c.* 115 *Hard.*).

Λεων *Aelian. anim. III c.* 1, 27. *IV c.* 3, 34, 46. *V c.* 39. *VII c.* 23. *IX c.* 1, 30. *XII c.* 7. *XVII c.* 26.

Λεων *Oppian. cyneg. III,* 7.

Leo *Gesn. quadrup. p.* 642 fig. bona.

Leo

FELIS genus sobrium, cursu celere, scandit facile arbores, noctu potissimum speculatur, casu delabitur in pedes contusioni vix obnoxium; glans penis ipsi muricata retrorsum; retractis vnguibus acutissimis incedit iisque saeuit; inhiando sanguinem haurit; visa praeda caudam mouet; capite rotundato gaudet. Specierum characteres et synonyma difficilius eruuntur.

Leo *Schwenckf. theriotr.* *p.* 101.
Leo *Aldrov. digit. p.* 2 *fig. p.* 6 *Leaenae* mediocris.
Leo *Ionſt. quadrup. p.* 111.
Leo Löw *Ionſt. quadrup. tab.* 50 *figg.* maris bonae.
Leaena, Leo *Ionſt. quadrup. tab.* 51 *figg.* bonae *maris ac feminae.*
Leo minor *Ionſt. quadrup. tab.* 52? fig. mala.
Leo *Muſ. Worm. p.* 317.
Leones *Bont. Ind. or. p.* 55.
Le Lion *Marmol Afr. I p.* 54.
Ein Löw *Geſn. Thierb. p.* 246 *fig. p.* 247 mal.
Le Lion *Perr. anim. I p.* 1 *tab.* 1 fig. bon.
La Lionne *Perr. anim. I p.* 19 *tab.* 3 fig. bon.
Leo *Charlet. exerc. p.* 14.
Leo *Rai. ſyn. quadr. p.* 162.
Der Löwe *Kolbe Vorgeb. p.* 154 *tab.* 5 *fig.* 3 *maris et feminae* mediocr.
The Lyon *Shaw trav. p.* 244.
Leo *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 43.
Löwe *Riding. jagdb. Th. tab.* 1.
Felis cauda elongata floccoſa, thorace iubato *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 1.
Leo *Klein. quadrup. p.* 81.
Felis cauda elongata floccoſa, collo piliato. The Felis, with an elongated floccoſe, tail, and a mane on the neck: the Lion *Hill anim. p.* 542 *tab.* 26 *figg. maris et feminae* mediocr.
Le Lion: Felis (Leo) cauda in floccum definente *Briſſ. regn. an. p.* 265 *n.* 5.
Felis cauda elongata floccoſa, thorace iubato *Kram. Auſtr. p.* 310.
Der Löwe. Die Löwinn *Hall. vierf. p.* 534.
Felis (Leo) cauda elongata, corpore heluolo *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 41 *n.* 1.
Lion *Dictionn. anim. II p.* 686.

Leeuw: Kat met een zeer lange Staart, die een Kwaſt aan 't end heeft, het Lyf ros van kleur *Houtt. nat. hiſt. II p. 96.*

Le Lion *Buff. hiſt. nat. IX p. 1 tab. 1.*

La Lionne *Buff. hiſt. nat. IX tab. 2.*

Lion *Bom. dictionn. II p. 697.*

Felis (Leo) cauda elongata, corpore heluolo *Linn. ſyſt. nat. 12, I p. 60 n. 1.*

The Lion *Penn. ſyn. quadr. p. 164 n. 120.*

Lione *Aleſſ. quadrup. I tab. 1* Buff.

Lioneſſa *Aleſſ. quadrup. I tab. 2* Buff.

Der Löwe *Müll. Naturſ. I p. 230 tab. 29 fig. 4.*

Der Löwe: Felis Leo Mas *Schreb. Säugth. III p. 376 tab. 97 A* fig. Riding.

Felis Leo Femina *Schreb. Säugth. III tab. 97 B fig. matris cum catulis* Riding.

Leon (*mas*) Leona (*femina*) *Hiſpanis.*

Leão, Leam (*mas*) Leóa (*femina*) *Luſitanis.*

Lione, Leone (*mas*) Leona, Leonza, Lioneſſa (*femina*) *Italis.*

Lion (*mas*) Lionne (*femina*) *Gallis.*

Löwe (*mas*) Löwinn (*femina*) *Germanis.*

Leeuw *Belgis.*

Lion (*mas*) Lioneſs (*femina*) *Anglis.*

Leyon *Suecis.*

Левъ (Lew') (*mas*) Львица (Lwitza) (*femina*) *Ruſſis.*

Longitudo corporis 8 pedum et vltra, caudae 4 pedum. Caput magnum. Frons quadrata. Oculi ingentes. Naſus craſſus. Labia pendula. Auriculae breues, rotundatae. Maris caput ſupra, mentum, totum collum et humeri pilis longioribus hirſuta, caudaque floccoſa: reliquum corpus pilis breuibus laeue. Pectus robuſtum; artus fortiſſimi. Color luteo-rufus, ventre albicante. Femina non iubata, paullo minor mare, mammis binis (quaternis Buffon.). Cor maximum.

Habitat

Habitat in Africa, rarior in calidioribus Asiae; Americae plane exul.

Segnis, esuriens praedatur equos et maiora quadrupeda, nec nisi famelicus hominem. Fugatur accensa flamma, non galli voce; canibus coercetur. Retro mingit et coit? (negat Buffonius.) Rugitus horrendus a tracheae annulis integris imbricatis. Dormit in aprico. Esurit tertio die. Tagax. Incessus sublentus, haud currit sed salit. Anima foetida, vrina foetidissima. Generosum, gratum, vehementer mansuescere veteres habent. Iratus iubam erigt. Olfactu debiliore pollet. Caro editur in Barbaria, sapore vitulinae, ingrato tamen.

Ossa durissima absque medulla, scintillantia cum chalybe veteribus falso.

Tigris. 2. F. cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis.

Tigris *Plin. hist. nat. VIII c.* 4 (*c.* 5 *Hard.*) *c.* 17, 18 (*c.* 23-25 *Hard.*).

Τιγρις *Oppian. cyneg. III,* 98, 340.

Tigris *Gesn. quadrup. p.* 1060 *cum fig.* mediocri.

Tigris *Schwenckf. theriotr. p.* 130.

Tygres *Purch. Pilgr. II p.* 1001.

Tygris *Aldrov. digit. p.* 101.

Tigris secundum nonnullos *Aldrov. digit. p.* 103 *fig.* pessima.

Tigris Gesneri *Aldrov. digit. p.* 104 *fig.* Gesneri.

Tigris *Ionst. quadrup. p.* 120.

Tigris Tigerthier *Ionst. quadrup. tab.* 53 fig. mala.

Tigris Gesneri *Ionst. quadrup. tab.* 54 fig. Gesneri.

Tygre *Boullaye voy. p.* 246.

Tigris *Bont. Ind. or. p.* 52 *fig. p.* 53 mediocr.

Tygerthier *Neüh. Gesandsch. p.* 372 *fig. p.* 373 mediocr.

Tigerthier *Gesn. Thierb. p.* 340 *cum fig.* mediocr.
Tygris *Charlet. exerc. p.* 14.
Tigris *Rai. syn. quadrup. p.* 165.
Tigris maculis oblongis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 43.
Felis cauda elongata, maculis virgatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 2.
Tigris asiatica *Klein. quadrup. p.* 80.
Felis cauda elongata, maculis virgatis. The Felis, with an elongated tail, and virgated spots; the Tyger *Hill anim. p.* 543 *tab.* 26 fig. mala.
Le Tigre: Felis (Tigris) flaua, maculis longis nigris variegata *Briss. regn. an. p.* 268 *n.* 6.
Felis cauda elongata, maculis virgatis *Kram. Austr. p.* 311.
Der Ceilonische Tiger *Hall. viers. p.* 530.
Felis (Tigris) cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 41 *n.* 2.
Tigre *Dictionn. anim. IV p.* 335.
Tyger: Kat met een zeer lange Staart, hebbende Vlacken op 't Lyf, die altemaal gestreept zyn *Houtt. nat. hist. II p.* 108.
Le Tigre *Buff. hist. nat. IX p.* 129 *tab.* 9.
Tigre *Bom. dictionn. IV p.* 387.
Felis (Tigris) cauda elongata, corpore maculis omnibus virgatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 61 *n.* 2.
The Tiger *Penn. syn. quadr. p.* 167 *n.* 121.
Tigre *Aless. quadrup. I tab.* 9 fig. Buff.
Der Tieger *Müll. Naturs. I p.* 235 *tab.* 30 *fig.* 4.
Tiger *S. G. Gmelin Reis. III p.* 485.
Felis Tigris *Schreb. Säugth. III tab.* 98 *fig.* le Basii.
Tigre *Hispanis.*
Tigre *Lusitanis.*
Tigre (*mas*) Tigra (*femina*) *Italis.*
Tigre (*mas*) Tigresse (*femina*) *Gallis.*
Tieger, Tiegerthier *Germanis.*
Tyger *Belgis.*
Tiger, Tyger *Anglis.*

Tiger

Tiger *Suecis.*
Тигрь (Tigr) *Russis.*
Paleng *Persis.*
Radja outang *Iauanensibus.*

Magnitudo Leonis, interdumque maior. Artus fortissimi. Corpus caputque laeue, ex flauo fuscum, maculis virgatis nigris a dorso versus ventrem et circum femora. Cauda corpore tertia parte brevior nigro annulata.

Habitat in Asia, non in Africa. Animal tremendae velocitatis dum salit, ceteroquin tardigradum, homini pessimum, timidum tamen. Mas occidit proprios filios. Visus qui occidit Leonem. Saltu ex insidiis praedam adoritur. Parit vere 3-4. Numquam mansuescit.

Pardus. 3. F. cauda subelongata, corpore fusco maculis annularibus nigris centro notatis.

Παρδαλις *Arist. hist. anim. II c. 7 n. 29. c. 8 n. 41.*
Παρδαλις *Aelian. anim. IV c. 49. V c. 40, 54. VI c. 2.*
Πορδαλις μειζων *Oppian. cyneg. III, 63.*
Panthera seu Pardalis, Pardus, Leopardus *Gesn. quadrup. p. 935 cum fig.* mala.
Pardus, Panthera *Alpin. Aeg. I p. 237 tab. 15 fig. 2* mediocr.
Pardus *Aldrov. digit. p. 64.*
Pardalion Aristotelis *Aldrov. digit. p. 68 cum fig* mediocr.
Pardus *Ionst. quadrup. p. 116.*
Pardus. Leopardus. Parderthier Leopard *Ionst. quadrup. tab. 53* fig. mediocr.
Pardus Parderthier *Ionst. quadrup. tab. 53* fig. mediocr.
Leopardi seu Pantherae *Bont. Ind. or. p. 55.*

Leopard oder Leppard *Gesn. Thierb. p.* 253 *cum fig.* mala.

La Panthére *Perr. anim. III p.* 16 *tab.* 3?

Pardus *Charlet. exerc. p.* 14.

Pardalis cuius mas Pardus *Rai. syn. quadr. p.* 166.

Tyger-thiere *Kolbe Vorgeb. p.* 171.

Le Tigre *Des March. voy. I p.* 182.

The Panther *Shaw trav. p.* 244.

Tigris maculis orbiculatis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 43.

Tiger *Riding. jagdb. Th. tab.* 2?

Felis cauda elongata, maculis superioribus orbiculatis, inferioribus virgatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 3.

Pardus, Pardalion *Klein. quadrup. p.* 78.

Felis cauda elongata, maculis superioribus orbiculatis, inferioribus virgatis. The long-tailed Felis, with the upper spots round, and the lower virgated: the Leopard *Hill anim. p.* 543.

Le Leopard: Felis (Leopardus) ex albo flauicans, maculis nigris, in dorso orbiculatis, in ventre longis, variegata *Briss. regn. an. p.* 272 *n.* 12.

Felis cauda elongata, maculis superioribus orbiculatis, inferioribus virgatis *Kram. Austr. p.* 311.

Der Parder *Hall. vierf. p.* 528.

Felis (Pardus) cauda elongata, corpore maculis superioribus orbiculatis; inferioribus virgatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 41 *n.* 3.

Léopard *Dictionn. anim. II p.* 611.

Panthére *Dictionn. anim. III p.* 322.

Luipaard: Kat met een zeer lange Staart, de bovenste Vlakken op 't Lyf rond, de onderften langwerpig *Houtt. nat. hist. II p.* 117.

La Panthere *Buff. hist. nat. IX p.* 151 *tab.* 11 fig. maris *tab.* 12 feminae.

Panthere *Bom. dictionn. III p.* 351.

Felis (Pardus) cauda elongata, corpore maculis superioribus orbiculatis; inferioribus virgatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 61 *n.* 3.

Leo-

Leopard *Knorr delic. II tab. K fig.* 4.
The Panther *Penn. syn. quadr. p.* 170 *n.* 122.
Pantera Maschio *Aless. quadrup. I tab.* 4 fig. Buff.
Pantera Femmina *Aless. quadrup. I tab.* 10 fig. Buff.
Der Leopard *Müll. Naturs. I p.* 237. *tab.* 30 *fig.* 5.
Leopardus *Forsk. fn. orient. p. V.*
Felis Panthera *Schreb. Säugth. III tab.* 99 fig. Buff.
Pantera, Leopardal, Leopardo *Hispanis.*
Panthera, Leopardo *Lusitanis.*
Pantera, Leopardo *Italis.*
Panthére, Léopard *Gallis.*
Panther, Pantherthier, Parder, Leopard *Germanis.*
Luipaard *Belgis.*
Panther, Leopard *Anglis.*
Panter *Suecis.*
Леопардъ (Leopard) *Russis.*
نمر (Nems) *Arabibus.*

Longitudo corporis fere 7 ped. caudae 3 ped. Auriculae breues acutae. Pili corporis breues, laeues, splendentes, fusci; latera et dorsum maculis nigris e minoribus quatuor vel quinque in annulum dispositis adspersa, centris nigris. Facies et crura maculis solitariis. Dorsum serie macularum oblongarum. Pectus album striis obscuris transuersis. Venter albus maculis nigris, magnis, irregularibus. Cauda nigro maculata. Apex nasi fuscus. Artus fortes. Mammae quatuor abdominales.

Habitat in omni Africa, huiusque fere Tigris magnitudine et crudelitate. Ex insidiis tribus saltibus praedam rapit. Equo insilit supra humeros, se triplo maiorem aufert. Hominem non adoritur, nisi fame coactus; gustato autem humano sanguine non desistit. Dicunt vero eum capere primo aethio-

aethiopem, tum europaeum, vltimo americanum. Caro sapida. Haud mansuescit.

Pennantus Asiae et hunc tribuit atque Americae; americanum autem animal certe alius speciei videtur.

Panthera. 4. F. cauda elongata, corpore albido maculis irregularibus nigris.

Panthera *Plin. hist. nat. VIII c.* 15 (*c.* 17 *Hard.*). *c.* 16 (*c.* 21 *Hard.*). *e.* 17 (*c.* 23 *Hard.*). *X c.* 63 (*c.* 83 *Hard.*). *XI c.* 40 (*c.* 95 *Hard.*). *c.* 49, 50 (*c.* 110, 111 *Hard.*).

Πορδαλις ὀλιγοτερα *Oppian. cyneg. III,* 95.

Leopardus *Schwenckf. theriotr. p.* 102.

Der Leopard *Olear. Reis. p.* 437?

Das kleine Pantherthier. Ein Untz. Ein kleiner Löwpard. Ein Hunds- oder Wolffpard *Gesn. Thierb. p.* 256 *cum fig.* mala.

Duo foetus Tigridis ceylonicae *Seb. thes. I p.* 52 *tab.* 32 *fig.* 7, 8?

The Faadh *Shaw trav. p.* 245.

Das junge ceilanische Tiger das Männlein *Meyer Thiere III tab.* 23. Das Weiblein *tab.* 24? figg. Sebae.

Tiegerthiere *Müll. Samml. III p.* 549?

Panterthiere *Müll. Samml. III p.* 549?

Tieger *Müll. Samml. III p.* 608?

Once *Dictionn. anim. III p.* 277.

L'Once *Buff. hist. nat. IX p.* 151 *tab.* 13.

Once *Bom. dictionn. III p.* 351.

Babr, Parder *Rytschk. Orenb. I p.* 225?

The Once *Penn. syn. quadr. p.* 175 *n.* 126.

Pantera asiatica *Aless. quadrup. I tab.* 13 fig. Buff.

Felis Vncia *Schreb. Säugth. III tab.* 100 fig. Buff.

Der kleine Panther *Müll. Naturs. Suppl. p.* 29.

Бабрь (Babr), Барсъ (Bars) *Russis*?

Kunik *Tungusis*?

Iöl-

Iölbars *Bucharice*?
فهد (Faadh) *Arabibus.*

Longitudo corporis 3½ pedum, caudae 3 ped. Caput craſſum. Auriculae breues. Corpus magis elongatum, pedibus breuioribus. Color albido-cinereus ſubflauicans. Caput maculis paruis rotundis nigris: poſt vtramque aurem macula maior. Collum ſupra maculis magnis ſolitariis. Dorſi latera maculis nigris approximatis in ſtrias longitudinales; infra has maculae irregulares magnae. Crura maculis minoribus rarioribus. Cauda ſat piloſa, maculis magnis nigris absque ordine notata.

Habitat in Africa boreali, Perſia, Hyrcania et Sinenſi regno. Eſt ex mitioribus huius generis, vt et venatui inſeruire queat cicurata.

Leopardus. 5. F. cauda mediocri, corpore fuſco maculis ſubcoadunatis nigris.

Variae (*feminae*), Pardi (*mares*) *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 15, 16 (*c.* 17 *Hard.*). *c.* 17 (*c.* 23, 24 *Hard.*). *X c.* 73 (*c.* 94 *Hard.*). *XI c.* 37 (*c.* 65 *Hard.*).
Vncia *Geſn. quadrup. p.* 937.
Quelly *Barbot Guin. p.* 115.
Leoparden oder Pantherthiere *Kolbe Vorgeb. p.* 156.
Le Leopard *Des March. voy. I p.* 181.
The leſſer Panther *Shaw trav. p.* 245?
Le Léopard *Buff. hiſt. nat. IX p.* 151 *tab.* 14.
Leopard *Bom. dictionn. III p.* 351.
The Leopard *Penn. ſyn. quadr. p.* 172 *n.* 123.
Leopardo *Aleſſ. quadrup. I tab.* 15 fig. Buff.
Felis Leopardus *Schreb. Säugth. III tab.* 101 fig. Buff.
Der guineiſche Leopard *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 29.
Quelly *Guineenſibus.*

Longi-

Longitudo corporis 4 pedum, caudae $2\frac{1}{2}$ ped. Pili pallide fului, maculis dorſi laterumque paruis nigris in circulos diſpoſitis maximeque approximatis. Facies et crura maculis ſimplicibus. Pectus et venter pilis longioribus albicantibus. Maculae in cauda magnae, oblongae.

Habitat in Guinea et propinquis terris Africae. Hominem atque beſtias adoritur, nec manſueſcit. Caro eſculenta. Pellis pulchra. Huic hoſtis Pardus eſt.

iubata. 6. F. cauda mediocri, corpore fuluo maculis nigris, collo iubato.

Leopard *Boullaye voy. p.* 248 *cum fig.* mala.

Une certaine beſte appellée Once *Tavern. voy. I p.* 348.

Tyger-Wolff *Kolbe Vorgeb p.* 171 *tab.* 6 *fig.* 5.

Der Tiegerwolf *Hall. vierf. p.* 533.

Le Tigre Barbet, ou Tigre friſé: Felis (Tigris criſpa) pilis criſpis veſtita, maculis nigris variegata *Briſſ. regn. an. p.* 271 *n.* 10.

Loup-Tigre *Dictionn. anim. II p.* 709.

Loup-Tigre *Bom. dictionn. II p.* 725.

Le Guépard *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 249, 254.

The hunting Leopard *Penn. ſyn. quadr. p.* 174 *n.* 125 *tab.* 18 *fig.* 1 propr.

Felis iubata *Schreb. Säugth. III tab.* 105 fig. propria.

Der Wolfstieger *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 30.

Magnitudo Canis familiaris graii maioris: longitudine corporis $3\frac{1}{2}$ ped. caudae 1 ped. 8 poll. Corpus elongatum. Caput paruum. Irides pallide aurantiae. Naſus apice niger. Linea fuſca ab angulo oris ad angulum oculi. Auriculae breues, fuſcae. Facies, mentum ac gula pallide flauo-

fuſca.

fuſca. Facies leuiter maculata. Corpus pallide fuluum, maculis multis paruis nigris diſtinctis, nec in circulos diſpoſitis. Venter et crura extus maculis maioribus. Collum iubatum, pilis longioribus. Venter albus pilis longioribus. Cauda e rubro fuſca, ſupra maculis magnis nigris, pilis infra valde longis.

Habitat in India atque Africa. Manſuefacta venatui inſeruit.

concolor. 7. F. cauda mediocri, corpore immaculato fuluo.
Puma ſeu Leo Americanus *Hernand. Mex. p.* 518.
Cuguacuarana *Marcgr. Braſil. p.* 235.
Cuguacuara *Piſ. Ind. p.* 103.
Cuguacuarana Braſil. Tigre Luſitanis *Rai. ſyn. quadr. p.* 169.
The Panther *Lawſon Carol. p.* 117.
The Panther *Catesb. Carol. app. p. XXV.*
Le Carcajou ou Quincajou *Charlev. nouv. Fr. III p.* 129? videtur vtique, quamuis nomen ad aliud animal pertineat.
Lions *Condam. voy. p.* 162.
Lions bâtards *Ulloa voy. I p.* 305.
Tigris fuluus, Tigre rouge *Barr. Fr. équ. p.* 166.
Tigris Cuguacuarana Marcgr. *Klein. quadrup. p.* 81.
Le Tigre rouge: Felis (Tigris fulua) ex flauo rufeſcens, mento et infimo ventre albicantibus *Briſſ. regn. an. p.* 272 *n.* 11.
Der groſſe Amerikaniſche Tiger *Hall. vierf. p.* 533.
Le Tigre *Du Pratz Louiſ. II p.* 90.
Puma *Dictionn. anim. III p.* 612.
Le Couguar *Buff. hiſt. nat. IX p.* 216 *tab.* 19.
Couguar *Bom. dictionn. I p.* 700.
The brown Tiger *Penn. ſyn. quadr. p.* 179 *n.* 129.
Felis (concolor) cauda elongata, corpore immaculato fuluo *Linn. mant. II p.* 522.

Tigre

Tigre roſſa *Aleſſ. quadrup. I tab.* 17 fig. Buff.
Felis concolor *Schreb. Säugth. III tab.* 104 fig. Buff.
Die braſilianiſche Katze *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 30.
Puma *Peruanis.*
Leo americanus *vulgo.*

Longitudo corporis 5 ped. 3 poll. caudae 2 ped. 8 poll. Caput paruum. Auriculae paullulum acutae. Oculi magni. Mentum album. Totum corpus pallide ruſo-fuſcum intermixtis pilis obſcurioribus: pectus, venter et crurum interiora cinerea. Cauda obſcure ferruginea apice nigro. Vngues albi: exteriore palmarum maiore. Corpus elongatum pedesque longi.

Habitat in continente Americae a Canada vsque in Braſiliam. Ferox et rapax, noui orbis Leo; hominem adeo ſame coacta adoritur. Verſus ſeptentrionem paullo minor eſt, magisque metuit hominem. Ex arboribus inſilit in praedam. Caro vitulinae ſapore.

nigra. 8. F. cauda elongata, corpore nigro.
discolor Gm.
Iaguarete *Marcgr. Braſil. p.* 235 *cum fig.*
Iaguareté *Piſ. Ind. p.* 103 *cum fig.* Marcgr.
Iaguarete Braſilienſis *Rai. ſyn. quadr. p.* 169.
Once, eſpéce de Tigre *Des March. voy. III p.* 285.
Tigris Iaguerete *Klein. quadrup. p.* 81.
Le Tigre noir: Felis (Tigris nigra) maculis nigris ſaturatioribus variegata *Briſſ. regn. an. p.* 271 *n.* 9.
Der gröſte Tiger mit ſchwarzen Flecken auf lichtgelbem Grunde *Hall. vierf. p.* 531.
Iaguarete *Dictionn. anim. II p.* 516.
The black Tigre *Penn. ſyn. quadr. p.* 180 *n.* 130 *tab.* 18 *fig.* 2.
Iaguareté *Braſilienſibus.*

Magni-

vidi in arce Londinensi (the Tower) d. 11 febr

Magnitudo vituli annui. Tota nigra, ſplendens, interdum maculis atris. Labium ſuperius album. Labium inferius, gula, venter et crurum interiora albicantia ſiue pallidiſſime cinerea. Vngues albi. Auriculae acutae.

Habitat in Braſilia et Guiania. Crudelior atque ferocior praecedente, ſed rarior.

Buffonius hanc ad F. Onçam refert: ego potius F. concoloris varietatem colore obſcuriorem crederem.

Onça. 9. F. cauda ſubelongata, corpore fuſco-luteſcente ocellis nigris rotundato angulatis medio flauis.

Tlatlauhqui ocelotl ſeu Tigris Mexicana *Hernand. Mex. p.* 498 *cum fig.*

Iaguara *Marcgr. Braſil. p.* 235 *cum fig.*

Iaguára *Piſ. Ind. p.* 103 *cum fig.* Marcgr.

Tlatlavhqui Ocelotl ſeu Tigris Mexicana. Ein Mexicaniſch Tigerthier *Geſn. Thierb. p.* 342.

Le Tigre *Perr. anim. III p.* 1 *tab.* 1 fig. bona.

Tigre de la grande eſpece, que les Portugais appellent Tigre Royal *Perr. anim. III p.* 287.

Pardus an Lynx Braſilienſis iaguara dicta Marcgr. *Rai. ſyn. quadr. p.* 168.

Tigres de Cayenne *Des March. voy. III p.* 283.

Ianovare iuuenis americanus *Seb. theſ. II p.* 50 *tab.* 49 *fig.* 4 videtur huius pullus.

The Tyger *Brick. North-Carol. p.* 114? *cum fig.* mala.

The Panther *Brick. North-Carol. p.* 115 *cum fig.* mediocr.

Le Tigre *Condam. voy. p.* 161.

Des Tigres *Ulloa voy. I p.* 49, 87.

Tigris Americana Iaguara Brasil. *Klein. quadrup. p.* 80.

Tigris quam Lusitani Tigre Royal appellant *Klein. quadrup. p.* 80.

Le Tigre royal: Felis (Tigris regia) in dorso fulua, in lateribus subcinerea, in ventre alba, maculis longis nigris variegata *Briss. regn. an. p.* 269 *n.* 7.

Le Tigre de l'Amerique: Felis (Tigris americana) flauescens, maculis nigris orbiculatis, quibusdam rosam referentibus, variegata *Briss. regn. an. p.* 270 *n.* 8.

Felis cauda elongata, maculis subrotundis fere aequalibus: the American Tiger *Brown. Iam. p.* 485.

Der Amerikanische Tiger *Hall. vierf. p.* 531.

Felis (Onca) cauda elongata, corpore flauescente maculis nigris rotundato - angulatis medio flauis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 42 *n.* 4.

Iaguara *Dictionn. anim. II p.* 516.

Amerikaansche Tyger: Kat met een lange Staart, het Lyf geelagtig, met zwarte Vlakken getekend, die rond zyn doch hoekig, in 't midden geel *Houtt. nat. hist. II p.* 121.

Le Iaguar *Buff. hist. nat. IX p.* 201 *tab.* 18.

Iaguar *Bom. dictionn. II p.* 564.

Felis (Onca) cauda mediocri, corpore flauescente ocellis nigris rotundato - angulatis medio flauis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 61 *n.* 4.

The Tiger of Guiana *Bancr. Guian. p.* 137.

Tigris americana *Fermin Surin. II p.* 84.

The Brasilian Panther *Penn. syn. quadr. p.* 176 *n.* 127.

Der Panther *Müll. Naturs. I p.* 238 *tab.* 30 *fig.* 6.

Felis Onca *Schreb. Säugth. III tab.* 102 fig. propria.

Onça *Lusitanis.*

Magnitudo Lupi et maior, longitudine corporis ad $4\frac{1}{2}$ ped. caudae $2\frac{1}{2}$ ped. Corpus fusco - lutescens maculis

maculis ocellaribus nigris saepe pupilla nigra vna alteraue instructis. Dorsum supra striis aliquot longis nigris. Femora et crura maculis coecis nigris. Abdomen album maculis atris, vt in pedibus, vbi minores. Cauda circiter longitudine corporis dimidii, supra profunde fusca maculis magnis irregularibus, subtus maculis minoribus.

Habitat in calidioribus Americae australis, saeuiens in homines et animalia. Noctu clamat canis famelici instar. Timida, canibus fuganda, praecipue autem ignem horret.

Pardalis. 10. F. cauda elongata corpore fusco maculis ocellaribus elongatis.

Tlacoozelotl. Tlalocelotl. Catus Pardus Mexicanus *Hernand. Mex. p.* 512 cum fig.

Catus Pardus siue Catus Montanus Americanorum *Rai. syn. quadr. p.* 169.

Le Chat Tigre *Dampier voy. III p.* 306.

The mountain-Cat *Brick. North-Carol. p.* 116?

Felis cauda elongata, maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 4.

Pardus cauda breui *Klein. quadrup. p.* 78.

Felis cauda elongata maculis superioribus virgatis, inferioribus punctatis. The Felis, with an elongated tail, with the upper spots virgated, the lower punctated: the Cat-a-Mountain *Hill anim. p.* 544 *tab.* 27.

Le Chat-Pard: Felis (Catus-Pardus) rufa, in ventre ex albo flauicans, maculis nigris, in dorso longis, in ventre orbiculatis, variegata *Briss. regn. an. p.* 273 *n.* 13.

Felis (Pardalis) cauda elongata, corpore maculis superioribus virgatis; inferioribus orbiculatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 42 *n.* 5.

Kat-Pard: Kat met een lange Staart, de Vlakken boven op 't Lyf geſtreept, de onderſte rondagtig *Houtt. nat. hiſt. II p.* 124.
L'Ocelot *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 239.
L'Ocelot Male *Buff. hiſt. nat. XIII tab.* 35.
L'Ocelot Femelle *Buff. hiſt. nat. XIII tab.* 36.
Ocelot *Bom. dictionn. III p.* 229.
Felis (Pardalis) cauda elongata, corpore maculis ſuperioribus virgatis; inferioribus orbiculatis *Linn. ſyn. nat.* 12, *I p.* 62 *n.* 5.
The Lynx of Guiana *Bancr. Guian. p.* 140.
The Mexican Panther *Penn. ſyn. quadr. p.* 177 *n.* 128.
The Mountain Cat *Penn. ſyn. quadr. p.* 185 *n.* 134.
Ocelot Maſchio e Femmina *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 152 figg. Buff.
Die wilde Katze *Müll. Naturſ. I p.* 239 *tab.* 30 *fig.* 7.
Felis Pardalis *Schreb. Säugth. III tab.* 103 fig. Buff.

Longitudo corporis 4 pedum, caudae 2 ped. Auriculae breues, margine bifidae absque penicillis. Myſtaces quatuor ordinum: in ſingulo ordine ſetae 3 ſ. 5, albae, baſi nigrae, longitudine capitis. Color corporis ex rufo fuſcus, lateribus magis albicantibus. Linea nigra per medium dorſum a capite ad caudam excurrens. Alia linea nigra a naribus ad angulos oculorum. Frons nigro maculata. Latera corporis ſtriis longitudinalibus nigris in medio fuſcis cum maculis nigris minoribus; aliae ſimiles a collo per humeros. Crura albicantia maculis paruis ſiue punctis nigris. Cauda corpore dimidio breuior, fuſca, maculis nigris, baſin verſus minoribus, maioribus verſus apicem nigrum. Mas coloribus pulchrior quam femina.

Habitat in Mexicano regno inque Braſilia, in montibus. Vorax victitat animalibus minoribus, quibus ex

ex arboribus insidiatur. Hominem timet. Simias deludit somno ficto. Facile cicuratur atque admodum pinguescit.

tigrina. 11. F. cauda elongata, corpore fuluo nigro striato maculatoque subtus albido.

Tepe Maxtlaton *Fernand. anim. p.* 9.
Maraguao siue Maracaia *Marcgr. Brasil. p.* 233.
Felis siluestris americanus tigrinus *Seb. thes. I p.* 47. *tab.* 30 *fig.* 2.
Felis siluestris tigrinus ex Hispaniola Tepe Maxtlaton *Seb. thes. I p.* 77 *tab.* 48 *fig.* 2.
Die wilde amerikanische Tiegerkaz *Meyer Thiere III tab.* 22. fig. Sebae.
Felis fera tigrina Malakaya. Chat-tigre *Barr. Fr. équ. p.* 153.
Alius Tepe Maxtlaton dictus, tygrinus ex Hispaniola *Klein. quadrup. p.* 75.
Le Chat sauvage tigré: Felis (siluestris tigrina) ex griseo flauescens, maculis nigris variegata *Briss. regn. an. p.* 266 *n.* 3.
Die Tigerkaze *Hall. vierf. p.* 522.
Die Amerikanische Kaze *Hall. vierf. p.* 523.
Le Pichou *Du Pratz Louis. II p.* 92 (at hic maior est).
Le Margay *Buff. hist. nat. XIII p.* 248 *tab.* 37.
The Tiger Cat of Guiana *Bancr. Guian. p.* 139.
Felis fera tigrina *Fermin Surin. II p.* 85.
The Cayenne-Cat *Penn. syn. quadr. p.* 182 *n.* 132.
Gatto tigrato americano *Alesf. quadrup. I tab.* 16 fig. Buff.
Felis trigrina *Schreb. Säugth. III tab.* 106 fig. Buff.
Der Margay *Müll. Naturf. Suppl. p.* 29.
Malakaya *Guianiensibus.*

Magnitudo Cati. Caput supra, collum, dorsum, latera, humeri ac femora fulua. Facies nigro deorsum striata. Humeri et corpus striis maculisque

magnis oblongis nigris. Crura maculis minoribus. Pectus et crura intus albida nigro maculata. Cauda elongata, nigro, fufco et grifeo notata.

Habitat in America auftrali, non domanda. Victitat auibus. Vox Cati.

Catus. 12. F. cauda elongata fufco annulata, corpore fafciis nigricantibus; dorfalibus longitudinalibus tribus; lateralibus fpiralibus.

ferus. *α) Ferus, cum fynonymis totius fpecici.*

Αιλουρος *Arift. hift. anim. V c. 2 n. 22. VI c. 35 n.* 422, 423.

Feles *Plin. hift. nat. X c. 73 (c. 94 Hard.). XI c.* 37 (*c. 55 Hard.*).

Αιλουρος *Aelian. anim. V c. 27.*

Catus filueftris *Gefn. quadrup. p.* 353.

Catus filueftris *Schwenckf. theriotr. p.* 80.

Felis *Aldrov. digit. p.* 564.

Felis filueftris *Aldrov. digit. p.* 582 *fig. p.* 583 mediocr.

Felis *Ionft. quadrup. p.* 182.

Felis filueftris. Wilde Katz *Ionft. quadrup. tab.* 72 fig. mediocr.

Catus fylueftris ein Baumreuter *Gefn. Thierb. p.* 246.

Felis *Charlet. exerc. p.* 20.

Felis feu Catus filueftris *Wagn. Heluet. p.* 175.

Catus filueftris *Rzacz. Polon. p.* 217.

Felis cauda elongata, auribus aequalibus *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 43.

Wilder Kuder *Riding. jagdb. Th. tab.* 18.

Felis cauda elongata, auribus aequalibus *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 6.

Catus filueftris, ferus vel feralis *Klein. quadrup. p.* 75.

Felis cauda elongata, auribus aequalibus. The long-tailed Felis, with even ears: the Cat *Hill anim. p.* 545 *tab.* 27 fig. mala.

Le

Le Chat ſauvage: Felis (ſilueſtris) pilis ex fuſco, flavicante, et albido variegatis veſtita, cauda annulis alternatim nigris et ex ſordide albo flauicantibus cincta *Briſſ. regn. an. p.* 265 *n.* 2.

Felis cauda elongata, auribus aequalibus *Kram. Auſtr. p.* 311.

Le Chat *Buff. hiſt. nat. VI p.* 1.

Le Chat ſauvage *Buff. hiſt. nat. VI tab.* 1.

Catus ſilueſtris. Die wilde Katze *Hall. vierf. p.* 521.

Felis (Catus) cauda elongata, corpore faſciis nigricantibus; dorſalibus longitudinalibus tribus; lateralibus ſpiralibus *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 42 *n.* 6.

Wilde Katzen *Müll. Samml. III p.* 608.

Chat *Dictionn. anim. I p.* 501.

Kater: Kat met een lange Staart, hebbende zwartagtige Banden over 't Lyf, drie in de langte op de Rug en geſlingerde ſtreepen op de Zyden *Houtt. nat. hiſt. II p.* 126.

The wild Cat *Penn. brit. zool. p.* 22.

Katte *Pontopp. Dan. I p.* 604.

Chat *Bom. dictionn. I p.* 503.

Felis (Catus) cauda elongata fuſco annulata, corpore faſciis nigricantibus; dorſalibus longitudinalibus tribus; lateralibus ſpiralibus *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 62 *n.* 6.

Wilde Katzen *Rytſchk. Orenb. I p.* 232.

Felis Catus *Forſter: Philoſ. transact. LVII p.* 342.

The common Cat *Penn. ſyn. quadr. p.* 183 *n.* 133.

Gatto ſelvatico *Alcſſ. quadrup. I tab.* 34.

Die Hauskatze *Müll. Naturſ. I p.* 240 *tab.* 31 *fig.* 5.

Die Katze *Mart. Buff. vierf. II p.* 206.

Die wilde Katze *Mart. Buff. vierf. II p.* 230 *tab.* 39 *fig.* 1.

Felis Catus ferus *Schreb. Säugth. III tab.* 107 *A* fig. propria.

Felis (Catus) cauda elongata fuſco annulata, corpore faſciis nigricantibus; dorſalibus longitudinali-

 bus

bus tribus; lateralibus ſpiralibus *Müll. Dan. prodr. p.* 2 *n.* 8.

Gato montès *Hiſpanis.*

Gatto ſelvatico *Italis.*

Chat ſauvage *Gallis.*

Cath goed *Cambrenſibus.*

Wilde Katze *Germanis.*

Kot dźiki, Zbik *Polonis.*

Степная кошка (Stepnaja koſchka) *Ruſſis.*

Manul *Bucharis et Calmyccis.*

domeſticus. β) *Domeſticus.*

Catus ſiue Felis *Geſn. quadrup. p.* 344 *fig. p.* 345 bona.

Catus domeſticus *Schwenckf. theriotr. p.* 79.

Felis Syriaca *Aldrov. digit. p.* 566 *fig.* mediocr.

Felis Syriaca altera *Aldrov. digit. p.* 567 *fig.* mediocr.

Felis Domeſtica. Zahme Katz *Ionſt. quadrup. tab.* 72 fig. mediocr.

Felis vulgo Catus. Eine Katz *Geſn. Thierb. p.* 239 *fig. p.* 240 bona.

Felis *Sibb. Scot. an. p.* 13.

Felis domeſtica ſeu Catus *Rai. ſyn. quadr. p.* 170.

Felis domeſtica ſeu Catus *Sloan. Iam. II p.* 329.

Feles ſeu Cati domeſtici *Rzacz. Polon. p.* 244.

Felis cauda elongata; auribus aequalibus *Linn. fn. ſuec.* I *p.* 2 *n.* 3.

Eine Katz *Meyer Thiere I tab.* 15 fig. mediocr.

Catus domeſticus, Felis domeſtica *Klein. quadrup. p.* 75.

Le Chat domeſtique: Felis domeſtica *Briſſ. regn. an. p.* 264 *n.* I.

Felis cauda elongata, vnguibus retractilibus; auribus aequalibus: the Cat *Brown. Iam. p.* 485.

Le Chat domeſtique *Buff. hiſt. nat. VI tab.* 2.

Die Hauskaze *Hall. vierf. p.* 519.

Felis

Felis (Catus) cauda elongata, corpore fasciis nigricantibus: dorsalibus longitudinalibus tribus: lateralibus spiralibus *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 4 *n.* 9.

The domestic Cat *Penn. brit. zool. p.* 21.

Gatto domestico *Alessf. quadrup. I tab.* 35.

Die zahme Katze *Müll. Naturf. I tab.* 31 *fig.* 6.

Die Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p.* 232.

Die zahme Katze *Mart. Buff. vierf. II tab.* 38.

Felis Catus domesticus *Schreb. Säugth. III tab.* 107 *B fig.* 1 propria.

Gato *Hispanis.*

Gato (*mas*), Gata (*femina*) *Lusitanis.*

Gatto *Italis.*

Chat *Gallis.*

Gwrcath (*mas*), Cath (*femina*) *Cambrensibus.*

Kater (*mas*), Katze (*femina*) *Germanis.*

Kater (*mas*), Kat (*femina*) *Belgis.*

Cat *Anglis.*

Kat *Danis.*

Katta *Suecis.*

Kot *Polonis.*

Komb (Kot) (*mas*) Кошка (Koschka) (*femina*) *Russis.*

Matsch, Kotschasch *Tataris.*

Priss *Tscheremissis.*

Kotschak *Tschuwaschis.*

Kotschisch *Wotiakis.*

Saka, Katka *Morduanis.*

Kan *Sirjänice.*

Angorensis. γ) *Angorensis: domesticus pilis longioribus argenteis sericeis, in collo longissimis.*

Le Chat d'Angora: Felis (Angorensis) pilis longissimis toto corpore vestita *Briss. regn. an. p.* 266 *n.* 4.

Le Chat d'Angora *Buff. hist. nat. VI tab.* 5.

The Angora Cat *Penn. syn. quadr. p.* 184 *n.* 133 β.

Gatto d'Angora *Aleff. quadrup. I tab.* 37 fig. Buff.
Die Angorifche Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p.* 237 *tab.* 40 *fig.* 2.
Felis Catus angorenfis *Schreb. Säugth. III tab.* 107 *B fig.* 2 Buff.

Hifpanicus. δ) *Hifpanicus: nigro, albo aurantioque varius.*
Le Chat d'Efpagne *Buff. hift. nat. VI tab.* 3.
The Tortoife fhell Cat *Penn. fyn. quadr. p.* 184 *n.* 133 *β.*
Gatto di Spagna *Aleff. quadrup. I tab.* 36 fig. Buff.
Die fpanifche Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p.* 234.
Die fpanifche Katze *Mart. Buff. vierf. II tab.* 39 *fig.* 2.

caeruleus. ε) *Caeruleus.*
Le Chat des Chartreux *Buff. hift. nat. VI tab.* 4.
The blue Cat *Penn. fyn. quadr. p.* 184 *n.* 133 *γ.*
Die Karthäuferkatze oder afchfarbige Hauskatze *Mart. Buff. vierf. II p.* 236 *tab.* 40 *fig.* 1.

ortus forte ex:
Blaue Katzen *Kolbe Vorgeb. p.* 153.

Catus Ferus maior domeftico. Pili longi molles ex flauo albi admixto grifeo, ftriis grifeis deorfum vergentibus oriundisque e ftria obfcura longitudinali dorfali. Cauda nigro fiue fufco et albo annulata, apice nigro. Crura poftice nigra. Seniori cauda apice nodofa. Domefticus variat colore.

Habitat in Europae auftralis filuis; domefticus colitur et in borealibus.

Mores congenerum. Tranquilla ore molat, caudam erigit; excitata agiliffima, fcandit, irata fremit odore ambrofiaco; oculi noctu lucent. Pupilla interdiu

terdiu perpendiculari oblonga, noctu tereti ampliata; vnguibus complicatis incedit; parce bibit; vrina maris corrosiua; ructus foetidissimus; stercus sepelit; clamando rixandoque misere amat; cum pullis repentibusque ludit; in praedam intenta caudam mouet; Murum Leo; pacata in comessantibus; pullos conuocat, carnes piscesque edit, calida, salsa vegetabiliaque respuit; os instante tempestate palmis lauat, in altum acta decidit in pedes, Pili electrici. Pulices non habet. Delectatur Maro, Nepetha, Valeriana. Coit primo vere, grauida 63 diebus parit 3-6 coccos per dies nouem.

Serval. 13. F. cauda subabbreuiata, corpore supra fusco maculis nigris, orbitis ventreque albis.

Le Chat-pard *Perr. anim. I p.* 108 *tab.* 13 fig. bona.
Der Kazenparder *Hall. vierf. p.* 529.
Chat-pard *Dictionn. anim. I p.* 504.
Chat-pard *Bom. dictionn. I p.* 509.
Serval *Bom. dictionn. IV. p.* 219.
Le Serval *Buff. hist. nat. XIII p.* 233 *tab.* 34.
Serval *Aless. quadrup. IV tab.* 151 fig. Buff.
Felis Serval *Schreb. Säugth. III tab.* 108 *fig.* Buff.
Der Serval *Müll. Naturs. Suppl. p.* 30.
Serval *Lusitanis in India.*
Maraputé *Malabarice.*

Maior Cato, minor Viuerra Zibetha. Corpus fulvum, ventre albo, maculis nigris, rotundis, minoribus. Orbitae albae.

Habitat in filuis montosis Indiae, in arboribus degens. vix descendens in terram, saliensque ex arbore in arborem. Ferum animal, non domandum.

Cara-

Caracal. 14. F. cauda fubabbreuiata, auriculis apice barbatis, corpore immaculato.

Les Karacoulacs *Thevenot voy. II p.* 114.
Siyah-Ghufh *Charlet. exerc. p.* 21 *fig. p.* 23.
Siyah-Ghufh Perfice dictum animal *Rai. fyn. quadr. p.* 168.
The Black-Ears, The Gat el Khallah, Siyah Gufh, or Karrah Kulak *Shaw trav. p.* 247.
Felis cauda elongata, auribus penicilliformibus *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 43.
Felis cauda elongata, auribus penicilliformibus *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 5.
Lynx cauda vitulina *Klein. quadrup. p.* 77.
Felis cauda elongata, auribus penicilli-formibus. The longtailed Felis, with penicilled ears *Hill anim. p.* 544.
Luchskaze mit gelben Haaren, ohne Flekken *Hall. vierf. p.* 527.
The Animal fent from the Eaft Indies etc. *Parfons: Philof. transact. LI p.* 648 *cum fig.*
Le Caracal *Buff. hift. nat. IX p.* 262 *tab.* 24.
Caracal *Bom. dictionn. I p.* 421.
The Perfian Lynx *Penn. fyn. quadr. p.* 189 *n.* 137 *tab.* 19 *fig.* 2.
Caracal *Aleff. quadrup. I tab.* 5 fig. Buff.
Felis Caracal *Schreb. Säugth. III tab.* 110 fig. propria.
Der Caracal *Müll. Naturf. Suppl. p.* 30.
Siyah-Ghufh *Perfis.*

Caput paruum. Facies elongata magis quam in reliquis. Auriculae longae, tenues, nigrae, intus apiceque albae, apice nigro barbatae. Nafus albus. Oculi parui. Corpus fupra pallide ex rufo fufcum. Cauda longitudine dimidii corporis obfcurior; pectus et venter albicantia. Artus fortes longique.

Habitat

Th. Hyde commentarii in Ulugh Beighi tabulas [s]tellarum fixarum, Operum ex ed. Greg. Sharpe, Ox[on.] 1767. 4. vol. 1. p. 36. c. icone a G. Edwards delin.

Habitat in Perſia, India et Africa boreali. Venatui inſeruit.

Lynx. 15. F. cauda abbreuiata apice atra, auriculis apice barbatis, corpore maculato.

Λυγξ *Ariſt. hiſt. anim. II c. 7 n. 31. c. 9 n. 50.*

Chama quem Galli rufium vocabant *Plin. hiſt. nat. VIII c. 19 (c. 28 Hard.).*

Ceruarii lupi *Plin. hiſt. nat. VIII c. 22 (c. 34 Hard.).*

Lynx *Plin. hiſt. nat. XI c. 46 (c. 106 Hard.). XXVIII c. 8 (c. 32 Hard.).*

Λυγξ *Aelian. anim. XIV c. 6.*

Λυγξ *Oppian. cyneg. III, 84.*

Lupus ceruarius ſ. Lynx *Hernand. Mex. p. 526.*

Lupus ceruarius *Geſn. quadrup. p. 769 cum fig.* mediocr.

Lynx *Ol. Magn. Sept. p. 610.*

Lynx *Schwenckf. theriotr. p. 108.*

Pinuum Daſypus ſiue Ocotochtli *Nieremb. hiſt. nat. p. 153 cum fig.* mediocr.

Lynx *Aldrov. digit. p. 90.*

Lynx africana *Aldrov. digit. p. 92 fig.* mediocris.

Lynx *Ionſt. quadrup. p. 118.*

Lynx. Luchs *Ionſt. quadrup. tab. 54* fig. mala.

Lynx. Luchs *Ionſt. quadrup. tab. 71 figg.* mediocres.

Ein Luchs, Lutz oder Lux. Ein Thierwolff *Geſn. Thierb. p. 354 cum figg.* malis.

Le Loup-Cervier *Perr. anim. I p. 125 tab. 17* fig. bona.

Lynx *Charlet. exerc. p. 14.*

Lynx, Lupus ceruarius *Wagn. Heluet. p. 178.*

Lynx, Latinis Lupus ceruarius *Rai. ſyn. quadr. p. 166.*

Luchſe *Kolbe Vorgeb. p. 157*; niſi forte ſit F. Caracal.

Wild Cat *Lawſon Carol. p. 118.*

Lynx *Rzacz. Polon. p. 222 auct. p. 313.*

The wild-Cat *Catesb. Carol. app. p. XXV.*

The

The wild-Cat *Brick. North-Carol. p.* 117.

Felis cauda truncata, colore rufescente maculato *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 43.

Luchs *Riding. jagdb. Th. tab.* 16.

The Loup Cervier or Lynx *Dobbs Hudf. p.* 41.

Felis cauda truncata; corpore rufescente maculato *Linn. fn. suec.* I *p.* 2 *n.* 4.

Luchse *Linn. Westgoth. p.* 222.

Der Luchs *Meyer Thiere III tab.* 31 fig. bona.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 7.

Lynx *Klein. quadrup. p.* 77.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato. The truncated-tailed Felis, with the body brown and spotted with black: the Lynx *Hill anim. p.* 544 *tab.* 27, fig. mediocr.

Le Loup-Cervier: Felis (Lynx) auricularum apicibus pilis longissimis praeditis, cauda breui *Briss. regn. an. p.* 275 *n.* 15.

Felis cauda truncata, corpore rufescente maculato *Kram. Austr. p.* 311.

Der Luchs *Hall. vierf. p.* 524.

Felis (Lynx) cauda abbreuiata apice atra, auriculis apice barbatis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 43 *n.* 7.

Luchse *Müll. Samml. III p.* 548, 607.

Loup Cervier *Dictionn. anim. II p.* 709.

Los: Kat met een zeer korte Staart, die aan 't end zwart is, de Ooren aan de tippen met een bosje Hair *Houtt. nat. hist. II p.* 141.

Felis (Lynx) cauda abbreuiata apice atra, auriculis apice barbatis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 4 *n.* 10.

Le Lynx ou Loup-Cervier *Buff. hist. nat. IX p.* 231 *tab.* 21.

Lynx ou Loup-Cervier *Bom. dictionn. II p.* 733.

Felis (Lynx) cauda abbreuiata: apice atra, auriculis apice barbatis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 62 *n.* 7.

Der Luchs *Rytschk. Orenb. I p.* 237.

The

v. Wildungen Taschenbuch a. 1800. c fig.

The Lynx *Penn. syn. quadr. p.* 186 *n.* 135.
Lupo cerviere *Aless. quadrup. I tab.* 18 fig. Buff.
Der Luchs *Müll. Natursf. I p.* 241 *tab.* 30 *fig.* 3.
Felis Lynx *Schreb. Säugth. III tab.* 109 fig. Buff.
Felis (Lynx) cauda abbreuiata: apice atra, auriculis apice barbatis *Müll. Dan. prodr. p.* 2 *n.* 9.
Lince, Lynce, Lobo cerval *Hispanis.*
Lince, Lobo cerval *Lusitanis.*
Lince, Lupo cervero, Lupo cerviere, Lupo Gatto *Italis.*
Lynx, Loup-Cervier *Gallis.*
Luchs *Germanis.*
Los *Belgis.*
Lynx, Ounce *Anglis.*
Los, Grup *Noruegis.*
Warglo *Suecis.*
Albos *Lapponibus.*
Rys, Ostrowidź *Polonis.*
Рысь (Rys') *Russis.*
Nondo *Tungusis.*
Scheleuffün *Bucharice.*

Longitudo corporis 4 ped. 6 poll. caudae 6 poll. Auriculae erectae, apice nigrae, pilis longioribus nigris barbatae. Oculi pallide flaui, fulgentes. Palpebra inferior albicans, vt et superior versus canthum maiorem. Macula linearis fusca pone oculos. Pili infra mentum longiores. Corpus pilis longis, mollibus, cinereis subrufis, maculis obscurioribus, in nonnullis vix apparentibus. Venter albus. Sutura velleris α) a latere reflexo auriculae ad humeros. β) a gula versus brachium et cubitum ad latus anterius exteriusue. γ) ab ano ad genu posticum. δ) duplicata a genu ad calcaneum: pilis interiectis reflexis, rigidulis, breuioribus. Verrucae setiferae supra oculos sex maiores superiores; octo minores inferiores. Verrucae tem-

porum quinque, quarum duae superiores aequales; tres vero inferiores remotiores: intermedia maiore. Verrucae ad calcanea palmarum quatuor inaequales. Cauda femoribus paullo brevior, apice atra. Pedes crassi fortesque, palmis plantisque amplissimis.

Varietas maior albicans, maculis nigris:

Felis cauda truncata, colore albo maculato *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 43.

Felis cauda truncata; corpore albo maculato Linn. *fn. suec.* 1 *p.* 2 *n.* 5.

Felis cauda truncata, corpore albo maculato *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 4 *n.* 8.

Lynx colore albo; maculis nigris cauda truncata *Klein. quadrup. p.* 77.

Felis cauda truncata, corpore albo, maculato. The short tailed, white Felis, with black spots: the white Ounce *Hill anim. p.* 545.

Le Chat-Cervier: Felis (Catus ceruarius) alba, maculis nigris variegata cauda breui *Briss. regn. an. p.* 274 *n.* 14.

Die Luchskatze mit schwarzen Flekken auf weissem Grunde *Hall. vierf. p.* 527.

Irbis *Müll. Samml. III p.* 607.

Felis cauda truncata, corpore albo maculato *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 5 *n.* 11.

Katzluchs *Borussis.*

Kattlo *Suecis.*

Habitat in siluis densioribus terrarum borealium Europae, Asiae, Americae. Arbores inhabitat. Victitat Leporibus, Capris, Ouibus, in quos se deiicit ex arboribus eorumque iugulo adhaeret. Adspiciens canem globo perfoditur. Parit duo vel tres. Pellis bona.

Haud

Haud differre videtur:
The Bay Lynx *Penn. ſyn. quadr. p.* 188 *n.* 136 *tab.* 19 *fig.* 1.

Magnitudo dupla Cati maioris. Auriculae erectae, acutae, pilis longis, nigris barbatae. Irides flauae. Orbitae albae. Caput, dorſum, latera et crura extus ſplendentia fuſca maculis obſcurioribus. In facie lineae nigrae ad naſum deorſum vergunt. Labium ſuperius vtrinque ſeriebus tribus macularum paruarum nigrarum, quibus vibriſſae inſident. Lineae aliquot nigrae, curuatae, ab oculis verſus collum excurrunt. Genae, labia, corpus ſubtus et crura intus alba. Crura antica intus ſupra lineis duabus nigris. Cauda breuis ſupra faſciis nigricantibus; in apice faſcia atra, apex caudaque ſubtus alba. Pili breuiores ac laeuiores quam in vulgari.

Habitat circa nouum Eboracum.

Species obſcurae.

* The Cape Tiger *Penn. ſyn. quadr. p.* 181 *n.* 131.
Tygerbuſchkatzen *Kolbe Vorgeb. p.* 154?

Longitudo fere trium pedum. Pili breues, ſplendentes, ferruginei. Facies lineis nigris deorſum verſis. Dorſum ab occipite ad caudam vſque ſtriis oblongis nigris. Latera maculis paruis nigris numeroſiſſimis. Venter albus. Cauda elongata fuſca, nigro maculata.

Habitat in capite bonae ſpei? Pellem deſcripſit Pennantus.

** A particular beautiful Kind of Cats *Kaempf. Iap. I p.* 125.

The leſſer Leopard *Penn. ſyn. quadr. p.* 173 *n.* 124.

Dimidio minor F. Leopardo, caudaque pro ratione corporis breuiore. Facies nigro maculata. Mentum album. Macula magna nigra ad vtrumque latus labii ſuperioris. Pectus maculis paruis. Venter albus nigro maculatus. Corpus ſupra et lateribus pilis ſplendentibus flauis, maculis nigris in circulos diſpoſitis vt in Leopardo, minoribus tamen quam in hoc. Cauda faſtigiata, pilis breuibus.

Habitat in India orientali et Iaponia. Mitis, vt domeſtica adeo ſit in Iaponia.

*** Rothe Katzen *Kolbe Vorgeb. p.* 153.

Stria pulchra ſplendide rubra lata in dorſo a capite incipiens. Venter cinereus ſiue albicans.

45. CANIS.

Dentes Primores Superiores VI: laterales longiores distantes: intermedii lobati.

Inferiores VI: laterales lobati.

Laniarii solitarii, incuruati.

Molares VI s. VII (pluresue quam in reliquis).

familiaris. 1. C. cauda (sinistrorsum) recuruata.

Κυων *Arist. hist. anim. I c. 6 n.* 41. *II c.* 5 *n.* 23. *c.* 11 *n.* 72, 73. *III c.* 7 *n.* 95. *V c.* 11 *n.* 125-127. *c.* 13 *n.* 138. *VI c.* 20 *n.* 264-291.

Canis *Plin. hist. nat. VIII c.* 40-42 (*c.* 61-63 *Hard.*). *X c.* 63 (*c.* 83 *Hard.*).

Κυων *Aelian. anim. III c.* 2. *IV c.* 40. *VI c.* 53, 62. *VIII c.* 1, 2, 9. *X c.* 45.

Κυων *Oppian. cyneg. I,* 367.

Canis *Gesn. quadrup. p.* 173 *cum fig.*

Canis *Schwenckf. theriotr. p.* 73.

Canis *Aldrov. digit. p.* 482.

Canis *Ionst. quadrup. p.* 176.

Canis. Ein Hund *Gesn. Thierb. p.* 211 *cum figg.*

Canis *Charlet. exerc. p.* 26.

Canis *Sibb. Scot. an. p.* 12.

Canis *Rai. syn. quadr. p.* 175.

Canes *Rzacz. Polon. p.* 244.

Canis the Dog *Sloane Iam. II p.* 329.

Canis cauda recurua *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 44.

CANIS genus vorax, morsu lacerans, arbores non scandit. Penis nodosus est. Facies longior ac Felis.

Canis cauda recurua *Linn. fn. suec.* I *p.* 5 *n.* 12.
Canis cauda (finistrorsum) recurua *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 1.
Canes proprie dicti *Klein. quadrup. p.* 68.
Canis cauda recurua. The Canis, with the tail bent upwards: the Dog *Hill anim. p.* 552.
Canis familiaris *Linn. amoen. acad. IV p.* 43 *cum fig.*
Canis (domesticus) cauda finistrorsum recurua *Linn. mus. Ad. Frid. I p.* 6.
Le Chien *Buff. hist. nat. V p.* 185.
Le Chien: Canis domesticus *Briss. regn. an. p.* 235 *n.* 1.
Canis cauda recurua *Kram. Austr. p.* 312.
Der Hund *Hall. vierf. p.* 470.
Canis (familiaris) cauda (finistrorsum) recuruata *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 38 *n.* 1.
Chien *Dictionn. anim. I p.* 603.
Hond: Hond met de Staart (over de slinkerzyde) opgekruld *Houtt. nat. hist. II p.* 35.
Canis (familiaris) cauda finistrorsum recurua *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 3 *n.* 5.
Canis cauda finistrorsum recurua *Gronov. zooph. I p.* 8 *n.* 29.
The Dog *Penn. brit. zool. p.* 23.
Hunde *Pontopp. Dan. I p.* 603.
Chien *Bom. dictionn. I p.* 564.
Canis (familiaris) cauda (finistrorsum) recuruata *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 56 *n.* 1.
Canis familiaris *Forster: Philos. transact. LVII p.* 341.
The faithfull Dog *Penn. syn. quadr. p.* 141 *n.* 110.
Der Hund *Mart. Buff. vierf. II p.* 88.
Der gesellige Hund *Müll. Natursf. I p.* 207 *Suppl. p.* 27.
Der Hund *Stell. Kamtsch. p.* 132.
Canis Ferus *Forsk. fn. orient. p. III.*

Der

Der Hund: Canis familiaris *Schreb. Säugth. III p.* 318 *n.* 1 *tab.* 87 *fig.* Riding.

Canis (familiaris) cauda recuruata *Müll. Dan. prodr. p.* 2 *n.* 4.

Perro *Hispanis.*

Cam *Lusitanis.*

Cane *Italis.*

Chien (*mas*), Chienne (*femina*) *Gallis.*

Ci (*mas*), Gast (*femina*) *Cambrensibus.*

Hund (*mas*), Hündinn (*femina*) *Germanis.*

Hond *Belgis.*

Dog *Anglis.*

Hund, Rakke, Köter, Mynde *Danis.*

Lubba *Islandis.*

Hund *Suecis.*

Psi *Polonis.*

Песъ (Pes), Собака (Sobaka) (*mas*); Сука (Suka) (*femina*), Псица (Psitza) (*obsolete*); Щеня (Sczenja), Щенокъ (Sczenok) *catulus.*

Ist *Tataris.*

Pi *Tscheremissis.*

Iida *Tschuwaschis.*

Punù *Wotiakis.*

Pi'na *Morduanis.*

Pon *Permice et Sirjänice.*

Kosha, Suka Guinoxa, Koha *Kamtschadalis.*

Kelb mærre *Aegyptiis.*

Caput horizontale, ante oculos angustatum, pilis brevioribus tectum. Cranium eleuatum, vertice carinato. Dentes primores superiores sex, recti, paralleli: lateralibus remotis. Primores inferiores sex, paralleli: exterioribus lobulo laterali instructis. Laniarii vbique solitarii, subulati, maiores: superiores vtrinque remoti; inferiores tantum postice remoti. Molares superiores sex vtrinque; inferiores septem, acuti, sublobati. Labium

 superius

ſuperius obtuſum, fornicatum, lateribus tegens inferius, antice lacuna longitudinaliter conniuente excauatum. Labium inferius margine laterali occultato; nudo, molli, obtuſe denticulato inſtar criſtae. Myſtaces labii ſuperioris ex vibriſſis rigidiuſculis, antrorſum flexis, quinque vel ſex ordinum horizontalium, inſidentibus papillis verrucoſis: ſuperiore ordine remotiore. Labium inferius antice plurimis papillis ſetiferis adſperſum. Naſus vltra labium prominens, obtuſus, nudus, rugoſus, humidiuſculus. Narium foramina rotunda, extrorſum recuruata ſinu lunari. Oculorum iris griſea; pupilla nigra; membrana nictitans intra canthum oculi maiorem, breuis. Supercilia vix vlla, quamuis pili in palpebra ſuperiore verſus canthum minorem promineant. Auriculae piloſae, oblongo-ouatae, margine baſeos ſuperiore reflexo, margine poſtico verſus baſin duplicato: interiore bilobo. Verrucae faciei ſeptem: α) vnica vtrinque ſupra canthum oculi maiorem. β) vnica vtrinque in medio vtriusque malae. γ) vnica vtrinque extra dentes molares. δ) vnica impar, ſub gula. Lingua laeuis, obtuſa, planiuſcula, longitudinaliter canaliculata. Palatum transuerſim profunde ſulcatum. Collum teretiuſculum, longitudine fere capitis. Truncus teretiuſculus, verſus abdomen poſtice attenuatum. Suturae velleris tredecim: α) collaris vnica vtrinque ab auricula, per latera colli, flexuoſa deſcendit ad baſin ſterni et connectitur cum oppoſita, vbi vorticem non minus format, quam in medio itinere ad latus vtrinque colli. β) ſternea vnica impar a baſi ſterni ad eiusdem apicem ducta, adnexa priori. γ) cubitalis vnica vtrinque a flexura cubiti ad palmam. δ) analis vnica ad anum breuis, transuerſalis. ε) auricularis vnica cingit anteriora auris arcuata. ζ) abdominalis vnica ab vmbilico latera abdominis vtrinque

que ambiens, ad inguina desinens. η) lumbaris vnica ab ano ad poplites. ϑ) ocularis vnica breuissima ad canthum oculi minorem. Pedes antici digitis quinque, semipalmati, vestiti: digitis duobus intermediis aequalibus, longioribus; duobus lateralibus aequalibus breuioribus; pollice ad latus interius tarsi breuissimo. Calcaneus sub basi carpi, digiti forma, muticus, apice nudus. Pedes postici anticis simillimi, sed absque pollice (qui tamen haud raro adest). Vngues conuexi modice compressi, obtusi, in omnibus digitis fixi, quos vix retrahit, hinc obtusiores. Cauda cylindrica, pedum fere longitudine, sinistrorsum recuruata, pilis vestita, quam hilaris recuruat, timidus vero inter femora inflectit. Scrotum vestitum quoad partem. Praeputium prominulum, vestitum. Mammae in femina decem: sex abdominalibus, quatuor pectoralibus; in mare sex abdominales, pectorales nullae.

Habitat fere vbique cum Homine; sacer olim Aegyptiis, hodie Iaponensibus, inter quos numerosissimus reperitur *Kaempf. Iapon. I p.* 125. Etiam spontaneus euasit passim ab homine derelictus: in Congo regno, Aethiopia inferiore, versus caput bonae spei, pilo rufo, corpore gracili, gregarius; adoritur adeo Leones, Tigrides, Elephantes, quorum saepe praeda fit. Copiosissimus quoque in America australi, in caucis cuniculorum similibus pariens, raro latrans, vigil, auriculis erectis: horum caniculi hominem facile sequuntur.

Dilacerat editque carnes, cadauera, adeoque putrida, vegetabilia farinosa, rarius olera fructusque. Digerit ossa. Vomitu a Tritico repente aut canino vel Dactyli glomerata purgatur. Cacat supra lapidem; album graecum septicum. Potat lambendo.

bendo. Mingit ad latus, cum hospite saepius centies. Odorat anum alterius. Odoratu excellit naso humido. Latrat. Oblique currit. Incedit supra digitos. Facile natat. Vix sudat; calidus linguam exserit. Cubitum iturus circumit locum. Dormit auditu acutiore, licet saepius cum stertore. Somniat. Oscitat euigilans. Procis rixantibus crudelis. Menstruans catullit cum variis; mordet illa illos, non illi illam; cohaeret copula iunctus. Grauida 63 diebus, parit 4 ad 10 coecos, masculis patri similibus, femineis matri. Adolescit annuo tempore. Aetas 12-15 annorum. Fidissimus omnium: Hominibus cohabitat; blanditur ad domini accessum; eius inflictum non fert. Praecurrit in itinere; in biuio respicit. Docilis: amissa inquirit, vigilias noctu instituit, aduenas indicat, ad merces vigilat, Pecora ab agris arcet, Tarandos coercet, Boues Ouesque a Feris custodit, Leones detinet, Feras agitat, Anatibus adstat, repit assiliens ad rete, occisa a venatore adportat e rapina desistens; veru trahit in Gallia, in Belgio currus leuiores, rhedam in Kamtschatka. Mendicat ad mensam; furatus timet cauda incurvata; inuidus edit; inter suos dominus domi; mendicorum hostis; ignotos sine iniuria lacessit. Lambendo vulnera, podagram, carcinomata curat. Vlulat mingitque ad musicam. Mordet proiectum lapidem. Instante tempestate foetet aegrotans; taenia laborat, rabiem disseminat, demum caecutit et se ipsum rodit; ab oleo empyreumatico aethereoue caudae instillato clamitat; saepe gonorrhoea infectus, a Mahometanis expellitur. Anatomicorum victima pro experimentis variis. Caro Africanis, Sinensibus incolisque insularum australium esculenta, olim Graecis ac Romanis.

Coire

Coire Canem cum Simia *Blumenb. gen. hum. var. p.* 11.

Varietates plures, nonnullae maxime diſtinctae: num verae ſpecies?

α) Canis οικȣρος domeſticus ſeu ſocius *Rai. ſyn. quadr. p.* 177 *n.* 8.
Canis domeſticus ſ. villaticus *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 1.
Le Chien de Berger *Buff. hiſt. nat. V p.* 241 *tab.* 28.
Der Schäferhund *Hall. vierf. p.* 479.
Huishond *Houtt. nat. hiſt. II p.* 36.
Herdershond *Houtt. nat. hiſt. II tab.* 12.
Canis (familiaris domeſticus) auriculis erectis, cauda ſubtus lanata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 57 *n. α.*
The Shepherd's Dog *Penn. ſyn. quadr. p.* 144 *n. I.*
Cane da Paſtori *Aleſſ. quadrup. II tab.* 94.
Der Schäfer-oder Hirtenhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 164 *tab.* 23 *fig.* 1.
Haushund *Müll. Naturſ. I p.* 207 *n. a.*
Der Schäferhund *Schreb. Säugth. III p.* 319 *n.* 1.
Can di paſtori *Italis.*
Chien de Berger *Gallis.*
Haushund, Schäferhund *Germanis.*
Huishond, Herdershond *Belgis.*
Curre, Houſe-Dog *Anglis.*
Hushund *Suecis.*

Magnitudo Vulpis. Auriculae erectae, breues. Cauda ſubrecta, ſubtus longius piloſa. Variat colore nigro, fuſco, etc.

β) Chien-Loup *Buff. hiſt. nat. V p. 242 tab. 29.*
Der Wolfshund *Hall. vierf. p. 480.*
The Pomerian Dog *Penn. ſyn. quadr. p. 144 n. I α.*
Can lupo *Aleſſ. quadrup. II tab. 95.*
Der Wolfshund *Mart. Buff. vierf. II p. 165 tab. 24.*
Der Spiz *Schreb. Säugth. III p. 319 n. 2.*
Chien-Loup *Gallis.*
Spitz, Pommer *Germanis.*

Magnitudo Vulpis, minorue. Os ſubacutum. Pili longiores circa os et in capite. Artus mediae longitudinis. Cauda maxime recuruata. Vtplurimum albus.

γ) Chien de Sibérie *Buff. hiſt. nat. V p. 242 tab. 30.*
Der Siberiſche *Hall. vierf. p. 480.*
Siberiſche Hond *Houtt. nat. hiſt. II tab. 12 fig.* Buff.
The Siberian Dog *Penn. ſyn. quadr. p. 144 n. I β.*
Cane di Siberia *Aleſſ. quadrup. II tab. 96.*
Der ſiberiſche Hund *Mart. Buff. vierf. II p. 166 tab. 25 fig. 1.*
Der ſibiriſche Hund *Schreb. Säugth. III p. 319 n. 3.*
Cptn Cook's voyage to the Northern hemisphere vol. III. p. 263 & tab. 70.
Similis praecedenti. Auriculae erectae. Caput pilis longis vti totum corpus. Niger, albus, vel griſeus.

δ) Canis Getulus ſeu Islandicus, a Shock *Rai. ſyn. quadr. p. 177?*
Chien d'Islande *Buff. hiſt. nat. V p. 242 tab. 31.*
Der Lappländiſche Hund *Hall. vierf. p. 480?*
Der Isländiſche Hund *Hall. vierf. p. 480.*
Yslandſche Hond *Houtt. nat. hiſt. II tab. 12 fig.* Buff.

Cane

Cane d'Islanda *Aleff. quadrup. II tab.* 97 fig. Buff.
Der isländische Hund *Mart. Buff. vierf. II p.* 167 *tab.* 25 *fig.* 2.
Der isländische Hund *Schreb. Säugth. III p.* 320 *n.* 4.

Caput magnum, rotundatum, rostro tenui atque acuto. Auriculae erectae, apicibus pendulis. Cauda recuruata. Pedes mediae longitudinis, tenues. Pili longi, excepto rostro.

e) Canis sagax ad aquas *Aldrov. digit. p.* 556 *fig.* mala.
Canes Hünde *Ionst. quadrup. tab.* 70 *fig. inferior ad dextram* bona.
Canis Auiarius aquaticus *Rai. syn. quadr. p.* 177.
Canis aquaticus *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 5.
Grand Barbet *Buff. hist. nat. V p.* 246 *tab.* 37.
Der Pudel *Hall. vierf. p.* 485.
Krulhond *Houtt. nat. hist. II p.* 37 *tab.* 12 fig. Buff.
Canis (familiaris aquaticus) pilo crispo longo instar Ouis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 57 *n. ε.*
Waterdog *Penn. syn. quadr. p.* 144. *n. II δ.*
Can barbone *Aleff. quadrup. III tab.* 101 fig. Buff.
Der grosse Budel *Mart. Buff. vierf. II p.* 174 *tab.* 30 *fig.* 1.
Pudel *Müll. Naturf. I p.* 208 *n. e.*
Der Budel *Schreb. Säugth. III p.* 320 *n.* 5.
Perro de agua, Barbudillo *Hispanis.*
Barbone *Italis.*
Barbet *Gallis.*
Pudel, Budel *Germanis.*
Krulhond *Belgis.*
Water-Spaniel *Anglis.*
Dogg *Suecis.*

Caput rotundatum roſtro breui et craſſo. Auriculae latae et pendulae. Corpus craſſum. Pedes breues. Cauda fere recta, horizontalis. Pili totius animalis longi et criſpi. Niger, griſeus, fuſcus, albus, etc.

ϛ) Petit Barbet *Buff. hiſt. nat. V p.* 250 *tab.* 38 *fig.* 2.
Der kleine Pudel *Hall. vierf. p.* 488.
Der kleine Budel *Mart. Buff. vierf. II p.* 183 *tab.* 31 *fig.* 2.
Barbino *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 167 *fig.* 2.
Der Zwergbudel *Schreb. Säugth. III p.* 321 *n.* 6.

Similis praecedenti, at minor; roſtro breuiore. Auricularum pili longiſſimi, penduli.

ζ) Canis Melitenſis breuioribus pilis *Aldrov. digit. p.* 541 fig. mediocr.
Gredin *Buff. hiſt. nat. V p.* 247 *tab.* 39 *fig.* 1.
Le Pyrame *Buff. hiſt. nat. V tab.* 39 *fig.* 2.
Der engliſche Wachtelhund *Hall. vierf. p.* 485.
King Charles's dog *Penn. ſyn. quadr. p.* 145 *n. III α.*
Pyrame *Penn. ſyn. quadr. p.* 145 *n. III β.*
Cani d'Inghilterra *Aleſſ. quadr. IV tab.* 170.
Der engliſche Wachtelhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 176 *tab.* 32 *fig.* 1.
Der Pyrame *Mart. Buff. vierf. II p.* 176 *tab.* 32 *fig.* 2.
Der kurzhaarige Bologneſer *Schreb. Säugth. III p.* 321 *n.* 7.
Gredin, E'pagneul d'Angleterre *Gallis.*

Caput paruum, rotundatum, roſtro breui. Pili longi, praecipue pone auriculas, ſub collo, pectore, ventre atque poſtice in pedibus anticis

et

et pofticis. Cauda recuruata. Color niger, albus, variegatus. *Pyrame* niger maculas fuluas habet fupra oculos.

κ) Canis Hifpanicus auribus demiffis, pectore, ventre, pedibus albis maculis nigris diftinctis, reliquo corpore nigro *Aldrov. digit. p.* 561 *fig.* mediocris.

Canis Hifpanicus alter auribus demiffis *Aldrov. digit. p.* 562 *fig.* mediocr.

Canis extrarius f. Hifpanicus *Linn. amoen. acad. IV p.* 47 *n.* 9.

E'pagneul *Buff. hift. nat. V p.* 246 *tab.* 38 *fig.* 1.

Das Bologneferhündchen *Hall. vierf. p.* 488 *tab.* 57.

Spaanfche Hond *Houtt. nat. hift. II p.* 38.

Spanjolet *Houtt. nat. hift. II tab.* 12 fig. Buff.

Canis (familiaris extrarius) auriculis longis lanatis pendulis *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 57 *n. κ.*

Spagnoletto *Aleff. quadrup. IV tab.* 167 *fig.* 1.

Der Spanifche Wachtelhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 175 *tab.* 31 *fig.* 1.

Der fpanifche Hund *Müll. Naturf. I p.* 209 *n. k.*

Der Bolognefer Hund *Schreb. Säugth. III p.* 322 *n.* 8.

E'pagneul *Gallis.*

Pili longiffimi, praecipue pone auriculas, fub collo, pectore, ventre atque pone in pedibus anticis atque pofticis. Vtplurimum albus, interdum variegatus, faepe maculis nigris et fufcis ad auriculas. Auriculae longiffimae, pendulae.

λ) Canis Melitenfis *Aldrov. digit. p.* 542.

Catulus Melitaeus *Rai. fyn. quadr. p.* 177 *n.* 9.

Canis Melitaeus *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 6.

Bichon *Buff. hift. nat. V p.* 251 *tab.* 40 *fig.* 1.

Schoothondje *Houtt. nat. hift. II p.* 37.

Bolo-

Bologneesch Hondje *Houtt. nat. hist. tab.* 12 fig. Buff.

Canis (familiaris meliteus) magnitudine Sciuri *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* ζ.

Shock *Penn. syn. quadr. p.* 145 *n. III* γ.

Can Malthese *Alessi. quadrup. IV tab.* 168 *fig.* 2.

Das Bologneser Hündchen *Mart. Buff. vierf. II p.* 184 *tab.* 33 *fig.* 1.

Bologneserhund *Müll. Naturf. I p.* 208 *n. f.*

Der angorische Hund *Schreb. Säugth. III p.* 322 *n.* 9.

Perrillo de falda *Hispanis.*

Cachorro *Lusitanis.*

Cagnuolo, Cagnuolino *Italis.*

Bichon *Gallis.*

Lap-dog, Shock *Anglis.*

Knähund *Suecis.*

Omnium minimus. Caput rotundatum, rostro crasso. Oculi auriculaeque pilis longissimis occultati. Pili mollissimi, sericei longissimique, in toto corpore. Pedes breues. Malignus.

ι) Chien-lion *Buff. hist. nat. V p.* 251 *tab.* 40 *fig.* 2.

Das Löwenhündchen *Hall. vierf. p.* 488.

Can Lione *Alessi. quadrup. IV tab.* 168 *fig.* 1.

Das Löwenhündchen *Mart. Buff. vierf. II p.* 185. *tab.* 33 *fig.* 2.

Der Löwenhund *Schreb. Säugth. III p.* 322 *n.* 10.

Similis praecedenti, at pilis longissimis tantum in capite, pectore, pedibus apiceque caudae.

κ) Petit Danois *Buff. hist. nat. V p.* 247 *tab.* 41 *fig.* 1.

Der kleine Dänische Hund *Hall. vierf. p.* 486.

Basterd-

Basterd-Deentje *Houtt. nat. hist. II tab.* 12 fig. Buff.

Der kleine Dänische Hund *Mart. Buff. versf. II p.* 177 *tab.* 34 *fig.* 1.

Der Harlekin *Schreb. Säugth. III p.* 323 *n.* 11.

Caput rotundatum magnum, vertice eleuato, rostro paruo, recto, acuto. Oculi magni. Auriculae paruae, subpendulae. Abdomen postice attenuatum. Crura gracilia. Color varius, saepe albus maculis maioribus minoribusue.

λ) Roquet *Buff. hist. nat. V p.* 253 *tab.* 41 *fig.* 2.

Der Roquet *Hall. versf. p.* 489.

Bastard-Pug *Penn. syn. quadr. p.* 147 *n. V* γ.

Der Roquet *Mart. Buff. versf. II p.* 188 *tab.* 34 *fig.* 2.

Der Bastartmops *Schreb. Säugth. III p.* 323 *n.* 12.

Caput paruum, vertice eleuato, naso subsimo crasso. Oculi magni, prominentes. Auriculae paruae, subpendulae. Abdomen postice attenuatum. Crura longa, gracilia. Color variat: saepe albus, maculatus aut immaculatus. Hybridus est ex antecedente et sequente.

μ) Canis fricator *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 7.

Doguin *Buff. hist. nat. V p.* 252 *tab.* 44.

Der Mops *Hall. versf. p.* 488.

Steendog *Houtt. nat. hist. II p.* 38 *tab.* 12 fig. Buff.

Canis (familiaris fricator) naso resimo, auribus pendulis, corpore quadrato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* ꝛ.

Pug-dog *Penn. syn. quadr. p.* 147 *n. V* β.

Cane mufolo *Aless. quadrup. III tab.* 103.

Der

Der Mops *Mart. Buff. vierſ. II p.* 186 *tab.* 36 *fig.* 2.
Mops, Steindocke *Müll. Naturſ. I p.* 209 *n.g.*
Der Mops *Schreb. Säugth. III p.* 323 *n.* 13.
Mopſe, Doguin, Dogue de Bologne, Dogue d'Allemagne. *Gallis.*
Mops *Germanis.*
Pug-dog *Anglis.*
Mops *Suecis.*

Caput quadratum, naſo breuiſſimo reſimo. Labia breuia. Corpus toroſum, breue. Auriculae pendulae. Pili breues, vtplurimum lutei, os nigrum. Mitis.

L'Artois *Buff. hiſt. nat. V p.* 253.
Der Achtziger oder der Rüſſelſche Hund *Hall. vierſ. p.* 490.
Der Artoiſiſche Hund *Mart. Buff. vierſ. II p.* 188.

Hybridus ex hoc et praecedente.

Le Chien d'Alicante *Buff. hiſt. nat. V p.* 254.
Der Alikantiſche Hund *Hall. vierſ. p.* 490.
Alikantiſche Hunde *Mart. Buff. vierſ. II p.* 189.

Hybridus ex fricatore et extrario.

ν) Canis Maſtiuus ſeu Moloſſus *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 4.
Dogue *Buff. hiſt. nat. V p.* 249 *tab.* 43.
Der Bullenbeiſer *Hall. vierſ. p.* 487.
Wagthond *Houtt. nat. hiſt. II p.* 37.
Dog *Houtt. nat. hiſt. II tab.* 12 fig. Buff.
Canis (familiaris Moloſſus) magnitudine Lupi, labiis ad latera pendulis, corpore toroſo *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* δ.

Bull-

Bull-dog *Penn. syn. quadr. p.* 147 *n. V α.*
Der Bullenbeisser *Mart. Buff. vierf. II p.* 180 *tab.* 36 *fig.* 1.
Bullenbeisser, Wachthund *Müll. Naturf. I p.* 208 *n. d.*
Der Bullenbeisser *Schreb. Säugth. III p.* 324 *n.* 14.
Dogo, Perro grande *Hispanis.*
Dogue *Gallis.*
Bullenbeisser *Germanis.*
Wagthond *Belgis.*
Bull-dog *Anglis.*
Blodhund *Suecis.*
Собака Меделянская (Sobaka medeljanskaja) *Russis.*

Similis fricatori, at maior. Labia pendula. Corpus torosum. Artus fortes. Color luteus saepe vmbra nigra aut grisea. Auriculae extus atque os nigra. Crudelis atque ferox, saepe mordet antequam latret. Angliae proprius, quamuis et ibi hodie rarior sit.

ζ) Canis bellicosus Anglicus *Aldrov. digit. p.* 559 *fig.* mala.
Mastiuus, nonnullis Mastinus *Rai. syn. quadr. p.* 176 *n.* 1.
Dogue de forte race *Buff. hist. nat. V p.* 252 *tab.* 45.
Die englische Dogge *Hall. vierf. p.* 488 *tab.* 32.
Mastiff *Penn. syn. quadr. p.* 146 *n. IV δ.*
Cane d'armi *Aless. quadrup. III tab.* 102.
Die grosse Dogge *Mart. Buff. vierf. II p.* 186 *tab.* 37.
Die englische Dogge *Schreb. Säugth. III p.* 324 *n.* 15.
Can d'armi *Italis.*
Dogue de forte race *Gallis.*

Englische Dogge *Germanis.*
Mastiffe *Anglis.*
Engelsk Dogg *Suecis.*

Affinis antecedenti, at maior, omniumque maximus. Labia crassa, pendula. Caput magnum. Color varius.

o) Canis Sagax *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 2.
Iagdhund *Hall. vierf. p.* 483.
Iagthond *Houtt. nat. hist. II p.* 36.
Canis (familiaris sagax) auriculis pendulis, digito spurio ad tibias posticas *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* β.
Iagdhund *Müll. Naturs. I p.* 207 *n. b.*
Der Iagdhund *Schreb. Säugth. III p.* 324 *n.* 16.
Iagt-hund *Suecis.*

Caput magnum, occipite carinato, rostro elongato. Auriculae latae, longissimae, pendulae. Labia pendula. Corpus elongatum mediae crassitiei. Artus fortes. Digitus spurius plantarum vnguiculatus. Cinereus, niger, rufus, fuscus aut luteus. Latratus grauis ac profundus.

π) Canis venaticus sagax *Rai. syn. quadr. p.* 177 *n.* 4.
Chien courant *Buff. hist. nat. V p.* 243 *tab.* 32.
Chien courant metis *Buff. hist. nat. V tab.* 36.
Dryf-Brak *Houtt. nat. hist. II tab.* 12 fig. Buff.
Hound, or dog with long smooth and pendulous ears *Penn. syn. quadr. p.* 144 *n.* *II.*
Cane da Corsa *Alest. quadrup. II tab.* 98.
Der Iagdhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 168 *tab.* 26.
Der Parforcehund *Schreb. Säugth. III p.* 325 *n.* 17.
Chien courant *Gallis.*

Hound *(maior)*, Beagle *(minor) Anglis.*

Similis praecedenti, albicans.

ρ) Canis Scoticus ſagax *Aldrov. digit. p.* 553 *fig.* mediocr.
Canis Scoticus furum deprehenſor *Aldrov. digit. p.* 554 *fig.* mediocr.
Sanguinarius ſeu furum deprehenſor *Rai. ſyn. quadr. p.* 177.
Spürhund *Hall. vierf. p.* 484?
Blood-hound *Penn. ſyn. quadr. p.* 144 *n. II.*
Der Schweiſshund *Schreb. Säugth. III p.* 325 *n.* 18.
Blood-hound *Anglis.*
Собака вижлая (Sobaka wiſhlaja) *Ruſſis.*

σ) Der Leithund *Schreb. Säugth. III p.* 325 *n.* 19.

τ) Canis ſagax ad coturnices capiendas pantherinus *Aldrov. digit. p.* 555 *fig. mediocr.*
Canis auiarius ſeu Hiſpanicus compeſtris *Rai. ſyn. quadr. p.* 177 *n.* 5.
Canis auicularius *Linn. amoen. acad. IV p.* 47 *n.* 10.
Braque *Buff. hiſt. nat. V p.* 245 *tab.* 33.
Le Braque de Bengale *Buff. hiſt. nat. V p.* 245 *tab.* 34.
Der Spaniſche Wachtelhund *Hall. vierf. p.* 485.
Der Bengaliſche Tigerhund *Hall. vierf. p.* 484.
Patryshond *Houtt. nat. hiſt. II p.* 38.
Brak *Houtt nat. hiſt. II tab.* 12 fig. Buff.
Canis (familiaris auicularius) cauda truncata *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 57 *n. ι.*
Harrier *Penn. ſyn. quadrup. p.* 144 *n. II α.*
Dalmatian Hound *Penn. ſyn. quadr. p.* 144 *n. II β.*
Spaniel *Penn. ſyn. quadr. p.* 145 *n. III.*

Can bracco *Aleff. quadrup. II tab.* 99.
Bracco di Bengala *Aleff. quadrup. II tab.* 100.
Der Spürhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 171 *tab.* 27.
Tiger-oder Bengal. Spürhund *Mart. Buff. vierf. II tab.* 28.
Der Hühnerhund oder Wachtelhund *Müll. Naturf. I p.* 209 *n. i.*
Der Hünerhund *Schreb. Säugth. III p.* 326 *n.* 20.
Podenco *Hifpanis.*
Bracco *Italis.*
Braque, Chien couchant *Gallis.*
Hünerhund *Germanis.*
Patryshond *Belgis.*
Land-Spaniel, Harrier *Anglis.*
Rapphöns-hund, Fogel-hund *Suecis.*
Собака испанская (Sobaka ifpanskaja) *Ruffis.*

Capite craffiore, roftro breuiore fortioreque; auriculis breuioribus anguftioribusque; cauda breviore, carnofiore, rectiore. Pili breues. Albicans maculis nigricantibus aut fufcis, fed et totus albus vel fufcus. Quem bengalenfem dicit Buffonius, dalmaticum Pennantus, tigrinus colore eft.

υ) Der Wafferhund *Schreb. Säugth. III p.* 326 *n.* 21.

Similis praecedenti, at pilis longioribus, crifpis.

φ) Grand Danois *Buff. hift. nat. V p.* 240 *tab.* 26.
Der groffe Dänifche *Hall. vierf. p.* 482.
Danifh Dog *Penn. fyn. quadr. p.* 146 *n. IV γ.*
Can danefe grande *Aleff. quadrup. II tab.* 92.
Der groffe dänifche Hund *Mart. Buff. vierf. II p.* 161 *tab.* 22.

Der

Der dänifche Blendling *Schreb. Säugth. III p.* 326 *n.* 22.
Grand Danois, Danois de Carroffe *Gallis.*

Corpore graciliore, cruribus tenuioribus atque longioribus. Auriculae breues, anguftae, pendulae. Color vtplurimum luteus.

Le Chien de Calabre *Buff. hift. nat. V p.* 254.
Der Kalabrifche Hund *Hall. vierf. p.* 490.
Kalabrifche Hunde *Mart. Buff. vierf. II p.* 192.

Hybridus ex hoc atque extrario.

x) Der Curshund *Schreb. Säugth. III p.* 327 *n.* 23.

Caput elongatum fronte plana, roftro mediae craffitiei. Auriculae paruae, fubpendulae. Crura longa carnofa. Corpus longius graciliusque quam in praecedentibus. Pili colli, ventris caudaeque faepe reliquis longiores. Colore variat.

ψ) Canis Graius Hibernicus *Raii fyn. quadr. p.* 176 *n.* 3.
Der Irrländifche *Hall. vierf. p.* 482.
Irifh Gre-hound *Penn. fyn. quadr. p.* 146 *n. IV α.*
Das groffe irländifche Windfpiel *Schreb. Säugth. III p.* 327 *n.* 24 *tab.* 80 fig. Riding.
Irifh Greyhound *Anglis.*

Omnium fere maximus, in reliquis graio vulgari fimilis. Olim valde communis in Hibernia ad Lupi venationem, hodie rarus.

ω) Canis Leporarius alter ferruginei coloris, feu Turcicus *Aldrov. digit. p.* 550 *fig.* mediocr.

Das türkische Windspiel *Schreb. Säugth. III p.* 327 *n.* 25.

Antecedenti similis, at pili subcrispi.

αα) Canis venaticus *Aldrov. digit. p.* 545 *fig.* mala.
Canis venaticus Graius seu Graecus, nonnullis Scoticus *Rai. syn. quadr. p.* 176 *n.* 2.
Canis Graius *Linn. amoen. acad. IV p.* 46 *n.* 3.
Levrier *Buff. hist. nat. V p.* 240 *tab.* 27.
Der Windhund *Hall. vierf. p.* 481 *tab.* 33.
Windhond *Houtt. nat. hist. II p.* 36 *tab.* 12 fig. Buff.
Canis (familiaris graius) magnitudine Lupi, trunco curuato, rostro attenuato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 57 *n. γ.*
Common Gre-hound *Penn. syn. quadr. p.* 146 *n. IV β.*
Cane levriere *Aleff. quadrup. II tab.* 93.
Der Windhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 162.
Das Windspiel *Mart. Buff. vierf. II tab.* 23 *fig.* 2.
Windhund *Müll. Naturs. I p.* 207 *n. c.*
Der gemeine Windhund *Schreb. Säugth. III p.* 327 *n.* 26.
Lebrel, Galgo *Hispanis.*
Galgo *Lusitanis.*
Levriere *Italis.*
Levrier *Gallis.*
Windhund *Germanis.*
Windhond *Belgis.*
Greyhound, Grehound *Anglis.*
Winthund *Suecis.*
Собака гончая (Sobaka gonczaja) *Russis.*

Caput paruum, elongatum, rostro attenuato, acuminato. Labia breuia. Auriculae minutae, subpen-

ſubpendulae. Totum corpus tenue, abdomine maxime attenuato. Dorſum curuatum postice. Crura longa, tenuia. Cauda tenuis. Pili breues. Vtplurimum ſubluteus, interdum ſtriis griſeis aut nigricantibus. Curſu velociſſimus omnium. Rarius latrat reliquis.

ββ) Canis Leporarius hirſutus albus *Aldrov. digit. p.* 549 *fig.* mediocr.
Oriental Gre-hound *Penn. ſyn. quadr. p.* 146 *n. IV* β 2.
Der zottige Windhund *Schreb. Säugth. III p.* 328 *n.* 27.

A praecedente differt pilis longioribus criſpis.

γγ) Levron *Buff. hiſt. nat. V p.* 241.
Italian Gre-hound *Penn. ſyn. quadr. p.* 146 *n. IV* β 1.
Das kleine Windſpiel *Schreb. Säugth. III p.* 228 *n.* 28.
Levron *Gallis.*
Windſpiel *Germanis.*

Dimidio minor graio vulgari, cui in reliquis ſimillimus. Timidus.

δδ) Canis ſine pilis *Aldrov. digit. p.* 563 *fig.* mala.
Canis aegyptius *Linn. amoen. acad. IV p.* 47 *n.* 11.
Chien-turc *Buff. hiſt. nat. V p.* 248 *tab.* 42 *fig.* 1.
Chien-turc metis *Buff. hiſt. nat. V tab.* 42 *fig.* 2.
Canis pilis carens, minor. The Indian Dog *Brown. Jam. p.* 486.
Der Türkiſche Hund *Hall. vierf. p.* 487.
Turkſche Hond *Houtt. nat. hiſt. II p.* 39 *tab.* 12 fig. Buff.

chlin de habitu & colore aethiopum - pag. 56 fig. 78

Canis (familiaris aegyptius) nudus absque pilis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* λ.
Naked Dog *Penn. syn. quadr. p.* 147 *n. V* δ.
Can Turco *Aless. quadrup. IV tab.* 169 *fig.* 1.
Can Turco bastardo *Aless. quadrup. IV tab.* 169 *fig.* 2.
Der türkische Hund *Mart. Buff. vierf. II p.* 178 *tab.* 35 *fig.* 1.
Der türkische Blendling *Mart. Buff. vierf. II p.* 179 *tab.* 35 *fig.* 2.
Der türkische Hund *Müll. Naturs. I p.* 210 *n. l.*
Der türkische nackte Hund *Schreb. Säugth. III p.* 329 *n.* 29.
Chien-turc *Gallis.*
Naken-Hund *Suecis.*

Conuenit cum praecedente abdomine attenuato cruribusque longioribus; differt capite crassiore, rostro breuiore. Pili in toto corpore nulli praeter vibrissas. Cutis nuda, cinerea, nigricans, aut coloris carnei. Ex Guinea oriundus.

εε) Mâtin *Buff. hist. nat. V p.* 239 *tab.* 25.
Der Bauerhund *Hall. vierf. p.* 481?
Wagthond *Houtt. nat. hist. II tab.* 12 fig. Buff.
Mastino *Aless. quadrup. II tab.* 91.
Der Haus-oder Bauernhund *Mart. Buff. vierf. II p.* 159 *tab.* 21.
Der Mezgerhund *Schreb. Säugth. III p.* 329 *n.* 30.
Mastin *Hispanis.*
Rafeiro *Lusitanis.*
Can mastino *Italis.*
Mâtin *Gallis.*

Caput elongatum, tenue. Auriculae mediocres, subpendulae. Corpus tenue, postice angustatum.

tum. Crura longa, fortia. Cauda craſſior, fere recta, horizontalis. Pili laeues, vtplurimum nigri, ſaepe fuluo maculati.

ττ) Der Saufinder *Schreb. Säugth. III p.* 329 *n.* 31.

Figura praecedentis, at pilis longioribus villoſus, vtplurimum niger.

ξξ) Der Saurüden *Schreb. Säugth. III p.* 330 *n.* 32.

Caput magnum fronte plana. Roſtrum craſſum, ſubacutum. Corpus poſtice attenuatum. Pedes longi. Pilis longioribus villoſus.

υυ) Vertagus *Rai. ſyn. quadr. p.* 177.

Canis Vertagus *Linn. amoen. acad. IV p.* 47 *n.* 8.

Baſſet à jambes torſes *Buff. hiſt. nat. V p.* 245 *tab.* 35 *fig.* 2.

Der Dachshund *Hall. vierf. p.* 485.

Dashond *Houtt. nat. hiſt. II p.* 38 *tab.* 12 fig. Buff.

Canis (familiaris vertagus) pedibus curuatis, trunco longo ſaepius variegato *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* 9.

Turnſpit *Penn. ſyn. quadr. p.* 145 *n. II* γ.

Der krumbeinigte Dachshund *Mart. Buff. vierf. II p.* 172 *tab.* 29 *fig.* 1.

Der Dachshund *Müll. Naturſ. I p.* 209 *n. b tab.* 12 fig. Buffoniana repetita cum reliquis, ex Houttuynii tabula.

Der Dachshund *Schreb. Säugth. III p.* 330 *n.* 33.

Perrillo, Rapoſero, Perro baxo *Hiſpanis.*

Baſſet *Gallis.*

Dachs, Tachs, Dachshund, Tachshund, Tächfel *Germanis.*
Dashond *Belgis.*
Tumbler, Turnfpit *Anglis.*
Hanfe *Suecis.*

Caput maius, fronte plana, roftro longo. Auriculae latae, pendulae. Truncus maxime elongatus. Pedes breues, antici curuati. Pili laeves. Niger, maculis fupra oculos, ore, pectore pedibusque infra fuluis, fed et varius reperitur. Alterum oculum altero maiorem habere dicitur *Rai.* In Sueciam introductus a Friderico I rege.

ϑϑ) Baffet à jambes droites *Buff. hift. nat. V p.* 245 *tab.* 35 *fig.* 1.
Der Dachs mit geraden Beinen *Mart. Buff. vierf. II p.* 172 *tab.* 29 *fig.* 2.

Ab antecedente differt folis pedibus rectis.

ιι) Der zottige Dachshund *Schreb. Säugth. III p.* 330 *n.* 34.

Differt a praecedentibus pilis longioribus crifpis.

Le Burgos *Buff. hift. nat. V p.* 254.
Der Hund von Burgos *Hall. vierf. p.* 490.
Hunde von Burgos *Mart. Buff. vierf. II p.* 189.

Hybridus ex vertago atque extrario.

Huc quoque referendus videtur:
Ytzcuinte Porzotli *Hernand. Mex. p.* 466 *cum fig.*
Secundus — quem Michuacanenfem abora — vocare folent *Fernand. anim. p.* 7.

Ter-

Tertius nuncupatus Techichi *Fernand. anim. p.* 7?

Ytzcuintepotzotli seu Canes gibbi *Fernand. anim. p.* 10.

Ytzcumbepotzotli. Ein Indianischer Hund. Canis Mexicana *Gesn. Thierb. p.* 225 *fig. p.* 226 Hernand.

Canis Mexicanus; monstroso corporis habitu *Klein. quadrup. p.* 68.

Der Mexikanische Hund *Hall. vierf. p.* 490.

L'Alco *Buff. hist. nat. XV p.* 151.

Der Mexikanische Hund *Mart. Buff. vierf. II p.* 190.

Der Alko *Schreb. Säugth. III p.* 342.

Magnitudo Canis familiaris minoris. Caput minutum. Rostrum caninum. Auriculae pendulae. Collum breuissimum. Dorsum arcuatum siue gibbosum. Cauda breuis, pendula. Venter crassus, mammis sex. Pedes canini. Color capitis antici albus, auriculis partim fuluis; dorsi fuluus, caudae albus. Venter maculis nigris. Pedes albi.

Peruanis et Mexicanis Canis familiaris loco erat cum detegeretur nouus orbis, fidelis domino, moribus Canis. Obscurum animal hodie.

Aliud obscurum:

Canis siluestris, americanus, cauda longissima *Seb. thes. I p.* 47 *tab.* 30 *fig.* 1.

Der wilde amerikanische Hund *Meyer Thiere III tab.* 21 fig. Sebae.

Canis Americanus siluestris, cauda longissima *Klein. quadrup. p.* 69.

Der Amerikanische wilde Hund mit sehr langem Schwanze *Hall. vierf. p.* 493.

Der Amerikanische wilde Hund mit sehr langem Schwanze *Mart. Buff. vierf. II p.* 193.

Ex

Smith Barton on ye different Species & varieties of Na-
-American, or Indian dogs. in Ey. philadelphia medical
-ysical Journal p. II. vol. 1. p. 3 — 31.

Ex promontorio de Tiburon e regione insulae Martinicae. In silvis degit, raptu viuens. Caput vulpinum. Auriculae arrectae, paruae. Oculi praegrandes. Vibrissae longiores. Rictus oris amplus. Digiti 5-5. Pellis dilute rufa, in capite, pedibus atque cauda color dilutissimus.

Lupus. 2. C. cauda incuruata.

Λυκος *Arist. hist. anim. V c. 2 n. 21. VI c. 35 n. 419-421. VIII c. 9 n. 101.*

Lupus *Plin. hist. nat. VII c. 58 (c. 83 Hard.). X c. 63 (c. 83 Hard.). c. 73 (c. 93 Hard.). XI c. 37 (c. 55, 67 Hard.). c. 43 (c. 99 Hard.). c. 49 (c. 109 Hard.). c. 50 (c. 111 Hard.).*

Λυκος *Aelian. anim. III c. 6. IV c. 4, 15. V c. 19. VII c. 20. X c. 26.*

Λυκος *Oppian. cyneg. III, 263.*

Lupus *Gesn. quadrup. p. 716 fig. p. 717.*

Lupus *Ol. Magn. Sept. p. 611.*

Lupus *Schwenckf. theriotr. p. 106.*

Lupus *Aldrov. digit. p. 144.*

Lupus siluestris *Aldrov. digit. p. 173 fig.* mediocr.

Lupus *Ionst. quadrup. p. 127.*

Lupus. Wolff *Ionst. quadrup. tab. 56* fig. mediocr.

Ein Wolff *Gesn. Thierb. p. 348 cum fig.* pessima.

Lupi *Scheff. Lappon. p. 338.*

Lupus vulgaris *Charlet. exerc. p. 15.*

Lupus *Wagn. Heluet. p. 178.*

Lupus *Rai. syn. quadr. p. 173.*

Lupus *Rzacz. Polon. p. 219 auct. p. 312.*

The Wolf *Catesb. Carol. app. p. XXVI.*

The Wolf *Brick. North-Carol. p. 119.*

Canis cauda recta corpore breuiore *Linn. syst. nat. 2 p. 44.*

Wolf *Riding. jagdb. Th. tab. 8.*

Canis cauda incurua *Linn. fn. suec. 1 p. 5 n. 13.*

Der Wolff *Meyer Thiere I tab. 35* fig. bona.

Canis

Canis cauda incurua *Linn. syst. nat. 6 p. 5 n. 2.*
Lupus vulgaris *Klein. quadrup. p. 70.*
Canis cauda incurua. The Canis, with the tail bending inward: the Wolf *Hill anim. p. 552 tab. 27* fig. mala.
Canis (Lupus) cauda incurua *Linn. muf. Ad. Frid. I p. 6.*
Le Loup: Canis (Lupus vulgaris) ex grifeo flauefcens *Briff. regn. an. p. 235 n. 2.*
Canis cauda incurua *Kram. Auftr. p. 313.*
Der gemeine Wolf *Hall. vierf. p. 496.*
Canis (Lupus) cauda incuruata *Linn. fyft. nat.* 10, *I p. 39 n. 2.*
Wölfe *Müll. Samml. III p. 546, 608.*
Le Loup *Buff. hift. nat. VII p. 39 tab.* 1.
Loup *Dictionn. anim. II p. 706.*
Wolf: Hond met een nederwards gekromde Staart *Houtt. nat. hift. II p. 69.*
Canis (Lupus) cauda incurua *Linn. fn. fuec.* 2 *p.* 3 *n.* 6.
Ulve *Pontopp. Dan. I p. 607.*
Loup *Bom. dictionn. II p. 717.*
Canis (Lupus) cauda incuruata *Linn. fyft. nat.* 12, *I p. 58 n. 2.*
Canis Lupus *Forfter: Philof. transact. LVII p. 342.*
The Wolf *Penn. fyn. quadr. p. 149 n.* 111.
Lupo *Aleff. quadrup. II tab. 66* fig. Buff.
Der Wolf *Müll. Naturf. I p. 219 tab.* 31 *fig.* 1 *Suppl. p.* 28.
Kuorchu oder Wölfe *Stell. Kamtfch. p.* 117.
Lupus *Forsk. fn. orient. p. V.*
Der Wolf *Mart. Buff. vierf. IV p. 59 tab. 57.*
Der Wolf: Canis Lupus *Schreb. Säugth. III p.* 346 *n.* 1 *tab.* 88 fig. propr. *tab.* 81 fig. capitis et dentium.
Canis (Lupus) cauda incuruata *Müll. Dan. prodr. p. 2 n. 5.*

Lcbo

Lobo *Hiſpanis.*
Lobo *Luſitanis.*
Lupo *Italis.*
Loup (*mas*) Louve (*femina*) Loûveteau (*catulus*) *Gallis.*
Wolf (*mas*) Wölfinn (*femina*) *Germanis.*
Wolf *Belgis.*
Wolf *Anglis.*
Ulv *Danis.*
Graabeen, Varg *Noruegis.*
Warg, Ulf, Gråben *Suecis.*
Kumpi, Stolpe, Saibek, Gaine, Olgobutzh *Lapponibus.*
Wilk *Polonis.*
Волкъ (Wolk) (*mas*) Волчица (Wolczitza) (*femina*) *Ruſſis.*
Bör *Bucharice.*
Boijuku *Tunguſis.*
Schonu *Burätis.*
Büre *Tataris.*
Pirä *Tſcheremiſſis.*
Kaſkar *Tſchuwaſchis.*
Kiòn *Wotiakis.*
Wjarges *Morduanis.*
Kaiin *permice.*
Köiin *ſirjänice.*
ديب (Dîb) *Arabibus.*

Maior Cane familiari maiore: longitudine corporis $3\frac{1}{2}$ ped. caudae fere $1\frac{1}{2}$ ped. Caput oblongum, craſſum, roſtro acuto. Dentes fortes. Auriculae erectae, acutae. Oculi oblique poſiti. Crura elongata. Cauda longius piloſa, incuruata. Color ex griſeo flaueſcens, ſubvariegatus, interdum albus, rarius niger in borealibus.

Habitat

Habitat in Europa, Aſia, Africa, America in ſilvis: non intra circulum arcticum. Rarior in Suecia ſub initio huius ſeculi, hodie vulgaris. Deletus hodie in magna Britannia ab anno 800 inde. Americanus omnium minimus, timidiſſimus in Kamtſchatka.

Cateruatim incedit quaſi claudus, nocturnus. Pecora, Equos, Sues, Canes occidit; in ſilvis ſuſpicioſiſſimus vix audet; tractum funiculum metuit; portam non ſubit, ſed ſepimentum ſuperſilit; ſonum tubae ſtentoreae non fert. Summa fame et frigore laceſſitus in propriam ſpeciem et hominem ſaeuit; guſtata humana carne illam praefert; inediam diu tolerat, modo non deſit aqua pro potu. Vnguibus retractis incedit. Collum facile flectit. Noctu vlulat. Excellit olfactu atque auditu. Lichene vulpino occiditur. Odit maxime Canem familiarem. Coit Ianuario menſe; grauida 10 hebdom. parit in nido ex muſcis mollioribus parato, loco occulto, pullos 5-9 coecos. Adoleſcit anno tertio. Aetas 15-20 annorum. Morſus pernicioſus. Iunior manſueſcit. Pediculos puliceſue non fert.

mexicanus. 3. C. cauda deflexa laeui, corpore cinereo faſciis fuſcis maculisque fuluis variegato.

Xoloitzcuintli Lupus Mexicanus *Hernand. Mexic. p. 479 cum fig.*

Cuetlachtli, ſeu Lupus Indicus *Fernand. anim. p. 7.*

Lupus Indicus *Nieremb. hiſt. nat. p.* 180.

Ein Indianiſcher Wolff *Geſn. Thierb. p.* 353.

Quanhpecotli ſ. Felis montana americana *Seb. theſ. I p. 68 tab. 42 fig. 2.*

Le Loup du Mexique: Canis (Lupus mexicanus) cinereus, maculis fuluis variegatus taeniis ſubnigris a dorſo ad latera deorſum hinc inde deductis *Briſſ. regn. an. p. 237 n. 4.*

Der

Der nackte amerikanische Hund *Hall. vierf. p.* 491.
Der Mexikanische Wolf *Hall. vierf. p.* 500.
Canis cinereus, maculis fuluis variegatus, taeniis subnigris, a dorso ad latera deorsum hinc inde deductis *Gronov. zooph. I p.* 8 *n.* 30.
Canis (mexicanus) cauda deflexa laeui, corpore cinereo fasciis fuscis maculisque fuluis variegato *Linn. syst. nat.* 12. *I p.* 60 *n.* 8.
Le Loup de Mexique *Buff. hist. nat. XV p.* 149.
The Mexican Wolf *Penn. syn. quadr. p.* 151 coniungit cum antecedente.
Der nackte amerikanische Hund *Mart. Buff. vierf. II p.* 491.
Der mexikanische Fuchs *Müll. Naturf. I p.* 228.
Der Mexicanische Wolf *Schreb. Säugth. III p.* 352 *n.* 3.

Magnitudo Lupi. Caput magnum. Maxillae dentesque fortes. In labio superiore setae longae, retrorsum versae, aculeis mollioribus Hystricis similes, coloris grisei albique. Auriculae magnae, erectae, cinereae, interstitio fuluo-maculato. Caput cinereum, lineis transuersis nigricantibus striatum. Collum crassum, cute laxiori cum stria longa fulua, aliaque in pectore. Corpus cinereum nigro maculatum. Latera nigro striata transuersaliter. Venter cinereus. Cauda minus pilosa, longa, cinerea, medio fulua. Crura pedesque nigro cinereoque striata. Interdum albus est.

Habitat in calidioribus regni Mexicani. Mores Lupi, cuius varietas videtur Fernandesio, Bussonio atque Pennanto.

Lycaon. 4. C. cauda recta, corpore toto nigro.
Vulpeculae nigrae *Scheff. Lappon. p.* 340.

Schwarze

Jo Fr Miller Fasc. IV. tab. XIX fig B.

Schwarze Füchse *Strahlenb. Af. p.* 355.
Renards noirs *Charlev. nouv. Fr. III p.* 133.
Der Scithische Wolf *Hall. vierf. p.* 501.
Der schwarze Fuchs *Hall. vierf. p.* 504.
Schwarze Füchse *Müll. Samml. III p.* 535.
Le Loup noir *Buff. hist. nat. IX p.* 362 *tab.* 41.
The black Fox *Penn. syn. quadr. p.* 152 *n.* 112 *γ*.
Lupo nero *Alessf. quadrup. I tab.* 24 fig. Buff.
Schwarze Füchse *Stell. Kamtsch. p.* 124.
Der schwarze Fuchs: Canis Lycaon *Schreb. Säugth. III p.* 353 *n.* 4 *tab.* 89 fig. Buff.
Der Steilohr *Müll. Naturf. suppl. p.* 28.
Черно бурои (Czerno buroi) *Russis.*

Magnitudo media inter Lupum ac Vulpem. Similis quodammodo Lupo. Oculi oblique positi, at minores quam in Lupo magisque inuicem remoti. Auriculae remotiores magisque distantes. Dorsum subiubatum. Color totius niger, sed et variat colore subgriseo, nec non apicibus pilorum argenteis.

Habitat in frigidioribus Europae, Asiae et Americae. Astutissimus omnium. Pellis pretiosissima, americani vilior.

Vulpes. 5. C. cauda recta: apice albo.

Ἀλώπηξ *Arist. hist. anim I c.* 6 *n.* 46. *VI c.* 34 *n.* 414.
Vulpes *Plin. hist. nat. VII c.* 58 *(c.* 83 *Hard.). VIII c.* 28 *(c.* 42 *Hard.). X c.* 63 *(c.* 83 *Hard.). XI c.* 49 *(c.* 109 *Hard.). c.* 50 *(c.* 111 *Hard.). XXIII c.* 8 *(c.* 75 *Hard.).*
Ἀλώπηξ *Aelian. anim. IV c.* 39. *VI c.* 24. *XIII c.* 11.
Κερδώ *Oppian. cyneg. III,* 449.
Vulpes *Gesn. quadrup. p.* 1081 *cum fig.* bona.
Vulpes *Ol. Magn. Sept. p.* 634.
Vulpes *Schwenckf. theriotr. p.* 133.

Vulpes *Aldrov. digit. p.* 195.
Vulpes *Ionſt. quadrup. p.* 131.
Vulpes. Fuchs *Ionſt. quadrup. tab.* 56 fig. bona.
Der Fuchs *Geſn. Thierb. p.* 121 *cum fig.* bona.
Vulpeculae *Scheff. Lappon. p.* 340.
Vulpes *Charlet. exerc. p.* 15.
Vulpes *Wagn. Heluet. p.* 187.
Vulpes *Sibb. Scot. an p.* 9.
Vulpes *Rai. ſyn. quadr. p.* 177.
Vulpes *Rzacz. Polon. p.* 231 *auct. p.* 324.
Canis cauda recta longitudine corporis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.
Fuchs *Riding. jagdb. Th. tab.* 14.
Canis cauda erecta *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 5 *n.* 14.
Der Fuchs *Meyer Thiere I tab.* 36.
Canis cauda recta extremitate alba *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 6.
Vulpes vulgaris *Klein. quadrup. p.* 71.
Canis cauda recta extremitate alba. The Canis, with the tail ſtraight and white at the tip: the Fox *Hill anim. p.* 553.
Canis (Vulpes) cauda recta: extremitate alba *Linn. muſ. Ad. Frid.* I *p.* 6.
Le Renard: Canis (Vulpes vulgaris) fuluus, pilis cinereis intermixtis *Briſſ. regn. an. p.* 239 *n.* 5.
Canis cauda erecta *Kram. Auſtr. p.* 313.
Vulpes Auctorum *Haſſelqu. Palaeſt. p.* 271.
Der gemeine Fuchs; Birkenfüchſe *Hall. vierf. p.* 501.
Canis (Vulpes) cauda recta: apice albo *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 40 *n.* 4.
Füchſe *Müll. Samml. III p.* 531, 608.
Le Renard *Buff. hiſt. nat. VII p.* 75 *tab.* 4.
Renard *Dictionn. anim. III p.* 676.
Vos: Hond met een regte Staart, die aan 't end wit is *Houtt. nat. hiſt. II p.* 85.
Canis (Vulpes) cauda erecta: apice albo *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 3 *n.* 7.

The

The Fox *Penn. brit. zool. p.* 28.
Reve *Pontopp. Dan. I p.* 608.
Renard ou Goupil *Bom. dictionn. III p.* 735.
Canis (Vulpes) cauda recta: apice albo *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 59 *n.* 4.
Canis Vulpes *Forster: Philos. transact. LVII p.* 342.
The Fox *Penn. syn. quadr. p.* 152 *n.* 112.
Volpe *Aless. quadrup. II tab.* 67 fig. Buff.
Der Fuchs *Müll. Naturf. I p.* 224 *tab.* 31 *fig.* 2.
Füchse *Stell. Kamtsch. p.* 123.
Canis Vulpes *Forsk. fn. orient. p.*III.
Der Birkfuchs: Canis Vulpes *Schreb. Säugth. III p.* 354 *n.* 5 *tab.* 90 fig. propr.
Der Fuchs *Mart. Buff. vierf. IV p.* 97 *tab.* 58.
Canis (Vulpes) cauda recta, apice albo *Müll. Dan. prodr. p.* 2 *n.* 6.
Zorro (*mas*) Zorra, Raposa (*femina*) *Hispanis.*
Rapoza *Lusitanis.*
Volpe *Italis.*
Renard *Gallis.*
Llwynog (*mas*) Llwynoges (*femina*) *Cambrensibus.*
Fuchs, Birkfuchs *Germanis.*
Vos *Belgis.*
Fox *Anglis.*
Ræv, Eiter-Vnge *Danis.*
Räf *Suecis.*
Rupsok, Raude, Zhiaepok, Vielgok *Lapponibus.*
Lis, Liszka *Polonis.*
Лисъ (Lis') (*mas*) Лисица (Lisitza) (*femina*) *Russis.*
Tülk *Bucharice.*
Schulak *Tungusis.*
Unagin *Burätis.*
Tschaschea, Ahsinges *Kamtschadalis.*
ثعلب (Taaleb) دربن (Dorên) *Aegyptiis.*
Tulki *Persis.*

Narî *Malabarice.*
Gjambûcaha *Grendice.*
Quaſſi *Guineenſibus.*
Terrianiak *Groenlandis.*

Longitudo corporis paullulum ſupra 2 pedes. Caput latum, roſtro acuto, fronte plana. Oculi oblique ſiti, fuſci, ſplendentes. Auriculae acutae, erectae. Corpus large piloſum. Cauda craſſa, recta, villoſa. Color corporis fuluus, labiis, gula, ſtriaque longitudinali pedum, caudaeque apice albis, pedibus anticis auricularumque apicibus nigris. Pectus cum ventre cinereum. Raro totus albus.

Habitat in Europa, Aſia boreali et auſtrali, Africa. Antra fodit, animal aſtutiſſimum. Saeuit noctu in Agnos, Anſeres, Gallinas, Auiculas, non Accipitres foetidioresque. Superflua defodit. Edit quoque ſtercora animalium. Pingueſcit vuis, maximeque mel amat. Non rapit facile in praedio quod inhabitat. Apricatur in ſole. Pruriens noctu clamitat menſe Februario. Grauida 9 hebdom. parit 5 - 8 coccos, interdum etiam bis in anno. Adoleſcit anno ſecundo. Aetas 13 - 14 annorum. Bombardas exploſas odoremque pulueris pyrii fugit. Pellitur fumo. Frigore naſum cauda obuoluit. Ludit ſaepe cum cauda. Vrinam foetidiſſimam intra terrae caueam mittit terraque tegit. Foetet maxime infra caudam. Vox quaſi latratus. Caro paſſim eſculenta. Pellis bona. Haud bene manſueſcit. Morſus malus, grauis, pernicioſus.

Coire cum Cane familiari cl. *Blumenb. gen. hum. var. p.* 11 aliique, ſed hybridos ex Vulpe et Cane haud obtinuit perill. Buſſonius.

Alopex.

Alopex. 6. C. cauda recta: apice nigro.

Vulpes villo denſiore et nigricante *Geſn. quadrup. p.* 1082.

Canis cauda recta extremitate nigra *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 5.

Canis cauda recta extremitate nigra. The Canis, with a ſtraight tail black at the tip: the larger Fox *Hill anim. p.* 554.

Der gemeine Fuchs; Brandfüchſe *Hall. vierf. p.* 501.

Der Brandfuchs *Hall. vierf. p.* 504.

Canis (Alopex) cauda recta: apice nigro *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 40 *n.* 5.

Renards charbonniers *Buff. hiſt. nat. VII p.* 82.

Hond met een regte Staart, zwart aan't end *Houtt. nat. hiſt. II p.* 92.

Canis (Alopex) cauda recta: apice nigro *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 59 *n.* 5.

The Brant Fox *Penn. ſyn. quadr. p.* 152 *n.* 112 *δ.*

Der Feldfuchs *Müll. Naturſ. I p.* 226.

Der Brandfuchs: Canis Alopex *Schreb. Säugth. III p.* 358 *n.* 6 *tab.* 91 fig. propria.

Renard charbonnier *in Burgundia.*

Köhler, Kohlbrenner, Brandfuchs *Germanis.*

Brandräf *Suecis.*

Hic et ſequentes 7, 8, 9, 10, 11 cum Vulpe in vnicam ſpeciem a pluribus auctoribus contrahuntur.

Differt a Vulpe colore magis ex ferrugineo nigricante, cauda obſcuriore: apice nigricante pilis paucioribus albis. Paullo minor Vulpe eſt.

Amat montoſa, rariorque Vulpe eſt, cui moribus ſimilis. Pellis minus bona.

Karagan. 7. C. cauda recta, corpore griseo.
Karagan (Schwarzohr) *Pallas Reis. I p.* 199.
Steppenfüchse (Karagan) *Pallas Reis. I p.* 234.
Der Karagan *Schreb. Säugth. III p.* 359 *n.* 7.

Colore griseo, lupino.

Habitat in desertis calmyccis et kirgisicis. Animal subobscurum.

Corsac. 8. C. cauda recta fulua basi apiceque nigra.
Canis (Corsac) cauda fulua basi apiceque nigra *Linn. syst. nat.* 12, *III p.* 223.
Korsaki eine Art kleiner Füchse *Rytschk. Orenb. I p.* 232.
The Corsac Fox *Penn. syn. quadr. p.* 154 *n.* 112 ε.
Der Korsak: Canis Corsac *Schreb. Säugth. III p.* 359 *n.* 8 *tab.* 91 *B* fig. propria.
Der Wolfshund *Müll. Naturs. Suppl. p.* 28.
Карсакъ (Karsak) *Russis.*
Korsak *Kirgisis.*

Corpus facie Vulpis, quo tamen minor: pilis mollibus, supra hieme griseis, aestate vero dilute fulvis; subtus albis. Cauda pilosa, longitudine corporis, dorso concolor, nisi quod basis atque apex nigricantes sint. Pedes dilute fului. Gula alba. Auriculae breues, erectae, dorso concolores. Oculi luteo-virides. Orbitae albicantes. Stria fusca vtrinque ab oculis ad nares.

Habitat in campis magni deserti a Iaico fluuio versus Irtim, innumera copia. Saeuit in Aues. Terram excauat. Superflua defodit. Foetet, clamitat, latrat. Pellis Kirgisis monetae loco est.

cinereo-

cinereo-argenteus. 9. C. cauda recta corpore cinereo: collo lateribus fuluo.

Der Grisfuchs: Canis cinereo-argenteus *Schreb. Säugth. III p.* 360 *n.* 9 *tab.* 92 fig. propria.

Der Silberhund *Müll. Naturs. Suppl. p.* 29.

Minor Vulpe. Vertex, collum et dorsum mixtum ex griseo nigro alboque: pilis mollioribus albidis, fortioribus nigro alboque annulatis. Auriculae extus ferrugineae, apicibus nigricantibus. Macula fulua circa auriculas et in colli lateribus. Gula, pectus, venterque alba. Pedes extus fului; in anterioribus antice linea ex albo nigroque mixta, infra latior. Pedes posteriores intus stria alba in nigricantem infra desinens postice. Cauda fusca, sublutea.

Habitat in America boreali. Forte idem cum sequente.

virginianus. 10. C. cauda recta, corpore ex cinereo albicante.

The Fox of Carolina *Lawson Carol. p.* 125.

The Gray Fox *Catesb. Carol. II p.* 78 *tab.* 78.

The Fox *Brick. North-Carol. p.* 124.

Renards *Charlev. nouv. Fr. III p.* 133?

Vulpes cinereus Americanus *Klein. quadrup. p.* 71.

Le Renard gris: Canis (Vulpes cinerea) ex cinereo argenteus *Briss. regn. an. p.* 241 *n.* 7.

Der Amerikanische Silberfuchs *Hall. viers. p.* 505.

Renard *Du Pratz Louis. II p.* 92.

Die erste Art Füchse in Surinam, Quassi *Fermin Surin. II p.* 91?

The grey Fox *Penn. syn. quadr. p.* 157 *n.* 114.

The silvery Fox *Penn. syn. quadr. p.* 157 *n.* 115?

Der virginische Fuchs: Canis Virginianus *Schreb. Säugth. III p.* 361 *n.* 10 *tab.* 92 *B* fig. Catesb.

Totus ex cinereo albicans, nisi quod paullulum rufescat circa aures. Rostrum acutum. Auriculae longae, erectae. Crura longiora.

Habitat in Carolina et reliquis calidioribus terris Americae borealis. Numquam fodit terram, sed degit in cauis arboribus. Olfactus debilis. Venatur aues. Facile mansuescit.

Lagopus. 11. C. cauda recta, palmis plantisque pilosissimis.

Vulpes alba *Aldrov. digit. p.* 222 *fig.* mediocr.
Vulpes alba *Ionst. quadrup. p.* 133.
Vulpeculae cinereae *Scheff. Lappon. p.* 340.
Fuchs *Mart. Spitzb. p.* 72 *tab.* O *fig. b* mala.
Les Renards *Egede Groenl. p.* 45.
Weiſſe Füchse *Strahlenb. Aſ. p.* 355.
Canis cauda recta vnicolore *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 7.
Canis cauda recta vnicolore. The Canis, with a ſtraight tail all of one colour: the Siberian Fox *Hill anim. p.* 554 *tab.* 27 fig. mediocr.
Weiſſe und blaue Füchse *I. G. Gmelin. Sibir. III p.* 214.
Iſatis *I. G. Gmelin: Nou. comm. petrop. V p.* 358.
Le Renard blanc: Canis (Vulpes alba) hieme albus, aeſtate ex cinereo caerulescens *Briſſ. regn. an. p.* 241 *n.* 8.
Der blaue Fuchs *Hall. vierf. p.* 504.
Der weiſſe Fuchs *Hall. vierf. p.* 504.
Canis (Lagopus) cauda recta: apice concolore *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 40 *n.* 6.

Stein-

Steinfüchse *Müll. Samml. III p.* 539.
Hond met een regte Staart, die aan 't end van de Zelfde kleur is *Houtt. nat. hist. II p.* 93.
Canis (lagopos) cauda recta apice concolore *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 4 *n.* 8.
L'Isatis *Buff. hist. nat. XIII p.* 272.
Isatis *Bom. dictionn. II p.* 608.
Die Füchse *Cranz Groenl. p.* 97.
Canis (Lagopus) cauda recta: apice concolore *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 59 *n.* 6.
The arctic Fox *Penn. syn. quadr. p.* 155 *n.* 113 *tab.* 17 *fig.* 1.
Arctic Fox *Forster: Philos. transact. LXII p.* 370.
Der Hasenfuss *Müll. Naturs. I p.* 226.
Pesci oder weisse Steinfüchse *Stell. Kamtsch p.* 126.
Der Steinfuchs: Canis Lagopus *Schreb. Säugth. III p.* 362 *n.* 11 *tab.* 93 fig. Pennanti.
Canis (Lagopus) cauda recta: apice concolore *Müll. Dan. prodr. p.* 2 *n.* 7.
Field-Rak, Mel-Rak *Noruegis.*
Fiäll-Racka *Suecis.* Blåräf (*varietas caerulescens*).
Nial *Lapponibus.*
Песецъ (Pesetz) *Russis.*

Longitudo corporis 22 pollicum, caudae 11-12½ poll. Figura canina potius, quam vulpina. Caput latum, rostro acuto breui. Auriculae fere rotundatae. Pedes breues, densissime pilosi vt in Lepore. Pollex palmarum distans a reliquis digitis. Corpus pilis vulpinis mollioribus, coloris plerumque candidi, interdum cinerei. Cutis denudata nigra ad nares et in maxilla inferiore. Cauda breuior ac in Vulpe, at pilosior. Folliculus putorius nullus ad anum, nec odor vulpinus, vel saltim debilis.

Habitat ad omne mare glaciale frequentiſſimus, atque in America boreali; in nudis montibus, non in ſiluis. Degit in cuniculis, aut vnico pare cohabitante, aut tribus vel quatuor. Cuniculi multifores, aperturis octo ad decem. Cubile muſcis mollioribus ſtratum. Edit Lemmos, Mures, Anſeres, etc. ſame coactus baccas, teſtacea. Callidiſſimum animal, raro integrum annum in eodem loco degens. Latratus vulpinus, voce magis rauca ac Canis; interdum etiam eiulat. Prurit menſe Martio, grauida per nouem hebdomades. Parit ſub fine Maii 6, 7, 8 (an ad 25? ſic I. G. Gmelin). Hieme pilis longioribus donatur, qui defluunt menſe Iunio. Catuli nigri ſunt.

Pellis proba, imprimis caerulea, id eſt cinerea, eo ſemper magis aeſtimata, quo magis ad nigrum accedit color.

Vulpes crucigera; cruce nigra in dorſo, linea transverſali per humeros ducta:

Vulpes crucigera *Schwenckf. theriotr. p.* 135.

Vulpes crucigera *Aldrov. digit. p.* 221 *fig.* mediocr.

Vulpes crucigera *Ionſt. quadrup. p.* 133.

Ein Kreutzfuchs *Geſn. Thierb. p.* 126 *cum fig.* mediocri.

Vuipeculae cruce notatae *Scheff. Lappon. p.* 340.

Vulpes ſuper dorſum crucigerae *Klein. quadrup. p.* 71.

Le Renard croiſé: Canis (Vulpes crucigera) fuluus, crucem nigram in dorſo gerens *Briſſ. regn. an. p.* 241 *n.* 6.

Der Kreutzfuchs *Hall. vierf. p.* 504.

Kreutzfüchſe *Müll. Samml. III p.* 534.

The Croſs Fox *Penn. ſyn. quadr. p.* 152 *n.* 112 *β.*

Korſ-

Korſräf *Suecis.*
Кресмовка (Kreſtowka) *Ruſſis.*
Kartal *Tunguſis.*

Hanc non Lagopodis, ſed Vulpis varietatem eſſe Pennantus aſſerit. Forte dantur crucigerae in vtraque ſpecie.

aureus. 12. C. cauda recta, corpore pallide fuluo.
Θως *Ariſt. hiſt. anim. II c. 19 n. 150. VI c. 35 n. 426-428. IX c. 70 n. 473-475.*
Thoes *Plin. hiſt. nat. VIII c. 34 (c. 52 Hard.). X c. 74 (c. 95 Hard.).*
Θως *Aelian. anim. I c. 7.*
Λυκος ξουθος *Oppian. cyneg. III, 296.*
Λυκος Χρυσεος *Oppian. cyneg. III, 314.*
Thoes *Geſn quadrup. p. 766.*
Aſiaticum animal Adil nuncupatum *Bellon. obſ. p. 160.*
Schakal eine Art Füchſe *Olear. Reiſ. p. 413.*
Le Schekal *Boull. voy. p. 254.*
Lupus aureus *Charlet. exerc. p. 15.*
Lupus aureus *Rai. ſyn. quadr. p. 174.*
Iackal *Barbot Guin. p. 209.*
Sjakallen of wilde honden *Bruin Reiz. p. 321.*
Lupus aureus *Kaempf. amoen. exot. p. 413 fig. p. 407, n. 3* mala.
The Deeb or Iackall *Shaw trav. p. 247.*
Canis Lupus aureus dictus *Linn. ſyſt. nat. 6 p. 5 n. 3.*
Lupus aureus *Klein. quadrup. p. 70.*
Canis roſtro anguſtiore. The Canis, with a ſlender ſnout; the Iackall *Hill anim. p. 552 tab. 27* fig. mediocr.
Le Loup doré: Canis (Lupus aureus) flauus *Briſſ. regn. an. p. 237 n. 3.*

Iackalls

Iackalls *Ruff. Aleppo p.* 60.
Canis Chical Turcarum *Haffelqu. Palaeft. p.* 271.
Der Zwerg-oder Goldwolf *Hall. vierf. p.* 500.
Canis (aureus) Lupus aureus dictus *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 40 *n.* 7.
Adil *Dictionn. anim. I p.* 52.
Iackals *Dictionn. anim. II p.* 514.
Loup doré *Dictionn. anim. II p.* 708.
Iakhals: Hond, de Gulden Wolf genaamd *Houtt. nat. hift. II p.* 93.
The Iackals *Bell trav. I p.* 53.
Adil *Bom. dictionn. I p.* 57.
Chacal *Bom. dictionn. I p.* 470.
Iackal *Bom. dictionn. II p.* 562.
Le Chacal *Buff. hift. nat. XIII p.* 255.
L'Adive *Buff. hift. nat. XIII p.* 255?
Canis (aureus) Lupus aureus dictus *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 57 *n.* 7.
The Iackal *Penn. fyn. quadr. p.* 158 *n.* 116.
Der Goldwolf *Müll. Naturf. I p.* 227 *tab.* 30 *fig.* 1.
Der Schakal *S. G. Gmelin Reif. III p.* 80 *tab.* 13 fig. mala.
Der Schakall: Canis aureus *Schreb. Säugth. III p.* 365 *n.* 12 *tab.* 94 fig. propr.
Squilachi *Graecis hodiernis*
Sjechaal *Perfis.*
Chical *Turcis.*
ذيب (Deeb), خثل (Chathal) *in Barbaria.*
Kâdtu-narî *tamulice.*
Gôlâ *Indis.*

Figura fere Lupi, magnitudine inter Lupum ac Vulpem, pedibus tamen longioribus quam hic: longitudo corporis circiter 3 pedum. Caput fupra fuluum mixtis pilis longis grifeis nigro annulatis. Labium fuperius ad vtrumque latus album. Gula alba. Vibriffae oris, menti et oculorum quinque nigrae.

nigrae. Auriculae extus fuluae, intus albae. Collum et dorſum ex cinereo flauum, vmbra pilorum longiorum apice nigrorum. Corpus ſubtus et pedes pallide fului, cruribus ac femoribus fuluis. Vngues nigri, pollicis altius poſito incuruato. Cauda recta, paullo longior et villoſior quam in Lupo, ex griſeo flaua apice fuluefcente pilis longioribus apice nigris, vt caudae ipſe apex niger appareat. Pili rigidiores ac in Lupo, lanugine griſea. Dentes primores intermedii quatuor obtuſe truncati; extimi maiores: ſupra conici, infra rotundati. Laniarii ſuperiores paullo maiores inferioribus. Molares vtrinque ſex, antico minimo, quarto ſupra et quinto infra maximo. Lingua ciliata. Femina minor mare. Mammae ſex vel octo.

Habitat in Oriente, India orientali, Africa boreali. Die latet in montibus ſiluisque, noctu cateruatim ad 200 vrbes villasque ingreditur, furto deditus. Lente incedit capite dependente; at praeda aliqua detecta celerrime currit. Vix adultos inuadit, pueros trucidat. Edit animalia minora, aues, cibaria varia, corium, fructus, radices, cadauera e terra effodienda. Vno clamante clamant remoti alii, vlulatu execrabili, quaſi eiulatu latratu intercepto. Coit canino more verno tempore. Parit quinque ad octo. Valde manſueſcit. Moſchum olet?

Latratu exagitare dicitur feras, hoc audientes reliqui in exercitum concurrunt, proſequuntur miſerum ceruum, dum Leo Tigrisue ex inſidiis fugientem proſternit praedamque vorat, circumſidente venatorum corona, vsque dum Rex ſatiatus diſceſſerit; niſi forte fabula ſit. Inde Anglis *the Lion's provider*, Gallis *Le Pourvoyeur du Lion* dicitur.

Videtur

Videtur Simſonis Vulpecula, nec non veterum Θως; hunc tamen amiciſſimum homini animal eſſe, eique adeo ſuccurrere habent.

Canem familiarem ferum eſſe putat celeb. *Pallas ſpicil. XI p.* 3.

Meſomelas. 13. C. cauda recta, corpore ferrugineo faſcia dorſali nigra.

Iackhals *Kolbe Vorgeb. p.* 150.

Le Chacal *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 268?

Der capiſche Schakall: Canis Meſomelas *Schreb. Säugth. III p.* 370 *n.* 13 *tab.* 95 fig. propr.

Tenlie, Kēnlee *Hottentotis.*

Facies vulpina. Longitudo corporis 2¾ pedum, caudae pedis vnius. Caput ferrugineum admixto albo nigroque, poſtice nigricans. Vibriſſae nigrae. Corpus ſupra ferrugineum. Faſcia nigra dorſalis a nucha vsque ad caudam, albo vndulata, in humeris latiſſima. Gula, collum ſubtus, pectus et venter albicant. Cauda ſupra ferruginea cum linea longitudinali nigra apicem non attingente; ſubtus nigra annulis aliquot pallidioribus.

Habitat vulgaris ad caput bonae ſpei.

Thous. 14. C. cauda deflexa laeui, corpore ſubgriſeo ſubtus albo.

Canis ferus maior cancroſus vulgo dictus. Koupara *Barr. Fr. équ p.* 149?

Canis (Thous) cauda deflexa laeui, corpore ſubgriſeo ſubtus albo *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 60 *n.* 9.

Die (Füchſe) von der zwoten Art *Fermin Surin. II p.* 92?

The

The Surinam Dog *Penn. syn. quadr. p.* 160 *n.* 117.
Der surinamische Fuchs *Müll. Natursf. I p.* 228.
Der surinamische Fuchs *Schreb. Säugth. III p.* 371 *n.* 14.

Corpus griseum, subtus totum album, magnitudine Cati maioris. Auriculae concolores erectae. Verruca supra oculos, in buccis, sub gula. Lingua lateribus ciliata. Pedes 5-4.

Habitat in Surinamo.

Hyaena. 15. C. cauda recta, pilis ceruicis erectis, auriculis nudis, pedibus tetradactylis.

Ὕαινα, γλανος *Arist. hist. anim. VI c.* 32 *n.* 401-406. *VIII c.* 9 *n.* 102.
Hyaena *Plin. hist. nat. VIII c.* 30 *(c.* 44 *Hard.) XI c.* 37 *(c.* 55, 67 *Hard.). XXVIII c.* 8 *(c.* 27 *Hard.).*
Ὕαινα *Aelian. anim. I c.* 25. *III c.* 7. *VI c.* 14. *VII c.* 22.
Ὕαινα *Oppian. cyneg. III,* 263.
Hyaena *Gesn. quadrup. p.* 624 *fig.* mala.
Papio *Gesn. quadrup. p.* 630 quem confundit cum Hyaena.
Lupus marinus *Bellon. aquat. p.* 33 *fig. p.* 34 mediocr.
Animal necrophagum, siue iesef, seu hyaena *Nieremb. hist. nat. p.* 181.
Zilio Hyaena *Ionst. quadrup. tab.* 56 fig. mala.
Hyaena *Ionst. quadrup. tab.* 56 fig. pessima.
Lupus Marinus Gesneri et Bellonii *Ionst. quadrup. tab.* 57 fig. Bellon.
Hyaena *Ionst. quadrup. tab.* 57 fig. mala.
Der Vielfrasz. Grabthier *Gesn. Thierb. p.* 356 *cum fig.* mala.

Der

Der Indianische Vielfrasz *Gesn. Thierb. p.* 357.

Lupus Marinus ein Meerwolff *Gesn. Thierb. p.* 359 *cum fig.* Bellonii.

Lupus Marinus *Charlet. exerc. p.* 15?

Dabuh Arabum, Africanis Sesef dicta *Charlet. exerc. p.* 15.

Kastaar i. e. Taxus porcinus, siue Hyena veterum *Kaempf. amoen. exot. p.* 411 *fig. p.* 407 *n.* 4 mala.

The Dubbah or Hyaena *Shaw trav. p.* 246.

Indianischer Wolf *Riding tabula peculiari*, fig. bona.

Canis pilis ceruicis erectis longioribus *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 5 *n.* 4.

Canis pilis ceruicis erectis longioribus. The Canis, with the hairs of the neck long and erect: the Hyaena *Hill anim. p.* 553.

L'Hyene: Hyaena *Briss. regn. an. p.* 233 *n.* 1 confundit cum Mustela Gulone.

Canis pilis ceruicis erectis longioribus *Kram. Austr. p.* 373.

Hyaena *Russ. Aleppo p.* 59.

Der Meerwolf *Hall. vierf. p.* 500.

Canis (Hyaena) cauda recta annulata, pilis ceruicis erectis, auriculis nudis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 40 *n.* 3.

Hyene *Dictionn. anim. II p.* 508.

Hond met een regte gebandeerde Staart, de Hairen in de Neck overendstaande, de Ooren kaal *Houtt. nat. hist. II p.* 83.

L'Hyæne *Buff. hist. nat. IX p.* 268 *tab.* 25.

Hyene *Bom. dictionn. II p.* 552.

Canis (Hyaena) cauda recta annulata, pilis ceruicis erectis, auriculis nudis, palmis tetradactylis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 58 *n.* 3.

Die Hyaene *Berl. Samml. II p.* 186 *cum fig.*

The striped Hyaena *Penn. syn. quadr. p.* 161 *n.* 118.

Iena

Skioldebrand nov. act. Ups. vol. 1.
Jo Fr Miller fasc. IV tab. XIX fig. A.
Bruce T. V. tab. 26.
ménagerie du museum national III.

Iena *Aleff. quadrup. I tab.* 22 fig. Buff.
Die Hyaena *Müll. Naturf. I p.* 222 *tab.* 31 *fig.* 3.
Hyaena *Forsk. fn. orient. p. III.*
Die Hyäne: Canis Hyaena *Schreb. Säugth. III p.* 371 *n.* 15 *tab.* 96 fig. le Basii.
Hyena *Hifpanis.*
Hyena *Lufitanis.*
Iena *Italis.*
Hyene *Gallis.*
Hyäne *Germanis.*
Hyena *Anglis.*
ضبع (Dabbá) *Aegyptiis.*
Dubbah *in Africa boreali.*
Kaftaar *Perfis.*

Magnitudo Lupi: longitudine corporis 3 ped. et vltra; facies Apri. Collum craffum. Pili dorfi fubfpithamei, erecti albidi, apicibus nigris. Caput lupinum, craffum, roftro acuto, nigricans. Oculi roftro propinquiores, nigri. Auriculae erectae, longae, acutae, nudae. Cauda longius pilofa, interdum annulis nigricantibus verticillata. Crura annulis nigris variegata. Pili corporis duriores, longi, albidi. Striae corporis fufcae et nigrae transuerfales, a dorfo ad ventrem ductae. Pedes 4-4. Penis offe nullo. Folliculus putorius fupra anum. Mammae ventrales quatuor.

Habitat in Oriente, Perfia, Africa boreali.

Excauat terram degitque in antris folitaria. Crudelis atque ferox, afpectu maligna, ipfi Leoni refiftit. Diutius fine cibo viuit; in humana cadauera faevit, quae e tumulis effodit, coemeteriis infefta. Carne deficiente radices palmarumque ramos iuniores edit. Quidquid irritata ore prehendit, mor-

dica tenet nec viua dimittit pertinaciſſima. Haud manſueſcit. Vox grauis rauca, quaſi hominis vomiturientis. Veteribus ſexum mutabat, ceruice rigida donata, humanam vocem imitabatur, faſcinabat opiliones.

Arabes carnem ad vſus medicos adhibent.

Coniungendam forte genere Hyaenam cum Mele doctiſſimus Schreberus monet; Pennantus a Cane diſtinguit Hyaenae genus.

Crocuta. 16. C. cauda recta, corpore nigro maculato, pedibus tetradactylis.

Hyaena ſiue congener illi Crocuta *Ludolf. Aeth. L. I c.* 10 *n.* 50. *Comment. p.* 152.

The Quumbengo *Barbot Guin. p.* 486.

Iachhals oder Boshond *Boſſm. Guin. p.* 291.

Tigerwolf *Kolbe Vorgeb. p.* 171 *tab.* 6 *fig.* 5?

The ſpotted Hyaena *Penn. ſyn. quadr. p.* 162 *n.* 119 *tab.* 17 *fig.* 2.

Spotted Hyaena *Schreb. Säugth. III p.* 374.

Zubbi Habeſſin. v. Salt in Valentia's voyages &c vol. II. p. 498.

Caput magnum, planum. Vibriſſae aliquot ſupra vtrumque oculum, longioresque ad latera naſi. Auriculae breues, ſubacuminatae, extus nigrae, intus cinereae. Facies et caput ſupra nigra. Iuba breuis, nigra. Corpus pilis breuibus, mollibus; cum artubus ruſo-fuſcum maculis rotundis nigris. Crura poſtica ſtriis transuerſis nigris. Cauda breuis, nigra, villoſa.

Habitat in Guinea, Aethiopia, ad caput bonae ſpei in terrae rupiumque caueis. Noctu praedatur oues, ſepulchra adit voratque cadauera; ipſosque homines adoritur. Vox terribilis.

Animal

Animal paucis viſum ex viuo exemplo deſcripſit Pennantus, diſtinguendum ab antecedente.

46. PHOCA.

Dentes Primores Superiores VI paralleli: exteriores maiores.
Inferiores IV paralleli, diſtincti, aequales, obtuſiuſculi.
Laniarii ſolitarii: ſuperiores a primoribus, inferiores a molaribus remoti, primoribus longiores.
Molares V ſ. VI, tricuſpidati.
Auriculae nullae (plurimis).
Corpus poſtice gracileſcens.
Pedes pentadactyli: poſtici coaliti.

vrſina. 1. P. capite auriculato.
Vrſus marinus *Steller: Nou. comment. petrop. II p.* 331 *tab.* 15.
Der Seebär *Steller: Hamb. Mag. XI p.* 264 *cum fig.* comm. petrop.
Der Seebär *Hall. vierf. p.* 585.
Phoca (vrſina) capite auriculato *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 37 *n.* 1.
Seekatzen *Müll. Samml. III p.* 249.
Zee-Beer: Rob met Ooren aan den Kop *Houtt. nat. hiſt. II p.* 3.

PHOCAE genus ſub aqua natat, vix incedit ob pedes anticos retractos, poſticos vnitos: victitat piſcibus; pingue. Aurium foramina valuula triangulari claudenda ſub aqua, nares contrahendae. Linguam bifidam habet.

Ours marin *Bom. dictionn. III p.* 318.
Phoca (vrsina) capite auriculato *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 55 *n.* 1.
The ursine Seal *Penn. syn. quadr. p.* 344 *n.* 271.
Der Seebär *Müll. Natursf. I p.* 195.
Der Seebär *Stell. Kamtsch. p.* 97.
Der Seebär: Phoca vrsina *Schreb. Säugth. III p.* 289 *n.* 1 *tab.* 82 fig Stelleri.
Морской котъ (Morskoi kot) *Russis.* Выпоротки (Wiporotki) (*ex vtero exsecti embryones*).
Tarlatschega *in sinu penschinico.*

Longitudo corporis nouem pedum. Caput vrsinum, at crassius et rotundius. Labia tumida, intus rubra atque serrata. Lingua longa, angusta, papillis acutis, bifida. Vibrissae albae, longae crassaeque. Nares lunatae. Apex nasi cute nigra, nuda, rugosa tectus. Oculi magni, prominentes: iride nigra, pupilla smaragdina, membrana carnosa tegendi. Auriculae paruae, acutae, extus pilosae, intus laeues, sub aqua occludendae. Collum crassum. Corpus postice gracilescens. Palmae digitis quinque magnitudine decrescentibus: vnguibus minutis, Plantae multo longiores: digitis quatuor prioribus aequalibus, quinto minore: vnguibus tribus interioribus rotundatis, duobus externis minutis. Cauda breuissima. Cutis crassa, pilis densis. Mares nigri, apicibus pilorum griseis in senioribus; feminae cinereae. Mammae abdominales duae. Penis osse instructus.

Habitat in Kamtschatkae maritimis inter Asiam et Americam proximam, primario in insula Beringii. A Iunio ad Septembrim inhabitant insulas inter vtrumque orbem, in quibus coeunt atque pariunt; mense Septembri emaciatae adeunt lito-

ra

ra aſiatica atque americana inter gradum latitudinis 50 et 56.

Impetuoſiſſime natant. Mares polygami gregatim degunt cum 8-50 vxoribus, filiis, filiabus ad 120; coeunt veſpera in litore reſupinata femina. Vterum fert nouem menſes. Parit Iunio menſe vnicum, raro duo. Naſcitur oculis apertis, omnibusque dentibus inſtructa exceptis laniariis. Vix metuunt hominem. Mordent proiectum lapidem maxime iraſcibiles. Senes elumbes quieſcunt pingues ſemperque fere dormientes; proprium lapidem pro lecto habent, quem non deſerunt. Bella inſtituunt propter vxores, lectum, aequum et iuſtum; ſuccumbente vno accurrit alter opem laturus, mox alteri alius, ne duo contra vnum, vsque dum omnes praelio inuoluti. Vxores victi brabea ſunt victoris. Mares prolem mire amant; crudeles in vxores timidas, niſi prolem defenderint ſtrenue; hae vero obedientiſſimae, ſubiectiſſimaeque. Moeſti lacrymas fundunt copioſiſſimas. Caro maris mala, haud eſculenta, feminarum ac iuniorum ſapida. Pellis adhibetur embryonum ex vtero exſectorum.

leonina. 2. P. capite antice criſtato, corpore fuſco.

Le Lion marin *Dampier voy. I p.* 118.

La Manate de Sainte Helene *Dampier voy. II p.* 268.

Sea-lyon *Anſon voy. p.* 122 *cum figg.* maris et feminae.

Les Loups marins *Ulloa voy. II p.* 24?

Phoca maior, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, vngulatis, poſterioribus latis bifidis *Parſons: Philoſ. transact. XLVII p.* 121.

G. Shelvocke's voyage round the world (a. 1719 [...]) p. 262 [fig.]

Phoca (leonina) capite antice criſtato *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 37 *n.* 2.
Lion marin *Dictionn. anim. II p.* 691.
Zee-Leeuw: Rob met een Kam van vooren aan den Kop *Houtt. nat. hiſt. II p.* 5.
Le Lion marin *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 333, 351.
Lion marin *Bom. dictionn. II p.* 703.
Phoca (leonina) capite antice criſtato *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 55 *n.* 2.
Loups marins *Pernetty voy. II p.* 40 *tab.* 9 *fig.* 1.
The leonine Seal *Penn. ſyn. quadr. p.* 348 *n.* 272.
Der Seelöwe *Müll. Naturſ. I p.* 197.
Der glatte Seelöwe: Phoca leonina *Schreb. Säugth. III p.* 297 *n.* 2 *tab.* 83 *A* fig. Anſon.

Longitudo corporis 15-20 pedum; at feminae minores. Mas naſo criſtato cute inflata retractili. Corpus pilis breuibus pallide fuſcis. Pedes nigricantes.

Habitat ad polum antarcticum. A Iunii menſis fine vsque ad Septembrim degit in inſula Iuan Fernandez, vbi in ſicco parit atque ſine cibo et motu viuit. Natat gregatim. Pugnat pro feminis; excubias agit. Caro eſculenta.

iubata. 3. P. capite ſubauriculato, collo (maris) iubato.
Leo marinus *Steller: Nou. comm. petrop. II p.* 360.
Der Seelöwe *Steller: Hamb. Mag. XI p.* 451.
Der Seelöwe *Häll. vierf. p.* 593.
Die Seelöwen *Müll. Samml. III p.* 250.
Les Lions-marins *Pernetty voy. II p.* 47 *tab.* 10.
Der Seelöwe *Stell. Kamtſch. p.* 97.
Der zottige Seelöwe: Phoca iubata *Schreb. Säugth. III p.* 300 *n.* 3 *tab.* 83 *B* fig. Pernettii.

Phoca (leonina) capite antice criſtato *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Der Seelöwe: Phoca leonina *Müll. Naturſ. Suppl. p.* 25.

Сивуча (Siwucza) *Ruſſis.*

Blandruſelr *Islandis.*

Neitſerſoak. *Groenlandis.*

Longitudo corporis ad 25 pedes. Differt a Phoca leonina, a qua eam bene diſtinxit doctiſſ. Schreberus, pilis longis nuchae et colli in mare, in femina deficientibus. Caput maius ac in Phoca vrſina. Naſus magis prominens, ſimus. Dentes fortiores ac in Phoca vrſina. Oculi magni, rubri in angulis, membrana nictitante inſtructi. Auriculae breues, erectae. Color totius animalis ruber vaccinus: ſeniores pallidiores ſunt, iuniores obſcuriores, feminae fere ochraceae, iuniores caſtaneae, nonnullae fere nigrae.

Habitat in borealibus maris pacifici ad litora occidentalia Americae, orientalia Kamtſchatkae, praecipueque in inſulis propinquis. Reperitur quoque verſus auſtrum. Edit Piſces, Phocas, Lutres, Aues aliaque animalia. Prolem minus curat. Pugnax. Polygamus, feminis tamen paucioribus quam vrſina, duabus, tribus, quatuor. Parit in ſicco initio menſis Iulii vnicum. Coit Auguſto et Septembri, reſupinata femina. Vox Bouis, iuniorum Ouis. Mares ſeniores graueolentes. Caro dulcis, bona, Kamtſchadalis expetita.

vitulina. 4. P. capite laeui inauriculato, corpore fuſco.

Vitulus maris Oceani *Rondel. piſc. p.* 458 *cum fig.* mala.

Vitulus marinus *Ol. Magn. Sept. p.* 701.

Phoca ſeu vitulus maris Oceani, Rondeletius *Geſn. aquat. p.* 829 *fig. p.* 830 Rondel. *aliaque* mala.

Phoca ſeu Vitulus marinus *Aldrov. piſc. p.* 722 *fig. p.* 724 medioer.

Phoca ſeu Vitulus marinus *Ionſt. piſc. p.* 221 *tab.* 44 *figg.* mediocres.

Phoca *Muſ. wormian. p.* 289.

Le veau marin *Perr. anim. I p.* 187 *tab.* 27.

Seehund den man auch Rubbe oder Sallhund nennet *Mart. Spitzb. p.* 75 *tab. P fig. a* mala.

Phoca *Charlet. exerc. piſc. p.* 48.

Phoca ſive Vitulus Marinus *Sibb. Scot. an. p.* 10.

Phoca ſeu Vitulus Marinus *Rai. ſyn. quadr. p.* 189.

Phoca ſeu vitulus marinus *Rzacz. Polon. auct. p.* 244.

Chiens marins *Egede Groenl. p.* 62 *cum fig.* medioer.

Phoca dentibus caninis incluſis *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 44.

Le Loup Marin *Charlev. nouv. Fr. III p.* 143.

Seehunde *Linn. Gothland. p.* 270.

Phoca dentibus caninis tectis *Linn. fn. ſuec.* I *p.* 4 *n.* 11.

Seehunde *Linn. Weſtgoth. p.* 191.

Der Seehund *Anderſ. Island. p.* 260.

Phoca dentibus caninis tectis *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 1.

Phoca Oceanica *Steller: Nou. comment. petrop. II p.* 290.

Phoca minor, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, vngulatis, poſterioribus latis ordinariis, vngulis teretibus donatis: the common Seal *Parſons; Philoſ. transact. XLVII p.* 120 *tab.* 6.

Phoca. Robbe *Klein. quadrup. p.* 93.

Phoca dentibus caninis tectis. The Phoca, with the canine teeth covered: the Sea-calf *Hill anim. p.* 554 *tab.* 27 fig. mediocris.

Retzius Djur-Riket tab. 1. fig. 2.

Phoca

Phoca (communis) dentibus caninis tectis *Linn. muf. Ad. Frid. I p.* 5.

Le Phocas ou veau marin: Phoca feu Vitulus marinus *Briff. regn. an. p.* 230 *n.* 1.

Das Seekalb. Robbe *Hall. vierf. p.* 579.

Das graue Seekalb, Skäl *Kneiff: Act. holmienf.* 1757 *p.* 171.

Phoca (vitulina) dentibus laniariis tectis *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 38 *n.* 4.

Seehunde *Müll. Samml. III p.* 559.

Phocas *Dictionn anim. III p.* 416.

Veau marin *Dictionn. anim. IV p.* 452.

Rob met de Hoektanden in den Bek befloten: Rob of Zee-Hond *Houtt. nat. hift. II p.* 14 *tab.* 11 *fig.* 6.

Phoca (vitulina) dentibus caninis tectis *Linn. fn. fuec.* 2 *p.* 2 *n.* 4.

Phoca pedibus anticis digitatis, vnguiculatis; pofterioribus latis: vnguibus teretibus *Gronov. zooph. I p.* 7 *n.* 28.

The Seal *Penn. brit. zool. p.* 34.

Loup marin *Bom. dictionn. II p.* 723.

Phocas *Bom. dictionn. III p.* 441.

Le Phoque de nôtre ocean *Buff. hift. nat. XIII p.* 333, 339.

Le Phoque *Buff. hift. nat. XIII p.* 395 *tab.* 45.

Kaffigiak *Cranz Groenl. I p.* 163.

Phoca (vitulina) capite laeui inauriculato *Linn. fyft. nat.* 12, *I p.* 56 *n.* 3.

Seehund *Knorr. delic. II tab. H,* 8.

Der Seehund *Fermin Surin. II p.* 107.

The common Seal *Penn. fyn. quadr. p.* 339 *n.* 265.

Vitello marino grande *Aleff. quadrup. IV tab.* 171 fig. Buff.

Der Robbe oder Seehund *Müll. Naturf. I p.* 198.

Eine andere Art eines Seehundes *Müll. Naturf. I p.* 201 *tab.* 11 *fig.* 6 Houtt.

Die dritte Sorte *Stell. Kamtfch. p.* 108.

Der gemeine Seehund: Phoca vitulina *Schreb. Säugth. III p. 303 n. 4 tab. 84 fig.* Buff.

Phoca (vitulina) capite laeui inauriculato *Müll. Dan. prodr. p. 1 n. 3.*

Lobo marino *Hispanis.*

Vechio marino *Italis.*

Veau marin *Gallis.*

Moelrhon *Cambrensibus.*

Robbe, Seehund, Seekalb *Germanis.*

Rob, Zee-Hond *Belgis.*

Seal, Sea-calf *Anglis.*

Sælhund *Danis.*

Selr *Islandis.*

Skjäl Siäl, Wikare-Siäl *Suecis.*

Alg (*mas*), Lagg (*femina*), Kut (*pullus*) *Ostrobothniensibus.*

Pies morski, Ciele morskie *Polonis.*

Тюленъ (Tjulen) *Russis.*

Kuma *Tungusis.*

Häp *Burätis.*

Нерпа (Nerpa) *in Sibiria.*

Pusse, Kassigiak *Groenlandis.*

Poezie is the Esquimaux word for seal. [Cartwright]

Longitudo corporis 5-6 pedum. Oculi magni, nigri, in fronte positi, membrana nictitante instructi: humore crystallino globoso. Vibrissae longae, vndulatae. Labia tumida. Nares oblongae. Auriculae nullae. Caput grande. Lingua apice parum bifida. Collum crassum, breue. Corpus fere conicum, postice gracilescens, pilis breuibus densis, colore fusco, albido adsperso: dorso magis fusco, abdomine pallidiore. Seniores grisei raroque toti albi. Pedes supra et subtus pilosi. Vngues acuti. Cauda breuissima, planiuscula, obtusa. Mammae duae abdominales, retractiles. Foramen ouale apertum.

Habitat

Habitat verſus litora in mari, praecipue boreali, circa Spitzbergiam, Groenlandiam, Americam borealem, Ruſſiam, Noruegiam inque omni mari balthico; in litoribus Belgii, Angliae, Galliae. Forte eadem ſpecies eſt circa nouam Seelandiam.

Aeſtate in ſicco degit, hieme ſaepius in mari; intrat quoque fluuios. Victitat piſcibus, imprimis Clupea Harengo, fucis. A Laris prouocata exſpuit piſces. Dormit in lapide ex aqua eminente. Coit Aprili menſe. Parit hieme (Februario menſe) atque primo vere vnicum pullum vel duo in arena, lapide, glacie, quem lactat per dies quatuordecim. Pulli colore albo aut flauicante hebdomade quarta mutando. Pugnant inter ſe propter vxores, lapides, glaciem. Vox quaſi latratus raucus, iunioribus fere Cati. Moeſta lacrymas fundit. Caro Groenlandis, Americanis, Kamtſchadalis eſculenta, iuniorum ſapida. Ictu ſupra naſum facillime occiditur.

Varietates huius forte ſunt, niſi ſpecies diſtinctae:

α) Der graue Seehund *Schreb. Säugth. III p.* 309. Gråſiäl *Suecis.*

Longitudo pedum ſex, et maior. Naſus latior. Vngues longiores. Corpus obſcure griſeum, interdum flaueſcens.

Habitat gregaria in mari balthico, ſed non cum vitulina. Parit Ianuario menſe in glacie pullum vnicum album, qui colorem mutat die octauo, primum in capite atque palmis.

β) Seals

β) Seals *Bell trav. I p.* 261.
Die vierte Sorte Seehunde *Stell. Kamtſch. p.* 108.
Der ſibiriſche Seehund *Schreb. Säugth. III p.* 310.

Magnitudo Phocae vitulinae, corpore toto argenteo.

Habitat in Lacu Baikal et Orok.

γ) Der Seehund *S. G. Gmelin Reiſ. III p.* 246.
Der caſpiſche Seehund *Schreb. Säugth. III p.* 310.

Magnitudo Ph. vitulinae, at pinguior. Color niger, albicans, ex flauo albicans, cinereus, murinus vel tigrinus.

Habitat in mari Caſpio. Caro comeditur.

groenlandica. 5. P. capite laeui inauriculato, corpore griſeo lateribus luna nigra.
Svartſiide *Egede Groenl. fig. p.* 62.
Seehund mit einer ſchwarzen Seite *Ellis Hudſ. tab.* 7
Attarſoak *Cranz Groenl. p.* 163.
The harp Seal *Penn. ſyn. quadr. p.* 342 *n.* 269.
Die andere Sorte *Stell. Kamtſch. p.* 107.
Der ſchwarzſeitige Seehund *Schreb. Säugth. III p.* 310 *n.* 5.
Phoca groenlandica *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*
Harp-Seal, Heart-Seal *Anglis.*
Vadeſelur, Vadeſelr *Islandis.*
Attarſoak, Atak *Groenlandis.*

Corpus longitudine nouem pedum. Caput acutius ac in Ph. vitulina. Corpus craſſum, maxime pingue,

pingue, ex albicante griſeum, lateribus luna nigra notatis, non ante annum quintum in conſpectum veniente: cornubus ſurſum verſis. Quouis anno in quintum vsque colorem mutat, nomenque apud Groenlandos. Foetus albus lanuginoſus *Iblau* eſt, primo anno albicans *Attarak* dicitur; altero griſea *Atteikſiak*; tertio *Aglektok*, quarto *Milektok*, quinto *Attarſoak*.

Habitat in Groenlandia et Newfoundland, nec non circa Kamtſchatkam. Forte et in lacu Baikal. Vtiliſſima ſpecies pelle atque oleo copioſiſſimo optimoque.

Migrat bis quotannis; primum Martio menſe boream verſus per fretum Davis, Maio redit ad Islandiam, Iuniique initio in Groenlandiam, macra. Tum deſerit Groenlandiam Iulio reditque Septembri, inque Islandiam fine Decembris maxime pinguis, vnica agmen ducente, quam vocant *Robbenkönig*.

hiſpida. 6. P. capite laeui inauriculato, corpore pallide fuſco pilis ſurrectis hiſpido.

Phoca minor, dentibus caninis tectis, ceruice longiore, capite lutrae caput referente, palmis anterioribus latis non digitatis, poſterioribus latis ordinariis: the long-neckd Seal *Parſons: Philoſ. transact. XLVII p.* 120 *tab.* 6?

Neitſek *Cranz Groenl. p.* 164.

The rough Seal *Penn. ſyn. quadr. p.* 341 *n.* 267.

Der rauhe Seehund: Phoca hiſpida *Schreb. Säugth. III p.* 312 *n.* 6 *tab.* 86 fig. propr.

Der rauhe Seehund *Müll. Naturſ. Supplem. p.* 26.

Phoca foetida *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Utſelr *Islandis.*

Neitſek *Groenlandis.*

Magni-

Magnitudo praecedentis. Pili surrecti fere Porci setae. Color pallide fuscus, circa oculos nigricans.

Habitat in Groenlandia et Labrador.

cristata. 7. P. capite antice cristato, corpore griseo.
Le Klap-myssen *Egede Groenl. p. 62.*
Klapmüts *Egede Groenl. fig. p. 62.*
Seehund mit einer Haube *Ellis Hudf. tab. 7.*
Neitsersoak *Cranz Groenl. p. 164.*
The hooded Seal *Penn. syn. quadr. p. 342 n. 268.*
Die Klpppmütze *Schreb. Säugth. III p. 312 n. 7.*
Neitsersoak *Groenlandis.*

Multo maior antecedentibus. Frons cute forti, plicata, retractili supra oculos et nares. Color pulchre griseus: pilis albis, lanugine densa nigra.

Habitat in Groenlandia australiori et Newfoundland. Non occidenda ictu capitis, nisi detrahatur antea cutis frontis.

Num forte idem animal cum Phoca leonina?

barbata. 8. P. capite laeui inauriculato, corpore nigricante.
The Phoca: Vitulus marinus or Sea-Calf *Parsons: Philos. transact. n. 469 p. 383 tab. 1 fig. 1.*
Phoca maxima *Steller: Nou. comm. petrop. II p. 290.*
Phoca maior, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, vngulatis, posterioribus latis ordinariis, corpore longiore: the long-bodied Seal *Parsons: Philos. transact. XLVII p. 121.*

See-

Seehunde von der gröſſern Art, die in Kamtſchatka Lachtak genannt werden *Müll. Samml. III p.* 250.
Le grand Phoque *Buff. hiſt. nat. XIII p.* 333, 343.
Ukſuk *Cranz Groenl. p.* 165.
The great Seal *Penn. ſyn. quadr. p.* 341 *n.* 266.
Der groſſe Seehund *Schreb. Säugth. III p.* 313 *n.* 8.
Phoca barbata *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*
Gramſelr *Islandis.*
Lachtak *in Kamtſchatka.*
Ukſuk, Urkſuk *Groenlandis.*

Similis vitulinae, at longitudo corporis 12 pedum. Cutis denſa, pilis nigricantibus.

Habitat ad Scotiam atque Groenlandiam auſtraliorem, vulgaris circa Islandiam. Parit Nouembri atque Decembri pullos albos.

An femina praecedentis?

pusilla. 9. P. capite laeui ſubauriculato, corpore fuſco.
Φωκη *Ariſt. hiſt. anim. I c.* 2 *n.* 12, *c.* 23 *n.* 210. *II c.* 4 *n.* 14, 19. *c.* 11 *n.* 68. *c.* 18 *n.* 130, 134. *c.* 20 *n.* 158. *III c.* 16 *n.* 237. *V c.* 2 *n.* 25. *VI c.* 11 *n.* 126-135.
Vitulus marinus *Plin. hiſt. nat. VIII c.* 31 *(c.* 49 *Hard.). IX c.* 12, 13 *(c.* 14, 15 *Hard.). XI c.* 37 *(c.* 50, 55, 75, 87 *Hard.) c.* 40 *(c.* 95 *Hard.).*
Phoca *Plin. hiſt. nat. IX c.* 7 *(c.* 6 *Hard.). XI c.* 37 *(c.* 72 *Hard.).*
Φωκη *Aelian. anim. IX c.* 9, 50.
Vitulus marinus *Bellon. aquat. p.* 19 *fig. p.* 21? mal.
Vitulus maris mediterranei *Rondel. piſc. p.* 453 *cum fig.* mala.
Phoca ſeu vitulus maris mediterranei Rondeletius *Geſn. aquat. p.* 827 *cum fig.* Rondel.

Les

Les veaux marins *Dampier voy. I p.* 116?

Phoca minor, dentibus caninis tectis, palmis anterioribus digitatis, vngulatis, posterioribus latis ordinariis, collo constricto, capite testudiniformi: the tortoise-headed Seal *Parsons: Philos. transact. XLVII p.* 120 *tab.* 6?

Loup marin *Vlloa voy. II p.* 2? 26?

Zee-Kalf in de Middellandsche Zee gevangen *Houtt. nat. hist. II p.* 16 *tab.* 11 *fig.* 5.

Le petit Phoque noir *Buff. hist. nat. XIII p.* 333.

Le petit Phoque *Buff. hist. nat. XIII tab.* 53.

Le Phoque de la Méditerranée et des mers du Midi *Buff. hist. nat. XIII p.* 340.

The little Seal *Penn. syn. quadr. p.* 343 *n.* 270.

Vitello marino picciolo *Aless. quadrup. IV tab.* 171 fig. Buff.

Müll. Naturs. I tab. 11 *fig.* 5 Houtt.

Der kleine geöhrte Seehund: Phoca pusilla *Schreb. Säugth. III p.* 314 *n.* 9 *tab.* 85 fig. Buff.

Der kleine Seehund *Müll. Naturs. Suppl. p.* 26.

Longitudo corporis 2-3 pedum. Dentes primores quatuor intermedii superiores bifurcati, inferiores duo intermedii leuiter trifurcati. Rudimentum auricularum. Pinnae inter digitos vltra hos atque vngues prominentes. Pili molles, longiores ac in P. vitulina. Corpus fuscum, subtus pallidius.

Habitat in Oceano, mari mediterraneo, ad insulam Iuan Fernandez; non in India, vti Buffonio. Haec veterum Phoca videtur.

47. TRICHECHVS.

Dentes Primores nulli vtrinque.

Laniarii ſuperiores ſolitarii.

Molares ex oſſe rugoſo vtrinque; inferius duo (*vtrinque quatuor ſecundum Pennantum*).

Labia geminata, fiſſa.

Auriculae nullae.

Pedes digitati pentadactyli palmati: poſteriores compedes coadunati in pinnam.

Rosmarus. 1. T. dentibus laniariis ſuperioribus exſertis longioribus.

Rosmarus ſiue Morſus noruagicus *Ol. Magn. ſept. p.* 757 *cum fig.* mala.

Rosmarus *Geſn. aquat. p.* 249 *cum fig.* Ol. Magn. *aliaque p.* 250 paullo meliore.

Animal quod noſtrates Walrus, Angli a Ruſſis mutuato nomine Morſh vulgo nominant *Laet Amer. p.* 38 *cum fig.* bona.

Wallrus ſeu Mors *Ionſt. piſc. p.* 227.

Rosmarus. Wallroſs *Ionſt. piſc. tab.* 44 fig. mala.

Rosmarus Vetus. Ein Alt Meer Ros. Rosmarus Iuvencus. Ein Iung Meer Ros *Ionſt. piſc. tab.* 44 fig. Laet.

Animal quod Anglis et Ruſſis Walrus, aliis Mors, Danis et Islandis Rosmarus vocatur *Muſ. Worm. p.* 289 *cum fig.* Laet.

Ruſſor oder Roſtinger *Geſn. Fiſchb. p.* 127 *cum fig.* Ol. *aliaque p.* 128 meliori.

Rosmarus, Wallroſs oder Seepferd *Olear. Gott. Kunſtk. p.* 35 *tab.* 23 *fig.* 3 Laet.

Wallroſs *Mart. Spitzb. p.* 78 *tab. P fig. b.* mala.

Walrus *Charlet. exerc. piſc. p.* 49.

...scriptio ac delineatio geographica detectionis freti ad occasum ... terras americanas in Chinam ducturi ... amst. 1613. 4. cum ... aeri incisa egregia, cuius imitamenta minus exquisita ... in Laeti, wormii aliorumque libros transierunt.

Theod. Hasaei dissertationum philologicarum Sylloge. 1731. 8. pag. 451 – 509. utilia collectanea. In eo [illegible] Rosmarum per fossili Marmont Sibiriae habet.

Walrus seu Mors *Sibb. Scot. an. p.* 10.

Equus marinus et Hippopotamus falso dictus *Rai. syn. quadr. p.* 191.

Le Wallrofs, ou Cheval marin *Egede Groenl. p.* 61 *cum fig.* mala.

Phoca dentibus caninis exsertis *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 44.

Vache Marine *Charlev. nouv. Fr. III p.* 147.

Das Wallrofs *Anders. Island. p.* 258.

Phoca dentibus caninis exsertis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 6 *n.* 2.

Ein Seepferd *Ellis Huds. tab.* 7 fig. mala.

Rosmarus. Wallrofs *Klein. quadrup. p.* 92.

Morsch *I. G. Gmelin Sibir. III p.* 165.

Phoca dentibus caninis exertis. The Phoca, with the canine teeth exerted: the Walrus *Hill anim. p.* 555.

La Vache marine: Odobenus *Briss. regn. an. p.* 48 *n.* 1.

Das Wallros *Hall. vierf. p.* 583.

Phoca (Rosmarus) dentibus laniariis superioribus exsertis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 38 *n.* 3.

Wallrofs *Müll. Samml. III p.* 563.

Rosmare *Dictionn. anim. III p.* 713.

Vache marine *Dictionn. anim. IV p.* 438.

Walrus *Dictionn. anim. IV p.* 570.

Walrus: Rob met de bovenste Hoektanden buiten den Bek uitsteekende *Houtt. nat. hist. II p.* 7 *tab.* 11 *fig.* 1 cranii.

Vache marine ou bête à la grande dent *Bom. dictionn. IV p.* 497.

Le Morse ou la vache marine *Buff. hist. nat. XIII p.* 358, 415 *tab.* 54 *fig.* animalis; *tab.* 55 fig. cranii.

Das Wallrofs *Cranz Groenl. p.* 165.

Trichechus (Rosmarus) dentibus laniariis superioribus exsertis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 49 *n.* 1.

The

Cptn Cook's voyage to the northern Hemisphere vol. II. p. 456 [illegible]

The arctic Walrus *Penn. ſyn. quadr. p.* 335 *n.* 263.
Vacca marina *Aleſſ. quadrup. IV tab.* 172 fig. Buff.
Wallruſs *Müll. Naturſ. I p.* 171 *tab.* 11 *fig.* 1 cranii; *tab.* 29 *fig.* 2 animalis mala.
Wallroſs *Stell. Kamtſch. p.* 106.
Das Wallroſs: Trichecus Rosmarus *Schreb. Säugth. II p.* 262 *n.* 1 *tab.* 79 fig. Buff.
Trichechus (Rosmarus) dentibus laniariis ſuperioribus exſertis *Müll. Dan. prodr. p.* 1 *n.* 1.
Vache marine *Gallis.*
Hors-whal *Cambrenſibus.*
Wallroſs *Germanis.*
Wallrus *Belgis.*
Sea-Cow, Walrus *Anglis.*
Hav-Heſt, Hval-Ros, Rosmar *Noruegis.*
Wallrus *Suecis.*
Morsk *Lapponibus.*
Roſt-Unger, Roſtungr, Roſſmer *Islandis.*
Auek, Auak *Groenlandis.*
Моржъ (Morſh) *Ruſſis.*
Tiute *ad oſtium Ob fluuii.*

Longitudo corporis 18 pedum, peripheria vbi craſſiſſimum 10-12 ped. Caput ſubrotundum, obtuſum, fere elephantinum absque proboſcide. Naſus minus eleuatus: naribus lunatis. Os paruum. Labia craſſa, ſupra et infra ſetis pellucidis craſſitie ſtraminis tecta. Laniarii ſuperiores elongati, fere duorum pedum longitudine ex maxilla prominentes, deorſum curui, eburnei, ſiniſter vtplurimum dextro breuior. Oculi parui, ſplendentes, retractiles. Orificia duo parua auricularum loco, fere in nucha. Collum breue, craſſum. Corpus medio craſſum, poſtice graciléſcens. Cutis craſſa, rugoſa, pilis breuibus, fuſcis, rarioribus adſperſa. Crura breuia. Pedes digitis 5-5 pinnatis, vnguibus paruis. Pedes poſtici lati, retrorſum

 ſpectan-

ſpectantes. Cauda breuiſſima. Penis ingens oſſe ſultus.

In ſceleto cranii muſei Erlangenſis dentes primores ſuperiores duo.

Habitat ad Spitzbergam copioſus, ad Groenlandiam rarius; circa neuam Zemblam, fretum Hudſonis, inque oceano glaciali vsque ad promontorium Tſchuktſchorum. Gregarius ad 100. Timidus at ferox. Lente incedit ope laniariorum. Dormit in glaciei inſulis. Vox fortis Bouis. Parit vnicum vel duo. Edit fucos, piſces, cruſtacea dentibus laniariis effodienda. Excrementa quaſi equina.

Manatus. 2. T. dentibus laniariis incluſis.

Manati *Hernand. Mex. p.* 323 *cum fig.* mala.
Manatus *Rondel. piſc. p.* 490.
Manatus *Geſn. aquat. p.* 253.
Manati Phocae genus *Cluſ. exot. p.* 132 *fig. p.* 133 mediocris.
Manati *Laet Amer. p.* 6 *cum fig.* Cluſii.
Manati Indorum *Aldrov. piſc. p.* 728 *fig. p.* 729 Cluſii.
Manati Indorum *Ionſt. piſc. p.* 223.
Manati *Charlet. exerc. piſc. p.* 49.
Manati ſeu Vacca marina *Rai. ſyn. quadr. p.* 193.
Manates ou vaches marines *Dampier voy. I p.* 46.
The Lamentyn female *Barbot Guin. p.* 562 *tab.* 7? videtur potius Tr. Dugung.
Manati *Sloane Iam. II p.* 329.
Thrichechus *Art. gen. p.* 79. *ſynon. p.* 109.
Trichechus Manatus *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 59.
Monatus *Klein. miſſ. piſc. II p.* 32.
Baca Marina *Gum. Orin. I p.* 319. icon II. p. 120
Gilij Saggio di storia americana I. p. 84. tab. I.
Lamen-

Philos. Transact. 1821. P. II. t. 26 -

Lamentin ou Poisson Boeuf *Condam. voy. p.* 154.
Trichecus Manatus *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 1.
Manati seu Vacca marina *Steller*: *Nou comm. petrop. II p.* 294.
Manatus. See-Kuh. See-Ochs *Klein. quadrup. p.* 94.
Das Manati oder die sogenannte Seekuh *Steller: Hamb. Mag. XI p.* 132.
Le Lamantin: Manatus *Briss. regn. an. p.* 49 *n.* 2.
Thrichecus mammis pectoralibus binis: the Manatee *Brown. Iam. p.* 459.
Lamantin *Adans. Seneg. p.* 143.
Trichecus (Manatus) *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 34 *n.* 1.
Die Seekuh *Müll. Samml. III p.* 251.
Lamentin *Dictionn. anim. II p.* 585.
De Zee-Koe genaamd Manati of Lamentin *Houtt. nat. hist. I p.* 462.
Le Lamantin *De la Caille voy. p.* 229.
Lamentin *Bom. dictionn. II p.* 635.
Le Lamantin *Buff. hist. nat. XIII p.* 377, 425 *tab.* 57 fig. embryonis.
Trichechus (Manatus) dentibus laniariis inclusis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 49 *n.* 2.
The Manati *Penn. syn. quadr. p.* 352 *n.* 273.
Seekuh *Müll. Naturs. I p.* 176 *tab.* 29 *fig.* 3 Clusii.
Die Seekuh *Stell. Kamtsch. p.* 97.
Der Manati: Trichecus Manatus *Schreb. Säugth. II p.* 269 *n.* 3 *tab.* 80 fig. Buff.
Trichechus (Manatus) dentibus laniariis inclusis *Müll. Dan. prodr. p.* 1 *n.* 2.
Manati *Hispanis.*
Pezze Mouller, Pezze Muger *Lusitanis.*
Lamantin, Lamentin, Vache marine *Gallis.*
Seekuh *Germanis.*
Manati, Manatee *Anglis.*
Söe-Koe, Hav-Nödd *Danis.*
Корова морская (Korowa morskaja) *Russis.*
Kapustnik *Russis in Kamtschatka.*

Lereou *ad Senegal fluuium.*
Cojumero *Guianienſibus.*
Pege buey *ad fluuium Amazonum.*
Ypepiapra Braſilienſibus. Casp. Barlaei res gestae in Braſilia pa. 22

Longitudo Africani 8 pedum, Americani 17 pedum: Pennanto autem 28 pedes, Barbotio ad 20 pedes longus eſt; hic tamen T. Dugung deſcripſiſſe videtur, cum laniarios tribuat animali. Cetis maxime affinis. Pedes antici fere pinnae ſunt, poſtici caudae horizontali ſimiles, neque vmquam terram ingreditur animal. Caput paruum, oblongum, fere quadratum. Nares ſetis breuibus repletae. Rictus paruus. Labia duplicata, ſetoſa, quibus abſcindit fucorum radices. In angulis oris ſetae albae, tubuloſae, ne cibus effluat ex ore. Dentes nulli? praeter oſſa ſolitaria vtrinque, rugoſa, plana, alba, dentium loco. Lingua acuta, parua. Oculi minutiſſimi, iride nigra. Auriculae nullae; meatuum auditoriorum foramina minuta. Collum craſſum, cum capite pendulo fere confluens. Palmae ſ. pinnae pectorales (absque vnguibus Pennanto, vnguibus quatuor Schrebero) ſubtus concauae ſetis duris tectae. Cauda craſſa, horizontalis, fortis, ſubdiuiſa margine. Cutis craſſa, nigra ſiue cana, inaequalis, corticis quercus aemula, duriſſima, ſetis rariſſimis. Mammae duae pectorales.

Habitat ad litora in Mari americano, aſiatico, ad oſtia fluuiorum. Mitis; muſica delectatur, forte veterum Delphinus. Vorat indeſinenter fucos vluasque et vegetabilia reliqua. Dormit poſt prandium in dorſo natans. Sociati Mas, femina, ſemiadultus, proles. Monogamus, verno tempore coit, praecipue diebus ſerenis verſus veſperam: femina variis gyris primum fugiente, reſupinata. Parit vnicum pullum vel duo; grauidam vltra annum putat Stellerus. Dorſum inter paſcendum ex aquis emi-

eminet, auibus animalis pediculos venantibus. Vox Bouis (Pennanto nulla). Male videt, bene audit. Caro alba, durior, bouilla, difficulter putrefcens, iunioris fapore vitulinae.

Stellerianum animal differre, aliamque fpeciem effecis, aliam transamericanam, doctiff. Schreberus.

Dugung. 3. T. dentibus laniariis fuperioribus exfertis breuioribus.

The Lamentyn female *Barbot Guin. p.* 562 *tab.* 7?
Le Dugon *Buff. hift. nat.* XIII *p.* 374 *tab.* 56 figg. cranii. F. Leguat voyages T. 1. p. 93
The Indian Walrus *Penn. fyn. quadr. p.* 338 *n.* 264.
Der Dugung *Schreb. Säugth.* II *p.* 267 *n.* 2.
Der Dugung: Trichechus Dugon *Müll. Naturf. Suppl. p.* 21.
Dugung, Ikan Dugung *Maleitis.*

Rosmaro affinis. Laniarii duo breuiores approximati. Molares fupra quatuor abs laniariis remoti, infra tres.

Habitat ad caput bonae fpei et circa infulas philippinas. Dicitur vefci recentibus mufcis in ficco. Species fubobfcura.

Species obfcurae.

* The Beluga *Penn. fyn. quadr. p.* 357.
Bieluga *Stell. Kamtfch. p.* 106.
Barclay & Neill in Mem. of ye Werner. Soc. T. 3. p. 371. t. 17

Diftinguendum animal ab Acipenfere eiusdem nominis. Longitudo 15-20 ped. craffities 3-4 pedum. Phocae fimile pedibus atque cauda. Dentes Vaccae. In collo foramina duo pro eiicienda aqua. Pili rariores in corpore, vt cutis alba transpareat vbique.

Habitat in mari Aſiam ab America diuidente, inque oceano glaciali ad oſtium Ieniſei. Grega-ium animal, piſcibus victitans, pullos in dorſo gerens. Raro circa litora conſpicitur.

** The Sea Ape *Penn. ſyn. quadr. p.* 356.

Animal quinque pedes longum, a Stellero viſum ad litora americana. Caput canis. Auriculae acutae, erectae. Oculi magni. Labium vtrumque barbatum. Corpus craſſum, rotundatum, verſus caput craſſius, poſtice gracileſcens. Cauda biſurcata, lobo ſuperiore longiore. Corpus pilis denſis, ſupra griſeis, infra rubris tectum. Pedes nulli. Animal ludibundum.

* * *

Piſcis anthropomorphos *Ionſt. piſc. p.* 209.
Anthropomorphos *Ionſt. piſc. tab.* 40.
The Meermaid *Barbot Guin. p.* 516 *tab.* 30.
Sirenes *Dictionn. anim. IV p.* 213.
Homme marin *Bom. dictionn. II p.* 532.

Haud iuuat afferre plura ſynonyma animalis fabuloſi, forte ex vitioſa Manati figura ac deſcriptione effícti.

48. BALAENA.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae pectorales*; posticorum loco *pinna caudalis* horizontalis absque vnguibus.

Dentium loco in maxilla superiore laminae corneae.

Fistula respiratoria duplex supra caput.

Mysticetus. 1. B. naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni.

φαλαινα *Arist. hist. anim. I c. 5 n. 35. III c. 16. n. 237?*

Μυστικητος *Arist. hist. anim. III c. 10 n. 164?*

Balaena *Plin. hist. nat IX c. 6,7 (c. 5,6 Hard.). c. 13 (c. 15 Hard.)?*

Φαλαινα *Aelian. anim. V c. 4?*

Balaena vulgo dicta siue Musculus *Rondel. pisc. p. 475 cum fig.* mala.

Balaena vulgo dicta siue Mysticetus Aristotelis, Musculus Plinii *Gesn. aquat. p. 132 cum fig.* Rondel.

Balaena *Schonev. ichth. p. 24.*

Balaena *Aldrov. pisc. p. 675 figg. a pag. 677 ad 682* malae.

Balaena vulgi *Aldrov. pisc. p. 688.*

Balaena vulgi *Ionst. pisc. p. 216.*

Balena vulgi *Mus. Worm. p. 281.*

Wallfisch *Mart. Spitzb. p. 98 tab. Q. fig. a, b.*

Balaena vulgaris *Charlet. exerc. pisc. p. 46.*

Balaena, the Common Whale *Sibb. Scot. an. p. 23.*

CETORVM species pauciores recte cognitae: videtur horum historia denuo fere inchoanda.

Balaena Rondeletii, Gesneri et aliorum. The Whale *Willughb. pisc. p.* 35.

Balaena vera Rondeletii *Willughb. pisc. p.* 38.

Balaena vulgaris edentula, dorso non pinnato *Rai. syn. pisc. p.* 6.

Balaena maior laminas corneas in superiore maxilla habens, fistula donata, bipinnis Sibb. *Rai. syn. pisc. p.* 16.

Balaena maior laminas corneas in superiore maxilla habens, bipinnis, fistula carens Sibb. *Rai. syn. pisc. p.* 16. fictam putat Artedi.

La seconde sorte *Egede Groenl. p.* 48.

Hvalfisk *Egede Groenl. fig. p.* 48.

Balaena fistula in medio capite; dorso caudam versus acuminato *Art. gen. p.* 76 *n.* 1. *descr. p.* 106. *synon. p.* 106 *n.* 1.

Balaena groenlandica *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 59.

Balaena vera Zorgdrageri *Klein. miss. pisc. II p.* 11.

Balaena fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 98 *n.* 264.

Der rechte Grönländische Wallfisch *Anders. Island. p.* 212.

Balaena fistula in medio capite dorso caudam versus acuminato *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 1.

Balaena fistula in medio capite, dorso caudam versus acuminato. The Balaena, with the fistula in the middle of the head, and the back ridged toward the tail: the Whale *Hill anim. p.* 312.

Balaena (groenlandica) fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. mus. Ad. Frid.* I *p.* 51.

La Baleine ordinaire de Groenland: Balaena (vulgaris groenlandica) bipinnis, in dorso nigricans, in ventre alba, dorso laeui *Briss. regn. an. p.* 347 *n.* 1.

Balaena (Mysticetus) naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 75 *n.* 1.

Baleine

Baleine *Dictionn. anim. I p.* 202 cum reliquis Cetis.
Groenlandsche Walvisch: Walvisch met bogtige Blaasgaten midden op den Kop, de Rug zonder Vin *Houtt. nat. hist. III p.* 442.
Balaena (Mysticetus) naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 16 *n.* 49.
Balaena dorso impinni: fistula in medio capite: dorso caudam versus carinato *Gronov. zooph. I p.* 29 *n.* 139.
Balaena. Hval *Pontopp. Dan. I p.* 645.
Baleine *Bom. dictionn. I p.* 224 cum reliquis Cetis.
Der eigentliche sogenannte Grönländische Wallfisch *Cranz Groenl. p.* 141.
Balaena (Mysticetus) naribus flexuosis in medio capite, dorso impinni *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 105 *n.* 1.
Der grönländische Wallfisch *Müll. Naturs. I p.* 481.
Balaena (Mysticetus) naribus flexuosis in medio capite; dorso impinni *Müll. Dan. prodr. p* 6 *n.* 45.
Wallfisch, grönländischer Wallfisch *Germanis.*
Groenlandsche Walvisch *Belgis.*
Whale, Greenlands Whale *Anglis.*
Hvalfisk, Slethack, Grönlandsk Hval *Noruegis.*
Grönlands Hualfisk *Suecis.*
Vatushalr *Islandis.*
Arbek, Arbavirksoak *Groenlandis.*

Omnium animalium maximum, vtplurimum 50-60 pedes longum, neque longius Martensio, aliis 70-80, Linneo saepe 100 ped. Caput pars tertia corporis est. Os longum, forma litterae S curvatum, vsque ad oculos protensum. Dentium loco laminae corneae circiter 700, apice margineque fissae in setas: media longissima ad 18-20 pedes longa. Lingua mollis, alba, lateribus nigro maculatis, maxillae inferiori adhaerens. Maxilla inferior latissima, imprimis medio. Oculi magni.

magnitudine bubulorum, laterales, remotiſſimi, cum aliquot pilis. Caput ſupra planiuſculum, tectiforme cum tuberculo, et in hoc ſpiracula flexuoſa. Aures infra oculos. Dorſum impinne. Angulus ſubacutus a media cauda ſecundum dorſi medium extenſus, breuis. Cauda parum biſida. Tota nitida nigra, ventre albo; raro tota nigra, vel nigro flauoque varia, vel alba. Cutis craſſitie pollicis, epidermis calami ſcriptorii. Penis 6 - 8 pedes longus, vaginatus. Mammae duae, abdominales ante vuluam, paruae. Lardum inter cutem ac carnem copioſiſſimum.

Habitat verſus polum arcticum, praecipue circa Groenlandiam atque Spitzbergam. Velociſſima timidaque. Victitat vermiculis marinis ingens bellua. Parit vnicum, raro duo, ad pedes decem longum, poſt grauiditatem nouem vel decem menſium. Prolem mire amat mater. Capitur ob lardum ex vnica Balaena ad 70 - 90 dolia obtinendum, ex quo poſtea excoquunt oleum; nec non ob laminas oris corneas. Caro ſicca, in cauda ſucculentior, molliorque, edulis, ſapore tamen non valde grato.

Eiusdem ſpeciei forte eſt, ſaltem affinis, nec rite determinata:

Une autre eſpece qu'on appelle Nord-kapper *Egede Groenl. p.* 53.

Balaena glacialis *Klein. miſſ. piſc. II p.* 12.

Der Nordcaper *Anderſ. Isl. p.* 219.

La Baleine d'Islande: Balaena (islandica) bipinnis, ex nigro candicans, dorſo laeui *Briſſ. regn. an. p.* 350 *n.* 2.

Noord-Kaaper *Houtt. nat. hiſt. III p.* 489.

Der Nord-Caper *Cranz Groenl. p.* 145.

Der Nordkaper *Müll. Naturſ. I p.* 494.

Balaena

Balaena (glacialis) *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 49.*
Nordkaper *Germanis.*
Sild-Qual, Lille-Hval, Nordkaper *Norvegis.*

Paullo gracilior minorque Mysticeto, capite laminisque corneis minoribus. Ex nigro candicans.

Habitat in borealibus. Victitat Medusis et Clupeis.

Physalus. 2. B. fistula duplici in medio capite, dorso extremo pinna adiposa.
Physeter *Plin. hist. nat. IX c. 4 (c. 3 Hard.). XXXII c. 11 (c. 53 Hard.).*
Physeter *Rondel. pisc. p. 485 cum fig.* mala.
Physalus bellua seu Physeter *Gesn. aquat. p. 851 cum fig.* Rondel.
Physeter *Aldrov. pisc. p. 689 cum fig.* Rondel.
Physeter qui et Physalus *Ionst. pisc. p. 217.*
Finnfisch *Mart. Spitzb. p. 125 tab. Q. fig. c* bona.
Physeter et Physalus *Charlet. exerc. pisc. p. 47.*
Physeter, the Spouting-Whale *Sibb. Scot. an. p. 23.*
Physeter Rondeletii *Willughb. pisc. p. 41.*
Balaena edentula corpore strictiore, dorso pinnato *Rai. syn. pisc. p. 9.*
Finne-Fiske *Egede Groenl. p. 48 cum fig.*
Balaena fistula in medio capite, tubere pinniformi in extremo dorso *Art. gen. p. 77 n. 2 synon. p. 107 n. 2.*
Balaena edentula, corpore strictiore, dorso pinnanto *Klein. miss. pisc. II p. 13.*
Balaena fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso *Linn. fn. suec. 1 p. 99 n. 265.*
Der Finnfisch *Anders. Isl. p. 219.*
Balaena fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso *Linn. syst. nat. 6 p. 39 n. 2.*

Balaena fistula in medio capite, tubero pinniformi in extremo dorso. The Balaena, with the fistula in the middle of the head, and a pinniform tuberosity on the back: the Physeter *Hill anim. p.* 313.

Le Gibbar: Balaena tripinnis, ventre laeui *Briss. regn. an. p.* 352 *n.* 5.

Balaena (Physalus) naribus in medio capite, dorso extremo pinna adiposa *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 75 *n.* 2.

Vinvisch: Walvisch met Blaasgaaten midden op den Kop, aan 't end van de Rug een Vet in *Houtt. nat. hist. III p.* 477.

Balaena (Physalus) naribus in medio capite, dorso extremo pinna adiposa *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 17 *n.* 50.

Der Finnfisch *Cranz. Groenl. p.* 145.

Balaena (Physalus) fistula duplici in medio capite, dorso extremo pinna adiposa *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 106 *n.* 2.

Finnfisch *Müll. Naturs. I p.* 491.

Balaena (Physalus) fistula duplici in medio capite; dorso extremo pinna adiposa *Müll. Dan. prodr. p.* 7 *n.* 46.

Finnfisch *Germanis.*

Vinvisch *Belgis.*

Fin-fish *Anglis.*

Rör-Hval, Finne-Fisk, Tue-Qual, Stor-Hval *Norvegis*

Finn-fisk *Suecis.*

Reider *Lapponibus.*

Hunfubakr *Islandis.*

Tunnulik, Kepokak, Kepokarsoak *Groenlandis.*

Longitudo Mysticeti, at corpore triplo quadruploue graciliore. Oris rictus amplior. Dorsum pinna recta acuta, tres aut quatuor pedes longa, prope caudam. Laminae corneae breuiores ac in Mysti-

ceto,

ceto, colore caeruleo. Corpus nitidum fuscum, subtus album.

Habitat in Oceano europaeo, americano. Vescitur Clupeis, Scombris. Aquam maiori vi eiicit ex spiraculis ac Mysticetus. Minus pinguis hoc est. Caro esculenta, sapore fere Sturionis.

Dentes acutos huic tribuit Rondeletius, ideoque ex Delphini genere esse putat Brissonius, vocatque distincto a Physalo nomine:

Le Souffleur: Delphinus (Physeter) pinna in dorso nulla *Briss. regn. an. p.* 374 n. 5.
Souffleur *Dictionn. anim. IV p.* 224.
De Blaazer *Houtt. nat. hist. III p.* 552.
Der Blaser, Souffleur *Müll. Naturs. I p.* 508.

Huc quoque forsitan pertinet:
Balaena gibbo vnico prope caudam *Klein. miss. pisc. II p.* 12.
Der Pflockfisch *Anders. Isl. p.* 224.
La Baleine de la nouvelle Angleterre: Balaena (nouae Angliae) bipinnis, vnico in dorso gibbo *Briss. regn. an. p.* 351 *n.* 3.
Nieuw Engelandsche Fenvisch *Houtt. nat. hist. III p.* 488.
Der Pflockfisch *Cranz Groenl. p.* 146.
Der Pflockfisch *Müll. Naturs. I p.* 493.
Pflockfisch *Germanis.*
Penvisch *Belgis.*
Bunch, Humback - Whale *Anglis.*

Dorsum caudam versus gibbere capite humano maiore.

Habitat circa nouam Angliam.

Boops.

Boops. 3. B. fiſtula duplici in roſtro, dorſo extremo protuberantia cornea.

Balaena tripinnis, nares habens, cum roſtro acuto et plicis in ventre Sibb. *Rai. ſyn. piſc. p.* 16.

Balaena fiſtula duplici in roſtro, protuberantia corniformi in extremo dorſo *Art. gen. p.* 77 *n.* 3. *ſynon. p.* 107 *n.* 3.

Iubartes *Klein. miſſ. piſc. II p.* 13.

Balaena, Tigridis inſtar, variegata *Klein. miſſ. piſc. II p.* 16?

Der Iupiterfiſch *Anderſ. Iſl. p.* 220.

Balaena fiſtula duplici in roſtro, protuberantia corniformi in extremo dorſo. The Balaena, with a double fiſtule in the roſtrum, and a corniform protuberance on the back *Hill anim. p.* 313.

La Baleine à muſeau pointu: Balaena tripinnis, ventre rugoſo, roſtro acuto *Briſſ. regn. an. p.* 355 *n.* 7.

Balaena (Boops) fiſtula duplici in roſtro, dorſo extremo protuberantia cornea *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 76 *n.* 3.

Oſſen-Oog: Walviſch met eenn dubbele Buis in de Snoet, een Hoornagtige uitpuiling op het uiterſte van de Rug *Houtt. nat. hiſt. III p.* 485.

Der Iupiter-Fiſch, beſſer Gubartas oder Gibbar *Cranz Groenl. p.* 146.

Balaena (Boops) fiſtula duplici in roſtro, dorſo extremo protuberantia cornea *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 106 *n.* 3.

Schnabelfiſch *Müll. Naturſ. I p.* 492.

Balaena (Boops) fiſtula duplici in roſtro, dorſo extremo protuberantia cornea *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Hrafu-Reydus *Islandis.*

Keporkak *Groenlandis.*

Longitudo corporis 46 pedum, ambitus circa pinnas pectorales, vbi craſſiſſimum, 20 ped. Caput oblon-

oblongum, roſtro ſubacuto. Lingua quinque pedes longa, figura bouillae. Oculi bouillorum magnitudine, prope angulos oris ſiti. Cutis laeviſſima, nigra, in ventre alba. Dorſum pollice protuberantia cornea. Abdomen rugis longitudinalibus.

Habitat in Oceano ſeptentrionali.

Muſculus. 4. B. fiſtula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore.

Balaena *Bellon. aquat. p.* 4.

Φαλενα, Balena, Baleine, Italis Capidolio *Bellon. aquat. p. 6 fig.* mediocr.

Balena Bellonii *Aldrov. piſc. p.* 676 *fig.* Bellon.

Balaena tripinnis, maxillam inferiorem rotundam et ſuperiore multo latiorem habens Sibb. *Rai. ſyn. piſc. p.* 17.

Balaena fiſtula duplici in fronte maxilla inferiore multo latiore *Art. gen. p.* 78 *n.* 4 *ſynon. p.* 107 *n.* 4.

Balaena fiſtula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 3.

Balaena fiſtula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore. The Balaena, with a double fiſtule in the forehead, and with the lower jaw broadeſt *Hill anim. p.* 314.

La Baleine à muſeau rond: Balaena tripinnis, ventre rugoſo, roſtro rotundo *Briſſ. regn. an. p.* 353 *n.* 6.

Balaena (Muſculus) fiſtula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 76 *n.* 4.

Breedſmoel: Walviſch met een dubbele Buis in 't Voorhoofd, de Onderkaak veel breeder *Houtt. nat. hiſt. III p.* 487.

Balaena (Musculus) fistula duplici in fronte, maxilla inferiore multo latiore *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 106 *n.* 4.

Breitmaul *Müll. Naturs. I p.* 492.

Balaena (Musculus) fistula duplici in fronte; maxilla inferiore multo latiore *Müll. Dan. prodr. p.* 7 *n.* 47.

Der Knotenfisch *Müll. Naturs. Suppl. p.* 60.

Longitudo corporis 78 pedum, ambitus vltra 35 ped. Maxilla inferior amplior et figurae semicircularis; superior angustior, apice acuto. Rictus ingens. Laminae corneae, nigrae, breues, longissimae trium pedum. Fistula figurae pyramidalis et septo diuisa, versus frontem. Abdomen rugis plurimis. Dorsum pinna adiposa. Corpus supra nigrum, ventre albo.

Habitat in mari scotico. Vescitur Clupeis.

gibbosa. 5. B. gibbis dorsalibus sex.

Balaena Gibbis vel Nodis sex. Balaena macra. *Klein. miss. pisc. II p.* 13.

Der Knotenfisch oder Knobbelfisch *Anders. Isl. p.* 225.

La Baleine à six bosses: Balaena bipinnis, sex in dorso gibbis *Briss. regn. an. p.* 351 *n.* 4.

Knobbel-Visch *Houtt. nat. hist. III p.* 488.

Der Knotenfisch *Cranz Groenl. p.* 146.

Der Knotenfisch *Müll. Naturs. I p.* 493.

Knotenfisch *Germanis.*

Knobbelvisch, Knabbelvisch *Belgis.*

Scrag-Whale *Anglis.*

Figura

Figura Myfticeti, at gibbi in dorfo fex, laminaeque corneae albae. Species fubobfcura.

Species obfcura.

* Balaena ore roftrato. Balaena tripinnis, edentula, minor, roftro paruo *Klein. miff. pifc. II p.* 13.
Balaena (roftrata) minima roftro longiffimo et acutiffimo *Müll. Dan. prodr. p.* 7. *n.* 48.
Nebbe-Hval, Butskopf *Noruegis.*
Anderne-Fia, Fær-Dögling, Sandæta *Islandis.*

49. PHYSETER.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae pectorales*; pofticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque vnguibus.
Dentes in maxilla inferiore, non in fuperiore.
Fiftula refpiratoria in capite f. fronte.

Catodon. 1. P. dorfo impinni, fiftula in roftro.
Balaena minor, in inferiore maxilla tantum dentata, fine pinna aut fpina in dorfo Sibb. *Rai. fyn. pifc. p.* 15.
Catodon fiftula in roftro *Art. gen. p.* 78 *n.* 1. *fynon. p.* 108 *n.* 1.
Catodon fiftula in roftro *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 1.
Le petit Cachalot: Cetus (minor) bipinnis, fiftula in roftro *Briff. regn. an. p.* 361 *n.* 4.
Phyfeter (Catodon) dorfo impenni, fiftula in roftro *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 76 *n.* 1.
Kazilot zonder Vin op de Rug, met een Buis in de Snoet *Houtt. nat. hift. III p.* 503.

Physeter (Catodon) dorso impinni, fistula in rostro *Linn. syst. nat. 12, I p. 107 n. 1.*
Der Weissfisch *Müll. Naturs. I p. 495.*
Physeter (Catodon) dorso impinni, fistula in rostro *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 51.*
Svine-Hval, Kaskelot, Pot-Fisk *Norwegis.*
Kigutilik *Groenlandis.*

Longitudo circiter 24 pedum. Caput rotundum. Rictus paruus. Fistula nasiformis in rostro.

Habitat in Oceano septentrionali.

Balaenam albicantem Kleinii, Weissfisch Martensii et Zorgdrageri hunc censet O. Fabricius (*Müll. Dan. prodr. p. VIII*). Istam tamen inter edentulas ponit ipse Kleinius, vir doctissimus Ott. Frid. Müller autem ad Balaenae genus refert eique est:

Balaena albicans *Müll. Dan. prodr. p. 7 n. 50.*
Hvitfisk-Reydur, Hrefna, Hvitingar *Islandis.*
Killeluak *Groenlandis.*

vide species obscuras huius generis.

macrocephalus. 2. P. dorso impinni, fistula in ceruice.
Aliud Cete admirabile *Clus. exot. p. 131 cum fig.* mediocri.
Balaena *Ionst. pisc. p. 215 tab. 41 fig. duae superiores et tab. 42* figurae bonae.
Cetus dentatus *Mus. Worm. p. 280.*
Cetus dentatus *Charlet. exerc. pisc. p. 47.*
Cetus dentatus Clusii *Sibb. Scot. an. p. 23.*
Cete Clusio — descriptum Pot-Walfisch Batauis maris accolis dictum *Willughb. pisc. p. 41.*

Balaena

Balaena *Willughb. pisc. tab. A* 1 *fig.* 3 bona.
Cete Pot Walfisch Batauis maris accolis dictum *Rai. syn. pisc. p.* 11.
Balaena maior, in inferiore tantum maxilla dentata macrocephala, bipinnis Sibb. *Rai. syn. pisc. p.* 15.
Le Cachelotet, ou Pot-fiske *Egede Groenl. p.* 54.
Catodon fistula in ceruice *Art. gen. p.* 79 *n.* 2 *synon. p.* 108 *n.* 2.
Catodon Cete Clus. *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 59.
Cete Clusii *Klein. miss. pisc. II p.* 14.
Cachelot s. Potfish Zorgdrageri *Klein. miss. pisc. II p.* 14.
Catodon fistula in ceruice *Linn. fn. suec.* 1 *p.* 98 *n.* 262.
Die Cachelotte *Anders. Isl. p.* 232.
Catodon fistula in ceruice *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 2.
Le Cachalot: Cetus (. . . .) bipinnis, supra niger, infra albicans, fistula in ceruice *Briss. regn. an. p.* 357 *n.* 1.
Catodon fistula in nucha, dorso topho instructo: the Sperma-ceti Whale *Brown. Jam. p.* 459.
Physeter (macrocephalus) dorso impenni, fistula in ceruice *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 76 *n.* 2.
Potvisch: Kasilot zonder Vin op de Rug, met een Buis in de Nek *Houtt. nat. hist. III p.* 505.
Catodon (macrocephalus) dorso impenni, fistula in ceruice *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 18 *n.* 53.
Der Caschelot oder Pottfisch *Cranz Groenl. p.* 148.
Physeter (macrocephalus) dorso impinni, fistula in ceruice *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 107 *n.* 2.
Der Potfisch *Müll. Naturs. I p.* 498.
Physeter (macrocephalus) dorso impinni; fistula in ceruice *Müll. Dan. prodr. p.* 7 *n.* 52.
Trold-Hval, Huus-Hval, Sue-Hval, Buur-Hval, Bardhualr *Norvegis.*

Corpus ad 60 pedes longum et vltra, ambitu 36 ped. Caput crassissimum, maxilla inferiore minore cum dentibus 46 ad duo vel tres pollices exsertis ex gingiua duplici ordine; superior maxilla totidem alueolos habet pro excipiendis dentibus maxillae inferioris. Fistula in ceruice. Dorsum nigrum absque pinna. Venter albus.

Habitat in Oceano europaeo.

Sperma ceti ex huius ventriculis cerebri.

microps. 3. P. dorso pinna longa, maxilla superiore longiore.

Balaena maior, in inferiore tantum maxilla dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens Sibb. *Rai. syn. pisc. p.* 15.

Physeter maxilla superiore longiore, pinna longa in dorso *Art. gen. p.* 74 *n.* 1. *synon. p.* 104 *n.* 1.

Balaena maior, in inferiore tantum mandibula dentata, dentibus arcuatis falciformibus, pinnam seu spinam in dorso habens *Klein. miss. pisc. II p.* 15.

Dritte Species der Cachelotte *Anders. Isl. p.* 248 *cum fig.*

Physeter maxilla superiore longiore, spina longa in dorso *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 1.

Physeter maxilla superiore longiore, spina longa in dorso: The Physeter, with the upper jaw longest, and with a long spine on the back: the crooked-toothed Whale *Hill anim. p.* 310.

Le Cachalot à dents en faucilles: Cetus tripinnis, dentibus acutis, arcuatis, falciformibus *Briss. regn. an. p.* 363 *n.* 6.

Physeter (microps) dorso spina longa, maxilla superiore longiore *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 76 *n.* 3.

Klein-

Klein-Oog: Kazilot met een lange Graat op de Rug, de Bovenkaak langer *Houtt. nat. hist. III p.* 530.

Physeter (microps) dorso pinna longa, maxilla superiore longiore *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 107 *n.* 3.

Kleinauge *Müll. Naturs. I p.* 501.

Physeter (microps) dorso pinna longa, maxilla superiore longiore *Müll. Dan. prodr. p.* 7 *n.* 53.

Staur-Hyning, Kobbe-Herre *Norwegis.*

Tikagulik *Groenlandis.*

Longitudo corporis ad 70 pedes. Caput maximum. Maxilla inferior paullo breuior superiore dentibus 42 rotundis, parumper compressis, arcuatis, falciformibus, medio crassioribus. In maxilla superiore totidem alueoli pro recipiendis istis dentibus. Oculi perexigui. Fistula parum sub rostri medio. Pinna dorsalis sat longa acuminata s. spina pinnae loco. Cutis laeuissima ex fusco nigricans.

Habitat in Oceano septentrionali. Exagitat saepe Phocaenas vsque in ipsam terram.

Tursio. 4 P. dorsi pinna altissima, apice dentium plano.

Balaena macrocephala tripinnis. Quae in mandibula inferiore dentes habet minus inflexos et in planum desinentes Sibb *Rai. syn. pisc. p.* 16.

Physeter pinna dorsi altissima, apice dentium plano *Art. gen. p.* 74 *n.* 2. *synon. p.* 104 *n.* 2.

Mular Nierembergii *Klein. miss. pisc. II p.* 15.

Physeter pinna dorsi altissima, apice dentium plano *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 2.

Physeter pinna dorsi altissima, apice dentium plano. The Physeter, with the back fin very tall, and the summit of the teeth plane: the plane-toothed Whale *Hill anim. p.* 310.

Le Cachalot à dents plattes: Cetus tripinnis, dentibus in planum desinentibus *Briss. regn. an. p.* 364 *n.* 7.

Physeter pinna dorsi altissima, apice dentium plano: the Grampus *Brown. Iam. p.* 459.

Physeter (Tursio) dorsi pinna altissima, apice dentium plano *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 77 *n.* 4.

Mastvisch: Kazilot met een zeer hoog uitstekende Vin op de Rug, de Tanden van boven plat *Houtt. nat. hist. III p.* 536.

Physeter (Tursio) dorsi pinna altissima, apice dentium plano *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 107 *n.* 4.

Der Mastfisch *Müll. Naturs. I p.* 503.

Physeter (Tursio) dorsi pinna altissima, apice dentium plano *Müll. Dan. prodr. p. VIII.*

Mastvisch *Belgis.*

Pernak *Groenlandis.*

Ad centum pedes longum dicunt, et vltra. Praecedenti similis, at dentes minus inflexi, apiceque plani. Fistula in fronte. Pinna dorsi longissima, erecta, acuta, quasi nauis malus.

Habitat in Oceano septentrionali.

Species obscurae.

* Weissfische *Mart. Spitzb. p.* 94.

Albus piscis cetaceus *Rai. syn. pisc. p.* 11.

Le Poisson blanc, Hviid-fiske *Egede Groenl. p.* 55 *cum fig.*

Balaena albicans; Weisfish Martensii et Zorgdr. *Klein. miss. pisc. II p.* 12. (Edentulam dicit.)

Der Wittfisch oder Weissfisch *Anders. Isl. p.* 251.

Le Cachalot blanc: Cetus (albicans) bipinnis, ex albo flauescens, fistula in ceruice, dorso leui *Briss. p.* 359 *n.* 2.

Wit-

Witvisch *Houtt. nat. hist. III p.* 503.
Der Weisfisch *Cranz Groenl. p.* 150. (Supra et infra dentatum dicit.)

Longitudo corporis 15-16 pedum. Figura Mysticeti, nisi quod caput acutius sit. Dentes parumper incurui, compressi, apice rotundati (aliis vera Balaena est). Eminentia et fistula in ceruice. Pinna dorsalis nulla. Cutis ex albo flauescit.

Habitat in freto Dauis.

** Dudleji Balaena *Klein. miss. pisc. II p.* 15.
Le Cachalot de la nouvelle Angleterre: Cetus (nouae Angliae) bipinnis, fistula in ceruice, dorso gibboso *Briss. regn. an. p.* 360 *n.* 3.
Nieuw Engelandsche Kazilot *Houtt. nat. hist. III p.* 526.

Longitudo corporis 60-70 ped. crassities 30-40 pedum. Caput praegrande. Maxilla inferior multo angustior superiore, dentibus plurimis; superior totidem alueolis. Oculi exigui. Fistula in ceruice. Pinnae dorsalis loco gibbus pedem crassum. Cutis mollissima ex cinereo nigricans.

Habitat circa nouam Angliam.

*** Zweyte Species der Cachelotte *Anders. Isl. p.* 246.
Le Cachalot à dents pointuës: Cetus tripinnis, dentibus acutis rectis *Briss. regn. an. p.* 362 *n.* 5.

Longitudo 80-100 pedum. Caput maximum, mediam fere corporis longitudinem attingens. Maxilla inferior superiore multo minor, dentibus crassis, rectis, apice acutis, quasi serrae. Superior totidem alueolos habet. Oculi exigui, splendentes, flauicantes. Lingua parua, acuta. Gibbus altissimum in parte superiore dorsi, et pinna dorsalis versus caudam. Cutis laeuissima, in dorso nigricans, in ventre albicans.

Habitat . . . . .

50. DELPHINVS.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae pectorales*; posticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque vnguibus.
Dentes in maxilla vtraque.
Fistula respiratoria in capite.

Phocaena. 1. D. corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso.

Tursio *Plin. hist. nat. IX c. 9 (c. 11 Hard.).*
Tursio *Bellon. aquat. p.* 15.
Φοκαινα, Tursio, Marsouin *Bellon. aquat. p. 16 fig.* mediocris.
Phocaena *Rondel. pisc. p.* 473.
Tursio *Rondel. pisc. p.* 474 *cum fig.*
Phocaena seu Tursio *Gesn. aquat. p.* 837 *cum fig.*
Tursio seu Phocaena *Schonev. ichth. p.* 77.
Phocaena siue Tursio *Aldrov. pisc. p. 719 fig. p.* 720.
Phocaena *Ionst. pisc. p.* 221.

Phocae-

Phocaena Meer Schwein. Braunfifch *Ionft. pifc. tab.* 41.

Meerfchwein oder Tunin *Mart. Spitzb. p.* 92.

Phocaena *Charlet. exerc. pifc. p.* 48.

Phocaena, the Porpus or Porpoife *Sibb. Scot. an. p.* 23.

Phocaena Rondeletii *Willughb. pifc. p.* 31 *tab. A* 1 *fig.* 2.

Phocaena Rondeletii *Rai. fyn. pifc. p.* 13.

Phocaena Rondeletii et Gefneri *Rzacz. Polon. auct. p.* 245.

Le Nifer ou le Marfouin *Egede Groenl. p.* 60.

Delphinus corpore fere coniformi, dorfo lato, roftro fubacuto *Art. gen. p.* 75 *n.* 1. *fynon. p.* 104 *n.* 1.

Delphinus Phocaena *Linn. fyft. nat.* 2 *p.* 59.

Anatome Phocaenae *De la Motte: Klein. miff. pifc. I p.* 24.

Turfio fiue Phocaena *Klein. miff. pifc. II p.* 26 *tab.* 3 *fig. B* bona; *tab.* 2 *fig. A, B* foetus.

Marfouin *Charlev. nouv. Fr. III p.* 147.

Meerfchweine *Linn. Gothl. p.* 198.

Delphinus corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubacuto *Linn. fn. fuec.* 1 *p.* 99 *n.* 266.

Das Meerfchwein oder Tunin *Anderf. Isl. p.* 253.

Delphinus corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubacuto *Linn. fyft. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 1.

Delphine *Linn. Schon. p.* 147.

Dephinus corpore fere coniformi, dorfo lato, roftro fubacuto. The Delphinus, with a coniform body, a broad back, and a fubacute roftrum: the Porpefs *Hill anim. p.* 311.

Le Marfouin: Delphinus (Phocaena) pinna in dorfo vna, dentibus acutis, roftro breui, obtufo *Briff. regn. an. p.* 371 *n.* 2.

Delphinus (Phocaena) corpore fubconiformi, dorfo lato, roftro fubobtufo *Linn. fyft. nat.* 10, *I p.* 77 *n.* 1.

Mar-

Marsouin *Dictionn. anim. III p.* 33.

Bruinvisch: Dolphyn met het Lyf omtrent Kegelvormig, een breede Rug, de Snoet eenigermaate stomp *Houtt. nat. hist. III p.* 540.

Delphinus (Phocaena) corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 17 *n.* 51.

Delphin oder Nisen *Gunnerus: Act. nidros. II p.* 237 *tab.* 4.

Delphinus Phocaena. Tumleren *Pontopp. Dan. I p.* 646.

Das Meerschwein *Cranz Groenl. p.* 151.

Delphinus (Phocaena) corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 108 *n.* 1.

Der Braunfisch *Müll. Naturs. I p.* 504.

Delphinus (Phocaena) corpore subconiformi, dorso lato, rostro subobtuso *Müll. Dan. prodr. p.* 7 *n.* 54.

Marsopa *Hispanis.*

Marsouin *Gallis.*

Meerschwein, Braunfisch *Germanis.*

Bruinvisch *Belgis.*

Porpus, Porpes, Porpesse, Porpoisse *Anglis.*

Marswin, Tumler *Danis.*

Nise *Noruegis.*

Marswin, Tumblare *Suecis.*

Swinia morska *Polonis.*

Морская свинья (Morskaja Swin'ja) *Russis.*

Nisa *Groenlandis.*

Longitudo corporis 5 ad 8 ped. Corpus supra nigro-caerulescens, subtus album. Caput obtusiusculum. Oculi perexigui. Foraminulum auditorium pone oculos. Spiraculum lunatum, sinu antrorsum verso, inter oculos. Dentes vtrinque 46 parui, acuti.

acuti. Foramen penis lineare pone vmbilicum, ſiue ſub pinna dorſali. Foramen ani medio loco inter penem et caudam pinnatam, parum biſurcam.

Habitat in Oceano europaeo et mari balthico.

Delphis. 2. D. corpore oblongo ſubtereti, roſtro attenuato acuto.

Δελφις *Ariſt. hiſt. anim I c. 5 n. 39. II c. 9 n. 44. III c. 1 n. 7. c. 7 n. 103. c. 16 n. 237. IV c. 9 n. 271. c. 10. n. 308, 309. IX c. 74 n. 498-503.*

Delphinus *Plin. hiſt. nat. IX c. 7, 8 (c. 6-10 Hard.). XI c. 37 (c. 50 Hard.).*

Δελφιν *Aelian. anim. I c. 18. II c. 6. V c. 6. VIII c. 3. X c. 8. XI c. 12, 22. XII c. 6, 45.*

Delphinus *Bellon. aquat. p. 7 figg. p. 9, 10.*

Delphinus *Rondel. piſc. p. 459 cum fig.*

Delphinus *Geſn. aquat. p. 380 fig. p. 381* Rondel.

Delphinus *Aldrov. piſc. p. 701.*

Delphinus prior *Aldrov. piſc. p. 703 fig.*

Delphinus alter *Aldrov. piſc. p. 704 fig.*

Delphinus *Ionſt. piſc. p. 218.*

Delphinus prior. Delphin *Ionſt. piſc. tab. 34 fig.* Aldrou.

Delphinus alter. Delphin *Ionſt. piſc. tab. 43 fig.* Aldrou.

Delphinus faemina. Delphin Weiblein *Ionſt. piſc. tab. 43* fig. Rondel.

Delphinus alius. Ein ander art Delphin *Ionſt. piſc. tab. 43* fig. mala.

Delphinus *Muſ. Worm. p. 288.*

Delphinus *Charlet. exerc. piſc. p. 47.*

Porcus Marinus *Sibb. Scot. an. p. 23.*

Delphinus *Willughb. piſc. p. 28 tab. A 1 fig. 1.*

Del-

Delphinus Antiquorum *Rai. ſyn. piſc. p.* 12.

Delphinus *Rzacz. Polon. auct. p.* 238.

Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto *Art. gen. p.* 76 *n.* 2. *ſynon. p.* 105 *n.* 2.

Delphinus *Linn. ſyſt. nat.* 2 *p.* 59.

Delphinus *Klein. miſſ. piſc. II p.* 24 *tab.* 3 *fig. A.*

Der Delphin *Anderſ. Isl. p.* 254.

Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 2.

Delphinus corpore oblongo ſubtereti, roſtro longo acuto. The Delphinus, with an oblong, ſubcylindric body, and a long, acute roſtrum: the Dolphyn *Hill anim. p.* 311.

Le Dauphin: Delphinus (. . . .) pinna in dorſo vna, dentibus acutis, roſtro longo, acuto *Briſſ. regn. an. p.* 369 *n.* 1.

Delphinus corpore ſubtereti oblongo, roſtro producto acuto: the Porpeſs *Brown. Jam. p.* 459.

Delphinus (Delphis) corpore oblongo ſubtereti, roſtro attenuato acuto *Linn. ſyſt. nat.* 10, *I p.* 77 *n.* 2.

Dolphyn: Dolphyn met het Lighaam langwerpig omtrent rolrond, den Snoet dun en ſcherp *Houtt. nat. hiſt. III p.* 543.

Delphinus Delphis. Marſvin *Pontopp. Dan. I p.* 646.

Der Delphin *Cranz Groenl. p.* 152.

Delphinus (Delphis) corpore oblongo ſubtereti, roſtro attenuato acuto *Linn. ſyſt. nat.* 12, *I p.* 108 *n.* 2.

Der Tummler *Müll. Naturſ. I p.* 505.

Delphinus (Delphis) corpore oblongo ſubtereti; roſtro attenuato acuto *Müll. Dan. prodr. p.* 7 *n.* 55.

Delfino *Italis.*

Dauphin *Gallis.*

Delphin, Meerſchwein, Tummler *Germanis.*

Dol-

Dolphyn *Belgis.*
Dolphin, Grampus, Porpeſſe *Anglis.*
Marſvin *Danis.*
Springer *Noruegis.*
Huyſen, Höſrung, Leipter *Islandis.*
Delfin *Polonis.*

Maior praecedente, minor ſequente: longitudo corporis 9-10 pedum, craſſitiei diameter 2 ped. Corpus minus craſſum quam in Phocaena. Roſtrum longius et acutius, ſupra cinctum faſcia lata transverſa. Dentes ſubulati. Oris ſciſſura magna ad thoracem vsque. Cutis ſupra nigra, ſubtus alba. Genitalia medio inter vmbilicum et anum. Renes conglomerati.

Habitat in Oceano europaeo, adhaerens ſaepius Balaenis vt exſiliant.

Orca. 3. D. roſtro ſurſum repando, dentibus latis ſerratis.

Orca *Plin. hiſt. nat. IX c. 6 (c. 5 Hard.). XXXII c. 11 (c. 53 Hard.).*
Orca *Bellon. aquat. p. 16 fig. p. 18.*
Orca *Rondel. piſc. p. 483 cum fig.*
Orca *Geſn. aquat. p. 748 cum fig.* Rondel.
Orca *Schonev. ichth. p. 53.*
Orca *Aldrov. piſc. p. 697 fig. p. 698.*
Orca *Ionſt. piſc. p. 217.*
Wagnhyalur vel Hualhund *Muſ. Worm. p. 279.*
Butskopf *Mart. Spitzb. p. 93.*
Orca *Charlet. exerc. piſc. p. 47.*
Orca Rondeletii et Bellonii *Willughb. piſc. p. 40.*
Orca Rondel. et Bellon. *Rai. ſyn. piſc. p. 10.*

Balaena

Balaena minor vtraque maxilla dentata Sibb. *Rai. syn. pisc. p.* 15.

Le Buts-Kopper *Egede Groenl. p.* 56.

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Art. gen. p.* 76 *n.* 3. *synon. p.* 106 *n.* 3.

Orca *Linn. syst. nat.* 2 *p.* 59.

Orca *Klein. miss. pisc.* II *p.* 22 *tab.* I *fig.* I cranii.

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. fn. suec.* I. *p.* 100 *n.* 267.

Der Butzkopf *Anders. Isl. p.* 252.

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. syst. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 3.

Delphinus rostro sursum repando, dentibus latis serratis. The Delphinus, with the rostrum repandous upwards, and with serrated teeth: the Grampus *Hill anim. p.* 512.

L'Epaulard: Delphinus (Orca) pinna in dorso vna, dentibus obtusis *Briss. regn. an. p.* 373 *n.* 4.

Balaena fistula in medio vertice, rostro obtusiori sursum repando: the Bottle-nose *Brown. Iam. p.* 459?

Delphinus (Orca) rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. syst. nat.* 10, *I p.* 77 *n.* 3.

Orca *Dictionn. anim. III p.* 279.

Botskop: Dolphyn met een opgewipten Snoet, de Tanden breed en Zaagswyze *Houtt. nat. hist.* III *p.* 547.

Delphinus (Orca) rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. fn. suec.* 2 *p.* 17 *n.* 52.

Delphinus Orca *Pontopp. Dan. I p.* 646.

Der Butzkopf *Cranz Groenl. p.* 151.

Delphinus (Orca) rostro sursum repando, dentibus latis serratis *Linn. syst. nat.* 12, *I p.* 108 *n.* 3.

Der Butzkopf *Müll. Natursf. I p.* 506.

Orca auf russisch Kosatky genannt *Stell. Kamtsch. p.* 104.

Del-

Delphinus (Orca) roſtro ſurſum repando; dentibus latis ſerratis *Müll. Dan. prodr. p. 8 n. 56.*

Botskop *Belgis.*

Grampus *Anglis.*

North-Caper *Scotis.*

Öre-Svin, Tandthöye *Danis.*

Spek-Hugger, Hval-Hund, Springer *Noruegis.*

Tandtheye, Springer *Hilgelandis.*

Huyding *Islandis.*

Löpare *Suecis.*

Koſatky *Ruſſis.*

Neque differre videtur:

Noch ein ander Art groſſe Fiſche *Mart. Spitzb. p. 94.*

Der Schwerdtfiſch *Anderſ. Isl. p. 255.*

L'Epée de mer: Delphinus pinna in dorſo vna gladii recurui aemula, dentibus acutis, roſtro quaſi truncato *Briſſ. regn. an. p. 372 n. 3.*

Zabel-Viſch *Houtt. nat. hiſt. III p. 550.*

De Walviſch dooder *Houtt nat. hiſt. III p. 551.*

Der Schwerdtfiſch *Cranz Groenl. p. 152.*

Delphinus Orca *Linn. mant. II p. 523.*

Der Säbelfiſch *Müll. Naturſ. I p. 507.*

Der Mörder. Killer *Müll. Naturſ. I p. 507.*

Delphinus (Orca) dorſi pinna altiſſima; dentibus ſubconicis, parum incuruis *Müll. Dan. prodr. p. 8 n. 57.*

Der Buttkopf *Müll. Naturſ. Suppl. p. 61.*

Stöur-Vangen, Vand-Hund, Staal-Fönning, Wagn-Hualur *Noruegis.*

Fakan *Lapponibus.*

Haa-Hyrningur *Islandis.*

Arlo, Arlorſoit, Tikagulik *Groenlandis.*

Maximus huius generis: longitudine corporis 24-25 pedum, latitudine dimidia. Maxilla inferior multo maior ſuperiore. Roſtrum ſimum, ſurſum repandum. Dentes obtuſi 40. Oculi parui. Spiraculum planum, biloculare. Pinna dorſalis eſt ſpina enſiformis, ſaepe ſexpedalis, cute veſtita, baſi latior. Corpus nigrum, ventre albo.

Habitat in Oceano norvegico, Freto Dauis. Occidit et vorat Balaenas et Pleuronectes maximas. Bellum gerit cum Phocis, quas ope gladii dorſalis e lapidibus detrudit; Balaenarum Phocarumque tyrannus, quas turmatim adgreditur.

51. MONODON.

Pedes nulli: anticorum loco *pinnae pectorales*; poſticorum loco *pinna caudalis* horizontalis, absque vnguibus.

Dentes duo in maxilla ſuperiore exſerti, praelongi, recti, ſpirales.

Fiſtula reſpiratoria in vertice.

Monoceros. 1. MONODON.

Decimum ſextum (genus) —— Nahwal *Schonev. ichth.* p. 28.

Vnicornu marinum *Muſ. Worm.* p. 282 *cum fig.* animalis mala; p. 283 *fig.* cranii.

Einhorn *Mart. Spitzb.* p. 94.

Monoceros, Vnicornu Marinum *Charlet. exerc. piſc.* p. 47.

Mono-

Monoceros piſcis, qui de genere Cetaceo eſſe fertur *Willughb. piſc. p. 42 append. p. 12.*

Piſcis Monoceros *Willughb. piſc. tab. A fig.* 2 mala animalis, bonae cranii ac dentis.

Monoceros piſcis e genere Cetaceo *Rai. ſyn. piſc. p.* 11.

Eenhiörning on le Narhval, Licorne *Egede Groenl. p.* 56 *cum fig.* mediocri.

Monodon *Art. gen. p.* 78 *n.* 1. *ſynon. p.* 108 *n.* 1.

Monodon Monoceros. Vnicornu *Linn. ſyſt. nat.* 2. *p.* 59.

Narwhal *Klein. miſſ. piſc. II p.* 18 *tab.* 2 *fig.* C bona.

Monodon *Linn. fn. ſuec.* 1 *p.* 98 *n.* 263.

Der Narhwal oder das Einhorn *Anderſ. Iſl. p.* 225 *cum fig.* mediocri.

Monodon Monoceros *Linn. ſyſt. nat.* 6 *p.* 39 *n.* 1.

Monodon. The Unicorn-fiſh, or Nar-Wal *Hill anim. p.* 313 *tab.* 16 fig. mala.

Monodon (Vnicornu) *Linn. muſ. Ad. Frid.* I *p.* 52.

Le Narhval: Ceratodon *Briſſ. regn. an. p.* 366 *n.* 1.

Monodon (Monoceros) *Linn. ſyſt. nat.* 10, I *p.* 75 *n.* 1.

Narhwal *Dictionn. anim.* III *p.* 217.

Eenhoorn-Viſch *Houtt. nat. hiſt.* III *p.* 423.

Monodon (Monoceros) *Linn. fn. ſuec.* 2 *p.* 16 *n.* 48.

Der Einhorn-Fiſch oder Narhval *Cranz Groenl. p.* 146.

Monodon (Monoceros) *Linn. ſyſt. nat.* 12, I *p.* 105 *n.* 1.

Der Narwal *Müll. Naturſ.* I *p.* 477.

Monodon (Monoceros) *Müll. Dan. prodr. p.* 6 *n.* 44.

Narhval, Lighval *Noruegis.*

Naahval *Islandis.*

Tauvar, Killelluak kernektok, tugalik *Groenlandis.*

Aglankook Eskimotis (ex relat. miss. Herrnhut. mscpta)

Longitudo corporis 20-22 pedum, latitudo 12 circiter: secundum alios 40-60 pedes longus est. Caput exiguum. In maxilla superiore dentes duo exserti, nouem vel decem pedes longi, recti, spiraliter torti, interdum laeues, labium superius perforantes, quorum saepissime alter deest. Oculi perexigui. Pinna dorsalis nulla, pectorales exiguae. Cutis alba, in dorso nigro maculata. Sub cute copiosum lardum habet.

Habitat in Oceano septentrionali Europae atque Americae. Velocissime natat, vt, quamuis saepius appareat, raro tamen capiatur.

ADDITA.

ADDITAMENTA.

pag. 14 *sub fine adde:*

Simia platypygos *Schreb. Säugth. I p.* 74 *tab.* 5 *B.*

Species huius generis noua, a celeb. Schrebero recenter descripta, olimque sub nomine Inui depicta, quam habuit a doctiss. Hermanno, prof. Argentor. Forte autem Papio est, aut Cercopithecus. Facies coloris carnei. Irides fuscae. Frons nigra prominens. Caput et dorsum pallide fusca subflauicantia. Collum pilis longioribus. Venter pectusque albicantia. Vngues pollicum plani, reliquorum digitorum angustiores. Nates late denudatae, coloris carnei. Càuda nuda, breuis, carnei coloris.

Habitat . . . . . . Submitis.

pag. 23 *lin.* 26.

Cebum lugubrem ex accuratiore examine cum Capucina contrahendum hodie credo.

pag. 73 *post lin.* 26 *adde:*

Maritacaca aliis Biaratacáca *Pis. Ind. p.* 324 *cum fig.*

pag. 76 *post lin.* 16 *adde:*

Maritacaca *Bom. dictionn. III p.* 32.

et post lin. 31:

Didelphys Marsupialis *Schreb. Säugth. III tab.* 144 fig. Sebae.

pag. 84 *post lin.* 30 *adde:*
Haút, beste qui vit de vent *Thevet cosmogr. II p* 941 *cum fig.* mala.

pag. 156 *post lin.* 27 *adde:*
Vrsus *Ol. Magn. sept. p.* 621.

pag. 157 *post lin.* 1 *adde:*
Vrsus *Scheff. Lappon. p.* 336.
et post lin. 31:
Bären *Müll. Samml. III p.* 550.

pag. 158 *post lin.* 16 *adde:*
Vrsus Arctos fuscus *Schreb. Säugth. III tab.* 139 fig Riding.
Vrsus Arctos niger *Schreb. Säugth. III tab.* 140 fig Riding.

pag. 161 *post lin.* 1 *adde:*
Vrsus maritimus *Schreb. Säugth. III tab.* 141 fig. propria.
et post lin. 23:
Taxus *Ol. Magn. sept. p.* 619.

pag. 163 *post lin.* 18 *adde:*
Vrsus Meles *Schreb. Säugth. III tab.* 142 fig. propria.

pag. 166 *post lin.* 32 *adde:*
Vrsus Lotor *Schreb. Säugth. III tab.* 143 fig. Buff.

pag. 172 *post lin.* 26 *adde:*
Erinaceus auritus *S. G. Gmelin: Nou. comment. petrop. XIV p.* 519 *tab.* 16.

Erina-

Erinaceus auritus *Pallas: Nou. comment. petrop. XIV p. 573 tab. 21 fig. 4.*

sub fine eiusdem paginae:

Erinaceus auritus Gmelini et Pallasii num diuersus?

Longitudo corporis 5-7 poll. caudae 5 lin. Aculei vt in europaeo, basi albi, medio obsolete nigri, apice ex flauo albi, versus basin incrassati. Corpus subtus pilosum. Oculi minuti, palpebris fuscis, iride pallide caerulea, pupilla nigra. Tempora castanea. Rostrum vt in europaeo. Nares oris dentatis reuolutis. Auriculae insignes, triangulae, obtusae, longissimae, pollicis vnius cum quatuor lineis. Dentes primores vtrinque duo reliquis longiores, cuneati. Laniarii vtrinque supra quinque: primo minimo, quinto paruo; infra tres antrorsum decumbentes. Molares vtrinque quatuor: primo maximo, vltimo minimo. Digiti 5-5. Vnguiculi rubicundi. Cauda ex albo sordide flaua, apice nigro.

Frequentissimus in regione Astrachanensi, europaeo plane exule. Mores europaei. Edit adeo Meloen vesicatoriam.

pag. 196 *post lin.* 3 *adde:*

Hippopotamus *Charlet. exerc. pisc. p.* 50.

pag. 228 *post lin.* 19 *adde:*

Vrus *Ol. Magn. sept. p.* 632.

pag. 305 *post lin.* 32 *adde:*

Rangifer *Ol. Magn. sept. p.* 595.

NOMINA HVNGARICA MAMMALIVM.

Simia.
Majom *(pronunt. Majom).*

Papio.
Pávián *(Paawiaan)*, Kutya majom *(Kutja majom).*

Cercopithecus.
Matska-majom *(Matschka majom).*

Talpa europaea.
Vakondok *(Wakondok).*

Sorex Araneus.
Patkány *(Patkaanj).*

Vespertilio.
Szárnyos egér *(Ssaarnjosch-egér)*, Denevér *(Denewér).*

Vrsus Arctos.
Medve *(Medwe).*

Vrsus Meles.
Borz *(Bors).*

Erinaceus europaeus.
Tövis Diszno *(Töwisch dissnoo).*

Sus Scrofa Aper.
Vad-kan *(Wad-kan)* (mas); Vad-disznó *(Wad-dissnoo)*, Vad-eme *(Wad-eme)* (femina).

Sus

Sus Scrofa mansues.
Kan (*Kan*), A'rtány (*Aartaanj*) (mas); Eme (*Eme*), Kotza (*Kotza*), Gönye (*Gonje*) (femina); Malatz (*Malatz*) (pullus).

Elephas maximus.
Eléfánt (*Eléfaant*).

Equus Caballus.
Mén-ló (*Mén-loo*), Tſödör (*Tſchödör*) (mas); Paripa (*Paripa*), Herélt-ló (*Herélt-loo*) (caſtratus); Kantza (*Kanza*) (femina); Tsikó (*Tſchikoo*), Vemhe (*Wembe*) (pullus).

Equus Aſinus.
Szamár (*Sſamaar*) (mas); Szamár-kantza (*Sſamaar-kanza*) (femina).

Mulus.
Öszvér (*Öſſwér*).

Camelus bactrianus.
Teve (*Tewe*).

Bos Taurus Vrus.
Belend (*Belénd*), Vad-Bika (*Wad-bika*).

Bos Taurus domeſticus.
Bika (*Bika*) (mas); Tehén (*Tehén*) (vacca); Borjú (*Borju*) (vitulus); Ökör (*Ökör*) (bos caſtratus).

Bos Bubalis.
Bivaly (*Biwaj*), Bial (*Bial*).

Ouis Aries.
Kos (*Koſch*) (*mas*); Örü (*Örü*), Berbéts (*Berbétſch*) (veruex); Iuh (*Iuh*) (femina); Bárány (*Baaraanj*) (agnus).

Ouis Strepsiceros.
Magyar-Iuh (*Madjar-juh*).

Capra Hircus.
Ketske-Bak (*Ketschke-Bak*) (mas); Ketske (*Ketschke*) (femina); Gödölye (*Güdöljé*), Allô (*Alloo*) (pullus).

Capra Ibex.
Vad-Kos (*Wad-koscb*).

Antilope Rupicapra.
Havasi-ketske (*Hawaschi-ketschke*).

Ceruus Alces.
Iávór (*Iaawor*).

Ceruus Elaphus.
Szarvas (*Ssarwascb*) (mas); Nöftény-Szarvas (*Nöschténj-ssarwascb*), Suta (*Schuta*) (femina); Szarvas-borjú (*Ssarwascb-borju*) (pullus).

Ceruus Dama.
Dámvad-bak (*Daamwad-bak*) (mas); Suta-dámvad (*Schuta-daamwad*) (femina).

Ceruus Capreolus.
Öz-bak (*Öhsbak*) (mas); Öz-nöstény (*Öhs-nöschténj*) (femina).

Lepus timidus.
Nyúl (*Njuhl*).

Lepus Cuniculus.
Tengeri-nyúl (*Tengeri-njuhl*).

Glis Marmota.
Havasi-hörtsök (*Hawaschi-hörtschök*).

Glis

Glis Cricetus.
Hörtsök (*Hörtschök*).

Mus Rattus.
Gözü (*Gösü*), Malom-egér (*Malom-egér*).

Mus amphibius.
Gáti-egér (*Gaati-egér*).

Mus silvaticus.
Erdei-egér (*Erdei-egér*), Mezei-egér (*Mesei-egér*).

Mus Musculus.
Egér (*Egér*).

Mus terrestris.
Ürge (*Ürge*).

Sciurus vulgaris.
Mókus (*Mookusch*), Evet (*Ewet*).

Castor Fiber.
Hód (*Hood*).

Lutra vulgaris.
Vidra (*Widra*).

Mustela Martes.
Nyest (*Njeschtt*).

Mustela Putorius.
Göröny (*Görénj*).

Mustela Zibellina.
Nyuszt (*Njusst*).

Mustela vulgaris.
Menyét (*Menjét*).

Mustela

Mustela Erminea.
Fegymet (*Pedjmet*).

Felis Leo.
Oroszlány (*Orosslaanj*).

Felis Tigris.
Tigris (*Tigrisch*).

Felis Pardus.
Párdutz (*Pahrdutz*), Tarka Párdutz (*Tarka Pahrdutz*).

Felis Catus.
Bak-matska (*Bak-matschka*) (mas); Matska (*Matschka*) (femina).

Felis Lynx.
Hiûz (*Hius*).

Canis familiaris.
Eb (*Eb*), Kutya (*Kutja*) (mas); Nöstény-kutya (*Nöschtenj kutja*) (femina); Komondor (*Komondor*) (domesticus); Pumi (*Pumi*) (Spitz *german.*); Vetzere (*Wezere*) (fricator); Szeléndek (*Sseléndek*) (Moloffus); Kopó (*Kopoo*) (fagax); Vizsla (*Wischla*) (auicularius); Agár (*Agahr*) (grains); Sinkuráta kutya (*Schinkurata kutja*) (vertagus).

Canis Lupus.
Farkas, (*Farkasch*).

Canis Vulpes.
Róka (*Rooka*).

INDEX GENERVM.

T

INDEX SYNONYMORVM.

Alawata

Bacore

Blanc-

Cavia

Coqual-

Elsdjur

Get

Gronoſtay

Hyen

Kanin-

Kuh

Liévre

Mauſe-

Mom-

Mules

Numola

Oſſo

Phy

Rotta

Schwerdt-

Speck-

Suco-

Ta-

Teletz

Tor-

V.

Viel-

Waterdog

INDEX
SYNONYMORVM GRAECORVM.

Καρωρ

INDEX

SYNONYMORVM RVSSICORVM.

Г.

Слонъ

ERRATA.

ERRATA.

pag.	lin.		pag.	lin.	
11	9	Altitudo	235	6	Βισωνες
16	4	vnguibus.	266	24	Africa
26	26	Cercopithecus	269	14	Chamoise
27	23	desinens	289	4	Baikal
39	4	siue	296	29	rigi-
57	13	*Parsons*	303	2	Elaphus
62	14	labio	304	28	Cerf
	17	bovenlip	311	vlt.	Dendl
63	3	Edw.	317	21	vere
73	14	nimis	319	5	Iugulum
84	20	insiliunt	321	2	moschiferus
90	18	Oouatirioüaou	322	1	orificiisque
94	1	Tamanduá	323	34	femina
96	7	Tamanduá-I		vlt.	Hallenii
	8	Myrmecophaga	324	22	Bancroftio
99	7	tab. 6	325	2	without
100	2	Natursf.	328	21	Delectatur
	17	rotundatae.	346	25	Hystrix
102	8	Cauda	355	16	Konyn
105	17	Schild-	368	24	refectae
112	33	zwölf	379	2	doctiss.
117	28	gefleckte	388	12	boreali
123	20	dan 't	397	12	Erdzeisl
126	28	Murgaño	405	8	I. G.
134	26	tregterswyze	441	14	Sarrasin:
136	9	van	444	vlt.	fissis
	30	Vespertilio	445	13	hiemem
170	32	Erinaceus.	465	2	Gad-fe
181	24	domesticis	470	11	Fisher
183	7	instructa		27	sibirica
	23	ad regionem	475	34	Горностай
197	17	loschad'	480	29	et
198	5	terri-	570	25	Vulpeculae
	7	insulis	596	32	Manatus
214	21	Caput	608	22	een
219	21	Camelus		33	Reydur

[illegible] maculata 193
[illegible] 185
[illegible] 118
[illegible] 119
[illegible] 193
[illegible] 154
[illegible] canus 155
[illegible] 161
[illegible] 165
[illegible] 167
" [illegible] 185
[illegible] 235
[illegible] 101
[illegible] 330
[illegible] 364
[illegible] 363
" Canadensis
[illegible] 418
Myer 417
[illegible] 416
[illegible] 421
[illegible] 420
striatus
[illegible] 426
[illegible] 440
Castor fiber
[illegible]
[illegible] 449
[illegible] 456
[illegible]
[illegible] 567

Patkány Sorex ein Spitzmaus, Mutzer.
Ürge Cuniculus Gurgulio Curculio ein Korn-wurm.
Gözü Gurgulio ein Luftröhre